









IOANNIS
TAGAVLTII
AMBIANI VIMACI,
PARISIENSIS MEDICI, DE
CHIRVRGICA INSTITVTIO-
NE LIBRI QVINQVE.

His accessit sextus liber de Materia chirur-
gica, authore Iacobo Hollerio Stem-
pano, medico Parisiensi, una
cum Indice copiosissimo.




VENETIIS

EX OFFICINA ERASMIANA,
VINCENTII VALGRISII.

M. D. XLIX.

ex libris Francisci de Cuvier



Catalogus librorum.

Primus liber, tradit tumores præter naturam. Pag. 1.

Secundus liber, generatim de plagis seu cruentis vulneribus tractat. pag. 199.

Tertius liber, est de ulceribus curandis. pag. 397.

Quartus liber, fracturas tradit, & curat. pag. 495.

Quintus liber, luxata ossa distinguit, & reponit. pag. 535.

Sextus liber, materiam chirurgicam docet. pag. 556.

Index in fine adiectus est. pag. 660.

NOBILI ET EXIMIO

THEOLOGO, DOMINO BAR.

THOLOMÆO A' CASTROMYRO,

Canonico, Decanoq; Curienſi, Antoa

nus Stupa Rhetus S. P. D.



AMETSI COM

munis epistolarum dedi-
cantium usus sit, Vir hu-
manissime, aut authoris

laudes & industriam prædicare, aut
operis utilitatem enunciare, (quod hic
noſter in ſua præfatione ad lectorem
facit) aut eius cui dedicatur cùm ſtem-
matis claram nobilitatem, tum celerem
ingenij in rebus peragendis ſolertiam
demonſtrare. Horum tamen hic nihil
agetur, cùm author ipſe poſtremum
ſua ad Franciſcū Galliæ regem epiſto-
la mediocriter ſit proſecutus, & quàm
neceſſaria ſit & utilis cognitio medi-

cinae, quæ à manuum operatione, χα-
εργία Græcis dicitur, cum exhorta-
tione ad eius institutionem, copiose
et rationibus et exemplis docuerit.
Nam cum qui bona methodo ducti in-
uentum suum omnibus communicant,
id unicum spectent, ut suo exemplo do-
cti reliqui id sagaciter edoctum uel cu-
mulent, uel aliud simile aut melius inue-
niant, minimeque uelint sua in alium,
quem ipsi non respexerint, usum con-
uerti: non malignum nobis uisum est,
si illis omnibus præteritis, sola hic la-
boris exhausti ratio cum omnibus stu-
diosis, tum tuæ prudentiæ perpenden-
da subiiciatur. Nouit tua amplitudo,
quomodo duodecimo abhinc anno in
abeuntis cuiusdam nostratum stipen-
dium, quod ex sua liberalitate Chri-
stianissimus Galliae rex, nostræ pa-
triae

triæ annuatim donat, ediscendæ medi-
cinæ ergo, suffectus fuerim: & quo-
modo Luteciam Parisiorum ob id pro-
fectus in aduersam ualitudinem, &
misera cùm bellorum tum morborum
epidemiorum (miserum aspectum)
tempora inciderim. In his calamitati-
bus usus ego cùm multorum honoran-
dorum doctorum solertia, tum maxi-
mè Ioannis Tagaultij, & Iacobi
Hollerij, præceptorum mihi semper
honorandorum, & familiaritate &
eruditione profeci, non quantum uolui,
sed quantum ob memoratas causas li-
cuit. Horum ergo præceptorum meo-
rum (ut reliquas peregrinationes,
Montempeffulum, Auinionem, Lug-
dunum omittam) opera hic ex typo-
graphorum negligentia deprauata ad
me cùm deferrentur inspiciunda, non

tollerabile uisum est hos tales, non
modò de Chirurgia & omni medici-
na physicali benemeritos, sed de omni
bonarum literarum professione, ex
aliorum culpa & negligentia male au-
dire. Itaque deposito omni calumnian-
tium metu, eos de maleuolentium fasci-
no uindicare studui, adhibita uidelicet
uariarum æditionum collatione, quò pu-
ri ipsi, purè quoque ab omnibus & le-
gantur & ediscantur. Quin & in hoc
Diuinæ naturæ munera me secutum ar-
bitror, dum eodem labore in æternum
obseruandi Doctores de inuidi morsu
uindicantur, & tuæ celsitudinis libe-
ralitas cum susceptoris mei & fratris
tui Iacobi à Castromuro nobilitate
protestantur, non pro meritis, ne-
que quantum illarum amplitudo (quo-
niam infinitæ sunt) exigat, sed quan-
tum

tum præsentis operis & laboris magnitudo patitur. Quò ergo in posterum tuti & sinceri hi de chirurgia libri permaneant, tuæ celsitudini eos dedicamus, scientes & id præceptores meos uelle, et tuam in bonis literis solertiam id tueri posse. Christianissimum Galliae regem (ad quem missi sunt) hos sedulo uindicare (unde & puri à suis leguntur) non negamus, sed quoniam unus ubique esse non potest, & à bonis & integris ad corruptionem facilis est transitus, non grauaberis credo tuam manum his dare, & unà mecum hanc gratiam bonis præceptoribus referre. Vale. Venetijs ex typographia Erasmana Calen. Maij M. D. XLIX.

IO ANNI ANTONIO
LEONICO BASSIANVS
LANDVS S. P. D.



ANTIQVOS scripto
res multum amo, & ob
seruo, tum propter mi-
ram rerum cognitionem,
tum propter singularem dicendi
rationem, atque facilitatem. Ex quo
incredibili quodam desyderio te-
neor, fauendi (quantum possum) il-
lis uiris nostri temporis, quos ui-
deo eloquentiam feliciter cum scien-
tia coniungere. Id sane institutum
mihi magnopere probatur, pro-
pterea quod bene, & praeclare
actum fuisse cum studiis literarum
annis superioribus animandueto:
quibus Picus Mirandulanus, Her-
molaus Barbarus, Marsilius Fici-
nus, caeterique eiusdem ordinis ui-
ri in

ri in ratione imitandorum ueterum, omnem operam posuerunt. Quocirca his proximis diebus, cū incidissem in hoc opus Tagaultii, in quo mihi uidetur literis Latinis Chirurgica Ars esse illustrata, non potui non uehementer lætari, & ualdè collaudare atque admirari. Hac mea collaudatione, & consilio adductus, Vincentius Vaugris familiaris meus imprimendum elegantissimis typis curauit. An igitur iure laudibus extulerim, & optimum consilium dederim, uolui te iudicem constituere. In huiusmodi enim manuum opera magna cū laude uersaris, & mirabiliter acquiescis. Sanè Tagaultius Methodum curandi tumores præter naturam, uulnera recentia, ulcera, fracturas, luxationes, mea quidem sententia,

tentia , perinfignem & eruditam
feruat : in ordine autem medican-
di singulos, mira dispositione mihi
uti uidetur . Differentias nanque
multiplices determinat: nomina in-
terpretatur , & distinguit : causas
cùm euidentes tum abditas , hoc
est, antecedentes, & proximas , in-
uestigat: signa tam propria, perpe-
tua ue , quàm communia & fuga-
cia notat : locos etiam num unde
ipsa depromi possint, apertè osten-
dit : indicia diligenter profert : ad
extremum curationem inchoat &
perficit . Ad hæc accessit ingens
sylvæ illorum medicaminum, quæ
usui sunt chirurgo . Medicamen-
ta porrò sunt ea , quæ habent po-
testatem repellendi , attrahendi ,
resoluendi, molliendi, pus mouen-
di , uomicas aperiendi , purgandi,
inducendi

inducendi cicatricem, carnem ge-
nerandi, glutinandi, dolorem le-
niendi, sanguinem sistendi, ossium
uitia tollendi, exurendi. Habes igitur
quid præcipuum admirer in
hoc opere. Tu uerò, interea cer-
torem me facies, quid desydera-
ri maius possit, quod ad institutio-
nem chirurgicam pertineat. Vale
III. Cal. Decemb. Venetiis.

PETRI CRVSELII ME-
DICI IN OPERIS HVIVS
COMMENDATIONEM
Hendecasyllabum.

*Ars chirurga diu malis magistris,
Lanfranco, Albucasi, Guidone, Bruno,
Rollando, Rogero, Vigonioq;
Indignam malè passa seruitutem,
Cæcis delituit gemens tenebris.
Olim iam medicas duas sorores
Emersisse uidens, gradu citato
Ad claros studijs uiros, & usu
Illustres medicos Lutetianos,
Tendit suppetias petens, opemq;
Cunctantur reliqui: Tagaultus unus
Afflicte lachrymas dolens, uicemq;
Et sordes, habitumq; non herilem,
Ornatu decorat nouo, reducens
Densis è tenebris, ut æmulari
Germanas meritò queat sorores:
Sic putres Arabum lacus repurgat.
Nam quod Cous habet senex, quod ipse
Huc spectans tot habet libris Galenus,
Hic totum poteris uidere Lector,
Descriptum methodo breui. Proinde,
Summo (iudice me) est honore dignus,
Vindex pæoniæ Tagaultus artis.
Quo chirurgia tam bono magistro,
Et doctore, tibi expolita prodit.*

CHRI.

CHRISTIANISSIMO

GALLIARVM REGI FRANCI-

SCO, SIVS NOMINIS PRIMO,

IOAN. TAGAVLTIVS

MEDICVS S. D.



INTER EXIMIAS PRAE-
clarasq; animi dotes, ac uirtutes pro
pè diuinas, quibus ceteris principi-
bus tantum antecellis, quatum digni-
tate, opibus, potētiaq; & imperij ma-
gnitudine illis omnibus praestas: ea mihi potissima sem-
per uisa est, Christianiss. simul & inuictiss. rex, quod
nullum unquam tēporis momentum praeterlabi sinis,
quo non aliquid cogites aut agas, bono ac saluari prin-
cipe dignum. Siquidem quicquid ocij ac temporis à ne-
cessaria cura corporis tibi superest, tu id omne uel
Reipub. tuæ sapienter moderandæ, uel honestis atque
optimis disciplinis (quæ secundas res ornant, aduersas
solantur) tribuis: ut ne in uenatione quidem ipsa, qua
colligendis & animi & corporis uiribus interdum ute-
ris, tibi temperes, quin uel de principatus tui admini-
stratione, uel de ferarum quas persequeris, aut stirpiū
quæ tunc se oculis obijciunt, aliarum ue rerum natura,
ferè semper disputes. Quo fit ut Minervam non mi-
nus quam Dianam, errare in montibus & syluis su-
binde experiaris. Sed & in mensa illa tua regia, fre-
quenti principum, illustriumq; uirorum Cardinalium
& Episcoporum conspectu ac confesso, semper aliquid
ardui, doctiq; & honesti, contra morem & exemplum
aliorum

aliorum principum, non eorum modò qui nunc sunt,
 sed qui multis ante hac seculis fuerunt, è media philo-
 sophia atque antiquitate depromitur: ut rectè estiman-
 ti ea sapientiæ uerius officina, quàm epulum regum
 possit uideri. Aut enim humane eademq; graues et
 te principe dignæ, aut diuinæ quæ animum ad religio-
 nem informant, in ea recitantur historiæ, aut de omni
 genere artium atq; disciplinarum disputatur. Hinc fa-
 ctū est, ut Gallorū Respub. inde adeò quòd illi præfui-
 ssi, uirtute honesta, religione ac pietate integra, iure
 et legibus æqua, opibus firma, copijs locuples, et glo-
 ria ampla semper fuerit. In hac autem assidua litera-
 rum concertatione, tu quasi arbiter honorarius, inter
 doctos homines de rebus controuersis, ut olim in ency-
 clijs et scholis suis (si parua magnis cōferre phas est)
 facere solebāt, magistri ac philosophi illi ueteres, non
 minore eloquentia quàm dignitate iudiciū interponis,
 grauerq; decernis. Quid quòd tu omnem omnium
 artium materiam, rationem, et instrumenta, in numera-
 to habes, atque appostitis nominibus exprimis. In quo
 Themistoclis, Mitridatis, Cyriq; Persarum regis memo-
 riam facilè superas, uel obscuras potius. Sed et cū
 de re medica (ut aliquid de ipsa separatim dicamus) di-
 sputatio incidit, (incidit autē frequenter) tu res medi-
 cas non aliter tractas quàm qui omni uita nihil aliud
 egerit. Nec aliter statuis, quàm qui in ea disciplina cō-
 sensuerit: ut et præceptiones artis, et medicamentorū,
 præsertim simplicium nomina et uires, ipsamq; corpo-
 rum anatomen (cuius speculatione incredibiliter dele-
 ctaris) ad unguem teneas, consilia curandi sapientissi-
 mē distinguas, uim remediū adnotes, quid unum-
 quodque

quodque proſit, quid noceat, aptè & acutè definiat. Quanquàm uerò hoc bonarum artium ſtudium, quod nunquàm intermittis, præpoſtere nati quidam, & ab omni ingenij cultu alieni, tanquàm parum regium ir-
rident atque damnant. Tu tamen, Princeps longè ma-
xime ac ſapientiſſime, regiarum uirtutum fundamen-
tum, & clarifſimum boni ac ſalutaris principis orna-
mentum ponis, uerè cum Platone nobiliſſimo totius
Græciæ philoſopho dijudicans, non aliter felices fore
reſpub. niſi ſi aut philoſophis cõmitteretur imperium,
aut quibus imperiũ contigiffet, philoſophiam ſequerẽ-
tur. Salomõ cum pro Dauid patre ſuo regnare cõcepit,
tantum ſapientiam à Deo poſtulauit, quarectè iudica-
re, & populum ſibi commiſſum ſapienter gubernare
poſſet: atque hic nihil aliud inculcabat filio ſuo, quàm
amorem ac ſtudium ſapiẽtiæ. Nec abs re quidem: nam
fato ſceptra cadunt, doctrinæ autem gloria perennis.
Quod tu etiam animo reputās, nihil unquàm charius,
nihil antiquius duxiſti, ſapientiæ ſtudio, atque aſſidua
eiufmodi bonarũ artium tractatione: ex qua tãtos iam
progreſſus in omni uirtute, atque omni diſciplinarum
genere feciſti, ut Imperatores illos, & belli duces cla-
riſſimos, Alexandrum magnum, Iuliũ Cæſarẽ, Octauĩũ
Auguſtum, Scipionem Africanum, nõ minus literarum
ſcientia, quàm bellicis artibus præſtantes, facile ſupe-
raueris. Sed & hac doctrinæ cupiditate, qua ſemper to-
tus ſic flagras, tu non ſolum eorum quibus imperas for-
tunis & coporibus, uerũ etiam animis excolendis,
multarum rerum uſu ac ſcientia edoſtus, prudẽter ac
ſapiẽter (quod uerè eſt imperare) conſulis proſpiciſq̃:
dum ſcilicet infinitos propemodũ homines, ac nobiles
maximè,

maximè, certatim ad studia literarum tuo exemplo excitas atque incendis. Regum enim mores, reliqui ciues ferè sequuntur. Hinc non abs re tanquã ad certissimũ rei literariæ præsidium, externi etiam homines, qui arte aliqua præstant, ad te unum undique confugiunt, teq; musarum patronum ac fautorè eximium agnoscunt, et prædicant. Quæ res effecit, princeps humanissime, ut depulso metu, aucta spe, hosce de chirurgia commentarios tibi consecrarem, ut scilicet in ista tua felici agri cultura, qua semina omnium bonarum artium, in hunc fecundissimum agrum tuum, tum etiam in totum terrarum orbem, dispergis, aliquam operæ partem suslinerem: utq; aliquid ex clarissimo tuo nomine patrocini nanciscantur, auspiciatiusq; in uulgus prodeant. Sed ad id etiam me uehementer impulit, quòd haud ita pridè, sermone in mensa illa tua semel atq; iterum de chirurgia habito, quod in reliquis literis, Græcis, latinis, hebræis cœperas, idem in hac quoq; arte, quæ manu me detur, te facturum spopodisti, teq; unum aut etiam alterum doctum, & longo iam usu exercitatum medicũ in stitutum, qui chirurgiam Lutetiæ Parisiorum diligenter ac fideliter interpretentur. Atque hoc quidem tuũ tam sanctum tamq; salubre institutum, nobis aliquãdo retulerunt ἀρχίαρχος & Burgensts, Capellanus pater, & Gulielmus Milletus, medici tui clarissimi, simul & fidelissimi. Fecerat idẽ quoque paulò antè amplissimus Cardinalis Bellaius, uir omni uirtutum ac scientiarum genere cumulatissimus, ac reip. Gallicæ longè amãtiss. Qui omnes me uehementer aliquoties hortati sunt, ut chirurgicam hanc lectionem maturè aggrederer, eam quidem tibi futuram quàm gratissimã affirmantes, teq; statuissè

statuisse unum aut alterum eius artis professorem Lu-
 tetiæ instituire: arbitratus amplissimo hac ac præpo-
 tenti tuo imperio, rem non utilem modò, sed & appri-
 mè etiam necessariam futurā. Quippe quòd deinceps
 chirurgos non parùm multos haberes in regno tuo, uul-
 neribus & fracturis ritè curādis, luxatisq; decèter in
 suam sedē reponendis, maximè idoneos. Ceterum ta-
 met si hac medicinæ parte, nulli sæpe non sit opus, nobi-
 lioribus tamen & principibus uiris, atque ijs etiam
 omnibus qui castra sequuntur, & militiæ addicti sunt,
 in primis necessaria est. Hi enim dum equis ad celerita-
 tem dispositis huc atque illuc excurrunt, dū ludis eque-
 stribus exercentur, dum in bello cum hoste conflentan-
 tur & dimicant, fracturis & luxationibus, ut interim
 uulnera taceam, nunquàm nō expositi sunt: quibus, nisi
 ritè tractentur, uel subinde periclitantur, uel membris sic
 affectis, suo tandem robore destitutis, reliquum uitæ tē-
 pus, miseri & imbecilles trahūt. Sed ut unde digressa
 est redeat oratio, quòd nondum hæ nostræ chirurgicæ
 institutiones erāt absolutæ, tantisper disuli clarissimo
 rum, quos supra nominavi, uirorum hortationi pare-
 re, quoad hoc, qualecunque est, opus absolueretur. Dum
 autem cudendo nimis cunctatur typographus, hominē
 ut alijs medicinæ partibus præstantē, sic chirurgiæ pe-
 rittia egregiè instructum, Vidum Vidium Florētinum,
 doctissimi unde quaque uiri, ac præstantium ingeniorū
 studiosiss. D. Castellani Tutelēsium episc. singulari iu-
 dicio conquistum, maximo rei chirurgicæ studio so-
 rum, atque eorum qui deinceps chirurgiæ præsidio in-
 digebunt, commodo, in hanc præclarissimam urbem mi-
 sisti, qui partem hanc medicinæ, propè desertam & ia-

centem, quo ad fracta saltem & luxata pertinebat, susceperet, atque extolleret. Librosq; Hippocratis (qui primus hanc artem excoluit) inextricabilibus penè sententijs, ob fecundam & obscuram nimis breuitatem, ubiq; ipsi medicinae parenti familiarè, ne dicā affectatā refertos; & ab eo nuper cum doctissimis atque accuratissimis Galeni commentarijs, latinos factos, magna sermonis elegantia; & rerum copia, interpretaretur. Quòd si hic, aut alius quispiam pari doctrina & eruditione præditus, in hoc docendi curriculo persisterit, bonis chirurgis, ut medicis, Galliam tuam breui referam iri confidimus. Quod non mediocri mortalium bono, & cum sempiterna quoque nominis tui gloria eueniet. Quàdoquidem effectus chirurgiæ, (quæ Celso auctore pars est medicinae uetustissima) inter ceteras artis medendi partes euidentissimus est, & maximè necessarius, nedum utilis. Siquidem in morbis cum multum (inquit ille) fortuna conferat, eademq; sæpè salutaria, sæpè uana sint, iure dubitari potest secunda uale tudo, medici nē industria, an corporis beneficio contigerit. In his quoque affectibus, in quibus medicamentis extrinsecus admotis maximè utimur, quamuis profectus euidentior est, tamē sanitatē & per hæc frustra queri, & sine his reddi sæpè manifestum est. Sicut in oculis uel phlegmone, uel lippitudine arida, aut ea humorum defluxione, quam epiphoram appellant, laborantibus quotidie deprehēdimus, qui à medicis, collyrijs, aut alterius generis medicamentis diu uexati, sine his aliquando sanescunt. At in ea parte quæ manu curat, (Χειρὸς γυμνῆς Græci nominant) euident est omnē profectum, ut aliquid ab alijs adiunetur, hinc tamen potissimum

ortuna

mum manare. Quot enim morbos, eosdemq; grauissimos, in rusticis & urbanis qui delicatiores sunt & medicinam auersantur, quotidie uidemus, sine illa uictus ratione tam exacta, nullisq; adhibitis medicamentis, naturæ duntaxat beneficio euinci, & profligari? At si cui uel crus uel brachium fractum sit, uel luxatus humerus, aut quispiam articulus: nunquã sine manus opera, & chirurgi industria ad sanitatem perducetur. Itaque cū tanta sit eius artis dignitas, usus, necessitas, quis hoc tuum tam salubre de constituendis chirurgiæ professoribus, institutum non maximopere probauerit? Opus sanè & liberali & magnifico principe dignum, & quod Romanorum olim iūperatorum exempla, & laudata consilia reuocabis. Hi enim medicis (quod Reip. salutares & necessarios nouerant) amplissimum stipendium ducena & quinquagena annua sestertia, centena uerò Rhet. & poetis, reliquarumq; disciplinarum professoribus pendebant: intellexerunt nimirum illi semper Augusti imperatores, inter disciplinas excellentibus illustrium hominum ingenijs inuentas, & incredibili grauium uirorum cura & industria perfectas, expolitasq; Medicinam principem ac reginam existimari sine controuersia debere. Hæc enim & honestatis splendore, et utilitatis magnitudine, & iucunditatis illecebris, reliquas omnes uincit, rebusq; humanis ceu altera secundum Deum, uitæ parens & uindex apprimè est necessaria: atque ideo non solum à Philosophis, aut Medicis, sed et ab ipsis quoque Imperatoribus, Regibus, atque etiam Pontificibus, aliquando non oscitanter exulta. Neque enim puduit illos primi ordinis uiros, studium atque industriam in eo genere disciplinæ nonnunquam colloca-

Augustus Caesar

Tiberius

C. 10

re. Et ut aliquot exempla proferamus: Augustus Caesar, compositione medica à se inuenta lubenter utebatur, quam postea plerique medici in suos libros tràsulerunt. Tyberius pasillum (Græci Trochiscum uocant) ad herpetas, Galeno teste, composuit. Nero imperator illaudatus quidem, sed tamen apprimè doctus, partem studij in hoc genere doctrinæ posuisse fertur. Hadriani et Iuliani antidota nomine ab eis accepto, hodie quoque apud medicos celebrantur. Princeps Arabs Aui-cēnas in remedijs medicis à se conscriptis, testimoniū Kabithi regis locis aliquot laudat. In Serapionis commentarijs Iacibussa Medorum rex, et Kemud item rex, uelut medicinæ testes memorantur. Lysimachus, Gentius, Eupator, et Clymenus reges, medicæ artis non ignari, suā ipsorum nomina plantis indita, æterno æuo memoranda reliquerunt. Taceo Iubam Mauritanie regem, qui herbam Euphorbiam nomine, miris laudibus celebravit. Prætereo et Archelaum, Hieronem, Attalum, et Philometora reges, qui de plantis Græcè scripserunt. Ex pontificibus autem Nicolaum quintum, et Eusebium, arte et professione medicos fuisse, in historijs nostris legimus. Ac de re quidem eiusmodi apud multos tam ueteres quàm nostræ ætatis scriptores, facundia et eruditione percelebres, in commendationem dignitatis et excellētiae medicæ artis, ac medicorum, longè plura literarum monumentis tradita sunt, quæ hoc loco referre et longum esset et minimè necessarium: eoq; magis quòd id iam cumulatè præstitit Andreas Tiraquellus tuus in curia Parisiensis cōsiliarius, uir optimis quibusq; disciplinis instructissimus, ac lingue utriusque Græcæ et Latine, iurisq; prudentiæ,

quam

quam summa cum humanitate & morum integritate
coniunxit, peritissimus: in opere quod de nobilitate
& iure primigeniorum mox in lucem est editurus.
At uerò non est, Rex illustrissime ac sapientissime,
quòd peregrina iam exempla commemorem, cum tu
nulla in re ueteribus cedas, adeò ut qui in posterum
medicinam, ac bonas omnes disciplinas (quæ te prin-
cipe & auctore suo splendori restituta sunt) aucto-
ritate principum commendare uolent, non habebunt
necesse ueteres illos clarissimos Cæsares, Alexan-
dros, Tyberios, Hadrianos, Iustinos, uel reges
alios, aut Pontifices amplius requirere, sed te unum
nominabunt, qui disciplinarum omnium intelligen-
tia, & amplitudine stabilis ac præpotentis imperij,
ueterum nemine sis inferior. Fœlicissimam igitur
Gallorum rempublicam iudico, quæ te regem tam
prudentem, tamq; salutarem, omnibusq; uirtutibus
& disciplinis ornatissimum, diuino numine consecra-
ta, rebus omnibus ad beatè degendam uitam conse-
rentibus, ita abundat, ut hodie uniuersi terrarum
orbis tractus omnes, & omnem antiquitatem supe-
ret. Sed multò adhuc fœliciores eam fore confidi-
mus, si te diutius incolumen, & quotidianis Reipu-
blicæ uulneribus medentem, eiusq; partes omnes il-
lustrantem habuerit. Quamobrem Deum optimū ma-
ximum precor, ut populum ab eo tibi commissum an-
nos adhuc quamplurimos, hoc salutare imperio rege-
re possis. Quo enim ij plures erunt, plus ad cumu-
lum fœlicitatis huius amplius. simul & Christianiss,
regni baud dubiè semper accesserit. Vale.

AD LECTOREM

PRAEFATIO.



CIRURGICEN GUIDONIS Cauliaci, abhinc centum & septuaginta annos, tanto apud medicos iuxta ac chirurgos in precio habitam, septennium ferè eius artis candidatis prælegi. Quam cum tot passim errorum ac mendarum portentis scatentem, tamq; inculta, squalenti, atque impura barbarie conspersam, ne dicam conspurcatam, reperissem: tum in animum induxi meum, opus eiusmodi, ab illis quibus ita refertum erat erroribus repurgare, & à uocabulis illis sordidioribus, atque ex intima ferè plebeij sermonis face acceptis, si quando per ocium liceret, pro mea uirili parte, uindicare. Videbam enim plerosque omnes, qui in disciplinis humanioribus & elegantioribus literis probè erant instituti, scèdam eiusmodi, atque impuro nimis sermone traditam chirurgiam auersari, ab eiusq; lectione, uel in ipso uestibulo adituq; perterritos, statim se subducere: nimirum existimantes (nec ab re quidem) disciplinam omnem detractò cultu orationis sordescere. Contrà autem considerabam, chirurgicos hosce commentarios, remedia quàm plurima, ad eos affectus quæ manus operam desiderant, longè optima & efficacissima continere: ac methodo tum ad rectè docendum, tum ad facile discendum aptissima conscriptos esse. Itaque operis huius

buius non poenitendi, nec usque adeò (ut existimo)
 aspernandi prouinciam, eo consilio subiui, ut ipsum
 à mendis, quibus scatebat, foedioribus uindicatum,
 ueluti reformarem, & quanta maxima possem diligen-
 tia ac fide recognitum, in lucem proferrem. Pluri-
 ma igitur ex Galeno & Hippocrate à Guidone ipso
 desumpta, deprauatè ac perperam ex uetere illo bar-
 baro interprete citata, uel ex doctis & fidelibus La-
 tinis interpretibus in sensum germanum restitutumus,
 uel ad fidem græci exemplaris in Romanum sermo-
 nem foeliciùs conuertimus: eaq; non rarò, si quando
 obscuriora adparebant, sermone magis dilucido ex-
 plicuimus: quæ uerò breuitas suppresserat, aut am-
 bigua effecerat, sic expressimus, ut omnis ambigui-
 tas tolleretur. Corruptas morborum penè omnium,
 de quibus differebat, & remediorum præsertim sim-
 plicium uoces propè innumeras abiēcimus; & alias
 magis germanas, lectas, & proprias tum græcas tum
 latinas in locum illarum suffecimus. Adhæc, locos
 quàm plurimos densissimis obscuritatis tenebris ob-
 ductos, penitusq; retrusos, in lucem clarissimam, non
 mediocri labore & diligentia reuocauimus. Græcas
 item dictiones, & latinas sanè multas cum barbaris
 & Arabicis aliud longè significantibus turpissimo er-
 rore confusas, distinximus & explicuimus. Romanas
 quoque etymologias, græcis uocibus ineptissimè attri-
 butas, reiecimus: & ueram illis interpretationem,
 ex probatis authoribus, iuxta linguæ utriusque pro-
 prietatem adiecimus. Quæ falso erant ab eo posita;
 (erant autem non parum multa) emendauimus, &

rationibus firmissimis, adiectis etiamnum classico-
rum authorum sententijs ad rem uel maxime facien-
tibus, refutauimus. In reliquis, quæ crassam nimis,
supinamq; barbariem respiciebant, ea paulò tersius ac
nitidius, ne lectori sordescerent, expressimus. De-
nique Guidonis commentarios de chirurgia conscri-
ptos, ex purissimis Græcorum, uidelicet Hippocrati-
tis, Galeni, Pauli Aeginetæ, & Aëtij Amideni fon-
tibus, ac longè eruditissimis atque elegantissimis Cor-
celsi de re medica libris, ita locupletauimus & illu-
strauimus, à mendisq; illis sordidioribus, ac porten-
tosis erroribus, quibus passim deformati erant, ex-
purgauimus, ut non iam amplius Cauliaci illius opus,
sed nostrum meritò omnibus dici & æstimari possit.
Quod & me etiam tacente facile uidebunt, ac (nisi
iniqui fuerint æstimatores) ingenuè fatebuntur, qui-
cunque nostras has institutiones chirurgicas accura-
tius perlustrauerint, & eas cum scriptis Guidonis
conferre non fuerint grauati. In quibus (fateor) or-
dinem illum à Guidone constitutum, (quòd nobis, ut su-
prà diximus, longè optimus uideretur) ubique ferè
obseruauimus. De quo nonnihil modò, quando id præ-
sens locus postulare uidetur, obiter dicemus. Itaque
à definitione eius ipsius de quo agitur, iuxta Philo-
sophorum præceptum, semper auspicamur. Mox
quod iam definitione explicatum est, in suas diffe-
rentias diuidimus. Post hæc causas, signa & iudicia
cuiusque subijcimus. Denique uniuersalem curandi
rationem apponimus. Iis sic absolutis, differentiæ
illæ primæ ac (ut ita dicam) genericæ, propria etiam
definitione

definitione circumſcribuntur, & deinceps in ſuas ueluti fibras ſinduntur, quæ notis cuique peculiaribus ſcitè designantur: præſagia deinceps cuiusque propria notantur: poſtremò curandi methodus particularis deſcribitur. Quo ſanè ordine uix alijs (meo quidem iudicio) ſtatui aut excogitari melior potuiſſet. Cæterum nos tantum uniuerſalem methodum eorum affectuum, qui chirurgiæ ſubiectioni ſunt, hinc ſecuti ſumus: quòd hæc abundè ſatis ſit, ijs qui in rationali medicina probè ſunt inſtituti, & corporum ægotantium ac ſingularum partium affectuum temperaturam, ſitum, connexum, ſubſtantiam, figuram, actionem, uſum, & ſi quæ ſunt alia, ex ſcriptis medicorum, ſed Galeni maxime, didicerunt. Itaque ſuperuacancum iudicaui de ijs rursus affectibus, quatenus in ſingulis partibus incidere conſueuerunt, diſſerere. Anatomen quoque (cuius cognitio in primis chirurgus eſt neceſſaria) prætermiſimus, quòd hæc in longè eruditiffimis ac propè diuinis Galeni commentarijs de uſu partium corporis humani, & libris eiufdem de anatomicis adminiſtrationibus, ac quibusdam etiam alijs, ſumma tum arte tum eloquentia conſcriptos, (ut reliquos taceam, qui hac de re noſtra memoria ſcripſerunt) ampliffimè ac fideliffimè doceatur & exponatur. Verum enimvero cum in eiufmodi libris plurima ſint, quæ ualde multis ſubobſcura, quædam uerò alijs prolixè nimis dicta, & parum ad chirurgum pertinentia uidentur, ſi in poſterum cognouerimus noſtros hoſce commentarios ab huius artis chirurgicæ ſtudioſſis hominibus probari, atque

ri, atque ut his accedat anatome (quod iam subodorati sumus) desiderari, quæ iam ante annos aliquot, ea qua fieri potuit breuitate & facilitate in hanc rem quantum satis est chirurgus, conscripsimus, alia editione superis benè fauentibus, ne quid huic operi desit, in publicum emittemus. Quod autem ad sty-
lum attinet, quo in hoc opere, quod totum ad docendum res, easq; non indignas cognitu, est accommodatum, usus sum: non tam religiosus fui, ut illum tam anxium uerborum delectum, tamq; splendendum orationis cultum & ornatum ubique obseruarem, qualem ab omnibus qui in communem utilitatem aliquid scribunt, exigere solent delicatuli isti laudioris eloquentiæ institores, qui omnem dictionem, atque orationem ut putidam auersantur ac respuunt, quæ ex Tulliana officina deprompta non sit: cum tamen Tullius ipse non requirat eloquentiam à philo-
sopho: quam etiam neque Seneca usquàm desiderat, nisi cum paruo constet, cumq; ultrò adest, ut res magnas (inquit) magnificè prosequatur. Ceterum etsi res ipsæ etiam quas hic tractamus, orationis cultum & ornamenta dicendi admitterent, ne uacabat quidem, dum hæc horis succisuius commentabamur, ut singulas tum uoces, tum sententias ita superstitiosè expenderem, & adeò curiosè persequerer. Sed nec licet nobis etiam esse tam disertis, qui seueriores Musus colimus: quiq; non ad ingenij ostentationem scribimus, aut ut uberem famæ messem nobis comparamus, sed publicam duntaxat studiosorum utilitatem spectamus. Atque huius sanè rei nos subinde admonuit

nuit Iacobus Syluius, arctissima consuetudine uel ab ipsa ferè statim ineunte adolescentia mihi semper coniunctissimus: uir cum omni arte ingenua liberaliq; doctrina, tum medicinæ scientia præstantissimus, ut copiosè & crudite eius lucubrationes abundè testantur. Itaque, si rectè iudico, effeci ut stylus noster neque nimis neglectus, neque anxie nimis & ambitiosè elaboratus, sed temperatus & mediocriter cultus uideri possit: quanquàm duobus postremis libris & paulò cultior sit & æquabilior, quippe quòd in eis alià quantum plus laboris & diligentia quàm in reliquis adhibuerimus, & quos sequeremur authores optimos habuerimus. Cæterum alia ædizione, si detur interim nobis ocium, hoc, qualecunque est, opus acrius recoquendi, & diligentius castigandi, futurum confidimus, ut in eo styli disparitas nulla, sed eadem ubique, quoad fieri poterit, æquabilitas (quod artis benè dicendi, atque etiam interpretandi primum caput est) reperiatur. Sed iam satis multa de præsentis operis materia, methodo, deq; toto labore nostro dictum sit: qui an à nobis frustrà uel rectè susceptus sit ac perfectus, aliorum esto iudicium. Restat ut paucis dicamus, cur liber sextus, ad quem toties lectorem quinque nostris prioribus remittimus, nostro nomine non fuerit euulgatus. Id fuit in causa, quòd dum importunis amicorum efflagitationibus urgerer, ut quæ de re chirurgica scripseram, ea æderem, non putabam sextum librum adiungendum: propterea quòd rudem duntaxat, & impolitam quandam syluam congestam habebant eorū, quæ ibi tractanda erant: quam

negotijs

AD LECT. PRAEFATIO.

negotijs plurimis, & familiaribus & publicis occupatus, haudquaquam recognoscere poteram. Itaque id oneris Iacobo Hollerio, lectissimo medico doctissimoq; philosopho, & arte dicendi instructissimo, dedimus, qui sic opus rude & inchoatum à me limavit, expoliuit, locupletavit, & consummavit, sicq; totū immutavit, ut cum ad me rediret, meum esse nequaquam agnoscerem. Quocirca sub illius nomine potius quam nostro, quicquid id erat censuimus euulgandum: ne hominem mihi amicissimum debita laude, meritaq; gloria fraudaremus. Tu lector utriusque labore frue-
re; & Vale.

GENERALIS, ET COM- PENDIARIA CHIRVRGI IN- STITVTIO, FACILI ET ARTI- ficioſa Methodo tradita.



IN PERITO AC RATIO = Duo in chirurgo
nali Chirurgo, duo potissi- desiderantur.
mum desiderantur:

1 Exacta cognitio eius partis ter-
tiæ, therapeutices medicinæ: quæ,
quia manu medetur, *Χειρουργικὴ* Græcis nominatur.

2 Peritia ac solers promptitudo, seu prompta quedã
dexteritas exequendi ea omnia, quæ ad affectus Chi-
rurgiæ subiectos attinent.

1 Vt exactè cognoscatur scientia, siue ars, Quatuor ad chi-
quæ Chirurgica dicitur, scire oportet, rurgiæ cognitio-
nem necessaria.

1 Quid sit Chirurgia.

2 Quæ sit subiecta Chirurgiæ materia, subiectum at-
tributionis nominant.

3 Quis sit finis Chirurgiæ,

4 Quis ordo seruandus sit in addiscenda Chirurgia,
seu quis sit modus procedendi in discenda chirurgia.

2 Vt peritè, pròptè, ac dexterè exequatur
Chirurgus, quæ ad artem quam exercet, per-
tinent, eum cognoscere oportet,

1 Quod nã sit hominis chirurgici officiũ, hoc est, quas
nam operationes in uniuersum chirurgicus exer-
cere debeat in humano corpore.

2 Quomodo manuales suas operationes hic artifex
exequi debeat.

3 Methodũ ac media, quibus deuenire possit in cogni-
tiones

Generalis & compendiaria

1. *tionēs singularum operationum, quas exercere debet in humanis corporibus.*

4. *Cōditiones requisitas, ut probe fiant huiusmodi manuum operationes.*

Quibus cognoscatur quid chirurgia.

1. *Porro cognoscimus quid sit chirurgia, per*

2. *Rationē nominis, quam etymologiam Græci uocāt.*

3. *Diuisionem, quæ & partitio dicitur, ac distributio, diductio uē.*

4. *Definitionem, quæ oratio est eius ipsius, quod definitur, naturam breuiter & aperte ostendens, atque explicans.*

Ratio nominis.

Chirurgia, quod ad rationem nominis attinet, idem sonat quod manuum operatio. Dicta enim est ἀπὸ τῆς χειρὸς, καὶ τῆς ἐργίας, id est, à manu, & opere:

uel ἀπὸ τῆς ἐργίας, id est, ab operatione: siquidē hæc ars manuum opere exercetur. Hinc chirurgus, & chirurgicus, manualis operator: χειρὺν ἔργον enim quasi χειρὺν ἔργον: & χειρὺν ἔργον, quasi χειρὺν ἔργον dicitur.

Est igitur chirurgia, si nominis rationem spectes, manualis operatio, uel ars, quæ docet rectum usum operationum, quæ in humano corpore manu exercentur.

Diuisio chirurgiæ duplex.

Chirurgia bifariam diuiditur; nempe in suas *Significationes diuersas, &*

Partes.

Diuisio chirurgiæ in diuersas significationes,

Prima,

Secunda.

Prima diuisio chirurgiæ in diuersas significationes,

Chirurgia

Chirurgi institutio.

- Chirurgia generaliter accepta.
Chirurgia speciatim sumpta.

Chirurgia generatim accepta, & cōsiderata, *Varia definitio-
nes chirurgie.*
Ars, quæ manus opera, morbos, & eorum sympto-
mata profligat.

Chirurgia uerò pressiore uocabulo, ac specia-
liter sumpta, est

- Tertium therapeutices, id est, facultatis curandi,
seu medicinæ curatricis instrumētum: uel si maius,
pars tertia therapeutices, quæ morbis medetur inci-
dendo, urendo, artus luxatos & ossa suis sedibus mo-
ta, in natium locum reducendo: atque id genus alio
conatu chirurgico, & manuum artificio.

Sed aliter quoque, ab omnibus ferè recēti-
oribus tum medicis, tum chirurgis definitur,
nempe hoc modo:

- Chirurgia, est scientia quæ docet modum & quali-
tatem operandi, præsertim adglutinando seu conso-
lidando, incidendo, & alias id genus, quæ manu fiūt,
operationes exercendo, homines quatenus licet sa-
nitati restituens.

In introductorio uerò medicorū hoc pacto *Alia definitio.*
diffinitur,

- Chirurgia est alieni, ut propriè uocant, per diuisio-
nes compositionesq; cum uia quadam & ratione abla-
tio: adhuc uulnere atque ulcerum humano corpo-
ri accidentium curatio.

Nos autē ex ipsius subiecto & fine, (ex qui-
bus finitio omnis suscipitur) breuē, apertā,
& essentialē sic illi nunc definitionem ac-
commodamus:

Chirurgia

Generalis & compendiaria

Propria & essentialis chirurgie definitio.

Chirurgia est ars, quæ ad humani corporis (cuius præcipuè curam habet) aduersam ualeitudinem, manus præsertim opera & administratione, profligandam, comparata est. uel sic: Chirurgia est ars, quæ præcipuè manus opera & artificio, corporis humani morbos ac uitia propellit.

Secunda diuisio chirurgiæ in sua significata.

Secunda diuisio chirurgiæ, quantum ad illius significatam attinet, cōmuniter talis solet assignari,

Chirurgia theorica,

Chirurgia practica.

Scientia.

Chirurgia theorica est,

Quæ docet, & scientia dicitur.

Chirurgia in se.

Hæc enim per demonstrationem acquiritur, & per cognitionem principiorum artis. Hanc autem quis habere potest, tametsi nulla unquā artis opera exercuerit, ut peritus medicus, qui ad unguem tenet præceptiones artis chirurgiæ.

Arts.

Chirurgia practica, ea est

Quæ per scientiam & rationem inuenta sunt, manuali opera rectè ac promptè nouit perficere. Et hæc inter artes mechanicas adnumeratur. In qua quidem nemo unquam absolutus esse potest, nisi qui in ea frequenter se exercuerit, & alios artis huius peritos, sepius uiderit operari: ac quæ uiderit, diligenter obseruarit. Hanc nonnulli usualem etiam appellarunt.

Diuisio chirurgiæ in suas partes.

Diuisio chirurgiæ in suas partes,

Generales,

Speciales.

Chirurgia quantum ad illius partes generalis, gemina est:

1. Exer-

Chirurgi institutio.

1 *Exercens operationes in membris, seu particulis mollioribus.*

2 *Exercens operationes in particulis durioribus.*

Partes chirurgiæ speciales sunt, scientia quæ docet recta cum ratione operari, circa

Tumores præter naturam,

Plagas, seu uulnera adhuc cruenta:

Ulcera,

Fracluris,

Luxationes, seu dislocationes,

Et circa alia id genus, quæ manus operã desiderat.

2 Subiectum attributionis chirurgiæ, id est, *Subiecta chirurgiæ materia.*
id quod maximè ac præcipuè cõsideratur in scientiâ chirurgica, & circa quod tota eius uersatur intentio, est

Corpus humanum sanitati & ægritudini obnoxium, manus operam exposulans: omnia enim quæ ratione perlustrat chirurgia, & manu facere docet, ad ipsius utilitatem refert & accommodat. Alia uerò ratione consideratum, subiectum est alterius sciëntiæ.

3 *Finis, seu intentio chirurgiæ, est,*

Manus opera & administratione, humani corporis morbos curatu possibiles profligare. Hunc autem scopum nõ semper assequitur, ut postea dicitur.

4 *Modus procedendi in discenda chirurgia, est*

Finis seu scopus chirurgiæ.
Modus procedendi in chirurgia.

A communioribus ad particularia, siue ab uniuersalioribus ad minus uniuersalia.

A rebus notioribus ad obscuriores, & minus notas, quod et in alijs similiter disciplinis obseruari solet.

Hactenus de ijs quæ ad cognitionem chirurgiæ attinēt.

Generalis & compendiaria

2 Nunc de ijs quæ ad eius executionem requiruntur: et primum de operationibus.

Operationes ad
scopum scientiæ
chirurgicæ asse-
quendum neces-
sariæ.

2 Operatiões quas exequi debet chirurgus, ut assequatur intentionem seu scopum aut finem, quem sibi proponit, sunt tres: nempe

1 Continuum diuidere, seu separare.

2 Diuisum seu disiunctum coniungere, atque in probā unionem reducere.

3 Superfluum demere.

Continui diuer-
tium.

Porro continuum separamus,

Incidendo, & excidendo.

Phlebotomando, hoc est, uenam secando.

Scarificando.

Coniunctio di-
uortij continui.

Disiunctum ac diuisum coniungimus,

Vulnera glutinando seu (ut dicunt) consolidando.

Luxata in locum suum adducendo,

Fracturas curando.

Superflui
ablato.

Superuacaneum adimimus,

Tumores qui præter naturam consistunt, auferendo:

Ganglia, carcinomata, nodos, strumas, myrmecias,
& id genus alia radicitus extirpando:

Serosum humorē ex uentre hydropicorū educendo:

Sextum, in manu aut pede, digitum ressecando.

Modus exercen-
di manuales ope-
rationes.

2 Manuales huiusmodi operationes obire ac
que exequi debet chirurgus,

Citò,

Tutò,

Citra dolorem,

Sine ulla fallacia, aut impostura,

Non lucri, aut corradende pecuniæ cupiditate, sed
pia quadam erga proximum affectione.

Siue

Chirurgi institutio.

Siue uanis promissionibus de curandis morbis, qui prorsus inexpugnabiles sunt atque insanabiles, cuiusmodi sunt canceri occulti & exulcerati, uel elephantiasis quæ iam inueterauit.

Rursus ut tuto curet chirurgus, tria sunt propria, quibus intentus sit oportet.

1 Vnum primumq; , ut omnino absolutionem operis consequatur.

Lib. 14. Method. med.

2 Alterum, ut sicubi hunc non consequatur, saltem cubantem non ledat.

3 Tertium, ut uitium non facile reuertatur.

3 Media quibus chirurgus deueniet in cognitionem eorum, quæ illi agenda sunt, tria statuuntur à Galeno.

1 Prima

2 Secunda

3 Tertia

} Indicatio.

1 Prima indicatio (quæ insinuatio est eorum quæ agenda sunt) sumpta ex natura rei cuius finis intentio dicitur,

Prima indicatio quid sit.

Conseruatio eius quod secundum naturam est.

Expulsio eorum quæ præter naturam sunt.

Secundum naturam sunt,

1 Sanitas, id est, affectus secundum naturam ad efficiendum actionem idoneus.

Enumeratio eorum quæ secundum naturam sunt.

2 Cause sanitatis.

3 Effectus sanitatis, id est, actiones quæ secundum naturam sunt.

4 Vires, id est, natura quæ præsens est, & aduersus morbum certat.

5 Consuetudo, quæ uelut altera est natura.

Generalis & compendiaria

6 Tēperatura. Quæ omnia similibus cōseruantur.

Quæ dicantur
præter naturā.

Præter naturam sunt,

1 Morbus, id est, affectus præter naturam per se ac primò actionem ledens.

2 Morbi causa. Quæ nō per se ac primò, sed per accidens, ac secundò (morbo scilicet interueniente) actionem ledit, & impedit.

Lib. de sympto.
differ.

3 Symptōma, speciatim sumpto nomine, id est, accidēs quod morbum sequitur, uelut umbra corpus.

Hæc autem per contraria expelluntur.

Expulsio morbi (cui propriè debetur curatio)

Simplicis,

Compositi, & implexi.

Expulsio morbi simplicis, sic

Per applicationē eius quod morbo contrarium est.

Prima indica-
tio sumpta à re
præter naturam
unde insinuat.

Prima igitur indicatio, à re præter naturam sumpta, nobis insinuat ab ipsa contrarietate, ut

Vnitio.

Refrigeratio

Calefactio

Humectatio

Desiccatio ab humiditate

Minutio

Auctio

Ablatio

Productio

Apertio

Ampliatio

Adstrictio

Reductio in propriam figuram à figura mutata

Repositio

soluta continuitate

caliditate

frigidityte

siccitate

quantitate excedente

quantitate minuta

numero excedente

numero deficiente

obstructione

angustia

ampliacione

Chirurgi institutio.

Repositio in pro- } positu uariato, ut membro lu-
prium locum à } xato, intestino in scrotum de-
lapso, & ita de alijs.

In propulsione morbi compositi considera-
re oportet,

*In morbo com-
posito quæ con-
sideranda.*

Cuiusque morbi contrarietatem,

Ordinem contrarietatis cuiusque adplicandæ.

Vt ordo debitus contrarietatis admouendæ
seruetur, cognoscere oportet,

Quis affectus primùm curari debeat.

Affectus qui primùm curari debet, is est,

Cuius curatio causa est curationis alterius,

Sinè quo alter curari non potest,

Qui magis urget, & periculosior est.

2 Secunda indicatio est, quæ nobis insinuat
an id quò tendimus, & prima postulat indi-
catio, sperari possit: ut

*Secunda indica-
tio quid insi-
nuet.*

An seruare possimus quæ secundum naturam sunt.

An quæ præter naturam sunt, expellere ualeamus.

Secunda igitur indicatio, à re secundum na-
turam sumpta, disquirat, an

Sanitatis recuperatio speranda sit,

Vires ad uitam seruari possint,

Causæ sanitatis seruari possint:

Et ita de cæteris.

A re uerò præter naturam sumpta, hæc in-
dicatio secunda, insinuat, an

Morbi aut symptomatis expulsio, sperari possit.

Causis possimus præcauere.

Porro, nos cognoscimus morbi expulsio-
nem fieri non posse,

*Modis tribus po-
tissimè cogno-
scimus morbum*

Generalis & compendiaria

non posse pro-
pelli, & incur-
abilem esse.

1 Quando morbus ex sua natura seu essentia, incurabilis est, uel elephantiasis iam absoluta, & (ut dicunt) confirmata.

2 Quando laborans renuit auxilia, ad morbi alioqui ex se sanabilis curationem necessaria, ut exempli gratia, excisionem in cancro membrū aliquod particulare occupante. Aut in hydropse paracentesim, id est, prætusionem, & ita de alijs.

3 Quādo curatio morbi nobis propositi occasionē præbet maioris mali: ut si malū mortuū (quod uocāt) in ueteratū, curetur. Aut diuturnæ hæmorrhoides omnino tollantur. Si. n. una ex ijs nō seruetur, periculum est, aquā intercutē, maniam, uel tabē adueniri.

Hippoc. aphor.
12. lib. 6.

Morbus ex sua
essentia incur-
abilis à quibus de-
prehendatur.

Morbū autē ex se, siue ex sua natura incurabilem esse deprehendimus, ex læsæ partis

Substantia,

Actione,

Vsu,

Situ.

Substantia.

Indicatio à substantia sumitur, uel

A' mixtione in $\left\{ \begin{array}{l} \text{Calido} \\ \text{Frigido} \\ \text{Humido} \\ \text{Sicco.} \end{array} \right.$

A' primordio, unde formata sit substantia, & eiusdem consistentia.

Indicatio à mixtione, in calido, frigido, humido, & sicco,

Aequaliter uitata, $\left\{ \begin{array}{l} \text{Insinuat id non posse} \\ \text{præstari, quò tendi-} \\ \text{mus.} \end{array} \right.$

Inequaliter

Chirurgi institutio.

Inæqualiter uitiata, } Insinuat id præsta-
ri posse, quò tendi-
mus.

Indicatio à primordio, ex quo formata est
partis substantia, & eiusdem consistentia,

A' substantia { Solida læsa, } Insinuat nō pos-
se præstari id
quò tendimus.
Carnosa ui-
tiata, } Insinuat id
posse præ-
stari, quod
Spiritali }
oblæsa } prima indicatio postulat.

Indicatio secunda ab actione partis, Actio.

Per quam est uita } Insinuat si perie-
rit, præstari nō pos-
se quò tendimus.

Sine qua uita esse non potest }
Per quam me- } Insinuat si perierit, aliquo modo
lior est uita } præstari posse quò tendimus, sed

Per quam con- } tamen noxam successu temporis
seruatur uita } maiorem futuram.

Indicatio ab usu, seu commoditate, ad alte-
rius affecutionem, à natura insita vsus.

Partis } Necesaria } Insinuat si perierit præ-
ad uitam } stari non posse id quo ten-
dimus.

Actio= } Nō necessa } Insinuat si perierit, præ-
nis } ria ad uitā } stari posse quo tendimus.

Indicatio secunda à situ partis sumpta Situ.

Ad quā me- } Possunt } } posse } } obtineri,
dicamenta } Nō pos- } } nō posse } } quod pri-
pertingere sunt } } } } } ma indi-
catio

Generalis & compendiaria

dicatio postulat, insinuat.

Tertia indica-
tio.

3 Tertia indicatio (quæ remedia inuenit, qui
bus assequi possumus id quod prima indica-
tio postulat, & secunda fieri posse sperat)
nobis insinuat,

† Auxilia opportuna, ad finē quò tēdimus assequēdū.

Remedia oppor-
tuna ad finem
quo tendemus
consequendum.

* Vsum remediorum conuenientium.

† Auxilia conuenientia, quæ & instrumen-
ta dicuntur,

Communia,

Propria.

Remedia com-
munia.

Instrumenta siue remedia communia dicta,
hoc est, quæ omnibus corporis partibus ad-
plicari possunt,

Medicinalia,

Ferrea.

Medicinalia.

Instrumenta medicinalia,

Bona uiuendi ratio, siue (quod aiunt) bonum regi-
men, in rebus sex non naturalibus:

Pharmacia,

In ijs tribus primis appli-

Phlebotomia,

candis, Cbirurgus debet

Emplastra,

peritum aliquem medicum

Vnguenta,

consulere.

Pulueres, & similia.

Vnguenta.

Vnguenta, quibus munitus esse debet chirur-
gus, ut communioribus suæ artis intentioni-
bus satisfaciat, numero sunt quinque,

Basilicum

maturandum, & pus mouendum.

Apostolicū

detergendum siue purgandum.

Aureum

ad

implēdū, seu (ut dicūt) incarnādū.

Album

ad

glutinandum seu consolidandum.

Dialthæū

demulcendum, mitigandum uē.

Instrumenta

Chirurgi institutio.

Instrumenta ferrea communia, quibus utitur chirurgus, sunt

Ferrea instrumenta communia.

Forfices

Nouacula, seu culter rasorius

Scalpellum chirurgicum quod phlebotomon appellant.

Ad incidendum & excindendum.

Cauterium, ad urendum.

Forcipes, uulgò tenacule,

Vulsellæ, seu uolsellæ,

Hamus recuruus,

Ferramentum, quod Diocleum erapiscum græci uocant. Cuius descriptionem & usum uide apud Corne.

Ad extrahendum.

Celsus lib. 7. cap. 5.

Specillum, Ad explorandum.

Acus

Ad suendum.

Cannule,

Ex his magis necessaria, & quæ in usum ueniunt quotidianum atque ideo semper à chirurgo circumferri debent, sunt,

Instrumenta ferrea chirurgo magis necessaria sex.

1 Forfices, fiseaulx Callicè.

2 Volsellæ seu

Vulsellæ, pincettes.

3 Nouacula,

4 Specillum, esprounette.

5 Scalpellum, lancette.

6 Acus.

Instrumenta propria ferrea, id est, quæ aliqui particulari membro dicata sunt,

Ferrea instrumenta propria.

Modiolus, quem χορὴνιον græci uocant. capiti.

Falx,

Generalis & compendiaria

Falx, seu fauceolus.

fedi siue ano.

Speculum oris,

Speculum matrix.

Vsus remedio-
rum.

* Vsus remediorum conuenientium ad fi-
nem propositum assequendum, ex singulis
tractatibus habetur, iuxta uarietatem rerum
(ut uocant)

Naturalium,

Non naturalium,

Et præter naturam.

Item eorum quæ illis

annexa dicuntur.

Res naturales.

Res naturales dicuntur, quæ corporis no-
stri constitutionem ingrediuntur: & hæ nu-
mero sunt septem.

1 Elementa, ignis, ær, aqua, terra.

2 Temperamenta, calidum, frigidum, humidum,
siccum, &c.

His annexa
sunt,
Ætas,
Sexus.

3 Humores, sanguis, pituita, utraque bilis.

Principalia, cerebrum, cor, hepar, testes.

Potentias sortita instas, & manentes à

principibus, pulmo, uentriculus, renes.

Vita industria.

4 Membra { Principibus subministrantia, arteriæ,
uena, nerui, uasa spermatica.

Ab insitis sibi à natura facultatibus gu-
bernata, os, chartil. ligam. &c.

5 Virtutes

6 Operationes } Animales, uitales, naturales.

7 Spiritus

Res non natu-
rales.

Res non naturales sunt, quæ corpus huma-
num, si rectè adhibentur, conseruant inco-
lume: si uerò haud rectè accommodantur
corpori, tunc idem destruunt. Sunt autem
numero sex:

1 Aër,

Chirurgi institutio.

- 1 *Aër, siue ambientis aëris adhæsus.*
- 2 *Cibus & potus, siue ea quæ assumuntur.*
- 3 *Motus & quies, & totius corporis, & partium singularium.*
- 4 *Somnus & uigiliæ.*
- 5 *Inanitio & repletio, siue ea quæ excernuntur & retinentur.*
- 6 *Animi affectus.*

*Annexa sūt, id est
pus, regio, ueni.
balnea, coitus,
consuetudo.*

Res contra naturam, seu præter naturam dicuntur, quæ humanæ naturæ contrariæ sunt, ipsamque demoliuntur, uel lædunt, aut ægrotare faciunt. Et hæ tres sunt numero, ut supra dictum est.

Res præter naturam.

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 <i>Morbus</i> | } | Quorum diffinitiones supra descriptæ sunt: horum differentias Gale. peculiaribus lib. explicuit. |
| 2 <i>Causa morbi</i> | | |
| 3 <i>Accidens, morbum sequens</i> | | |

Morborum in uniuersum tria sunt genera,

Morborum tria genera.

- | | | | | |
|---|---|----|---|--------------------------------|
| 1 <i>Intèperies, siue mala cõplexio</i> | } | in | } | similariibus |
| 2 <i>Mala cõstitutio seu cõpositio</i> | | | | partibus. |
| 3 <i>Vnionis dissolutio</i> | | | | partibus instrument. utrisque. |

Diuisio perficienda ex lib. de differentiis morborum.

Causæ morborum genericæ, recentioribus tres solent assignari.

Morborum causæ tres.

- 1 *Prægressæ, siue euidentes, quæ & primitiue dicuntur uulgò. Græcis autem προαταρχητικῇ, Quæ extrinsecus corpori adueniunt.*
- 2 *Antecedentes seu præcedetes. Græcè προϋούμεναι, Quæ paratæ sunt statim morbos efficere.*

Generalis & compendiaria

3 Coniunctæ siue continentes. Græcè συνεκτικαί,
Quæ iam morbum excitarunt.

Symptoma spe-
ciatim dictum
triplex.

Symptoma siue accidens morbum sequens,
trifariam distinguitur. Aliud enim est,

- 1 Actio læsa siue functionis noxa. (ne.
- 2 Qualitas mutata, ut caliditas uehemēs in phlegmo
- 3 Exiens mutatum, } } Excretiones,
ut immodicæ ex- } } Suppressiones.
crementorum.

Actio læditur trifariam

Ablatè siue abolitè } } *Cæcitas*
Diminutè, seu debilitè } ut } *Visus habes* } *in oculis*
Corruptè, siue depravatè } } *Deprauata uisio*

4 Conditiones requisitæ ad manuales ope-
rationes probè exercendas, uariæ sunt ac
multiplices. Aliæ enim spectant ad
Chirurgos ipsos,
Laborantes,
Assidentes,
Exteriora.

Boni chirurgi
conditiones.

Quatuor cōditiones in uniuersum requirun-
tur in bono chirurgo: nempe ut sit

- 1 Doctus, & disciplinarum gnarus, & earum præ-
sertim quæ ad suam artem pertinent.
- 2 Multis experimentis exercitus.
- 3 Ingeniosus.
- 4 Bonis moribus præditus. (sistit in

Doctrina.

1 Doctrina atq; eruditio boni chirurgi, cō-

Theoria seu speculatione, } *Naturales*
cognoscendo res } *Non naturales*
 } *Præter naturam.*

Praxi

Chirurgi institutio.

Praxi { Exercendo probè, celeriter, concinnè, &
expeditè operationes manuales.
Consulendo medicum in ijs quæ ad phar-
maceuticæ attinent, et diætetice.

Ex rebus naturalibus, præcipuè illi. cogno-
scenda sunt,

Corporũ tẽpera menta, Singularum par tium.	{ Substantia Tẽperamẽtũ Cõformatio Compositio.	{ Ab his enim cu randi indicatio nes desumun- tur.
---	---	---

Experientia chirurgi, consistit Experientia.

In ijs quæ certa ratione excogitata sunt, & frequẽ
ti usu confirmata:

1 Aliàs empiricus & temerarius censendus erit, nisi
scilicet experientiam habuerit rationi coniunctam.

Ad chirurgi ingenium pertinent, Ingenium.

Bona ac prompta apprehensio,

Tenax memoria,

Reminiscencia facilis,

Rectum iudicium,

Operandi dexteritas,

Solertia ac promptitudo in remedijs inueniendis.

Ad operandi dexteritatem ac promptitudi- Ex Cor. Celso.
& Hippoc. lib.
quæ intus
inscribitur.
nem hæc requiruntur,

1 Acris oculorum acies claraq;.

2 Manus strenua, stabilis, nec unquam intremiscens.

3 Vt non minus sinistra quàm dextra sit promptus.

4 Optima corporis conformatio, atque habitudo.

Mores qui decent chirurgum, sunt, ut sit Mores.

Audax, & animo intrepidus, in rebus tutis &
necessarijs.

In rebus

Generalis & cōpend. chir.instil.

In rebus dubijs ac periculosis nō admodū praecept.
Comis & affabilis erga laborantes.

Māsuetus ac facilis erga suae factionis homines, et ut
græcè dicam Φιλέταιρος, id est, amator sociorum.

Prudens ac circumspectus in præsagiendo.

Castus, ac temperans.

Misericors erga pauperes.

Pecunie non nimis cupidus, nec exactor iniquus.

*Laborantis cō-
ditiones.*

Conditiones quæ ad laborātem attinēt, tres
sunt præcipuæ, ut

1 Pareat medico, nō secus ac seruus domino, et in nul-
lo propriæ indulgeat uoluptati.

2 Confidat in medicum, & chirurgum.

3 Patienter ferat omnia, quæ fiūt à chirurgo rationa-
li & experto, gratia recuperandæ sanitatis.

Assidentes.

Qui assident ægro, debent esse

Prudentes,

Pacifici.

Fideles.

Exteriora omnia apparatus esse debent,

In utilitatem laborantis,

Et ut morbus desiderat.

Nomine exteriorum comprehenduntur,

idoneæ, & omni turba uacantes.

Habitationes, { parum commodæ, & turbarum
uel { plenæ.

Quæ nunciantur, aut aguntur.

Quæ iram, tristitiam, aut aliquem alium affectū in-
fligunt egrotanti.

Quæ somnum abrumpunt, & interturbant.

FINIS COMPENDII CHIRURGIAE.

TVMORVM

TUMORVM, QVI

PRAETER NATURAM CON-

SISTVNT GENERALIS DIVI-

sio, in primum librum chirurgicarum

Institutionum Ioannis Ta-

gaultij Medici.

Primæ ac generales, tumorum præter natu-
ram differentiæ.

- | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| | Sanguinea fluxione | | | | |
| 1 Phlegmone, | { | Biliosa fluxione | { exuperan | | |
| 2 Erysipelas, | | Tenuis pituitæ sub- | | { te pro- | |
| 3 Oedema, | | stantia | | | { creatur. |
| 4 Scirrhus. | | Limoso & sæculento | | | |
| | sanguine. | | | | |

- 5 Inflatio, seu Flatusus tumor { Ex flatuoso spiri-
ritu collectio nasci-
tur.

6 Abscessus, Quod græci apostema nominant.

φλεγμονή.

1 Phlegmone duplex est,

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1 Ex sanguine syncero, | { | Vera phlegmo- |
| | | ne vulgò appella- |
| 2 Ex sanguine optimo alijs humori- | { | Recentioribus |
| bus commixto, | | chirurg. phleg- |
| | | mone non ue- |
| | | ra nominatur. |

Ex sanguine alijs humoribus commixto, fit

- | | |
|-------------|-----------------|
| Phlegmone { | Erysipelatodes, |
| | Oedematodes, |
| | Scirrholes. |

Phlegmonosi

➤ In Lib. I. Instit. chirurgicarū.

Phlegmonosi affectus sunt,

Dorhienes, { Furunculi Celso, Auicennæ Aldemius-
renul. Tuberculum acutum, cum in-
flammatione & dolore.

Eubo, Simplex laxarū partium inflammatio.

Phygethlū, { Panus uocatur Celso. Græcis Phleg-
mone erysipelat. uel erysip. phlegmo-
nodes. In inguinibus et alis nascitur.

Phyma { Inflammatio glandularum, quæ citò au-
getur, & ad suppurationem accelerat.
Celso tuberculum dicitur.

Carbunculus, Græcis Anthrax, { Cum pustulis
Sine pustu-
lis.

Nil aliud quoque quàm Phlegmonæ sunt.

Vua, { Gurgulionis, qui Græcè γοργυλιών,
& σαρφύλη: dicitur Latinis etiam
columella.

Tonsillæ, { Glandularum, quæ in faucium princi-
pio sibi opponuntur, amygdalas uulgò
appellitant.

Paristhmia, corporū, quæ in pharynge consistunt.
Hæc morborum & partium sunt nomina.

Phlegmonē sequuntur, atq; eius proles sunt

Abscessus, { Qui etiam fiunt aliquando protinus
ab initio, nulla inflammatione præce-
dente.

Sinus, { Græci κόλπον nomināt, recentiores chi-
rurgi ulcus profundum & cauernosum,
quod nondum occalluit.

Fistula,

Gener. diuifio tum. Præter natura tum.

Fistula, { Græcis syrinx dicitur. Hæc nihil aliud
est quàm sinus arctus & oblongus, qui
non statim curatus, temporis progressu
obduruit, & callo obductus est.

Gangræna, Partis affectus mortificatio, nõ tamen absoluta.

Sphacelus, { Latinis syderatio. Absoluta atq; om-
nimoda partium etiam solidarum mor-
tificatio & corruptela.

2 Erysipelas biliosæ fluxionis soboles, geminum est, ἑρυσίπτελας.

1 Verum ac legitimum, { Solius cutis passio est,
& absque ulceratione
incidit.

2 Non exquisitum } Non solam cutim, sed etiam
seu illegitimum, } subiectam carnem occupat,
ac molestat.

Erysipelas non legitimum, duplex est,

1 Ex bile crassiore et acriore, exacta tamen & syn- } Non natur ery-
cera, } sipelas cum ulce-
ratione.

2 Ex bile alijs hum- } Phlegmonosum
moribus permix- } Oedematosum
ta, alios tamẽ suc- } Scirrhum
cos exuperante. } Dicitur erysipe-
las

Erysipelati similis est herpes, qui geminus est Galeno,

1 Herpes exedens, siue depascens, { Græcè ἐρσθιόμεν & A' bile fit acro-
re et exacta tota cutim usq; ad subte-
ctam carnem exulcerante. Eiusdẽ gene-
ris est cum ulcerato erysipelate.

d 2 Herpes

Generalis diuifio Tum.

- 2 Herpes milia } Cēchrias Græc. Ex bile fit te-
ris, siue puſtu } nuioſe et dilutioſe, proinde &
loſus. } minus acri calidaq̃.

Ad eryſipelas etiam pertinent,

- 1 Bullæ ſimiles ijs, quæ in corpore à ſeruīda aqua
torrefacto contingunt, Phlictenæ à Græcis uocatæ.

Oedema.

- 3 Oedema bifariam conſideratur,

- 1 Vt ſym } Tumor rarus, & ſine doloris ſenſu: ex pi-
ptoma } tuita, uel flatulento ſpiritu, periculoſos
} quosdam affectus ſequens, ut tabem, ca-
} chexiam, hydropem.

- 2 Vt morbus.

*Oedema mor-
bus.*

Oedema morbus duplicem habet originem,

- 1 Ex pitui- } Tumor etiā laxus, fungoſus, et abſq̃;
ta ſola, } doloris ſenſu, ex tenuiſ pituitæ influxu
} ortum habēs, quod uerum ac legitimū
} oedema nominant.

- 2 Ex pituita alijs humoribus } Recētioribus œde-
permixta, ſed tamē illis præ } ma non uerum at-
pollente. } que illegitimū ap-
} pellatur.

Oedema morbus ex pituita alijs humori-
bus commixta, in treis differētijs findi ſolet:

Nempe in

- 1 Oedema phlegmonodes,

- 2 Oedema eryſipelatodes,

- 3 Oedema ſcirrhodes.

*Tumores œde-
matofi.*

Ad œdema referuntur,

- Hydrocele, } Vulgò bernia aquoſa. Quum hu-
} mor aqueus in teſtium tunicis con-
} gregatur.

Ascites,

Aquosus hydrops . Quum serosus humor in membrana abdominis interiore continetur.

Leucophlegmatia, { *Hypofarca, et anasarca etiã dicitur. Quũ corpus inæquale est, tumoribus aliter, aliterq; per totum id (ut Celsus ait) orientibus.*

4 Scirrhus, tumor durus sine ullo dolore, Σκίρρῶς.

1 *Exquisitus,* Sensu caret, nec curationem admittit.

2 *Non exquisitus,* { *Non omnino est sine sensu, ægrè tamen admodum sentit.*

Scirrhus tam exquisitus, quàm non exquisitus,

1 *Statim ab initio paulatim concrescens, & augescens,*

2 *Ex coincidentia creatus.*

Scirrhi qui à principio paulatim cōcrescūt, & augentur.

1 *Ex pituita lenta, crassaq; tenuiore eius substantia resoluta,*

2 *Ex atra bile, seu melancholia.*

Scirrhi ex atra bile, seu melancholia (ut uocant) naturali,

1 *Sola, & alijs humoribus impermixta,* { *Legitimi et ueri scirrhi nostræ ætatis chirurgis appellantur.*

2 *Alijs humoribus commixta, do minium tamen super illos ob tinente.* { *Illegitimi censentur.*

Generalis diuifio Tum.

Scirrhus ex atra bile alijs permixta humo-
ribus,

- 1 Phlegmonodes,
- 2 Oedematodes,
- 3 Eryfipelatodes.

Scirrhi ex coincidentia, uel transmutatione
fiunt,

Phlegmone, }
Eryfipelate, } impendiò refrigeratis.
Oedemate, }

Melancholici ac fcirrhofi tumores censeantur
Cancer, Græcè carcinoma. Fit ab atra bile, sine
ebullitione.

Phagedæna cum tumo- }
re, } Cum cute pariter fu-
biecta attingit & de-
pascitur: in quo dif-
fert ab herpete.

Ulcera cacoëthe, id est, maligna, cum } ut sunt Chi-
tumore, } roniam et Te-
lephiam.

Psora, }
Lepra, } Cutis tantum affectus sunt.

Elephas, seu }
elephantia= } Ex sanguine melancholico ducit
fis. } originē, tempore uerò bilis atra
sanguine copiosior redditur.

Satyrifmus, id est, elephas incipiens.

Vicina fcirrhus sunt,

Enchymo- }
mata } Senibus ex uenarū contusione ac
Melasmata, } cidetia, sanguine ex uenis effuso
ob extremas earū adaperitiōes: et
interdū ob tunicarū cōtusiones.

Aneurisma,

Aneurisma, { Arteriæ ad aperta affectus, ex quo in
terdum, grumo scilicet innato, spha-
celus gignitur.

Varices, { Id est, uenæ dilatatae in
cruribus à sanguine
crasso.

Scirrhi sunt à parte affecta nomina sortiti
Chœrades, { Strumæ glandularum.

Sarcocoele, { id est { Ramex testium, vulgò her-
nia carnosæ: fit cum caro
inter tunicas testium incre-
scit.

5 Ex inflationum genere sunt

Inflatio.

Tympanis, seu tympanites, { Hippocrati aqua
intercutem sicca
uocatur.

Priapismus, qui
et satyriasmus { Pudendorum intetiones nō
quibusdam dici- { remittentes, à spiritu hali-
tur, { tuoso cauernosū neruū (qui
propriam colis substantiā
constituit) implente.

Sunt & parui quidam tumores in cute
nascentes, qui ad prædicta genera referun-
tur, ut

Achores, { Pituitæ salsæ et aluminosæ soboles, Parui tumores
in cute nascentes.
Parua in cute capitis ulcera, cum tu-
more modico.

Favi, { Ex his humor melleus effluit. Cum tumo-
re quodam et foraminibus plurimis eue-
niunt.

Ad scir-

Generalis diuifio Tum.

Ad fci-
rbum
perti-
nent, { Myrmecia } Verruca, quæ latiore
{ Acrochordones, } sunt bafi, & quafi fefsi=
les. Latini formicantes
uerrucas appellant.
{ } Penfiles uerruca,
& anguftiore ba-
fi.

Pfydra=
ces, feu { Tumores parum fuprà fummam
pfydra=
cia, } cutem eminentes, phlyctenis, hoc
eft, bullis, quæ ab igne excitantur,
fimiles.

Epinyctides, { Luētes puftula, fabæ magnitudinē
nō excedentes, noctu quidem magis,
quàm interdiu infeflantes.

Tumores etiam funt, fed non ex humo-
ribus,

Epiplocele, Cū omentū in fcrotum descendit.

Enteroccele, { Inteflinorum ramex.
Hernia inteflinalis
uulgò.

Enteroëpiplocele, { Cū Inteflinum finum
cum omento in fcrotum
delabitur.

Cirfocele, { Vulgò hernia uaricofa. Fit quum
teftium integris tunicis ramex inna-
fcitur.

Bubonoccele, id eft, in- { Fit rupto peritonæo, aut
guinis ramex, } uulnerato iuxta inguē. Ad
obliquos uentris mufculos
pertinet, & ad nerueā illo-
rum tenuitatem.

Exom=

Ex omphalorum eminentia, cum } Hic affectus ad
umbilicus indecore prominet. } transversos mu-
sculos pertinet,
et nerueam eo-
rum tenuitatem.

Ex carne supercrescente fiunt

Sarcocele, { Tumor testium. Quum caro in-
ter tunicas ipsorum incre-
scit.

Epulides, { Superflue carnes ex inflammatione in
extremo molari dente, cui dolor quan-
doque et febris iungitur.

Parulides, { Abscessuli circa gingivas fa-
cti, qui nisi soluti fuerint, suppu-
rantur.

Thymi, thy- { Verruculae infra tenues, su-
per latiores, capituli, id est, ca-
mia, uel thyma { cuminis floris thymi fruticis
surculosi, figuram uerius quam
colorem representantes.

Polypi, uel polypodes, id est, multipedes,

In naribus,

6 Abscessus fiunt, uel

Abscessus.

Natura fluorem uincente,

Natura à fluore uicta.

Hi toto genere præter naturam sunt.

Abscessuum, qui toto genere præter naturam
sunt, materia,

Humores,

Solida corpora.

Generalis diuifio Tum.

Humor qui in abfcefibus toto genere pæternaturā cōtinetur, aliū est, ueluti

Lutū,

Cœnum,

Olei limus,

Vini fex,

Vrina,

Melleus muccoſusq; ſuccus.

Vniuerſa hæc, tunc a quadā membra-
rioſa com-
prehēdit.

Solidā corpora in abſcefibus inuenta ſunt, ueluti

Vngues,

Lapides,

Pili,

Pori,

Oſſa,

Teſtæ,

Animalcula, propè omnibus, quæ ex putredine generationem habent, ſimilima.

Frequentiffima abſceſſuum genera ſunt tria, quorum natura ex nominibus conſtat,

Atheroma,

Meliceris,

Steatoma,

in } Eo pulticulæ quid ſimile inuenitur.
Quo melli quid ſimile reperitur.

Eo aliquid ſimile ſeuo uifitur.

FINIS.

INSTITV.

INSTITVTIONVM

CHIRVRGICARVM IOANNIS
TAGAVLTII MEDICI,

LIBER PRIMVS:

De Tumoribus præter naturam in uniuersum.

Quid sit Tumor præter naturam, qui uulgò
generali nomine Apostema dicitur; &
multiplicis eiusdem definitionis
examinatio: Caput I.

10



VMORES OMNES, QVI
præter naturam consiſtunt, recen-
tiores tum medici, tum chirurgi, at-
que etiam uulguſ ipſum, ſub nomi-
ne Apoſtematiſ comprehendunt:

quum tamen ἀποστήμα Galeno, & Græciſ omnibuſ, ἀποστήμα.
una ſit ſpecies tumorum præter naturam incidentium,
quam Latini apoſtē Abſceſſum nominauerunt, & Abſceſſus.

20 iuniorum turba, accepto ab Auicennæ interprete uo-
cabulo, Exituram: de qua in ſequentibuſ fuſiuſ, atque
accuratiuſ dicetur. Sed & Apoſtema nonnunquam
ſpeciem, ſeu differentiam faciunt tumoriſ præter na-
turam: cū ſcilicet ipſum diuerſum faciunt ab Exitu-
ra, quam uocant, & puſtuliſ; de quibuſ etiam ſuo loco
copioſiuſ differemus. Nomine enim Apoſtematiſ gre-
garij iſti medici, ac chirurgi, ferè eoſ tumoreſ paſſim
30 intelligunt, qui & in magnam ſatiſ molem attollun-
tur, & ex humorum (ut loquuntur) naturalium influxu

A

procreantur;

procreantur; atque ideò etiam uera apostemata uocant. Itaque cum Apostema generis nomen est, omnes præter naturam tumores sub se complectens, Anicennæ, & eius sequacibus ita communiter definitur: Apostema est ægritudo composita ex triplici genere morborum in unam magnitudinem aggregatorum. Quam definitionem essentialē esse contendunt. Quippe quæ genere constet, & differētia, naturamq; ipsius definiti sufficienter explicet. Porro generis definiti locum in ea obtinet ægritudinis uocabulum: reliqua uerò appposita sunt ad differentiam aliorum morborum, qui in compositione, seu constructione instrumentorum contingunt; quorum differentias Galenus recenset libro primo de morb. & symptomat. Tria autem illa morborum genera, quæ in tumore hoc præter naturam, Apostemate uulgò nuncupato, reperiuntur, unius morbi essentiam constituentia sunt Intemperies, quam & malam complexionem appellant: Incommodatio, quæ etiam mala compositio dicitur: & Continui, seu Continuitatis, aut Vnitatis solutio: Graijs autem uocibus dicuntur δύο γὰρ αἰτίαι, ἀμειψία, καὶ οὐνὲς εἰς ἄνους. Cæterum alias multas Apostematibus uulgariter dicti descriptiones adferunt, uerius quàm definitiōnes; quæ neque cum ipso definito conuertuntur, neque eius naturam satis explicant, aut eius essentiam sufficienter constituunt: proinde & accidentales eas uocant. Cuiusmodi est hæc, ex initio libri de tumoribus præter naturam à Galeno conscripti, ab eis desumpta: Apostema seu tumor præter naturam unum aliquid eorum est, quæ corporibus accidunt, partem, quam occupat, secundum omnem dimensionem, distendens.

Apostematis de
finitio uulgaris.

Definitionis
examinatio.

Tria morborum
genera tumoris
præter naturam
essentiam consti-
tuentia.

Definitiones
accidentales.

distendens: Quæ descriptio ex ijs Galeni uerbis descripta est: ἐν τῇ συμπερικυκλώσει τοῖς σπύμασι μὴ ὑπάρχει, τὸ δηλούμενον πρᾶγμα πρὸς τὸ ὄγκον φωνῆς, τὴν γὰρ εἰς μῆκος ἢ πλάτος ἢ βάθος διάστασις οὕτως ὀνομάζεται ἑλκυσσες. Hoc est:

- „ Quod tumoris uocabulo significatur, id eorum, quæ
 „ corpori accidunt, unum esse constat. Sic enim disten=
 „ sionem in longum, latum, & profundum nominant: uel
 „ si ita dixeris: Apostema incrementum est, naturalem
 „ statum excedens. Item & quæ sequitur, ex lib. 13. Lib. 13. The-
 rap.

Therapeutices methodi deprompta: Apostema tumor est, in quo partes à naturali habitu in quantitate, seu magnitudine recesserunt. Sic autem apud Galenum legitur: ἐν δὲ τῷδε τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῆς ὅλης πρᾶγμα τεῖας ὄντι, περὶ τῇ παρὰ φύσιν ὄγκου ἀρξομένη ἀέγειν, ἐν οἷς δηλονότι κατὰ μέγεθος, ἰζίσσεται τὰ μέλη τῶ κατὰ φύσιν: id est, In hoc, uerò totius operis tertiodecimo de tumoribus, qui præter naturam incidunt, differere incipiemus; in quibus scilicet partes à naturali habitu in quantitate recesserunt. Itaque nisi his definitionibus particulam hanc addideris, Actiones lædens; seu, Euidentem actionis noxam inducens, nequaquam absolutæ, & essentielles erunt. Nō enim tumor omnis, distensionem in longum, latum, & profundum, ultra naturæ habitum, in toto corpore, aut particula aliqua efficiens, uel incrementum quodcunque, naturalem statum excedens, iuxta uulgarem acceptionem, apostema, aut tumor præter naturam, statim dici debet. Siquidem ut libro de tumoribus præter naturam Galenus ait: Incrementum, eiusmodi naturalem statum excedens, non agris mo-

Gal. lib. de tu.
præter naturā.

dò, sed & sanis etiam, tam in toto corpore, quam in qualibet particula accidere potest. Obest nanque tametsi ultra naturæ habitum in latum, & profundum distenti sint, non tamen iam præter naturam se habent, sed solum (inquit) non naturaliter. Nondum enim naturæ limites sunt egressi, neque in eis adhuc est actionis læsio, qui terminus est excessuum, qui præter naturam dicuntur. Tumores quoque illi, qui in particulis adhuc sanis existētibus, & citra omnem sensum doloris consistunt, rectè quidem supra, seu ultra naturam, non tamen præter naturam dicuntur. Ut si utraque mamma, uel altera duntaxat immodicè increuerit, ita tamen, ut ipsa partis essentia ab omni noxa uideatur immunis, nequaquam appositè præter naturam hic tumor dicetur, sed ultra naturam duntaxat. Ergo si absolutam magis, & essentialem tumoris præter naturam definitionem ex Galeni sententia placet colligere, hoc pacto definiēs: Tumor præter naturam incrementum est, naturalem statum in corpore excedens, & læsionem actionis inducens. Ceterum aliam quoque ipsius apostematis impropriè licet ita appellati, definitionem ex Halyabb. medico, nominis inter Arabes percelebris, adferunt: quam absolutissimam, & perfectissimam esse adfirmant: habet autem ad hunc modum: Apostemia est tumor præter naturam, in quò aliqua materia replens, & distendens est aggregata. In qua definitione tumor generis locum occupat, utpote pluribus communis: Præter naturam deinde in ea adiectum est, propter incrementum illud uel corporis totius, uel particulæ alicuius, naturalem symmetriam, seu naturæ habitum excedens, quod supra, uel ultra naturam,

Absoluta tumoris præter naturam definitio, ex Galeni scriptis desumpta. Halyabb.

Tumor. Præter naturam.

naturam cum Galeno appellauimus. Item propter tumores naturales capitis, uentris, & iuncturarum. Cum autem adijcitur: In quo est materia aliqua; subaudire oportet, superflua; ut puta humoralis, uel quæ ad humorem (ut loquuntur) sit reducibilis. Adiecta præterea est particula hæc, Aggregata, propter tumores, qui in fracturis, & luxationibus conspiciuntur, in quibus non humor, aut substantia aliqua, quæ ad humorem reduci possit, tumorem committit, sed ossa, quæ extant. Po-

Materia humoralis.

Replens, & distendens.

Tumoris præter naturam diuisio in suas species iuxta recentiorum sententiam.

Apostemata, Pustula.

Exitura.

- 10 siremo appositæ sunt hæc duæ particulae, Replens, & distendens, quibus ostenderet tria morborum genera supraposita (nempe intemperiem, prauam compositionem, & unionis diuortium) in unum esse congregata, atque unius morbi essentiam constituere. Tumores autem eiusmodi, qui præter naturam dicuntur in tria genera, seu tres species Guidon, & suæ ætatis scriptoribus, solent diuidi, in apostemata scilicet, pustulas, & exituras. Apostemata itaque tunc illi nominant tumores maiores, in quibus materia, ex
- 20 qua creantur, magis (ut dicunt) quantitate peccat, quam qualitate: Pustulas uero, exiguas quasdam eminentias, seu minutiores tumores, quos & Bothor appellant, in quibus substantia, ex qua nascuntur, qualitate magis, quam copia, molesta esse solet; imò & plerumque in eis (ut uolunt) uenenositas subest: At exituras, eos tumores uocant, quos Latini abscessus, & Græcis ἀποστήματα rectè nominari iam supra diximus. Sed liceat cuique nominibus quibus uelit, uti, modò à rerum natura (ut Galenus
- 30 ait) non discedat.

De differentiis tumorum, qui præter naturam incidunt: Cap. II.

Divisio tumorum
in suas differen-
tias.

A quibus sum-
tur differentiæ tu-
morum præter na-
turam recentio-
ribus.
Substantia.



TUMORVM præter naturam, qui uulgo ge-
nerali nomine apostemata dicuntur, uariæ,
ac multiplices sunt differentiæ. Quæ om-
nes recentioribus chirurgis sumuntur, uel à substan-
tia rei (ut uocant) uel à materia, uel ab accidentibus,
uel à membris, seu partibus affectis, uel à causis effi-
cientibus. Itaque differentiæ tumorum, quæ à substan-
tia ipsius affectus desumuntur, his, & eorum principi
Auicennæ: sunt tumor magnus, tumor paruus. Magna
quidem apostemata illis censentur, Phlegmonostu-
mores, qui in carnosiss particulis tumidioribus fiunt:
item œdematost, erysipelatost, & scirrhost, qui in mo-
lem, effatu dignam, at tolluntur. Parua uero apostema-
ta eisdem dicuntur, minutæ eminentiæ (quas pustulas,
& bothor appellant) in cute, ac corporis superficie
non infrequentius apparentes: cuiusmodi sunt lepræ
Græcorum. psore, id est, scabies, impetigines, & id ge-
nūs alia; de quibus in sequentibus latius dicemus. Por-
rò materia tumorum præter naturam, sunt humores
quatuor tam naturales (ut uocant) quàm non natura-
les, sanguis scilicet, pituita, & utraque bilis, nempe
flaua, & atra: item humores, qui toto genere præter
naturam sunt, & solida aliquandò quædam corpora,
flatus quoque, & serosus humor: à quibus omnibus aliæ
sumuntur tumorum præter naturam differentiæ, ut in
sequentibus amplius declarabitur. Symptomata, seu
accidentia, quæ communiter ipsis tumoribus superue-
nire solent, sunt ueluti dolor, calor, mollities, durities,
& id

Et id genus alia, à quibus etiam et differentias su-
 mendas esse uolunt. A membris quoque, seu particu- Pars affecta.
 lis ipsis laborantibus, quædam sumuntur differentie

tumorum, qui præter naturam consistunt, ut sunt oph-
 thalmia, oculi inflammatio, synanche, gutturiis phleg-
 mone, phymata, phrygethla, partium laxarum, quas

glandulas uocamus, inflammationes, item et bibiones.
 Causæ efficientes, à quibus et differentie quædam ac- Causæ efficien-
tes.

10 cipiuntur, sunt congestio, et deriuatio, seu fluxio,

quod et rheuma Græcis dicitur; Crisis, ad est, iudicium,
 quod in morbis fit: ac quædam alie tum interiores,

tum exteriores causæ, de quibus copiosius atque accu- Tumorum præ-
ter naturam dif-
ferentie unde na-
scentur Galeno.

ratius in sequentibus edisseremus. Verumenimvero

tumorum huiusmodi præter naturam incidentium uar- Gal. 13. Meth.

rietates, ac differentie omnes, ex eius, quod insluit na-
 tura, et substantia, tumorem committente, nascuntur,

Galeno lib. quem de tumoribus præter naturam inscri-
 psit. Item secundo libro ad Glaucconem, et 13. me-

thodi medendi, ubi ad hunc modum scribit, si saltem

10 Græca Latina reddantur: Quinetiam omnium tumo-

rium, qui præter naturam sunt, uarietas ex eius, quod

inluit natura, enascitur. Vbi enim flatulenta materia

, copiosior accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phleg-

, mone uero magis similes ubi sanguis: sicut erysipelati,

, ubi flaua bilis: et cedematosi magis, ubi pituita: simi-

, liter scirrhusi, ubi uel crassus, uel uehementer lentus

, humor est, qui parti est infixus. Itaque tumores om-

nes præter naturam ipsi Galeno eo loci fiunt, aut ab

humoribus, aut à flatuoso spiritu, qui quandoque sub

30 cute, quandoque sub circumossalibus membranis, quan-

doque in uentre, quandoque in intestinis, nonnunquam

in medio

Emphysema.

Calidi tumores.

u mores fri-
gidi.Tumores com-
plicati.

in medio horum, & peritonæi colligitur: Græci em-
physema, Auicenna apostema uentosum uocat. Si ab
humoribus tumores eiusmodi fiant, aut calidi, aut fri-
gidi sunt, aut misti. Calidi autem fiunt à sanguine
optimo, id est, adamusim rubente, & consistentia me-
diocri, ac moderata qualitate; & tunc phlegmonem
Græci, Latini inflammationem uocant. Aut à flaua bi-
le, uel à sanguine feruenti, ac tenui; uel sanguine, & bi-
le calidioribus; erysipelas illi, hi ignem sacrum appella-
lant. Frigidi uel à tenui pituita suscitantur, atque hos
Græci œdema, nostri laxum tumorem uocare possunt.
Auicenna undimiam appellat, aut ab humore atræ bi-
lis, uel crassa, & lenta, tenaciq; pituita; scirrhus illi,
Latini duritiem, Arabes sephtros uocant. Ex seroso
quoque sanguinis recremento quandoque tumores
fiunt, ut in sequentibus dicitur. Ceterum miscentur
aliquandò simul eiusmodi humores, atque tunc si alter
alteri dominetur; ab eo, qui in mistura exuperat, no-
men ipsi tumori inditur. Vt sanguine bili dominante,
phlegmonem dicemus erysipelatòdem, seu erysipelatò-
sam: sicuti ob flauam bilem præpollentem, erysipelas
phlegmonòsum, seu phlegmonòdes. Iam uerò aliarum
mistonum similis est interpretatio, phlegmone scir-
rhòsa, & schirrhus phlegmonòsus: œdema phlegmonò-
sum, & phlegmone œdematòsa. Atque ad hoc exem-
pli, reliquos quoque tumores, etiam si trium, uel qua-
tuor humorum inuicem cōmistio sit, nominabis. Por-
rò si pares sint, atque ex æquo misti humores, ita ut
alter alteri non præpalleat, tunc per copulam eorum,
quos excitant, tumorum nomina coniungemus. Vt si 30
sanguis bili æqualiter misceatur, uitium illud per con-
iunctionem,

- iunctionem, phlegmone, & erysipelas dicetur, uel cum Galeno, phlegmones, erysipelatosq; specie, & natura medium. Et hi quidem sunt præcipui tumores, qui ex humorum influxione fiunt Galeno: Phlegmone inquam, erysipelas, oedema, scirrhus. Ad quos innumerum alij, naturæ modum excedentes, tumores reducuntur, ac sub eis comprehenduntur, tametsi uarijs ex causis diuersa sortiti sint nomina. Itaque ad phlegmonarum genus pertinent phygethlon, quod panus, Celso autore, à nostris uocatur; Phyma, tuberculum eidem Celso nuncupatum; Termintho, phymatis species Oribasio, sed Aetio phygethli; Dothienes, quos Celsus furunculos uocat; item gangræna, & sphacelus, qui à Latinis syderatio, & à præcipe Auicenna ascachilos, dicitur; Carbunculus quoque, Græcis anthrax nominatus: de quo scribit Auicenna capite de pruna, & igne persico. Ad erysipelata uerò quodammodo referri uidentur herpes; qui specie sunt duplices, miliares scilicet, & exedentes, quos ἐὸς θίον ἐνός Græci appellant.
- 20 Vtrinq; speciē Auicennæ interpres formicas uocauit, sed eas cū uerrucis illis, quas Græci myrmecias, Latini formicas uocant, nominis similitudine deceptus, eodem capite turpissimo errore commiscuit. Has biliosas inflammationes, herpes à Græcis nuncupatas, Celsus sub ignis sacri nomine uidetur comprehendisse. Recentiores eas inter pustulas (ut loquuntur) cholericas adnumerant. A bile etiam ferè proueniunt, atque ideo ad erysipelas pertinent, phlyctænæ à Græcis uocatae, de quibus agit Auicennas capite de uesticis, & inflammacionibus. Ad tumores pituitæ, hoc est, oedemata, referuntur nonnulli tumores sub apostematis nomine à Græcis com-

Tumores præcipui, qui ex influxu humorum fiunt.

Tumores ad phlegmonē pertinentes.

Erysipelatosi tumores.

Pituitosi tumores.

cis com-

eis comprehensī, qui ab Auicenna nodi, ab Halyabbate
 selaa, & dubeleta phlegmatica dicti sunt, Latini ab-
 scessus uocant. Quorum iuxta diuersas materias in
 eis contentas, diuersae etiam sunt species. Nihil au-
 tem refert, si & genera, uel differentias hoc loco dixe-
 ris. Porro tria sunt Galeno eiusmodi abscessuum ge-
 nera frequentissima, quorum singula propriam ap-
 pellationem Græcè sunt sortita, ea sunt atheromata,
 steatomata, melicerides, à similitudine quidem con-
 tentorum in his corporum dicta, ut amplius in sequen-
 tibus declarabimus. Est & apostematum, hoc est ab-
 scessuum genus, in quo res aliæ continentur, quæ non
 humorum modò, sed & solidorum quorundam corpo-
 rum proprietates representant: uerum hæc inquit Ga-
 lenus rarius. Ac de ijs quidem etiam in sequentibus,
 cum de abscessibus sermonem faciemus. Ad hæc au-
 tem modò dicta abscessuum genera pertinent tumo-
 rum quædam nomina à recentioribus excogitata, &
 nusquam apud antiquos scriptores reperta, ut testu-
 do, mollis tumor caluariæ inherens, & talpa; hæc ad
 atheroma, illa ad meliceridem magis spectare uide-
 tur. Ad steatoma uerò ferè pertinet, tumor dolore ca-
 rens, quem Natam, uel Naptam appellant, de quibus
 suo loco dicemus. Hoc quoque, hoc est ad tumores
 pituitæ, spectant uocata à Græcis ganglia, ab Auicen-
 na glandulae, quæ à uocatis nodis differunt. Serofulae
 quoque à uulgo uocatae, à pituita fiunt, proinde, & ad
 cedemata reducuntur: hæ Græcis cherades, Latinis
 strumæ dicuntur: Galenus tamen alicubi inter scirr-
 hos, ob duritiem annumerat. Ad cedemata etiam refer-
 tur Galeno ea hydropis species, quæ leucophlegmatia
 Græcis, &

14. Tera.

Tumorum noua
 quædam apud re-
 centiores medi-
 cos nomina.

Testudo.

Talpa.

Nata.

Ganglia.

Strumæ.

Leucophleg-
 matia.

- Græcis, & hypofarca nuncupatur. Cæterum tumores, qui ad atrā bilem spectant, & sub uocato scirrho continentur, sunt Canceri, qui à Græcis carcini, & carcinomata dicuntur, Celsus tamen cancrum à carcinoma se iungit, ut illum ab his, quæ extrinsecus insidunt, oriri dicat, & serpere, hoc corrupta interius aliqua parte innasci. Idem cancrum in multas species diducit, erysipelas scilicet, gangrænam, et ulcus nigrū. Huius quoque farinæ est elephantiſis, seu elephantiſis, à uulgo medicorum lepra uocata, & quibusdam sancti Lazari morbus. Itaque lepræ nomen Auicennæ, & imperitæ multitudini, morbum grauissimum, ac perniciosissimum significat: cum tamen Galeno, Paulo Aeginetæ, ac reliquis Græcis, leuis sit morbus, non multum à scabie differens, quæ psora eisdem dicitur. Ex scirrhomato etiam tumorum genere censentur, Verrucæ ab Auicennæ interprete uocata Latina uoce, quæ tumores sunt instar monticulorum quorundam in cute eminentes, unde & nomen illis factum est, à uulgo porra dicuntur. Huius autem generis sunt myrmecia, ac si formiculas diceret, & acrochordones, quæ nostris pensiles uerrucæ dicuntur: Clauus, qui callus est figura teres, Græcis ὄλλος uocatur, Auicennæ almisfar: Thymion, uel thymon uerrucula thymi herbe capita representans: Auicenna uidetur tumorem, uel ut alia habet lectio, trassecum nominasse. Ex uerrucarum quoque genere sunt, uocata ab Auicenna cornua, ita quidem dicta, quòd eum oblonga sint, instar cornuum recuruantur. Item & calli, quos Græci τῦλλος uocant: hi ex labore obdurata cute gignuntur. Ad atram quoque bilem spectare uidetur morbus,

Scirrhomati tumores.

Cancer.

Carcinoma.

Elephantiasis.

Verrucæ.

Porra.

Myrmecia.
Acrochordones.

Clauus.

Thymion.

Cornua.

Calli.

Dracunculi.

morbis, quem dracontion Græci appellant, Latini dracunculum, ab eius nominis animalis similitudine; Auicenna, uenam medeni; Halyabbas, uenam saniosam uocauit. De quo Paulus capite ultimo lib. quarti. Hic morbus apud nos parum est frequens. Præter hosce,

Pustula.

quos iam recensuimus, tumores, accidunt & alij, corporis superficiem non raro occupantes, nempe parue quædam eminentiæ, quas pustulas, & bothor appellant: quæ licet & inter se, & ab ijs tumoribus, quos supra commemorauimus, differant: ab ijsdem tamen hu-
moribus fiunt, à quibus & magni iam dicti tumores. Proinde maioris, minorisue ratione ab illis tantum distare uidentur. Cæterum ut eiusmodi minuti tumores (quos sanè ignorare non debet chirurgus) notiores, ac peruij magis cuique euaderent, operæpretium me facturum putauì, si nomina tum Græca, tum Latina, tum etiam Barbara, ac rudem quandam (ut de alijs maioribus fecimus) descriptionem hoc loco subiecerimus. Ergo ut rem ipsam aggrediamur, ex pustula-

Lepra.

Pсора.

rum genere sunt, lepræ Græcorum, & ψωρα, Latinis
scabies appellatur, affectus quidem inter se admodum affines: cutis enim sunt aspredines cum pruritu, & corporis colliquatione, ab eodem humore progeneriti, nempe atra bile. In hoc tamen differunt, quòd lepra cum manifestis squammis cutem profundius in orbem depascitur: Pсора uerò superficiem tantum uarijs figuris lædit, & fursuracea quædam corpuscula renouat. Item ea leuis cutis infectio, quæ Græcis lichena, Latinis impetigo, & uulgò quibusdam (ut Manardus refert) uolatica nominatur. Hæc frequenter, ac facile
in prædictos affectus, lepram scilicet, & scabiem, quam
psoram

Lichena.

- psoram uocant, Galeno autore degenerat. Sunt tamen qui Græcorum lepram, impetiginem uocari à Celso (qui eius genera quatuor facit) cõtendant. Fiunt autem lichenes testibus Galeno, & Paulo Aegineta, mistis saniebus tenuibus, & acribus cum alijs crassis. Verumenimuerò cùm Celsus (ut diximus) quatuor im-
 petiginis species faciat lib. quinto sue medicinae, cui-
 denti argumẽto conuincitur, eũ aliam rem per impe-
 tiginem intellexisse, quàm Græcorum lichenas. Quan-
 10 doquidem nullus autor Græcus legitur, qui tot genera in lichenis unquàm agnouerit. Ceterum quando cùm sola leuiori cutis affredine, & pruritu manent liche-
 nes, impetiginis nomen retinent: dum autem peiores
 fiunt, nomen, sicuti & formam, mutant. Si enim mani-
 festas squammas lichene. i. impetigo excitat, atque al-
 tius cutem depascitur, lepra propriè dicitur: si uerò
 per extimam tantum superficiem extenditur, & cor-
 pora surfuracea emittit, psora à Græcis, à nobis pro-
 priè scabies uocatur: quanquàm scabiei nomen uul-
 20 gò, & medicis multis, latius longè pateat, qui om-
 ne cutis uitium, scabiem nominant. Itaque pura, ac
 uera scabies Latinis is proculdubio affectus est, qui
 Græcis psora uocatur, ab Auicenna etiam albata, &
 morphea (contra quorundam opinionem) diuersus. Por-
 rò quod ipsi Auicennæ, & Punicis fere omnibus alba-
 ras dicitur, à Græcis, et Celsò Leuce nuncupatur. Illo-
 rum uerò morpheam, Græci alphon uocant: in quo
 quidem affectu non tota quidem caro afficitur, sed cor-
 poris duntaxat superficies, ueluti (inquit Galenus)
 30 squammis quibusdam inspergitur. Sunt autem alphi
 ipsi Galeno genere duplices, nempe albi, qui ex pitui-
 ta: &

Quatuor impe-
tiginis species.

Impetigo.

Lepra.

Psora.

Scabies.

Albata.

Leuce.

Lib ult. de cau-
sis symptomatũ.
Alphi.

ta: & nigri; qui ex melancholico humore prodeunt. Sed hæc à rerum consequentia tracti diximus. Neque enim leucæ, neque albi ipsi inter tumores præter naturam annumerandi ueniunt, sed potius inter cutis maculas seu descædationes. Quæ licet minimè lædant, quia tamen dehonestant, maiori plerumque studio (præsertim mulieribus) esse consueuerunt, quàm multi alij lædentes quidem, sed latentes morbi. Vtrunque autem hunc affectum, leucam inquam, & alphon, uiliginis nomine Celsus (qui tres eius species facit) complexus est: quamuis alij medicinæ interpretes, Græca Latina facientes, leucam passim uiliginem conuertant.

Viligis. Itaque uiligis, si genere quodam comprehendatur, fœdus cutis color est, ex malo particule alicuius habitui proueniens, quæ nutrimentum probè sibi assimilare non potuit. Maximo enim facultatis alteratricis errore uitium hoc contingit: cuius duplicem speciem alij constituunt: Vnam quidem, quæ solam cutim inficit: alteram, quæ altius descendit, adeò ut carnem quouque ipsam attingat, ac pilos coloret. Vtraque autem albo, uel nigro præcipuè colore cõmaculat. Prior species, siue alba, siue nigra sit, Græcis eadè uoce alphas dicitur, & Auicennæ morphea: Altera uerò species, quam profundiorē diximus, Celsus, & Græcis leuce, Auicennæ Albaras, Halyab. lepra nuncupatur, sedus quidem, & difficilè curabilis affectus, non tamen perniciosus. Ex quibus intelligi potest, quòd parum nominibus sit fidendum, nisi res (inquit ille) admodum fuerit explorata. Eadem enim uox sæpe apud uarios autores diuersam, ac longè dissidentem habet significationem, ut passim in ijs commentarijs demonstratur.

Parum nominibus fidendum esse.

Hæc

Hæc autem obiter de eiusmodi maculis; & cutis de-
 fœdationibus annotauimus, ut verum confusio, quæ ex
 perperam intellectis nominibus sequi solet, effugeretur.
 His igitur omiſſis, ad institutum reuertamur, ac
 reliquas puſtulas breuiter quantum fieri poteſt, per-
 curramus. Ex quarum etiam genere præter iam enu-
 meratas cenſentur Græcorum ionthi, epinyctides, hy-
 droa, pſydraces, exanthemata, Celsi papulæ, & Plinij
 mentagra. Ionthi parui ſunt, & duri in uultu, seu

Ionthi.

10 cute faciei tumores Galeno, & Paulo, à crasso humo-
 re progeneri, qui uel reſoluentur, uel, exiguo ingenito
 pure, maturantur: Latinis uari dicuntur. Meminit Ga-
 lenus libro quinto de medicamentis ſecundum locos,
 ionthoſi cuiuſdam affectus, quem principium eſſe dicit
 elephantiaſis: ſub quo affectu uidetur tertium, et quar-
 tum genus impetiginis Celsi comprehendiffe.

Epinyctides.

Epinyctides Celſo puſtulæ ſunt peſſimæ, colore uel ſubliui-
 do, uel ſubnigro, uel albo, fabæ magnitudinem non ex-
 cedentes, in eminentibus partibus, ut tibijs, & pedibus
 20 maximè naſcentes. Circa has uehemens inflammatio
 eſt, & cum ad aperta ſunt, reperitur intus exulceratio
 mucoſa: color eſt humori ſuo ſimilis: dolor uerò ex
 eis ſupra magnitudinem earum eſt. Neque enim ut di-
 ximus fabæ maiores ſunt. Nomen à nocte acceperunt,
 uel quòd noctu grauiori dolore torqueant, uel (ut Cel-
 ſus uoluit) quòd noctu ſerè oriantur. Plinius eas puſtu-
 las liuentes, ac noctibus inquietantes nominat: Ara-
 bes uerò, eſſere, ſere, uel faire eiufmodi puſtulas, ſic no-
 ctu infeſtantes, uocauerunt. Quod Græci ſunt hy-

*Unde dicta epi-
 nyctis.*

30 droa, Latinis quibuſdam ſudamina, & Plinio papulæ
 ſudorum dicuntur: Auicennæ uerò, planta noctis: &

Sudamina.

Planta noctis.

Almanſori,

Almanfori albasaphum. Quò fit, ut epinyctis à plan-
ta noctis ipsius Auicennæ plurimum differat, tametsi
uox ipsa Græca epinyctis (ut modò dicebamus) à no-
fle etiam originem trahat. Sunt autem sudamina hæc,
Galeno teste libro tertio aphorismorum, comment.
xxi. ex genere pustularum, summa corporis parte
hærentium, quæ instar ulcerum cutem exasperant:
proveniuntq; ut & nomen ipsum (inquit) indicat, ob
multos sudores, uel biliosiores, uel mordaciores, qui
cutem mordent, & pruriginosam reddunt, ac per mo- 10
dum ulcerum exasperant. Porro hæc affectio puerulis,
atque iuuenibus, sed his præcipuè, qui naturâ sunt bi-
lios, ætus tempore communis est, adeoque facilis cu-
rationis, ut per se absque ullo præsidio albicantibus
quibusdam squammulis dimissis sanescat. Auicennæ au-
tem desudationes (ut ex earum constat descriptione)
potius exanthematibus Celsi, quàm sudaminibus Gale-
ni respondere uidentur. Si quis tamen nomina atten-
dat, desudationes ipsas principis Auicennæ putabit
Græcorum hydroa, quæ Latini sudamina uocant. Ve- 20
rumenim uerò non tam nomina ipsa apud Barbaros,
& Arabicæ sectæ autores sequenda sunt, quàm ipsæ
rerum descriptiones. Psyraces, seu psydracia pu-
stulæ sunt, parùm supra summam cutem eminentes,
phlyctænis, hoc est, bullis, quæ ab igne excitantur, per-
similes. Hæ in capite præcipuè nascuntur. Psysacion
corruptè legitur apud Celsum pro psydracion. Pu-
stulæ illæ in cute florentes, quæ uulgò morbilli, & ua-
riolæ nuncupantur, Galeno exanthemata, Hippocrati
eclhymata dicuntur, Plinius papulas, & interdum pi- 30
uitiæ eruptiones uocat. Porro uariolæ, & scopuli
uocati,

Gal. de sudami-
nibus.

Desudationes
Auicennæ.

Psyraces.

Morbilli.
Variolæ.
Exanthemata.

Eclhymata.

Scopuli.

uocati, à materia fiunt craſſiore; morbilli à tenuiore. Papulæ tamen ſcopuli, uulgò dictæ, maiores ſunt uariolis. Hæ minora, illi magna ecſthymata ſunt Hippocrati. lib. 111. Epid. Morbilli uerò eidem herpetes magni nominantur. Magnos autem (ait Galenus) herpetas dixit Hippocrates, uel quia magnum occupant locum, uel quia cum maligna contingunt eroſione. Morbilli nanque quandoque altero tantum, quandoque utroque modo magni uiſuntur. Cornelius Celſus libro quin-

10 to ſuæ medicinae, poſt tractatum de impetigine, meminit duplicis papulæ: unius quidem leuioris, quæ ſi ieiuna ſaliua quotidie defricatur, ſaneſcit: alterius maioris, in qua magis cutis exaſperatur, exulceraturq; ac uehementius et roditur, et rubet, difficiliusq; ſaneſcit. Hanc agriam, id eſt, ſeram dicit à Grecis appellari. In utroque tamen genere minus uitij, quàm in impetiginibus agnoſcit: adeò ut id, quod difficilius ſaneſcit, niſi ſublatus ſit, in impetiginem uerti, ac tranſire aſſermet. Galli (ſi quid iudico) genus utrunque, ſed

20 prius maximè, dartras appellant. Id enim uitium maximè rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit, ac tardè ſerpit. Quæ omnia papulæ primi generis Celſi conueniunt. Haſ autem Celſi papulas nihil à Græcorum lichenis diſſerre nonnulli conſtanter aſſeuerant: eumq; ſolum autorem inter Latinos, lichenas, papulas uertiſſe legimus. Mentagra Latina

30 intellexerunt: licet in medicinis quandoque Græcorum lichenas impetiginem ſit interpretatus, et mor-

Papulae
Celſi.Dartra
Gallica.

Mentagra.

Plin. lib. 26.

Mentagria agnō
bit Galenus.Morbus Neapo-
litanus.Morbus uene-
rens quando pri-
mum in orbem
irrepsit.

bum eiusmodi mentagram appellatum, eo loco etiam
 lichenus uocet. Porro refert idem Plinius, malum hoc
 Tyberij Caesaris principatu primum in Italiam irreps-
 sisse, omniq; æuo priore uniuersæ Europæ, nedum Ita-
 liæ, incognitum: tanta quidem sceditate, ut quæcunque
 mors hinc præferenda esset: tanta etiam contagione,
 ut osculo solo ueloci transitu inficeret, sed procures
 maximè. Hec lues à mento ferè oriebatur, unde et
 nomen illi factum est mentagra. Ceterum morbum
 hunc agnouisse uidetur Galenus. Quinto enim libro de
 medicamentis compositis secundum locos meminit.
 foedissimæ cuiusdam menti impetiginis, quæ pruriturum
 (ut ex Critone refert) excitat, et affligit patientes;
 atque in discrimen non mediocre adducit. Nam inter-
 dum per uniuersam faciem serpit, et ad oculos usque
 procedit, et ferè supremæ deformitatis causa effici-
 tur. Quæ impetiginis descriptio per omnia menta-
 græ Plinij conuenit. Errant autem uehementer, qui
 foedissimum hunc lichenem, mentagram à Plinio ap-
 pellatum, morbum eum esse existimant, quem hodie
 uulgò quidam Gallicum, alij Neapolitanum, alij (citra
 odiū, et iniuriam nationum) Venereum appellant. Hic
 enim ueteribus, et priori seculo omnino ignotus fuit;
 primūq; apud Neapolim irrepsit anno à Christo nato
 1493. Quo tempore Carolus, Gallorum Rex inui-
 sissimus, alpes superabat, Italiam petiturus: quamuis
 antea non longe per Hispanias (ut quidam referunt)
 serpsisset: quapropter tanquam inde traxit origine;
 lues Hispanica coepit appellari. Quæ pestis diuina
 ueluti ultione (ut par est credere) ob foedos, illicitos,
 atq; à Deo uetitos concubitus, in terras immissa, ma-
 gnā

gnam generis humani partem sua cōtagione fœdauit,
 & prostrauit. Id enim malum sensere magistratus, sen-
 sere maucipia, sensere procures, sensit humilis plebs;
 ueloci unius ad alterū transitu: iamq; per Hispanias,
 Gallias, Italiā, totamq; Europam magno mortaliū di-
 spendio uagatur. Sunt & pustulæ quædā præter has
 modò enumeratas, apud Auicennā libro quarto, glādo-
 sæ dictæ, quæ nihil à gāglio differre uidetur, nisi mino-
 ris tantum, maioris uel ratione. Mētio quoque est apud
 10 eundem Auicennam lib. 3. de quibusdam pustulis, quas
 iunclurarum bothores uocat, & libro quarto alma-
 tim: quas cum nigras esse dicat, & uiridibus granis si-
 miles; Græcorum proculdubio terminthi erunt, quos
 20 suprà inter phymatis species enumerauimus. Has uide-
 tur Celsus similes uaris facere, & putare à Græcis
 helcodes dici, id est ulcerosas. Pustulæ albæ, uel lacteæ
 Rasis, & Serapionis, & bothor leues Auicennæ, si ear-
 um descriptiones penitus inspiciantur, ad ionthos
 Græcorum, quos Latine uaros nominauimus, pertine-
 25 re uidebuntur; quanquā eadem remedia, quæ ad illas
 scribit Auicenna, à Dioscoride ad ephelidas præcipian-
 tur. Hactenus de differentijs tumorum præter natu-
 ram, qui præcipuè foris in corpore fiunt.

Pustula glan-
dose.

Terminthi.

Pustula albæ.

De causis tumorum præter naturam,
 extrinsecus apparentium, in
 uniuersum: Cap. III.



AVSAB tumorum præter naturam re-
 centioribus medicis, & chirurgis geminæ
 30 statuuntur: generales scilicet, & spectrales.

Causæ tumorum
præter naturā.

Generales causæ sunt, fluxio, quod Græci ῥέυμα uo-

B ij cant,

Fluxionis cau-
sa sex.

Pars propellens.

Particula exci-
piens.

Humor fluens.

Spacium.


Congestionis
causa.

Quomodo cali-
da defluxio tu-
morem creet.

cant, & congestio. Rursus fluxionis causæ iisdem sex numero constituuntur. Nempe membri propellentis robur; excipientis imbecillitas; materiae copia, seu multitudo meatuum deferentium, id est, per quos fit fluxio; laxitas, siue amplitudo, propellētium angustia, siue strictura; & loci fluxionem excipientis situs inferior. Hæ autem ad quatuor reduci possunt, utpote ad membrum propellens; particulam suscipientem humoris fluentis conditionem, & spacium per quod fit defluxio. Caterum fluxio concitatur ratione membri expellentis, uel propter robur facultatis expultricis ipsius, uel propter connexum naturalem, quem habet cum membro excipiente, uel propter propriorum meatuum angustiam. Pars uero aliqua fluxionem excipit, quia uel dolens, aut calida, uel imbecillior, uel rarior, atque ignobilior, uel in inferiori loco sita. Porro ratione humoris fit defluxus in partem aliquam, quia sit copia superuacua, qualitate molestus, substantia tenuis: spacium autem fluxionis causa existit, ob meatuum amplitudinem, utpote uenarum, arteriarum, & pororum. Congestionis uero (quæ altera est causa generalis tumorum, qui præter naturam incidunt) causæ geminæ assignantur: nempe error uirtutis, quæ alteratrix, & alatrix dicitur, & imbecillitas expultricis. Ex quibus colligitur, quod tumores calidi magna ex parte fiunt à defluxu humorum: frigidi uero eorundem congestionem potius excitantur. Quomodo autem calida fluxio tumorem excitet, aperte, ac scite demonstrat Galenus libello illo, cui titulum fecit, De inequali intemperie, ad hunc modum scribens: Statim defluxione calida ad musculum decumbente, primum arte-
ria

,, riae maiores, uenæq; opplentur, ac distenduntur: ab ijs
 ,, uerò minores, atque ita res procedit, donec ad minia
 ,, mas sit peruentum. In ijs ubi ualenter impacta fluxio
 ,, est, & amplius contineri non potest, pars eius per
 ,, ipsarum orificia egreditur, pars per tunicarum fora-
 ,, mina percolatur ad exteriora, atque exinde fluxione
 ,, implentur spacia uacua, atque intermedia primorum
 ,, corporum. Sic omnia ab humore, omniq; ex parte in-
 ,, calefcunt, ac perfunduntur. Sunt autem hæc, nerui, li-
 10 gamenta, membranæ, caro ipsa, & ante hæc arteriæ,
 ,, & uenæ, quæ scilicet & primæ, & præter cætera ua-
 ,, rio dolore afficiuntur: quippe interius à fluxione tum
 ,, excalfiunt, tum distenduntur, ac diuelluntur, distrahun-
 ,, tur'ue. Exterius non modò excalfiunt, sed etiam pre-
 ,, muntur, ac degrauantur. Reliquæ uerò particule, aliæ
 ,, quidem calfiunt tantum, uel comprimuntur, aliæ utro-
 ,, que modo laborant. Atque hic morbus phlegmone no-
 ,, minatur. Hactenus Galenus. Itaque in eiusmodi tumo-
 20 ribus præter naturam, qui ex humorum influxu fiunt,
 aliquid iam (per initia saltcm, & antequam resistit
 fluxio) factum, ac generatum est, & aliquid adhuc fu-
 turum, atque in generatione est: hoc fiens, illud factum
 esse, uulgò dicunt. Quod adhuc fit, siue fiens, materia
 est antecedens, quæ adhuc in fluxu est: factum uerò,
 materia coniuncta, quæ iam influxit, & in parte labo-
 rante impacta est. Hinc non simplex, sed composita, in
 eiusmodi phlegmone, quæ in generatione adhuc est,
 (ueluti in reliquis alijs tumoribus, ac morbis etiam
 omnibus, qui in gignendo adhuc sunt, necdum absolu-
 30 tionem sunt nacti) medentis sollicitudo est Galeno, ex
 ea scilicet, quæ prouidet, & ea, quæ, curat: sed hæc al-

Omnium morbo-
 rum, qui adhuc
 in gignendo sūt,
 duplicē esse in-
 dicatione m.



*Causæ speciales
tumorum præ-
ter naturam.*

Prægressæ.

Antecedentes.

*Naturales hu-
mores qui dican-
tur.*

*Humores nō na-
turales qui di-
cuntur.*

terius sunt contemplationis. Ceterum tempestiuum est, ut speciales (quas uocant) tumorum, qui præter naturam sunt, causas subiiciamus. Hæ autem tres uulgò assignantur: Prægressæ, quæ & prægressæ, & euidentes nolis dicuntur: antecedentes: & coniunctæ: Græcis dicuntur. πρὸν αὐτῶν τῶν καὶ, πρὸν ὑμῶν, οὐκ ἐκ τῶν καὶ. Prægressæ seu prægressæ causæ dicuntur, quæ dum aduersam ualeitudinē, seu morbosos affectus creant, separantur; ut casus, percussio, fractura, distensio, luxatio, aut error, qui in uiculus ratione cōmit- titur. Antecedentes, seu præcedentes causæ dicuntur, quæ paratæ sunt morbos efficere; ut sunt humores quatuor tam naturales (ut loquuntur) quàm non naturales. Naturales humores sunt, qui ad corporis nutritionem sunt idonei, & in massa sanguinaria continentur: proinde & una sanguinis appellatione continentur. Qui si ex uenis, aut arterijs effundantur, subito cōcrescunt, siue extra corpus manent, & profluant, siue in ipso adhuc quocunque loco cōtenti remaneant.

Non naturales uerò eos appellant, qui à sanguine, quo partes nutriuntur, hoc est, massa sanguinaria separati inueniuntur, & ob suam prauitatem, uel corruptelam ex seipsis, hoc est, ex natura sua, inepti sunt ad corporis nutritionem, & ad alimoniam illi præstandam: qui quantumuis etiam in aëre nos ambiente permaneant, nunquàm concresecunt. Hi autem uel quadam naturæ providentia certi alicuius usus gratia in conceptacula quædam relegantur, aut foras ad corporis extima propulsi, tumores non ueros, ac illegitimos appellatos, abscessus inquam, pustulas, & cutis defædationes generant. Interdum uerò insensibili perspirant, uel sensibilitèr

uel sensibiliter per sudores digeruntur, atq; exhalant, Nonnunquam intrinsecus putrescunt, & febres excitant. Atque hi (inquiunt) æquiuocè, & improprie humores dicuntur, naturaliumq; nomina sibi usurpant. Solùm enim eos succos, qui ab hepate in sanguinea generatione nutritionis, ac fluoris nostri corporis reparandi gratia conficiuntur, proprie humores censent appellandos: cuiusmodi est sanguis uerus, ac purus, biliosus, pituitosus, & melancholicus, quo singulæ
 10 nostri corporis partes nutriuntur, insaturanturq;: aliæ quidem puriores, & (ut ita dicam) magis sanguineæ: aliæ uerò biliosiores: aliæ pituitoso magis: aliæ melancholico, prout cuiusque natura exposulat. Itaque humores uniuersi in uenis, & arterijs continentur, quod & coloris ipsius, & consistentiæ uarietas indicat, ut libro de atra bile Galenus expressit. Porro ex ijs quatuor humoribus naturalibus dictis, quatuor præcipui, ac legitimi tumores præter naturam fiunt, quæ uulgò apostemata uera nominare solent: in quibus scilicet
 20 tumor ad sensum magnus est, materia, unde procreantur, magis quantitate peccat, quàm qualitate. Hi autem proprijs nominibus dicuntur phlegmone, erysipelas, œdema, scirrhus. Ex nō naturalibus uerò (ut uulgaribus medicis placet) abscessus, quas exituras uocant, & pustulæ oriuntur: de quibus in præcedentibus abundè diximus. Atq; hos tumores, abscessus inquam, & pustulæ, apostemata non uera eisdem censentur. Ad quæ, & alia duo tumorum genera reduci uolunt, flatuosos scilicet (quas & inflationes uocamus) & aquo-
 30 sos, qui ex serosa substantia procreantur, uulgò apostemata uentosa, & aquosa nuncupant. Itaque sex sunt

Qui succi propriè humores dicuntur.

Ex quatuor humoribus naturalibus quatuor fiunt legitimi, ac præcipui tumores.

Ex humoribus non naturalibus qui tumores fiunt.

*Causæ coniunctæ
tumorū præ
ter naturam.*

*Continens cau-
sa quæ dicatur.*

nomina simplicium (ut loquuntur) apostematum: nempe apostema phlegmonosum, erysipelatosum, & dematodum, scirrhusum, flatuosum, & aquosum. Compositis uerò (quoniam horum infinita propemodū turba est) non omnibus propria sunt indita nomina, sed illis dumtaxat, in quibus humor aliquis supra ceteros dominum obtinere euidenti ratione deprehenditur, ut iam ex præcedentibus satis innotuit, & rursus in sequentibus suo loco plenius ostendemus. Ceterum causæ coniunctæ, seu continentes tumorum præter naturam, quos apostemata, pustulas, & exituras uocant, sunt materiæ, quæ in particula ipsa laborante aggregate, & infartæ reperiuntur, quæq; adhuc permanent, postquam tumorem excitarunt: ac dum crescunt, tumores ipsi augentur: cum decrescunt, minuuntur: & cum desinunt, finiuntur. Causa enim coniuncta, siue continens morborum omnium, ac dispositionum, quæ in corpore sunt, in uniuersum ita ab Auicēna, & uniuerso iuniorum medicorū cœtu definitur: Quæ cum præsens est, eius quoq; morbus adest: cum uerò tollitur, etiā morbus euanescit. Verū enim uerò quidā huius ætatis medici non uulgariter eruditi duas tantum esse morborū causas Galeno contendunt, externā uidelicet, & internam, siue ut nunc loquuntur, primitiuam, & antecedentem. Itaque primitiuam, atque externam causam (inquiunt) appellat Galenus, quæ extrinsecus corpori aduenit, ipsumq; uehementer alterat, atque immutat, quæq; dum uersam ualeitudinem creauit, separatur: ueluti calor, frigus, scorpio pungens, Græci (ut diximus) eam πρῶτα καὶ ἀρχικὴν uocant: internam uerò, siue antecedentem nominat Galenus, quæ in ipso animis

malis corpore consistit, & iam morbum facit. Eam autem quam coniunctam appellat, ne (inquiunt) somniauit quidem, cum secundum huius sententiam, affectus actionem impediens, aut uitians, morbus sit, & non morbi causa. Coniuncta autem illa causa, quam Auicenna, eiusque sequaces somniarunt (ut ex data ab ipsis descriptione constat) affectus sit actionem ledens, quæ propria est morbi definitio. Nihil igitur causa illa coniuncta à recentioribus medicis, & eorum princepe Auicenna introducta, à morbo prorsus differt, à quo primum ea, quæ secundum naturam est actio, leditur. Ceterum cum hæc de triplici causarum morbificarum genere opinio iam inueterauerit, & apud omnes ferè nostræ etiamnum ætatis medicos irrobauerit, non absurdum uidebitur, si eas morbosas causas passim in hoc opere, dilucidioris doctrinæ gratia, huiusmodi nominibus distinguamus: nempe primitiua, antecedente, & coniuncta. Atque hæc de causis tumorum præter naturam dicta sufficiant. Nunc postulat ordo, ac orationis series, ut eorum signa, & iudicia subiiciamus, modò tamen pauca de abscessuum natura, & generatione præmiserimus. Itaque abscessus, qui Græcis ἀποσφύκτου, & uulgo exituræ dicuntur, Galeno libro de tumoribus præter naturam, & secundo ad Glauconem, dispositiones sunt, in quibus abscedunt, atque inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora. Materia enim, quæ eiusmodi tumores excitat, extra carnem musculi propulsa, continentia à subiectis diducit, et abscedere facit. Spacium igitur (inquit Galenus) uacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, uel humidam, uel mistam ex utrisque comprehendit,

Coniunctā causam nihil à morbo differre quorundam opinione.

Abscessus qui dicantur Galeno.

Duplex genus
abscessuum Gal.
lib. 14. therap.
meth. & lib. 2.
ad Glau.

ἀποσπυμματα.

Quæ in absces-
sibus inuenian-
tur.

comprehendit, quæ temporis diuturnitate in multiformes, & uarias substantiis alterantur. Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus: unum, cum inflammatio in pus uersa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: alterum, cum, nulla precedente inflammatione, humor aliquis, isq; aliâs species alius, uel spiritus aliquis uaporosus, aut substantia ex utrisq; mista, in parte aliqua colligitur. Quod bifariâ accidit: nam uel in spacio ipso, quod abscedentes interiacet partes, eiusmodi substantia, siue præuia defluxione generatur, aut aliunde in ipsam laborantem particulam confluit, uel statim quidem ab initio, uel ea ratione, qua fiunt illa, quæ ἀποσπυμματα uocantur. Nominant uerò (inquit Galenus) sic huiusmodi dispositionem, cum qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto, ad alterum transmutantur. Spacium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat uel inter duas tunicas, uel sub quibusdam membranis. Porro excoriât tandem circumposita corpora, uel quia omnino acris, aut omnino ipsa copia distendens, aut putredinem quandam tempore contrahens: sed & iam tunc acris est. Quod si humiditates ipsæ, quibus spacium, quod abscedentes interiacet partes, completur, & abscessus excitatur, longo interdum tempore perdurauerint, plures (ut suprâ diximus) habent alterationes, atque in uarias substantiis transmutantur, quæ non humorum modò, sed etiam solidorum quorundam corporum proprietates representant. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, atque carbonibus, & luto, & olei limo, & uini feci, & stipule, ac multis alijs talibus, similia corpora in abscessibus

scēsisbibus contineri inueniuntur, ut iam suprà de differētijs tumorum explicuimus.

De signis tumorum præter naturam extrinsecus apparentium in uniuersum, & eorundem iudicijs: Cap. IIII.

NO T A B tumorum præter naturam summa corporis occupantium (quorum diuinitatē speculatio ad chirurgum pertinet) sensuum organis, ac cuiusque particule laborantis præsentia faciliè deprehenduntur. Vbiunque enim incrementū apparet, naturalē statū excedens, ac præter naturæ modū particulam, quam occupat distēdens, eiusque actionem ledens, quod uel humor aliquis, uel substantia ex humore procreata, aut quæ ad humorem (ut loquuntur) sit reducibilis, uel uaporosus spiritus gignit, ibi & tumorem præter naturam, seu (ut dicunt) apostema generaliter loquendo, esse necesse est. Cæterum tumores, quæ uera apostemata appellant, tumore, dolore, & calore, magis, uel minus intensis, dignoscuntur. Non uera autem, quæ pustulas, & abscessus nominauimus, præter tumorem, malignitate quoque, seu (ut corū uerbis utar) mala morigeratione, & sequestratione etiam maiore, uel minore, hoc est, secundum magis, & minus (ut ab eorum uocibus non recedam) determinata deprehenduntur, & significantur. Signa autem particularis cuiusque differentie, & materierum, ex quibus fiunt, in sequentibus suo loco dicentur, dum scilicet de simplicibus ipsorum, qui præter naturam consistunt, tumorum differentijs tractabitur: ex quibus & compositis

Note tumorum
præter naturam
uniuersales.

Aristot. lib. 1.
physico:

Generalitas spe-
cialitatem ante-
cedit.
Iudicia.

Lib. de differen-
morborum.

positæ facile dignoscuntur. Verum enim uerò non prius
ad particularia est accedendum, quàm de uniuersalibus
sermo fuerit absolutus: is enim ordo in disciplinis obser-
uari solet: nec immeritò sanè. Nā uniuersalia ipsa, atq;
communia manifestiora sunt nobis, quàm particularia:
quippe quæ magis promiscua, confusioraq; sint, quàm
Aristoteles. Nemo igitur miretur, si passim in hoc ope-
re chirurgico à communioribus, & plura comprehen-
dentibus semper inceperimus, tum ob nuper adductam
rationem, tum quòd secundum naturam generalitas
specialitatem antecedit, ut idem testatur philosophus.
Sed ad propositum reuertamur, & iudicia tumorum
præter naturam consistentium persequamur. Circa
quæ primùm aduertendum est, omnes eos tumores, quæ
uera apostematà uocant, si Galeno, & Auicennæ cre-
dimus, inuicem magna ex parte complicari, neque fa-
cilè aliquem eorū syncerum, & purum inueniri. Nam
(ut Galenus inquit) phlegmonæ, hoc est, inflammationi
ex sanguine, magna ex parte miscetur aliquid, quod
uel erysipelatis, uel œdematis, aut scirrhi naturam ser-
uet: erysipelatis autem, quod phlegmones, aut œdematis,
aut scirrhi speciem referat. Et ita in reliquis omni-
bus similiter perpende. At uerò ij præter naturam tu-
mores, quæ non uera apostematà appellantur, ut pluri-
mum synceri, ac puri reperiuntur. Cæterum simplicium,
ac syncerorū curationes in sequentibus persequemur,
ex quibus & compositorum, & implexorum curatio
facilè intelligetur. Nam omnes & persequi, & compo-
nere, superuacaneum mihi uidetur. Si enim simplices
ipso tumores omnes cognoueris, deinde quo pacto in-
ter sese

ter sese componantur didiceris, satis idoneus eris, qui in reliquis particulatim te exerceas. Sed iam reliqua, quæ in uniuersum de tumoribus ipsis sumuntur, iudicia persequamur. Periodi, paroxysmi, & crises tumorum, qui præter naturam sunt, humorum, ex quibus constantur, analogiam (inquit Guido) sequuntur. Analogiam autem hic interpretamur proprietatem, seu proportionem, naturam, ac substantiæ similitudinem, quam formam specificam, & occultam

10 appellant. Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui per humorum influxum fiunt, quatuor temporibus distinguuntur, principio, augmento, statu, & inclinatione. Principij nota est, cum particula incipit distendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc exiguo. Incrementum adesse iudicabis, cum uideris tumoris molem attolli, locumq; affectum impleri, & in sublime efferri, ac symptomata, quæ unumquemque tumorem sequi solent, manifestè augeri. Status uerò indicium est, cum prædicta omnia, tum

20 mor scilicet, & symptomata cuiusque tumoris differentiæ, proprium uigorem suum obtinent, nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia faciens tumorem in aliam formam, seu substantiam alteretur, & transmutetur. Declinatio autem tunc adesse cognoscitur, cum tumoris moles, & propria ipsius symptomata imminuntur, uel materia, quæ tumorem facit, in aliam substantiam incipit transmutari. Itaque tempora hæc (ut inquit Guido) penes tria potissimum distinguuntur: nempe penes ipsius tumoris essentiam, hoc

30 est, magnitudinem, uel paruitatem: penes materiæ dispositionem, & accidentia, quæ curandi indicationem plurimum

Quatuor tempora tumorum præter naturam.

Principium.

Augmentum.

Status.

Declinatio.

Tempora tumorum præter naturam à tribus potissimum suis discriminantur.

Tumores præ-
ter naturā qua-
tuor modis ter-
minantur.

Optimus 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

Gale. lib. de in-
equali in intem-
perie.

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

plurimum immutant. Cæterum quatuor hæc tempora
simul aliquando coincidere videntur, propter breuem
scilicet, ac penè imperceptibilem uniuscuiusque dura-
tionem, ut contingit in uenenosis inflammationibus
non lethalibus, quæ statim uigent, ac florèt. Porro tu-
mores huiusmodi, qui ex humorum præsertim fiunt in-
fluxione, nisi retrocedant (hoc est, fieri prohibeantur,
per repressionem scilicet fluentis materie) uel spon-
te, & extra ullam rationalem causam, intrò recurrente
fluxione, minimè delitescant, altero istorum quatuor 10
modorum terminantur: nempe uel insensibili exhala-
tione, seu resolutione, uel facta suppuratione, uel cor-
ruptione, uel induratione. Omnium autem istorum
modorum optimus, & magis expetendus is est, qui per
sensu imperceptibilem fit dissolutionem: post illum ue-
rò, qui per suppurationem. At quæ per indurationem
fit tumoris præter naturam terminatio, simpliciter, at
quæ absolute mala dicitur. Quæ autem fit ad corru-
ptionem particulæ laborantis, omnium pessima censen-
da est: ut apertè nobis Galenus insinuat libello de inæ- 20
quali temperie, ad hunc modum scribens, postquam do-
cuit quomodo fiat phlegmone ex calida defluxione in
musculum decumbente. Itaque (inquit) duorum alterū,
sequi est necessarium, uel superante fluxione corpo-
rum, quæ succubere, sequi corruptionem, uel ea deui-
tia, musculum ad naturalem habitum reuerti. Subijcia-
mus igitur ipsam primùm fluxionem superari: rectius,
enim à melioribus incipitur. Duplex hic incidit cura-
tionis modus: quod scilicet uel digeretur, seu dissolue-
tur quicquid humoris in particulam procumbit, uel 30
concoquetur, uerùm dissolutio optabilior existit. Ad
concoctionem

concoctionem autem hæc duo necessario consequuntur: nempe puris generatio, & eius in aliquod spatium abcessio. Et paucis interiectis subiungit: At si uictæ à fluxione particula fuerint, in tantam hæc deuenient intemperiem, quod eorum operatio destruetur, & ipsæ temporis processu corrumpentur. Hactenus Galenus.

Diffolutionis autem, seu resolutionis indicia sunt, leuitas membri, & deficiens pulsatio. Signa tumorem uerti in suppurationem, indicantia, sunt dolor intrin-

Diffolutionis
indicia.
Suppurationis
notæ.

secus, pulsatio, & caloris incrementum. Fluxionem uistricem esse, & particula laborantis corruptelam, testantur nigror, & liuiditas, quibus nonnunquam & graucolentia accedit. Tumorem lapidescere, hoc est in lapideam abire duritiem, aperte demonstrat, tumoris immutatio, & cum hac, durities remanens. Regressionis uel delitescentiæ notæ sunt, subita tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationem, nonnunquam uero propter uenenositatem (nullis forinsecus admotis reprimentibus) accedit. Ad hanc

Corruptionis
signa.

Indurationis
notæ.

Regressionis, et
delitescentiæ in-
dicia.

autem subitam, atque affatim factam tumoris immutationem, febris statim consequitur, ac multa alia praua symptomata. Hactenus de signis, & iudicijs eorum tumorum, quos uulgò apostematis nomine proprie censent appellandos. Pusularum autem uulgò nuncupatarum notæ, & iudicia, suo loco, cum de illis tractabimus, dicentur. Abscessuum uero (quas exituras uocant) iudicia, ac signa, quæ uel statim eos futuros denuntiant, uel iam præsentem adesse demonstrant, hæc

sunt: Cum uideris (inquit Auicenna) pulsationem, aut duritiem in longum iam tempus productam; uel caliditatem, aut dolorem incrementum, tunc existima, quod apostema

Signa mox futuri abscessus, ex Auic.

Nota abscessus
iam facti.

apostema proximum est, ut in suppurationem uertatur, & fiat exitura, id est, abscessus. Cum autem con-
spexeris, ac deprehenderis leuitatem quandam affectæ
particulæ, & doloris sedationem, ac remissum calorem, quodq; tumētis loci pars aliqua cæteris emineat,
atque in mucronem subducatur: ad hæc cum premendo
digitis inundationem (ut loquuntur) perceperis, uide-
risq; gibbi illius seu mucronis colorem iam albescere,
tunc certò credere oportet, pus eo loci subesse, & tu-
morem iam abscessisse. Vnde, & ab Hippocrate re-
ferte est iudicatum, Quòd dum pus conficitur, dolores,
ac febres magis accidunt, quàm iam confecto pure.
Porro notæ eiusmodi tum iam facti abscessus, tum
mox futuri, uulgaribus ijs uersiculis communiter ex-
primuntur:

Durities longa, pulsus, dolor, & calor aucti
Signant pus fieri: sed factum, dicta remissa,
Sub digitis undans, albescens pars, & acuta.

Ceterùm in pure ipso cognoscendo, ac dijudicando,
maximè te attentum esse conuenit. Quandoquidem
suppuratio ipsa, seu puris in loco aliquo comprehensi-
notitia, multoties occultatur, nec satis medico innotescit,
ob loci scilicet, & puris crassitudinem: ut hæc
aphoristica sententia nobis expressit Hippocrates;

Quibuscunque suppuratio in corpore existens, non
innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci non
innotescit. Atque hæc de signis abscessuum, quas exitu-
ras uocant, dicta sufficiant. Porro de horum iudicijs,
hæc ab Auicenna, & recentioribus chirurgis scriptis
tradita sunt. Abscessus, uulgò exitura dictus, qui iux-
ta membrum aliquod nobile, uel prope iuncturas fit,
atque

atque adeò in uenosis, aut neruosis ipsis partibus, quique *Iudicia abscessuum.*
 in debili particula, & natiuo calore propemodum de-
 stituta, prædura quoque, & densa cute obiecta, consti-
 tit. Ad hæc qui crassiore materia, & ad motum tar-
 diore constat. Planus etiam, seu æquabilis, & in con-
 formulâ nō subductus, suspectus admodum est, ægreq;
 ac tardè maturatur. Quocirca maturantibus, & pus
 mouetibus, auxilijs, ac celeri, maturâ ue apertione indi-
 get. Qui uerò huic ex aduerso respōdet, boni moris est,
 & laudabilis. citò enim, & facillè maturatur, & in
 10 suppuratiōe uertitur, sæpiusq; nullo forinsecus adhibi-
 to auxilio, per se debiscit, aperiturue. Itaque si absces-
 sus tendit in acutiem, & puris substantia tenuis fue-
 rit, et acris, nec prædura, aut densa cutis extiterit, na-
 20 tura seipsa, hoc est, sua facultate alienorum expultri-
 ce, & citra aduentitium aliquod subsidium conceptum
 humorem foràs propellet: nisi quis facta incisione pro-
 tinus ipsam spontaneam apertionem anteuertat. Cæte-
 rum abscessus ipsi nōnunquàm per balitū digeruntur,
 30 hoc est, per resolutionē terminantur, nulla tunc in cu-
 te facta continui solutione, ubi scilicet pus & modicū
 est, & bonum, tenue quoque, & non in alto delitescēs.
 Sæpius tamen factō à natura, uel arte emissario, con-
 ceptus humor profunditur, quàm digeratur resolu-
 titurue. Quæ autem natura fit apertio, multò tutior est,
 quàm quæ arte tentatur: quod si arte fiat, securius ad
 huc, & melius scalpello, aut candenti ferro illam mo-
 liemur, quàm adurentē medicamento, quod raptorium
 appellant. Ideò autem ea sectio, quam in abscessibus
 manu, & arte molimur, deterior est ea apertione, quæ
 naturæ beneficio accedit, quoniam (ut inquit Auicenna)

Qui abscessus fa-
cile concoquan-
tur.

Qui abscessus
per resolutionē
maximè termi-
nantur.

Melius, ac tu-
tius scalpello,
quàm raptorio
abscessu ape-
riuntur.

nas) generatiua sit saniei (quàm uirus, & uirulentiam appellant) sordiciei quoque, & fistularum. Vbi tamen urget necessitas, nec alio datur uti meliori, & præsentiore auxilio, eam intrepidè aggredunda est. Hæc autem modò commemorata incommoda uitabis, si facta (cùm res exposculat) sectione, & continui solutione, pus mouentia, ad reliquiarum concoctionem, seu maturacionem, & detergentia, prout res exigit, laboranti particulæ mox adhibueris. Cæterum puris optimi, ac deterrimi notas, oraculo ultimo libri primi præfagiorum, nobis expressit Hippocr. ad hunc modum inquiriens: Pus illud optimum censetur, quod album, æquale (id est, si bi undique simile) leuèq; (tangenti) & quam minimè foetidum est. Quod uerò huic maxime contrarium apparet, pessimum est. Porro reliquorum aliorum, tum humorum, tum solidorum corporum, quæ in abscessibus continentur, signa, & iudicia in particularibus capitibus subsequentibus explicabuntur.

Puris optimi,
& deterrimi nota,
ex Hippocr.

De curatione tumorum præter naturam in uniuersum (eorum maximè, qui ex influxu humorum fiunt, ueracè apostemata uulgò dicuntur) & abscessuum, quas exituras uocant. Cap. V.

Tumorum omnium curandorum communis indicatio.



TUMORUM omnium, qui præter naturam sunt, iam factorum, & qui non adhuc in generatione sunt, communis, ac primæ curandæ indicatio una est Galeno lib. 1. 3. & 14. metho. med. nempe, ut quod præter naturam in particula est, & eam in tumorem attollit, totum uacuetur. Qui uerò adhuc

rò adhuc in generatione sunt, in his prior uacuatione est confluentis ad effectum locum humoris inhibitiō. Proinde in illis non simplex, sed composita est, medentis sollicitudo, ac curandi indicatio. Hæ autem communes indicationes pro tumoris ipsius differentia, & particulæ laborantis natura, ac ratione, plurimum uariant, & immutantur. Si quidem in omnibus iam factis tumoribus, & qualibet corporis parte, eius, quod infestatur, uacuatō, haudquaquàm similiter administratur: ut

10 libro secundo ad Glauconem, & locis nuper citatis docet Galenus: quod ex sequentibus etiam euadet manifestum. Sed neque ijsdem semper auxilijs, quibuscumque incipientibus adhuc tumoribus, & quamlibet particulam occupantibus, occurrimus, & præcauemus, aut quod in illis iam factum est, uacuamus: sed alijs, atque alijs, prout tumoris genus, seu differentia, & partis affectus natura postulat, inhibentibus fluxionem, & uacuantibus, quod generatū est, præsidijs uti nimirū cogimur, si rectam saltem agendorum rationem sequimur. Itaque ab ijs duobus, nempe ab ipsa dispositione,

20 seu morbi essentia, & partis affectus natura, tumorū, qui præter naturam sunt, curandi indicationes potissimum desumuntur Galeno. Porro dispositio ipsa, de qua nunc agimus, seu morbi essentia, tria in se iuxta recentiorum placita complectitur. Nempe quantitatem, qualitatem, & materiam, seu substantiam, quæ tumorem efficit. Quorum ratione prima illa, & communis indicatio immutatur, atque ab ijs etiamnum particulares curandi indicationes desumuntur. Aliter enim

30 tumor magnus, aliter paruus curatur. Si quidem magnitudo, & paruitas tumoris (ut existimant) differen-

Communes curandorum tumorum indicationes pro tumoris differentia, & laborante particulam uariari.

Curandorum tumorum indicationes à duobus potissimum desumi.

Tumoris essentiam tria in se continere.

tiam constituent. Alia enim ratione ingens phlegmone, alia minutus herpes curatur: aliter quoque, qui per defluxionē fit, & adhuc in gignendo est, quā qui per congestionem procreatur, aut iam factus est. Sed & calidus tumor, ut erysipelas, alia ratione, quā frigidus, ut est cedema, uel scirrhus, curatur. Quantitas igitur in tumore præter naturam curationem euarians, est magna, parua. Qualitas, fluxio, seu (ut loquuntur) deriuatio, & congestio. Materia, humor calidus, frigidus. Ceterum in partium laborantium natura quatuor potissimum spectanda sunt: temperatura, formatio, situs, uirtus, seu potentia. Quibus & quintum addi potest, facilitas scilicet, ac difficultas sentiendi. Nisi manus istud cum Galeno sub uirtute cōprehendi, atque includi. Hæc itaque communem etiam illam, quæ per singula dispositionis ipsius, id est, tumoris præter naturam, genera obseruatur, curationem plurimum euariant. Proinde & hæc omnes, quæ ab ipsis sumuntur indicationes, in curandis ijs, qui præter naturam incidunt, tumoribus, memoriā tenere oportet. Aliter namque curatur phlegmone, aut quouis alius tumor, in carnosiss partibus, quā in neruosis: aliter in oculo, quā in genu, uel collo: aliter in adenibus, quā in alijs partibus non glandosis. Breuiter particule ipsius laborantis, ac tumore obsessæ, temperatura, & formatio, & situs, & uirtus, seu potentia, singulas, quas ipsi in morbo curando molimur, operationes commutant: communi etiamnum intentione seruata, quam semper à morbo assumendam esse Galenus edocuit. Itaque communem curandorum tumorum præter naturam methodum, eorum præsertim, qui ex humorum influxu procreantur,

In indicatione,
quæ à natura
partium desumi-
tur, quatuor po-
tissimū spectan-
da esse.

Lib. 2 ad Glau-
conem.
Ordo tractado-
rum in sequen-
tibus.

procreantur, sumpta ab ipso affectu indicatione, nulla partis ipsius affectæ habita ratione, tradere hic primum insituiimus. Deinceps eorundem, sed maxime inflammationum, cum in abscessum degenerauerint, uniuersalem curationem subiiciemus. Post hæc uerò particularem singularum differentiarum, simplicium præsertim (ex quarum analogia compositorum curatio facile addiscetur) curandi rationem persequemur. Atque interim ubi locus exposulabit, nonnulla de curandi indicationibus, quæ à laborantibus, & tumore obsessis particulis assumuntur, ex Galeno proferemus. Quibus rectè intellectis, facile erit cuique rationali medico, ac chirurgo, tumores quoscunque quibusuis partibus insidentes, certa methodo, ac ratione curare. Galienus igitur imitantes, principium curationis tumorum, qui præter naturam dicuntur, ex humorum influxu procreatorum, ab inuentione occasionis ipsius affectus desumemus, ut scilicet, quæ eum excitant, ac faciunt causæ abscindantur: quod uerò in eo iam factum est, tollatur, sanetur uel. Itaque ut unius differentie tumorum, qui per defluxionem fiunt (de ijs enim duntaxat modò hic agimus) exemplo, atque analogia ceteras etiam differentias, quæ ex influxu humorum nascuntur, intelligamus, unius phlegmones breuè, ac compendiosam curationem hic subiiciemus. Hæc nanque & frequentissimè incidit, & febres, aliæque symptomata periculosissima excitat. Nomine autem phlegmones hoc loco non omnem calidam, ac ueluti flammeam dispositionem, quam Græci etiam phlogosin appellant, intelligi uolumus, sed eam duntaxat, quæ fluxionis sanguineæ soboles est, in carnosa corpora maxime inci-

Inuentio occasionis, principium est curationis tumorum præter naturam.

phlegmone quid.

dens, in qua dolor est uehemens, rubor per summa
 uigens, calor ueluti deurens, tensio, renixus, & cum
 malum increuerit, pulsationis sensus. Hanc enim in-
 flammationem cum Galeno, & alijs, qui eum tan-
 quam ducem optimum sequuti sunt, Græcis scripto-
 ribus, ut Paulo, Aëtio, & Oribasio, proprie phlegmo-
 nem appellamus. Vt igitur rem ipsam aggredia-
 mur: Communis omnium phlegmonarum genera-
 tio ex sanguinis influxu est, copiosioris scilicet, , ,
 quam sit parti ex usu. Inluit autem copiosior san- , ,
 guis, alia quapiam, alijs'ue particulis eum aliquando , ,
 mittentibus, ac ea, quæ phlegmone laborare incipit, , ,
 recipiente: aliquando uerò particula, quæ affligitur, , ,
 hunc ad se trabente. Partes autem, quæ mittunt, uel ut , ,
 copia superuacuum, uel ut qualitate molestum, uel uiro- , ,
 que nomine succum persequuntur. Quæ uerò attra- , ,
 hunt, hæc morbofo calore, uel dolore attrahunt. Sed & , ,
 his coadiutrices causæ sunt, particula imbecillitas, &
 ignobilitas; canalium, seu uiarum, per quas fit defluxio,
 amplitudo; meatuum quoque partium expellentium an-
 gustia; & situs inferior, ut iam supra dictum fuerat. 20
 Itaque ex omnibus his tres colliguntur recentiorum
 chirurgicorum turbæ curandorum tumorum, qui ex deflu-
 xione ortum habent, intentiones. Prima est, fluxionem
 auertere, ac eam omninò intercipere. Secunda est, do-
 lorem demulcere, atque eam occasione, propter quam
 particula fluxionem excipit, uel etiam attrahit, in to-
 tum summonere. Tertia est, id totum, quod iam factum
 est, curare, id est, totum eum humorem, qui in partem
 affectam confluit, uacuare. Cæterum quomodo pri- 30
 ma in-

Gale. lib. 13.
 meth. med.
 Communis om-
 nium phlegmo-
 narum genera-
 tio.

Causæ coadiu-
 trices fluxionis.

Tres scopi in cu-
 randis tumori-
 bus, qui ex flu-
 xionum influxu
 fiunt, chirurgi
 proponuntur.

Primus scopus.

ma in-

ma intentio perfici debeat, appositè docuit Galenus ^{Lib. 13. Thera.}
 lib. 13. methodi medendi, ubi modos omneis auertenda
 fluxionis, methodumq; ac rationē inhibendæ phleg-
 mones, quæ adhuc in generatione est, nobis expressit;
 ad hunc modum, si Græca Latina faciamus, scribens:
 „ Vbi equaliter succi inter se sunt adaucti (quod Græci
 „ plethoram uocant) imò etiam ubi purum ab excremen- ^{Plethora quid,}
 „ tis totum corpus est, & succorum mediocritatem con-
 „ tinet, dolore & membri, in quo phlegmone sedet, ca-
 „ lore fluxionem excitante: sanguinis nissione incipien-
 „ ti adhuc phlegmone succurrimus. Curatur etiam ple-
 „ thora tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum
 „ multa frictione. Præterea digerentibus medicamentis,
 „ modò febris non adsit: & præter hæc omnia, inedia,
 „ ac proba uictus ratione etiam si febricitet æger. Cùm
 „ uerò flaua bile, uel atra, pituita ue, aut serosis humori-
 „ bus refertum corpus est (eum habitum Græci cacochy- ^{Cacochymia,}
 „ miam nomināt) purgatione, quæ cuiq; suppuranti suc-
 „ co sit accommodata, uacuatio molienda est. Ac de ijs qui-
 „ dem in particularibus capitibus diffusius tractabitur.
 „ Cæterum antispasmi, id est, in cōtrarium reuulsio, com- ^{Antispasmi,}
 „ mune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxilium,
 „ dum fluxio adhuc ualenter irruit; utpote in principio
 „ morbi, & in augmento: in fine uerò status, & in ipsa
 „ declinatione, dum scilicet iam fluxio reslitit, atque in
 „ membro inhæsit, & corpus totum abundè uacuatum
 „ est: uel ab ipsa, quæ affligitur particula, uel à maxime
 „ uicina, uacuatio amolienda est. Secunda intentio com- ^{Secundus seor-}
 „ pletur anodynus remedijs, id est, sedantibus dolorem, ^{pus.}
 „ 30 & (ut communiter loquuntur) rectificantibus malam
 „ qualitatem: item adstringentibus, & intercipientibus
 „ C iij fluxionem,

fluxionem. Ad hæc, relaxantibus naturales meatus, per
 Tercius scopus. quos membrum affectum consueuerat repurgari. Ter-
 tiam uerò intentionem assequemur ijs, quæ materiam,
 tumorem excitantem, à loco affecto euacuant. Euac-
 uatur autem contenta iam in loco materia nō solum
 diaphoreticis, id est, euaporantibus, seu resoluentibus
 medicamentis, sed etiam repellentibus, seu repercutien-
 tibus. Itaque incipientibus phlegmonosis tumoribus,
 atque etiam alijs quibuscunque, qui ex humorum in-
 fluxu procreantur, magis utendum est reprimentibus, 10
 quàm euaporantibus, quibusdam exceptis casibus: ex
 quibus (inquit Guido) Galenus uisus est quatuor po-
 tuisse. Primus est, quando tumor eiusmodi fit in emun-
 ctorijs: Secundus, quando fit à materia uenenosa:
 Tercius, quando materia est crassa, & repulsiōi in-
 obediens: Quartus, quando uehementer est impacta. Aui-
 cennas duos duntaxat casus excipit: nempe cū tu-
 mor est in emunctorijs: aut loco aliquo, ex quo sit ti-
 mendus refluxus, seu reditus materiæ ad membrum
 aliquod præcipuum, & nobile. Alij unicū tantū, ca 20
 sum eximunt, alij sex, alij decem, alij 19. alij 23. Ego
 autem (inquit Guido) distinguendo de repercussiujs,
 dico quòd quædam sunt repercussiuæ propriè dictæ, ut
 oxycratum, quod constat ex aqua, & aceto: plantago,
 solanum, bolus Armenius, absinthium, cinnamomum,
 & alia id genus: quæ repellunt materiam, cui occur-
 sant, ad profundum. Alia uerò sunt repercutientia
 communia, seu communiter dicta: cuiusmodi sunt, oui-
 candidum, quod albumen nominant: malua, oleum ro-
 faceum, oleum chamæmelinum, & mastichinum: item 30
 colliria alba, & eius generis alia, quæ alterando mem-
 brum

Casus, in quibus
 non licet repel-
 lere, s. uic reper-
 cutere.

Repellentia pro
 propriè dicta.

Repellentia cō-
 munitia.

brum ipsum à superfluitatum receptione uindicant, ac
 tuentur. His suppositis, duo prologia subiungit Gui-
 do. Primum (inquit) dico, quòd in principio omnium
 tumorum, qui ex humorum influxu fiunt, & maximè
 phlegmonosorum, conferunt reprimèntia propriè di-
 cta, ijs decem casibus solum exceptis. Primus est,
 quando materia est in emunctorio: Secundus, quando
 tumor fit ex materia uenenosa: Tertius, quādo ex ma-
 teria fit admodum crassa, & ad motum inepta: Quar-
 tus, quando materia particule laboranti uehementer
 est impacta: Quintus, quando tumor criticus est:
 Sextus, quando excitatus est à causa primitiua: Sep-
 timus, quando in corpore est plethorico, & admodum
 pleno: Octauus, quando imbecillum, & uiribus penè
 destitutum corpus occupat: Nonus, quando sedem ha-
 bet iuxta principem aliquam particulam: Decimus,
 quando cum uehementi dolore incidit tumor: tunc enim
 mitigatorijs auxilijs, & nō repellentibus propriè di-
 ctis, opus est. Secundum prologium ad hunc modum
 habet: In principio omnium tumorum phlegmonosorū
 conducunt reprimèntia communia, & largius (ut dici-
 tur) sumpta: tribus duntaxat exceptis casibus. Pri-
 mus, quando est in emunctorio: Secundus, quando per
 crism excitatus est: Tertius, quando ex materia ue-
 nenosa procreatur. Ceterum in omnibus istis casibus,
 præcipuè uerò quando ferè iam constitit fluxio,
 & tumor iam factus est, seu (ut loquuntur) in facto es-
 se, ita ut materia in parte aliqua sit relictā, oportet
 materiam ipsam resolvere, ac discutere, admotis ipsi
 tumenti particule diaphoreticis, id est per halitum
 digerentibus, seu euaporantibus, non quidem mordā-
 cibus,

Primum Guido-
 nis prologium
 de repercutien-
 tibus.

Gal. 2. ad
 Glauz.

Secundum Gui-
 don. prologiū.

Si tumor iam fa-
 ctus est.

cibus, & acribus ualde, sed potius domesticis, ac familiaribus, modice quidem, ceu mediocriter calidis, & humidis: maxime uero in tribus ultimis casibus, in quibus fludere debemus materiam attrahere ad locum tumore obsessum, ipsumque tumorem augere, & materie iam fluxæ, ac coniunctæ refluxum prohibere. Quod interdum quidem facimus emplastris attrahentibus: nonnunquam uero cucurbitulis dolenti loco affixis, ut docet Auicenna. Sit ergo regula, seu canon artis generalis, quod in principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu creantur, exceptis paulo ante memoratis casibus, sola, ac pura reprimentia sunt adhibenda. In augmento uero, ipsis repellentibus, nonnihil ex ijs, quæ discutiunt, admiscendo. At in statu, & paulo ante statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus. Cum autem declinatio, uel finis status adfuerit, solis resoluentibus, & relaxantibus uti licet. Quibus uerbis nihil aliud innuitur, nisi quod perseverante adhuc fluxione, repellendum est: ubi uero iam constiterit, digerendum, seu resoluendum. Verum si medio modo res habeat, id est partim iam aliquid fluxerit, & loco inhaeserit, partim uero aliquid adhuc influat, mistis auxilijs uti oportebit, hoc est, partim resoluentibus, partim regredientibus, quæ & re-percussiuæ uocant. Coeuntibus enim unâ contrarijs indicationibus, compositum quoque esse præsidium oportet, ut 13. Therap. Galenus ait. Porro hæc omnia sanè intelligenda sunt, utpote si tumor præter naturam resolutione, seu (ut communiter dicunt) iuxta resolutionis terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulæ modò dictæ intentiones complentur, pro ratione diuer-

Artis canon generalis.

statis

fitatis materiae tumorē excitantis, in sequentibus particularibus capitibus, & in antidotario describentur.

De curatione abscessuum in uniuersum.

CAeterum si phlegmone, aut quouis alius tumor degeneret in abscessum (quam exituram uocant) eius curatio per initia præstatur. Gal. lib. 2. ad Glauconem, per mitigatoria, seu indolorosa auxilia, quæ Græci chalaſtica uocant, id est, relaxantia, siue remittentia, cuiusmodi est medicamentum, quod à Galeno tetrapharmacum appellatur, molle quidem, & anodynum, id est, mitigatorium. Cui ex ſententia eiusdem 13. Therap. mellis paululum admixtum sit oportet. Constat autem tetrapharmacum, ex ceræ, resinæ Colophonie picis, seu taurini, pari portione. Procedente uerò tempore, ad ea, quæ concoquendi, seu maturandi, ac suppurandi uim habent, transire oportet. Quæ autem in aliam speciem, hoc est, in alienam substantiam, & toto genere præter naturam degenerauerunt, ea per chirurgiam summouenda sunt. Porro in ijs amouendis iuxta Galeni consilium 14. Therap. id agere oportebit, ut rationibus, quibus id fiat, quod intendis, pensitatis, optimam semper earum deligas. Sane optimæ rationes tripliciter indicantur: nempe ex 20 temporis curandi breuitate, ex curando citra dolorē, 21 & ex maximè tutè curando. Rursus ut tutò cures, 22 tria propria sunt, quibus intentus sis oportet. Vnum, 23 primumq; ut omninò absolutionem operis consequaris, 24 rk. Alterum, ut sicubi hunc non consequaris, saltem cubantem non ledas. Tertium, ut uitium non facili reuertatur.

Curatio tumorum in abscessum degenerantium.

Tetrapharmacum.

Gal. lib. 14. metho. med.

Optimam curationem rationem tripliciter indicari.

tatur. His considerationibus si optimam curationis , ,
 uiam indicaueris, inuenietur quidem in omnibus modò , ,
 propositis tumoribus, quando potius chirurgiæ, & quã , ,
 do potius medicamentorum ope sit curandum. At chi- , ,
 rurgiæ quidem studium in ijs, præsertim, quæ nunc , ,
 sunt proposita (hoc est in ijs tumoribus, quò toto gene- , ,
 re sunt præter naturam) ad interemptionem eorum fe- , ,
 cinat, utq; prorsus tollantur sibi proponit. Quòd si , ,
 perficere nequeat, proximum illud consilium habet, ut , ,
 uitium transferat, ueluti in hypochymatis, id est, suffu- , ,
 sionibus. Quod uerò ex medicamentis petitur, primum , ,
 huc tendit, ut quod præter naturam est, tum in pus , ,
 uertat, tum putrefaciat: hoc uerò secundo loco destinat.
 Hæc Galenus. Itaque, ubi partes, quæ phlegmone in- , ,
 festantur, uehementius pulstant, sic ut iam despere- , ,
 tur de horum, citra pus curatione ueteres omnes , ,
 (inquit Gal. 4. Therap.) eiusmodi applicant medi- , ,
 camenta, quæ celerrimè pus mouent: ante uerò ne- , ,
 quaquam. Ceterum sicubi cataplasmate, quod calfa- , ,
 ciat, humectetq; (& ad suppurationem perducatur) illi- , ,
 nuntur quæ phlegmone infestantur, id nequaquam ex , ,
 prima ratione fit, hoc est, ut remedium affectus, sed , ,
 ut symptomatis mitigatio, utpote doloris. Si quidem , ,
 ipsius phlegmones remedia sicciorum sunt uirium. Et , ,
 paucis interiectis subdit. Compendiosa obsessarum , ,
 phlegmone partium curatio per id genus præsidia , ,
 (hoc est per siccantia, & resoluentia) obitur, ac perfi- , ,
 citur, quæ sanè uel affectum prorsus summouent, uel si , ,
 quid exiguum, quod suppuret, reliquerint, alterum me- , ,
 dicamentum acre, quod educere pus queat, requiritur: 30
 uel si tenuis, circumposita cutis sit, uel isq; celerius ex- , ,
 plicatum

Ex libro. 4.
 The. meth.

- , , plicatum ægrum, sectione, seu incisione opus est. Et hoc
 , , sanè est, quod dicebat Auicennas: nempe quod curatio
 apostematis, quatenus apostema est, extractio est ma-
 teria extranea, quæ excitat apostema. Auxilia autè,
 quibus mouere pus expedit, & alia, quæ suprà dicta
 sunt, perficere, in particularibus capitibus, & in anti-
 dotario dicentur suo loco. Porrò suppurato iam ab-
 scessu, aut transmutato, uel ualenter impacto, si pus,
 aut alia quæuis materia ibi contenta non discutiatur,
 10 uel si tempore conuenienti, & dum iam tempestiua
 adest occasio, sponte, hoc est, citra manus operam,
 non aperiatur, secare exitum ei, quod digestionem, seu
 resolutionem non cæsit, oportet. Potissimè uerò id mo-
 liendum erit, si timeatur futura aliqua erosio, uel
 aliud quoduis nocumentum: imò si necessitas ur-
 get, ex aduerso etiamnum aperiiri debet, & quàm
 promptissimè, ac tutissimè fieri poterit, materia ex-
 trahi, ob causam superius adductam. Tutius autem
 ferro, quàm medicamentis causticis, & adurentibus
 20 aperitur, ut amplius docebitur in antidotario. Com-
 munitè autem phlegmonosi eiusmodi tumores, iam in
 suppurationem uersi, scalpello inciduntur. Porrò aper-
 tio ipsa, seu puris emissarium fieri debet pro ratione
 tum quantitatis, seu copię materia ibi collectę: tum
 etiam ipsius loci affecti. Quòd si computruisse portio
 aliqua suppurantis partis, uidebitur, excidi eam est ne-
 cesse ad formam, seu similitudinem folij oliuę, uel myr-
 ti, quòd facilius sanescat. Cæterum Galenus maximas
 sectiones semper uitandas præcepit, sanabatq; huiusmo-
 30 di suppuratas particulas, etiam inguina, & axillas, so-
 la ut plurimum incisione, & medicamentis ualenter
 siccantibus.

Auicennas.

Quando potis-
simùm secandi
sunt abscessus.Tutius ferro,
quàm medica-
mentis aduren-
tibus suppurat-
tis tumor ape-
ritur. 13. The-
rap.Sectio oliuę,
aut myrti foliū
imitans.

ficantibus. Quod si aliquādo excindere aliquid propter multitudinem, non puris modo, sed etiam corruptarum partium fuit opus, contentus erat sectione, quæ myrti folium imitatur, planè (ut inquit) non magna. Ex amplis enim sectionibus, ubi ad cicatricem perducta est particula, præterquam quod turpissima redditur, sit etiam imbecillior, & ad motum ineptior.

Noxæ ex amplis sectionibus.

Señio in suppuratis bubonibus cur fiat pertransuersum.

Fiunt autem huiusmodi sectiones, myrtaceum folium imitantes, in ijs potissimum tumoribus, qui in axillis, & bubonibus suppurant. Et in ijs quidem longitudo pertransuersum ducta esse debet, non autem per cruris, aut corporis reilitudinem. Quippe ita cum crus, aut brachium inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. In alijs uerò locis incisione simplici ferè semper utimur. In ipsa autem apertione, siue incisione, septem potissimum sunt attendenda, iuxta iuniorum sententiā. Primum, ut sectio fiat eo loco, quo materia continetur: Secundum, ut fiat in loco inferiori, quò melius purulenta illa colluues uacuari possit: Tertium, ut fiat secundum rugas, & processum musculorum: Quartum, ut nitentur nerui, uenæ, & arteriæ, quoad fieri poterit: Quintum, ut non tota materia semel, atque affatim educatur, præsertim in magnis abscessibus, ne scilicet ex nimia, subitaq; inanitione, & spirituum resolutione, uirtutis sequatur prostratio: Sextum, ut blandius, & minime quàm fieri potest dolore, locus tractetur: Septimum, ut facta apertione locus detergeatur, carne impleatur, & ad cicatricem more aliorum ulcerum perducatur. Galenus autem lib. 13. Therap.

Septē attendenda in apertione iam suppurati abscessus.

Duo spectantur Galeno in apertione suppurati abscessus.

duo potissimum monet esse attendenda in sectione suppurati abscessus, ad hunc modum scribens: Sin, aliquando

„ aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea
 „ uideantur tibi totum digerere posse, secare exitum ei,
 „ quod digestionem non cessit, eo potissimum loco oportet,
 „ quo est editissimum. Quippe tenuissimam etiam illic
 „ inuenies cutem. Memineris præterea in sectione, & al
 „ terius indicationis, quæ ad effluxum pertinet, atque ad
 „ ambo respiciens, ita quos suppurauit, incide: ac dein
 „ ceptis medicamentum aliquod eorum, quæ sine erosione
 „ siccant, impone. Auxilia autem deterforia sunt Guido
 10 ni linamenta, stupæ, emplastra, & unguenta, quæ in
 „ particularibus capitibus, & in antidotario recense
 „ buntur. In primis tamen diebus (inquit Guido) sufficit
 „ uellus oui cū albumine, alumine zuccharino inspisa
 „ satus, ut facere (ait) solebat Guilelmus à Saliceto. Pos
 „ tea uerò transeundum est ad mel rosatum, & mundifi
 „ catium ex apia: & postremo, ad unguentum aposto
 „ lorum, & ægyptiacum, si res ita desideret. Suprà ue
 „ rò ad nouenda unguenta, basilicon, diachylon, & diapal
 „ ma uulgò nūcupata, atque alia id genus, quæ ad ulce
 20 ra insituntur. Post apertionem enim exituræ, siue ab
 „ scessus, excrecentiæ, & pustulæ (inquit ille) ad ulcerū
 „ curationem reducuntur. Gal. lib. 13. Therap. post ex
 „ cisionem cutim in phlegmonis axillarum, et inguinum, me
 „ dicamento, quod Græci mannam, id est, thuris purga
 „ mentum uocant, affectam partem implebat. Hæc au
 „ tem leui adstrictione prædita est. Sed & mitigare (in
 „ quit) prius incisam partem, quantum poscere uidebitur,
 „ oportebit: somentiis primum, dein cataplasmatibus, mox
 „ bumeclante aliquo medicamento, aut non siccante, sin
 „ gulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso ulce
 30 re, tum manna (ut dictum est) tum ex præsidij, quæ lin

Detergentia.

Hic variant
exemplaria.Vnguenta super
tumorē iā aper
tum applicanda.Manna, & ibi
ri usus post in
cisionem, & eo
rum uires.Partem incisam
prius mitigan
dam esse.Quæ in ulcere
ponenda.

teolis excipiuntur: primùm quidem ea, quæ pus citat;
 dein ea, quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si
 cautitas etiam mansit, quæ impleant, adhibenda sunt:
 sin aliter, ea, quæ cicatricem inducunt. Porro si labo-
 rans nec ferro candente, nec scalpello, fieri sectionem
 præ mollicie admiserit, medicamentis adurentibus erit
 molienda apertio. Ad hoc autem laudat Auicennas se-
 men lini, fermentum, & sterus columbinum. Et si in-
 corporarentur (inquit Guido) cum sapone molli, aut mu-
 cilagine seminis sinapis, bonum esset. Caterùm rupto-
 rium, seu causticum, quod fit ex calce, & sapone, in
 hac re principatum obtinet. Hactenùs de tumoribus
 præter naturam in uniuersum: ac deinceps de particu-
 laribus eorum differentiis.

Auicennas in fi-
 ne tract. 1. fen.
 3. lib. 4.

De phlegmone uera, & alijs à sanguine pro-
 creatis tumoribus: Caput VI.



AB SOLUTO iam in uniuersum sermone
 de tumoribus, qui præter naturam consi-
 stunt, tempestiuum est, de singulis eorum
 differentiis particulatim differamus, à phlegmone su-
 mmentes exordium, ut quæ & frequentissimè incidat, &
 symptomatica (ut Galenus ait) periculosissima excitet.
 Itaque phlegmone Galeno lib. primo de morbis, et sym-
 ptomaticis, bifariam accipitur. Vno modo communiter,
 ueterum, cui ante illum fuerunt, more, pro omni partiũ
 ueluti inflammatione, & quadam efferuescentia, hoc
 est, pro omni calida, ac ueluti flammea quadam dispo-
 sitione, quam Græci propriè phlogosin appellant. Alte-
 ro modo à Galeno, & iunioribus accipitur pro tumo-

Duplex acce-
 ptio phlegmo-
 nes.

Phlegmone pro
 phlogosi.

Phlegmone
 pro inflamma-
 tione ex sangui-
 ne optimo.

re ex

re ex sanguine uero ac puro, hoc est, optimo, ac medio crem cassitiem obtinente, procreato. Et hæc quidem generis sortitur appellationem, atque inflammatio æquiuocè generi Latinis nominatur, Græcis uerò absolute phlegmone. Ea autem recentioribus duplex est: uera scilicet, & non uera. Vera phlegmone fit à sanguine benigno, hoc est, qualitate, & substantia, seu cōsistētia optimo, sed copiosiore quàm sit parti ex usu.

*Phlegmone duplex.
Sanguis quid, et quoruplex.*

- Non uera & illegitima phlegmone, ex prauo, & non
 10 naturali sanguine efficitur. Est autem sanguis, humor calidus & humidus, ex temperationi parte ipsius chyli progenitus. Et hic quidem duplex est: naturalis, & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & humidus, substantia quidem mediocris, colore uerò multum rubens, odore autem & sapore dulcis, mitis, ac benignus. Verum non naturalis ille dicitur, qui ab isto nuper descripto deflexit, degenerauitq;: intra tamen suæ latitudinis terminos, quos si transgreditur, non iam sanguis, sed alius humor uenit appellandus. Hoc autem
 20 (sanguinem inquam degenerare à propria sua natura) contingit dupliciter. Vno modo (ut aiunt) in se, hoc est, ratione sui, permutata propria eius substantia, citra alterius admixtionem. Altero modo per alium, seu ratione alterius. Et per se quidem adhuc bifariam: nempe, uel quia eius substantia crassior est, aut tenuior quàm debeat: uel quia adurit, & quod ex tenuibus est, in flauam bilem mutatur: quod uerò crassius, in atram, idq; absque separatione. Alterius uerò ratione sanguis fit non naturalis, quando alius humor illi
 30 permiscetur. Quod multifariam contingere potest, prout scilicet uariæ species bilis, pituitæ, aut melæcholicæ,

Sanguis bifariam degenerat à propria sua natura.

Quatuor tumorum differentia ex sanguine.

liæ, cum ipso sanguine misceri possunt: Ex quibus liquet, quòd ex sanguine quatuor species, seu differentia tumorum præter naturam procreantur. Primum ex sanguine naturali & benigno generatur uera phlegmone. Ex sanguine uerò illaudabili factò per admixtionem aliorum humorum, tres enascuntur differentia phlegmones non ueræ, atque illegitimæ: quippe quòd tres alij humores (pituita inquam, & utraque bilis) ipsi sanguini pernasceri possunt. Itaque si flaua bilis sanguini commisceatur, quod ex ambobus tum est 10 conflatum, uocatur phlegmone erysipelatodes: si pituita, phlegmone oedematodes: si atra bilis, seu melancholia, phlegmone scirrhwodes. At ex sanguine illaudabili et maligno per adustionem & corruptionem propriae substantia, pro ratione tenuitatis aut crassitiei ipsius, generantur uel carbunculi, qui Græcis anthraces dicuntur, uel gangræna, uel sphacelus. De quibus in sequentibus dicemus.

De causis signis, & iudicijs phlegmones.

20

Causa phlegmones tres.

Prægressa.

Antecedens.

Phlegmones causæ sunt tres, ut & aliorum omnium tumorum præter naturam qui per defluxionem fiunt. Primitiua scilicet, quam & prægressam, & euidentem appellamus: antecedens, & coniuncta. Euidentes causæ inflammationis, sunt occasiones externæ: ut contusio, disruptio, cõuulsio, fractura, uulnus, ulcus spontaneum, luxatio, & alia id genus, quæ quatenus dolorem in laborante particula excitant, fluxionem accerunt. Antecedens, ut sanguinis exuberantia, probi quidem & inculpati, ut cum ad immoderatam uenarum repletionem 30

repletionem uenæ pertingunt. Tunc enim cogitur sanguis (ueluti quid superfluum) ad partem aliquam uel imbecillam, uel plus iusto excalfactam, uel dolore affectam, effundi, ac defluere: ubi tandem compingitur, atque impactus manet, nisi protinus ab initio reprimatur, ut iam supra in capite uniuersali dictum est. Ad quod subinde recurrendum tibi est, ut absolutam magis particularium tumorum, de quibus nunc agimus, intelligentiam consequaris. Coniuncta causa, seu

Coniuncta.

- 10 continens, est ipse sanguis, qui iam loco affecto infarctus est. Plegmones notæ sunt, tumor, seu incrementum partis supra naturalem habitum. Calor uehemens, adeo ut membrum comburi uideatur. Rubor per summa uigens, qualis ex balneis, uel igne, aut quouis alio modo calfactis aduenit. Dolor uehemens, nisi membrum difficilem omnino sensum habuerit. Pulsus, seu pulsationis sensus in profundo molestus. Tensio, seu extensio membri, quam non modo ipsi tantum deprehendimus, sed etiam ipse æger proprio sensu aduertit. Re-
- 20 nixus partis tangenti eam, pro tensionis modo. Et si quæ sint alia, quæ præsentem sanguinis abundantiam in parte aliqua testantur. Plegmone quatuor
- habet tempora, principium, augmentum, statum,
- & declinationem: nisi saltem fluxio intro recurrat,
- uel repellentibus medicamentis statim reprimatur ac
- retrocedat. Vbi autem hæc quatuor tempora per-
- currerit, necesse est terminetur uel per exhalationem, seu resolutionem, (quam diaphoresin Græci uocant) uel per suppurationem, uel per corruptionem,
- 30 quæ & putrefactionem nominant: uel per indurationem, dum scilicet resolutio tenui, in scirrhi abit duritiem.

Notæ ueræ, ac legitimæ plegmones.

Lib. de tum præter. nat. & 13. metib.

Plegmones tempora quatuor. Iulicia.

Symptomata,
que phlegmones
curationem in-
terpellant.

Et horum quidem omnium signa ex capite uniuersali sunt requirenda: ubi explicata sunt notæ omnium temporum, & modorum terminationis tumorum præter naturam, quæ uulgò apostemata uocant. Ceterum phlegmonen plerumque mala comitantur symptomata, quæ eius curandi rationem interpellant, immutantiq; . Cuiusmodi sunt dolor uehemens, partem admodum sensibilem occupans: recursus materiæ ex glandulis (quas Greci adenas, & uulgò emunctoria uocant) ad partes internas: item partis affectæ mortificatio (quam corruptionem æsthiomenicam appellant) ex nimia scilicet refrigeratione, & ualido infarctu ipsius materiæ (quæ inflammationem committebat) proueniens. Durities quoque lapidea, & pene indissolubilis, uulgò sclerotica nuncupata, ex perperam ac temerè facta tenuioris humoris dissolutione. Quocirca diligenter ac sæpius quidem obseruare oportet, in curandis tumoribus qui præter naturam consistunt, quò quisque tandem sit euasurus, & quæ inopinatè superuenerint accidentia, ut circa id quod apparet, & urgens est, maxime insistamus. Quod nos probè Galenus admonuit libro secundo ad Glauconem, & 13. Theophrastus ad hunc modum inquit: In morbis quidem qui difficulter resoluuntur, uerendum est, ne eorum reliquæ præduræ reliquantur. Quare in singulis resolutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis, cuius curatio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exiccantibus agitur, reliquias præduræ operatur. Hæc Galenus. Sed tempestiuum est, ipsius phlegmones curationem aggrediamur.

Galenus.

Ratio curandæ phlegmones ex defluxione concitata,
corporis summa occupantis.

- C**um inflammatio, quæ Græcis peculiariter phlegmone dicitur, ex influxu sanguinis, copiosioris scilicet quàm sit parti ex usu, nascatur: fluxio autem incipiente adhuc phlegmone, partim fiat, partim iam facta sit: geminus sanè erit curationis ipsius adhuc incipientis phlegmones scopus, nempe uacuandi quod influxit, & prohibendi quod influit. Porro
1. 0 fluxionem inhibebimus, si humorem influentem retraxerimus ac repulerimus, si afflicte parti robur addiderimus, & si quid fluxionem accersit, summouerimus. Retrahemus autem, atque in contrarium humorum defluxum reuocabimus, uenæ sectione, si quidem uires ualeant, & ætas permiserit. Sin minus, admotis cucurbitulis, uel ligaturis, uel frictionibus, uel calfactis partibus, directè affecto loco respondentibus. Regere
2. 0 propellere ac transmittere possint. Causas uerò defluxionem ad partem iam phlegmone obsessam accersentes summouemus, particulam ipsam, si imbecilla sit, confirmantes roborantesque: si laxa nimis, adstringentes: si calida est, ut esse solet, refrigerantes: & dolorem, si discruciat, demulcentes: ac corpus uniuersum, si sanguine abundet, & parti contagium transmittat, uenæ sectione uacuantes: de quibus omnibus mox dicetur.
3. 0 Vacuamus autem quod iam influxit, & in partem afflictam se recepit, non modò medicamentis ijs quæ digerunt, hoc est, discutiunt ac resoluunt, sed etiam quæ adstringunt, & refrigerant. Magisq; profectò (in-
- Methodus curandæ phlegmones, quæ adhuc in generatione est.
- Fluxio quibus prohibeatur.
- Retractio.
- Repulsio.
- Causa summotio.
- Vacuatio eius quod iam influxit.
- Galc. 13. Tbe. rap.
- D iij quit

quit Galenus) ad incipientes phlegmonas, frigidis, adstringētibusq; quā ijs quæ digerunt est utendum. Atque etiam magis, ubi crassum quod confluit non est. Sed si sanguis in particula, quam phlegmone prehendit, uehementer est impactus, non est amplius repercutientibus utēdum (ut in præcedentibus dictum est,) sed tum digerere est tempestiuum. In ueterascente quoque inflammatione, quæ post totius corporis uacuationem, aliamq; idoneam curationem, duritiem quandam ac nigrorem in partibus reliquit, sanguinem scarificationibus auferre (Galeno etiam autore) non est incommo-
 dum. Atque hæc summam, ac uniuersali quadam methode dicta sint de curatione inflammationum, quas Græci peculiariter phlegmonas appellare consue-
 runt, ex humorum defluxu incidentium. Quæ certe rationali medico, & in artis operibus exercitato, satis esse possent. Verum enim uero quoniam chirurgiæ can-
 didatis, & non ita eruditis, hæc scribenda suscepimus, non abs re, neque alienum à nostro instituto factum ui-
 debitur, si quæ de phlegmonarum curatione scriptis
 suis non modò ueteres medici, sed & recentiores chi-
 rurgi nobis scripto reliquerunt, post hanc uniuersalem ac compendiarium methodum sermone ma-
 gis peculiari, & uulgari subiiciamus. Itaque rationem curandi phlegmonem, præter regimen (ut uocant) uni-
 uersale, in quatuor scopos, seu intentiones particula-
 res, reuocare solent posterioris huius seculi chirurgi:
 nempe in debitam uitæ rationis obseruationem: in fluxionis inhibitionem, seu materiæ (quod aiunt) antea-
 dentis auersionem: in humoris, qui iam se in parte re-
 cepit (quam materiam coniunctam uocant) uacuationem, &

Scarificatio.

Quatuor inten-
 tiones curatio-
 nis phlegmo-
 nes.

nem: & in symptōmatum, seu accidentium correctio-
nem. Prima itaque intentio perficitur debita sex re-
rum (ut uocant) non naturalium, & eorū quæ illis an-
nexa dicuntur, administratione. Sunt autem res non
naturales à medicis dictæ numero sex, ut statim ab ini-
tio huius operis dictum est, aër, cibus & potus, motus
& quies, somnus & uigilia, inanitio & repletio, ani-
mi affectus, seu accidentia. Quæ omnia (quoniā phleg-
mone subinde febres accendit) ad frigiditatem, & mo-
deratam humiditatem, spectare debent. Pro quibus se-
quentia subiecinus præcepta:

Prima intentio,
quæ est uig in-
stitutio.

Res non natu-
rales.

Aërem syncerum, & clarum, eundemq; frigidiuscu-
lum deligito.

Aër.

Viduum tenuem frigidum & humidum seruato.

Cibus.

Vinum debile & pauciferum, id est, quod in tempe-
rando haud multam aquæ mixtionem suslinet (Græci
oligophoron uocant) assumito.

Potus.

Vinum obys-
phoron.

Quod si febris uehemens (ut sæpè assolet) accesserit,
abstemius esto.

20 Partem phlegmonem obsessam ne exercitato.

Motus.

Quietem quantum potes, præsertim si plurima succo-
rum abundantia sit, seruato.

Quies.

In somno & uigilijs modum teneto.

Somnus.

Somnum diurnum, et præsertim meridianū, uitato.

A crapula, & ingluuie summopere caueto.

Repletio.

Aluus fusa, & mollis tibi semper esto, atque eam
interdum, si opus est, clysteribus subducito.

Inanitio.

Iram, clamorem, contentionem, ut inimica, fugito.

Animi pathe-
mata.

A ueneris usu, seu cōcubitu, uelut ab hoste infestissi-

Venus.

20 mo, te substrabito.

Secundus scopus curandæ phlegmones, qui est flu-

Auersio fluxio-

*nis, quæ secun-
da est inuentio.
Vena semper è
directo secanda.*

fluxionis auersio, perficitur uenæ sectione, si uires & ætas ferant. Semper autem in omnibus membris è re-
gione siue è directo (quod Græcè κατ' ἴξιν dicitur)
siue reuellere, id est, in cōtrarium retrahere uelis, siue
ad latus deriuare, uena secanda est, etiam si plethora
adsit. E directo autē sunt dextra dextris, & sinistra
sinistris. Ergo si ophthalmia oculum dextrum infestet,
uel synanche partem gutturis dextram occupet, hūme-
ralis uena, uel eius loco (si non appareat) alia, statim
per initia fluxionis, in brachio dextro incidenda est. 10
At si humor in genu confluat, secanda est cubiti ue-
na, uel interna uel media, nisi alterū crus malis scarifi-
care, aut in eo uenam pertundere, ut alicubi Gale-
nus consuluit. Itaque uenæ secandæ electio, & auer-
sionis in contrarium (quæ ab Hippocrate antispæ-
sis dicitur) inuentio, à laborante particula, & cu-
randi membri positu præstat, indicaturq; ut 13.
& 14. meth. med. ac sæpè alibi Gal. docet. Cæterum
corpus ipsum, quod phlegmone occupatur, non mō cū
plethoricum est, sed etiā ubi morbi magnitudo suadet, 20
cū mediocritatem succorum continet, sanguinis emis-
sione uacuamus, si saltem Galeni consilium sequamur,
qui libr. 13. meth. meden. ita fieri præcipit, inquiens:
Dolor siquidem, & membri, in quo phlegmone se-
det, calor, etiam si purum ab excrementis totum cor-
pus sit, fluxionis causa fiunt. Expedit autem tunc par-
cius id efficere, (hoc est, sanguinē detrahre) ac uacua-
re quidem prout maxime tum ætati laborantis, tum
naturæ congruit. Aestimatis præterea tum anni tem-
pore, tum regione, tum hominis ipsius consuetudine. 30
Conferunt etiam non parū ad retractionem sangui-
nis in

*Venæ secandæ
electio à labo-
rante particula
indicantur.*

*Gale. 13. The-
rap.*

- nis in partem affectam cōfluentis, motus, frictio, & ligatura partis oppositæ, sed maximè celebrata prius (ut dictum est) sanguinis detractio. Itaque si in manibus phlegmone est orta, crura exercitanda sunt, uincienda, fricanda. Sin in cruribus, manus. Sed hæc magis ad medicum, quàm chirurgum pertinent. Tertium scopum assequimur solis, per initia phlegmones, repellentibus (exceptis prius memoratis casibus) parti inflammatione laboranti admotis. Vacuatur enim
- 10 (ut Galenus ait) quod impletum est, non modò medicamentis ijs quæ digerunt, sed etiam quæ adstringunt & refrigerant: cuius generis sunt, quæ repellentia & reagentia dicuntur. In augmento autem ad præsentem intentionem, id est, ad uacuandum quod iam influxit, simul & prohibendum ne deinceps amplius aliquid confluat, miscenda sunt digerentibus reprimentia: ita tamen ut horum copia ac potentia illis adhuc præpollere possint. In statu uerò æquis portionibus inuicem commiscenda sunt, ac mitigatoria (cùm uehementissimè
- 20 tunc dolores adsint) applicanda. At in fine status, & in declinatione, solis digerentibus quod impactum est uacuare oportet, si saltem ipsa phlegmone resolutione, seu discussione terminari debeat. Si uerò degeneret in abscessum, & fieri non possit, ut puris collectio ac eruptio impediatur, tum suppurantibus, aperientibus, ac detergentibus medicamentis uti licebit. Porro exicantia conferunt in fine utriusque affectus, hoc est, phlegmones & abscessus. Hæc enim quod reliquum humoris est prorsus absument. Verum facta sectione in
- 30 abscessu iam suppurato, medicamentum quod sine erosione siccet, imponendum est, ut in sequentibus dicetur.
- Porro

Tertius scopus
qui est humoris
iam in parte re
cepti uacuatio.

Reprimentia in
augmento præ-
pollere debent
digerentibus.

Si phlegmone in
abscessum de-
generet.

*Repellentia cir-
ca initium phleg-
mones admo-
uenda.
Oxycraton.*

*Lib. 13. meth.
meden.*

*Lib. 13. meth.
meden.*

*Galenī cata-
plasma lib. 2.
ad Glanc.*

*Fen. 3. lib. 4.
traft. 1. ca. 3.*

*Halyab. lini-
mentum.*

Porro ad incipientes phlegmonas repellendo aptissi-
mum auxilium est Galeno oxycraton, quod Latini pu-
scam aquosam nominant. Est autem mixtura ex aqua
& aceto, ita quidem temperata, ut adhuc bibi possit.
Spongia ergo hoc ipso oxycrato persusa atque imbu-
ta, parti, in qua phlegmone residet, imponenda est. Lo-
co autem oxycrati, Galeni ipsius consilio, sumi potest
uinum aliquod austerum, uel frigida, solum in particu-
lis scilicet, quæ circa artus sunt. Galeni uerba hæc
sunt si Romano sermone loquatur: In particulis, quæ
circa artus sunt, sat fuerit (per initia phlegmones) etiā,
spongiam uel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit,
inmixtū, uel ex aqua sola imponere. Et ut etiam ex ui-
no aliquo austero. Ad idem summè efficax est eiusdem,
Galenī cataplasmā, ex semperuiuo, & malicorio in ui-
no decoctis, rhu, id est, sumach, & polenta. Repellit
enim quod influit stringendo, atque id quod cōtinetur
exiccando uacuat, affectusq; partes utroq; nomine con-
firmat & corroborat. Hoc remedium à recētioribus,
ex Auicenna, sub hac formula postea descriptum est: 10
R. succi semperuiui libram unam, uini quod crassæ,
sit substantiæ, & saporis acerbi lib. semis, farinæ horæ,
dei quartū unum, corticis malorum granatorum, &
sumach pulueris factorum, ana unciam semis, coquantur
& fiat linimentum. Aliud quod ad idem efficaciter au-
xiliatur, ex Halyab. Sandali albi, et rubri, singulorum,
drach. tres, memithæ, id est, glaucij drach. duas, terræ,
cimoliæ, boli Armenicæ, singulorum drach. unam &
semis: omnia in tenuissimum pollinem terantur, & di-
ligenter cribrentur, postea dissoluantur in succo sem- 30
peruiui, aut portulacæ, uel lactucæ, & fiat linimentū.

Aliud

Aliud ad incipientes etiam inflammationes phlegmonasas, tritum & uulgare, quod & recentibus uulneribus, & nuper acceptis contusionibus, ualde utile est. Constat oui candido liquore, rosaceo, & stillaticia rosacea, hoc est, aqua rosarum. Panniculi hoc imbuuntur, parti inflammatae apponuntur, & subinde mutantur. Ceterum plurima alia tum simplicia tum composita medicamenta, ad incipientes phlegmonas, stringendo & fluxionem reprimendo conferunt, quæ partim ex li-

- 10 bro sexto (quem antidotarium uocauimus) partim ex alijs auctoribus, qui de hac scripserunt, requirenda sunt. Sed hæc ad præsens nobis uisa sunt sufficere. Inter remedia, quæ phlegmonarum incremento forinsecus admota subueniunt, efficaciter auxiliatur rosaceum, Græci rhodinon uocant. Hoc enim (ut Galenus uisum est) partim repellit, partim per halitum digerit: quippe quod olei rosæq; mediam ad unguem naturam obtineat. Itaque rosaceo paucula quedam inest adstrictio, quæ tenues ipsius particulas præuertere quidem (inquit
- 20 Galenus) nequit: sed ubi illæ altius penetrauerint, in ipsam iam superficiem agere incipit, pro uiribus consolidando, contrahendo, ac condensando. Proinde fit, ut rosaceum phlegmonarum augmentis optimum sit, & aptissimum præsidium. Aliud Auicennæ phlegmonarum incremento ualde efficax. Concipit foliorum maluæ M. unum, absinthij, rosarum, ana unciam semis, farine hordei unciam unam, olei chamæmelini quart. semis: coquantur, & pinsantur, ac in formam emplastris molliis redigantur. Aliud eiusdem, habet uini ad dimidias uel tertias cocti (hoc saram, illud defrutum appellamus) quart. unum, aquæ rosacæ, aceti, ana quart. semis

Remedia in
phlegmonarum
incremento ad-
mouenda.
Lib. 3. de simpl.
medi.

Rosaceum in
phlegmonarum
augmento opti-
mum esse præ-
sidium.

Quæ in statu
phlegmones
conueniant.

Emplastrum
Galeni.

semis, croci drachmæ duas : moderato igne parum fer-
ueant, postea colentur, & panni eo liquore imbuti par-
ti phlegmone obsessæ applicentur, epithematis more.
Porro eiusmodi præsidia, quæ in augmento inflamma-
tionis adhibentur, mixtæq; ex reprimentibus & dige-
rentibus facultates habet, tardius amoueri & mutari
debent, quàm pura repellentia, initio ipsius phlegmo-
nes accommoda. Auxilia in uigore, seu statu phlegmo-
nes, & cum in ea uehementes urgent dolores, idonea
sunt Actio, malua priuatim, & cum modico pane, & 10
rosaceo illita. Melilotum quoque in passo decoctum,
& cum pane admotum. Idem possunt (inquit) & pal-
mule in passo elixate, & cum pane, & rosaceo confe-
ctæ, & mixtæ. Aliud quod per halitum digerit, in uigo-
re phlegmones summè efficax. Perdicij, id est, parietaria,
maluæ, ana M. i. furfuris, subtilis farinæ uolatilis,
ana p. i. sœnigræci, anethi, ana unciam. β. olei cha-
mæmelini quart. β. Coquantur in uino, & exactè subi-
gantur, donec in unitatem coëant, & fiat emplastrum.
Aliud ex Gal. desumptum lib. 13. Therap. Recipit 20
medullæ panis frumentacei li b. unam, maceratur spa-
tio unius horæ in aqua feruenti, postea exprimitur, et
huic admiscetur mellis optimi quart. unum formaturq;
emplastrum molle. Hoc discutit, & dolores mulcet. Vn-
guentum basilicon, & quod è succis conficitur, diachy-
lon nominatur, in uigore phlegmones admouenda esse
consuluit Arabs ille Auicennas: uerùm hoc remollienti-
do, illud uerò maturando magis est idoneum: quanquam
tamen utrumque uel aliqua etiam digerente polleat. Ho-
rum autem descriptiones ex antidotario requirendæ 30
sunt, ubi & ualde multa discutientia, tum simplicia,
tum

tum composita recensentur, quæ in statu eiusmodi inflammationum efficaciter auxiliantur. Caterum hæc & similia, quæ ad discutendum quod iam influxit, & ad dolores mitigandos, præsidia adferunt, cum multa humiditate participant, tardissime mutanda erunt. Porro cum ex admotis nuper memoratis auxilijs, humor in particulam pblegmone obsessam delapsus discutitur, tumorq; & extensio minuuntur, doloresq; mitiores fiunt: tunc inflammationis declinationem adesse puta-

Quibus sit utendum auxilijs in declinatione pblegmones.

- 10 to, quo tempore solis discutientibus utendum est. Cuiusmodi sunt, agrestis malua illita, & passulae exemptis acinis cum pane & modico melle, & hordei farina cum melle applicata. Item lana succida, stupæ, spōgis, aut quid simile, uino calente imbuta, postea expressa, & apposta: hæc enim omnia discutiendi ui polent, & dolorem non excitant. Caterum si ob morbi pertinaciā & difficultatem locus affectus nimis multum, & resolutioni contumacem materiam continuerit, non ideo protinus, ut quidam faciunt, ad chirurgiā,
- 20 id est, sectionem aut usionem, prorumpere oportet, sed eniti ut collectus humor discussorijs medicamentis per balitum digeratur. Moliri enim prius digestionem oportet, medicamentis ad id conducentibus, quàm inflammationem incidere. Quod si tumor digerentibus medicamentis non cedat, nullaq; amplius discutiendi quod in eo continetur, spes relinquatur: sed uideatur potius materia ad suppurationem spectare, ad ea quæ maturant, & pus mouent, transeundum erit. Speramus autem tumorem (etiam si iam in abscessum degenerauerit) per balitum digeri posse, si materia quæ eum excitauit, tenuis, & pauca, resoluiq; idonea fuerit: si et in loco
- 30

Quando speranda resolutio.

in loco minimè profundo delitescat, cutisq; particule laborantis rara extiterit. Si uerò humor multus sit, et crassus, atque in alto sinu reconditus, cutis uerò densa, exhalatio seu resolutio nequaquam speranda est. Proinde ad maturantia, & pus mouentia ueniendum erit: cuiusmodi est cataplasma, quod ex farina triticea in aqua & oleo temperatè ac mediocriter cocta, constat: hoc enim celeriter inflammationes, quæ digestionem non cesserunt, ad suppurationem perducit, ut etiam Galenus nobis autor extitit. Siquidem & calorem habet nostro calori persimilem, nempe temperatum, ac mediocrè, & ratione farinæ & olei (quæ lentoris quipiam habent, quo meatus obstruendo partis calorem natium digeri prohibet) ut emplastica præditum est. Quæ duo maxime in maturantibus, & pus mouentibus medicamentis desiderantur. Sunt qui huic cataplasmati croci momentum coloris gratia adiungunt. Cæterum si tumor, ob infarctos in eo crassos & uiscosos humores, ægrè ad suppurationem ducitur, eximie subueniet cataplasma ex radicibus althææ, et caricarum dulcium ac pinguium decocto, quod mellis crassitudinem representet, et farina triticea compositum. Ergo accipe prædicti decocti libram unam, farinæ triticeæ se libram, incoquantur simul, & in formam cataplasmatum reducantur. Si autem loco farinæ triticeæ hordeacea apponatur, uel cibarius panis, quem Græci syncomisum uocant, discutiendæ inflammationi magis quam suppurationi conueniet, ut libro ad Glauconem secundo Galenus annotauit. Aliud in declinatione phlegmones puri mouendo apprimè idoneum, quod à uulgaribus chirurgis communiter usurpatur. Habet autem corticis radicis maluanisci, id est, althææ,

Pus mouentia

Lib. 2. ad
Glauc.Huius cataplas-
matis me-
minit Halyab.Cataplasma
commune.

est, altheæ, radicis lilij, senecionis, Græcis erigeron dicitur, & foliorum malvæ, singulorum M. unum, farinæ triticeæ quart. unum, farinæ sem. lini unciam unam, axungie suillæ recentis lib. semis: coquantur herbæ in aqua quantum satis esse videbitur, & tundantur cum reliquis in mortario, fiatq; cataplasma. Pluraq; alia puri mouendo accommoda, libro sexto descripta sunt, ex quibus peritus quisque chirurgus, & in artis huius, quam docemus, operibus exercitatus, præstantiora, &

- 10 naturæ laborantis, ac particulæ cui medetur, magis idonea seligere atque in usum præsentem assumere poterit. Caterum si collectio ac iam confecto pure, abscessus in quem phlegmone degenerauit, sponte non aperitur, scalpello, uel cauterio, aut medicamento quopiã erodente (liberis iam ab inflammatione partibus) mouenda puris, quod digeri nõ potuit, euacuatio est. Deinde ulcus ad cicatricem similiter reliquis ulceribus, perducendum est, nempe detergendo, carne implendo, glutinando, & demum cicatricem inducendo. Porro si materia, quæ tumorem parit, crassa est, & resolutioni, atque etiam concoctioni contumax, uehementerq; carnis meatibus impacta (qualis esse solet in diuturnis inflammationibus malè curatis, resoluta scilicet tenuioris humoris parte, & crassiore in meatibus relicta) scarificatio timenda non est, præsertim (ut 2. lib. ad Glau. Galenus admonuit) ubi duresces, liuor, ac nigror apparuerit. Quartus scopus, qui in curanda phlegmone chirurgus ac medico proponebatur, est symptomaticum, seu accidentium, quæ ipsi inflammationi superueniunt,
- 30 correctio, & summotio. Ea autem ferè sunt, dolor, regressus materiæ, ex qua tumor excitatur, ad interiora, putredo,

Symptomaticum
correctio.

Dolor.

Dolorē in p̄leg
mone lenientia.Lib. 2. ad
Glauc.

ra putredo, & corruptela partis suppurantis, & ueluti lapidea quædam durities, ex ualenter exiccantibus & digerentibus relicta. Ergo si uehemens dolor inflā-
mationi accesserit, modis omnibus laborandum est, ut
statim mitigetur. Quandoquidem præterquàm quòd ui-
res prosternt, & legitimas actiones impedit, fluxio-
nes quoque accersit, & sanguinē ad se allicit. Itaque si
dolor acrius urget in phlegmone, confectum imponen-
da medicamenta sunt, quæ doloris uehementiam citra
ullam noxam leuent, & demulceant. Quale est, quod 10
ex passo, oleo rosaceo, & paucula cera, cum his ambo-
bus liquata conficitur Galeno: hoc autem lana succi-
da, quæ plurimum habet æsypi, excipiendum est, ac
æstate quidem frigidum: hyeme uerò tepidum apponē-
dum. Itaque medicamentum eiusmodi, sicut dictum est,
attemperatum & admotum, rarefacit, extenuat, dige-
rit, euacuat: humorem acrem, lentum, crassum, aut
multum, partibus dolentibus hærentem, æquabilem red-
dit, uaporemq; crassum, commodum exitum non haben-
tem discutit, atque sic dolorem mulcet: nullam uerò 20
sua caliditate noxam inuehit: rosaceum namque calo-
rem retundit, & infrenat. Quo fit, ut hoc remedium
citra noxam ullam dolorem mitiget, & affectui non
incommodet, ut aqua calida, oleum, & triticea farina,
quæ in inflammatione, cum dolore incidente ex usu
esse non possunt, ut testis est Galenus. Hæc enim calfa-
ciendo ac humectando relaxant, ac robur partis resolu-
uunt, unde & imbecillior redditur, & ad fluxionem
excipienda pronior. Ad eundem usum (nempe ad miti-
gationem doloris in phlegmone) efficaciter apponun- 30
tur, rosaceum, ouorum lutea, quæ & uitellos appellāt,
mica

mica panis albi, in aqua calente macerata, postea expressa, & rosaceo permixta. Præsenti etiam auxilio sunt, malua in aqua decocta, mixta cum fursure, & rosaceo, uel oleo uiolaceo. Crocum autem in omnibus se-

Crocum.

- dandis doloribus assumitur Auicenna, atque alijs anodynis, id est, dolorem mitigantibus, utiliter commiscetur. Porro si tanta tamque uehemens sit doloris acerbitas, ut ijs quæ à sedando leniendoque dolore quasi suppetijs latis naturæ, propriè anodyna & paregorica dicta sunt, demulceri non possit, ad narcotica, id est, stupefacientia, transeundum erit. Inter quæ hyoscyamus admirandam opem sæpe contulisse, quorundam scriptis prædicatur, & à nobis, alijs uel ualde multis frequenti experimento comprobatum est. Itaque folia eius sub calidis cineribus coquito, recenti axungie misceto, & admovento. Hoc uehementes dolores mulcet, & phlegmonosos tumores ad suppurationem perducit. Cauenda autem semper est, dum hoc moliris, nimia humectatio: quippe quæ per initia inflammationis, cum magno dolore fluxu incidente, perniciofa sit, ut paulò antè diximus. Cæterum si metus adsit recessus materiæ phlegmonem excitantis ad loca penitiora, & maxime uersus principes partes, trahentibus, medicamentis, (de quibus lib. sexto fusissimè egimus) uel etiam admotis cucurbitulis, quæ uehementius, & ex penitioribus partibus trahunt, eam foras euocare oportet. Si uerò à uehementer exiccantibus ac digerentibus inflammationi temere admotis, reliquæ tumoris in scirrhum abierint, radices cucumeris agrestis, (qui uulgò herbarijs & officinis cucumer asinus dicitur) aut bryoniæ, aut asari, in aqua incoques: sæpe quidem

Nota de hyoscyamo.

Recessus materiæ ad interiora.

Durities reliqua.

Galenī cataplasma, ad induratos tumores.

(ut præcepit Galenus) has solas, nonnunquam uerò et caricas pingues adiiciens. Deinde farinam cum aqua misceto, cui & aliquid adipis, præsertim anserini aut gallinacci, adjicito. Quòd si horum copia non sit, suillum addito, & cataplasma conficito. Hoc scirrhum affectum, ex ualentius exiccantibus & digerentibus medicamentis in parte, quæ phlegmone occupabatur, relictum, efficaciter sanat. Prædictarum quoque herbarum, & cum his althææ radices, post moderatam decoctionem cum pane & adipe contritæ & admotæ, 10
eiusmodi induratos tumores discutiunt, ut libro secundo ad Glauconem luculenter docet Galenus. Itaque si phlegmonosos tumores, qui ægrè per halitum digeruntur, nec faciliè concoquuntur, in scirrhum mutari timuerimus, ualenter digerentibus semper emollientia remiscebimus. Sed de ijs iterum libro sexto, cui nomen fecimus antidotarium, locupletius dicemus. Porro si portio aliqua suppurantis particulæ cõputruerit, eam protinus excidere oportet, uel plurimis scarificationibus profundis incidere, dein aqua salsa perfundere, 20
& demum emplastrum apponere ex fabarum, aut orobi farina cocta in oxymelite. Reliqua quoq; tibi molienda erunt, quæ in curatione gægræne mox subijciemus. Sed melius fuerit capita curationis eiusmodi phlegmonosi affectus, breuibus quibusdam sententijs cõplecti.

Capita curationis rheumaticæ, id est, ex humorum influxu factæ phlegmones adhuc incipientis, & cum dolore non usque adeo magno affligentis. Ex Galeni lib. 2. ad Glauconem.

1 Corpus uniuersum congruis uacuationibus, sed præsertim uenæ sectione, modò nihil obstiterit, 30
inanito.

Partem

Partem inflammatam his, quæ influentis humoris repellendi vim habeant, perfundito, ac illinito.

Humorem qui in affecto loco continetur, admotis exiccantibus ac digerentibus medicamentis, uacuato.

Robur ac uirtutem affectæ parti, & eam circumstantibus, addito.

Capita curationis eiusdem phlegmones, quando cum grauiore dolore affligit.

10 **V**bi inflammatio ex defluxione orta, grauiore cum dolore affligit, doloris uehementiam citra ullam noxam leuato, mitigato ue.

Ergo quæ uehementer stringunt, aut quæ calfaciendæ & humefcendæ relaxant, ac robur resoluunt, ne admoueto.

Sed quæ quod influit, mediocriter stringendo, repellunt, & quod iam affectam partem obsidet, uacuât, inflammato loco adhibeto.

Spongiam acerbæ uino aut poscæ imbutâ, ut fluenti humori uia præcludatur, applicato.

Si hæc profecerint, & nusquam adhuc pus appareat, mollibus, & ijs quæ aduersus fluxiones temperantur emplastris, utitor.

Ex ijs autem quæ exiccare, & fluentem sanguinē repellere citra dolorem possint, tanquam optima deligito. Quale est, quod chalcite constat, rosaceo resolutum. Deinde lanam puram ex uino acerbæ madentem, superponito.

7 **V**bi uerò pus in parte ipsa apparuerit, semel, atque iterum supradictum cataplasma, aut potius quod ex hordei fariua constat, admoueto.

E ij Si puris

- 8 Si puris eiusq; crassi copia, medicamenta superet, adeò ut nulla exhalationis seu resolutionis spes habeatur, exitum ei quod digestionem non cessat, eo potissimum loco, quo est editissimum, parato.
- 9 Post sectionem, nisi dolor urgeat, uulnus exiccato, ac citra dolorem detergito.
- 10 Si post sectionem dolor urgeat, cū somētis primum, deinde cataplasmate, mox humectante aliquo medicamento, aut saltem non siccante, mitigato.
- 11 Si uerò pars adhuc inflammata sit, cataplasma ex lenticula, quod uacuat & repellit, imposito.

De carbunculo, gangræna, & sphacelo,
quas sanguineas pustulas uocant. Cap. VII.

De carbunculo.



OSTQVAM de phlegmone prima inflammationum differentia, & nostris corporibus frequentissimè incidente, abundè satis, quantum ad chirurgum attinet, differuimus: consequens usum est, ut primum de carbone seu carbunculo, qui Græcis ἀνθράξ dicitur: dein de gangræna & sphacelo (quem uulgò cum Auicennæ interprete estibome non appellant) dicamus. Ille enim ex sanguinea fluxione, uti & phlegmone, ortum habet, febremq; acutissimam infert. Hæc uerò magnas phlegmonas subinde concomitari solent: ut libello de tumoribus præternaturam, & plerisque alijs locis Galenus annotauit. Itaque carbo ex influente sanguine, nigro, crassoq; ac feculento, eodemq; feruente, atque impensè calido, nascitur. Cui si tenues quædam humiditates admixtæ fuerint, pustule quædam ambustis consimiles, per summa cutis

ἀνθράξ.

Γὰρ ὁ πρῶτος.

Σφαιρόδης.

Gangræna & sphacelus magnas consequuntur phlegmonas.

Carbunculi generatio & descriptio.

Carbunculus duplex.

- ma cutis excitantur, appellaturq; tunc hæc inflammatio, carbunculus cum pustula. Quod vitium sanè frequentissimè incidit. Interim tamen (licet rarò) & citra pustulam, pustulas uel incipit; uerùm omnibus crustosum ulcus fit. Dixi autem, citra pustulam; pustulas uel: quoniam una diutaxat aliquando pustula maiuscula cum hoc morbo exoritur, qua rupta, ulcus cum crusta gignitur. Sæpe uerò non una tantum pustula erumpit, sed multe exiles, ueluti milij semina, crebræ
- 10 in particularesidētes, quibus præruptis, similiter crustaceum ulcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant. Cæterum inter initia priusquam pustula enascantur, scabunt particulam omninò, Crusta autem ipsa modò cinereum colorem, modò nigrorem præ se fert, eoq; loco leuari cutis non potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Circumiacens caro in summam ac feruidam peruenit inflammationem, quam Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo, ueluti si plusculo rubro minus
- 20 misceas nigri. Talis autem est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidem notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborantis particule dolor, perindè ac si uinculis esset uehementer constricta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febricitant; idq; etiā magis quam illi, quibus erysipelatosæ est phlegmone. Quod si uenenositas aliqua subsit, (ut ferè semper assolet) nausea quoque, et frequenti uomitu, unā cum omnimoda appetitus prostratione miserè torquentur laborantes. Sed & cor-
- 40 dis tremor, & palpitatio, & frequens animi defectio illis adsunt. Quod ultimum tunc huius ætatis chirurgis

Note carbunculi.

Vlcus crustosū.

Pustula una maiuscula, uel plures exigue.

Crusta color cinereus aut niger.

Carnis circumpositæ inflammatio cum nigrore.

Dolor grauis.

Febris uehementis.

Nausea.

Vomitus.

Prostratio appetentie.

Cordis tremor.

Animi deliquiū.

peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate, & uenenositate (ut uolunt) differens: cum tamen ἀνθραξ Græcis sit idem, quod carbō, uel carbunculus Latinis. Proinde superuacuaneum est, eorum signa & curationem (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de ijs perraculare. Ceterum carbunculi ipsi ex causis popularim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocirca diligenti animaduersione circa eos opus est, tantum abest ut negligi debeant. Porro tametsi ἀνθραξ, seu carbunculus omnis, morbus sit acutus, periculosus, & contagione inficiens, omnium tamen pessimus est Auicennæ, & maximè lethalis, qui in emunctorijs, & propè membra principalia enascitur. Timendum enim est ne ad interiora, & partem aliquam principem materia hæc uenenoſa, quæ carbunculum excitauit subito recurrat. Quod si acciderit, in maximo uitæ discrimine ager est, præsertim si mala aliquot signa se prodiderint. Quin sola illius putida, & plusquàm lerneō tineta ueneno exhalatio, sufficiens est hominem enecare. Si circa stomachum, siue œsophagū, fauces uel incidat carbunculus, subito (ut ait Celsus) spiritum sæpe elidit. Minus læthalis est carbunculus Auicennæ, qui primum ruber, deinde citrinus apparet. Qui uerò liuescit, aut nigricat, neminem ferè non iugulat. Nullus tamen ex sua natura non periculosissimus censetur. Si accidentia, quæ morbum hunc comitari solent, plurimum remittantur, spes aliqua nobis promittitur. Si uerò magis atque magis semper intenduntur, & uehementiora fiant, tum planè est desperandum.

Carbunculi luem
pestiferam ferè
semper consequuntur.
Iudicia.

Carbunculus quādo maximè lethalis, sumptio à loco affectio iudicio.

Aliud iudicium à loco affectio.

Iudicium à colore.

Iudicium ab accidentibus.

De curatione carbunculi.

- C**arbunculi curationem (supposita conuenienti uisus ratione) statim ab initio (si nihil obliterit ex ijs , quæ uenam incidi uetant) auspiciandam esse à sectione uenæ, Gale. præcepit lib. metho. meden. 14. Et secundo ad Glauconem : uultq; sanguinis uacuationem ad animi defectionem usque fieri . Quippe quæ plurimum commodi hoc uitio laborantibus sit alaturæ: idq; perpetuò est obseruandum, ut uena è directo pertundatur. Vena autem secundæ electio ex laborante particula (ut in curatione phlegmones dictum est) nobis indicatur . Quo circa ea in re consulendus est à chirurgo peritus aliquis medicus , qui undè, & quatenus sanguis mittendus sit, probè nouerit definire. Secta ut decet uena, si nihil (ut dixi) prohibuerit, alienum non fuerit eiusmodi tumorem scarificare, plangis quidem (ob infestantis succi crassitudinem) satis profundis : nempe quæ mediocribus (ut Galeno uisum est) sint altiores . Sunt qui præcipiant ipsos sacrificatus in crustaceo ulcere duntaxat esse faciendos. Ipsas uerò incisiones aqua salsa calente statim perfundunt, ne in illis sanguis coëat, concreseat uel, sed foràs egrediatur. Interdum etiam erodens aliquod medicamentum imponunt, cuiusmodi est arsenicum, quod in ea re. inter cetera primatum obtinet. Quidam uerò loco scarificato sanguisugas admouët. Ceterum laboranti particula (tamen si quod ad inflammationem spectat, refrigerantia desideret) ualide repellentia haudquaquam admoueri debent. Nec enim eiusmodi fluxionem, propter humoris crassitiem, atque etiam malitiam auertere poteris. Et si quando id feceris , aliud quippiam

Carbunculi curatione à sanguinis missione statim auspicianda.

Vena è directo secunda.

Scarificationes profunda.

Perfusio ex aqua salsa calente.

Arsenicum.

Sanguisuga.

Fluxionē in carbunculo nec auertere posse, nec debere, lib. 14. Therap.

(ut Galenus ait) quod in alto sit corpore offendes. Atqui nec affatim affluere is humor, ipso Galeno auctore, permittendus est. Inquirēda igitur remedia sunt, quæ cum modicè reprimendo, etiam digerere, seu dis-

Cataplasmata
carbunculo
idonea.

sipare possint. Tale profectò est cataplasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod ex bis cocta lente constat. Sed hîc admiscenda nobis erit mica panis, qui furno sit coctus. Eslo autem panis (ex Galeni consilio) nec omninò à fursure purus, nec

Emplastrum de
arnoglossò.

nmium eius habens. Huiusmodi autem cataplasma, recentioribus appellatur emplastrum de arnoglossa, cuius forma apud eos est talis: *℞. arnoglossi, lentium, panis furnacei*; singulorum partes æquales, coquantur in

Emplastrum ex
malis Punicis.

aqua. His gallis addidit Auicennas, qui & ad eandem intentionem probat emplastrum, quod constat duobus malis granatis coctis in aceto, aut aqua acetosæ. Et hæc quidem tum parti ipsi laboranti, tum circumiacen-

Paulus.

tibus imponunt. Huic sententiæ accedit & Paulus Aegineta, inquiens: Vt radicitus carbunculos diuellas, dirimisq; ab adiacentium cōmercio, malum Punicum acidum minutatim concisum in aceto coques: ubi autem intabu-
erit, in læuorem deteres, linteoq; illitum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Item, nucis

Medulla nucis
auellaneæ car-
bunculos ma-
turat, & rum-
pit.

auellaneæ ueteris, uel etiam non ueteris medulla, carbunculos maturat rumpitq;. Optimum autem etiam fuerit perpetuò circumiacentibus ipsis partibus unguentum ex bolo Armenia, rosaceo, uel myrtaceo oleo, & aceto confectum, inducere: ne scilicet intrò, qui iam fluxit humor, recurrat. Sunt qui uirus ipsum, & malignum humorem in pestilenti carbunculo, suc-
curbitulis, & medicamentis attrahentibus ad locum

Auxilia attrahē-
tia uirus.

carbone

carbone obsessum euocant, & alliciunt. Quod sanè & faciendum consuluerim, si artus, & minoris notæ partes à vrbocæ occupet, & pigre moueatur fluxio. Si uerò ualide, atque affatim ualde irruat, modicè reprimentibus (ut modò ex Galeno adductum est) infrenandus utcunque est fluxionis impetus, ne scilicet ingens nimis dolor ex fluxione tam ualenter irruente in laborante particula excitetur, atque ita malum exaspere-

- 10 membrum putrefit, ualens aliquod medicamentum, & quod uehementer exiccet, nō autem quod concoquat, & pus moueat, (quando ita putredinem particulae foueris) imponendum est. Cuiusmodi est Andronis, Musæ, Passonis, uel Polyidæ: diluig; id uino aliquo dulci, uel sapa, ad sordium crassitudinem debet. Cataplasma etiam, quod ex orobi farina, & oxymelite cōstat, Galeno rectè apponitur: ubi ulcus malignum & cum putredine fuerit. In communi autem usu est unguentum uulgò Aegyptiacum nominatum. Quod si hæc parum proficiat, ad acriora, & quæ ignis uires habeant, deueniendum erit. Cuius generis sunt, radix dracunculi, uel aristolochiæ, ex aceto trita, & imposita: calx, arsenicum, & sandaracha, & alia huiusmodi, quæ non aliter quàm ignis adurunt. Hæc proficiunt satis, si protinus à uiua corruptam partem resoluant. Quo facto, quicquid corruptum est & emortuum, protinus auellere & radicitus extirpare oportet. Cum autem sub ipsis erodentibus medicamentis sequatur crusta, undique à uiua carne diducta, uulnus quidem, quod ex
- 30 eis excitatur, ut cætera adusta curandum est. Cæterum cum extremis morbis (ut inquit Hippo.) exquisitè extrema

Quid super ulcus crustosum imponendum.

Cataplasma ex orobi farina & oxymelite.

Unguentum Aegyptiacum.

Adurentia medicamenta.

Quādo adustionem properandum.

trema

trema remedia optima sunt, cogimur aliquando (uictis scilicet malo medicamentis) malignum carbunculum cauterio, ut uocant, actuali, hoc est, candente ferro ex-

Finis adurendi.

tirpare. Finis autem adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est, ut rectè Celsus admonuit. Post hæc crusta ulceribus inducta, auxilijs ad id accommodatis, resoluenda est. Quod si adustionem laborans pati recusauerit, aliquis ex humili plebe adhibendus est, qui carbonem ipsum mordicus apprehensum radicitus euellat.

Psylli.

Quales olim erant Psylli in Italia nominati, qui uulnera ex morsu serpentum illata, innocuè exugebant. Porro auulso sic uel quomodocunque assumpto carbunculo, sinus, cessante iam inflammatione, primùm detergeri: deindè iam purus factus, impletibus medicamentis (quæ Græci synulotica uocant) curari debet. Vbi uerò iam penitus fuerit impletus, nec amplius quicquam illi cauum remanserit, ea quæ cicatricem inducunt, similiter reliquis ulceribus adhibere fuerit tempestiuum. Horum autem omnium materia ex antidotario, & tractatu de ulceribus requirenda est. 10

Auulso uel assumpto carbunculo, quid postea agendum.

Maturatiuum Auicennæ.

Cæterum si non admodum sæuiat malum, nobisq; aliquas dederit inducias, maturatur, & aperitur Auicennæ, admotis ficibus, fermento, et sale ad inuicem mixtis. Vbi autem bis uel ter appositum fuerit huiusmodi emplastrum, locus omnino niger & dehiscens apparere solet: atque tunc mundificatiuo ex apio locus detergens erit. Medicamen quoque ex uittellis ouorum & sale confectum, si sæpius admoueat, maturat & aperit carbunculum, ut scribit Theodoricus. Ad eundem finem in communi usu est hodiè emplastrum ex melle, 30

Mundificatiuum ex apio.

Emplastrum iudicare optimum, quod usurpatur in Parisiorum Nosocomio.

sale, triticea farina, & ouorum luteis compositum.

Consolida

Consolida maior (quod Græci symphyton appellant) *Cōsolida maior.*
 inter duos lapides contrita, diuino quodam (ut refe-
 runt) miraculo anthracem sanat, et ex toto intra diem
 unū interimit, ita ut nulla amplius deinceps curatione
 egeat, præterquàm ea quæ cōmunis est alijs uulnerti-
 bus. Miranda etiā narrant alijs de scabiosa: nēpe quòd *Scabiosa,*
 comesta uel ex uino pota, internos tumores ad exte-
 riora protrudit, & insensibiliter dissoluit, discutitq̃.

Quæ crustas ulceribus resoluunt.

10

CRUSTAS huiusmodi carbunculi ulceribus resol-
 uunt, butyrum recens, axungia porci, & alia id
 genus pinguia. Ad id etiam mirè proficit subsequens
 emplastrū: nam præterquā quòd escharam, id est, cru-
 stam, citius multò quā prædicta resoluunt, dolorem etiā
 ab acerbis & adurentibus medicamentis, uel candente
 ferro excitatum, demulcet, atque malignū ipsum suc-
 cum, qui carbunculum creabat, potenter discutit. Ha-
 bet autem farinæ triticeæ & hordeaceæ, singulorum

Emplastrum
 escharam re-
 soluens.

20 uncias tres: ex quibus cum decocto maluarum, uiola-
 rum, & radicum althææ fit solidum emplastrum, ad-
 dendo butyri, & axungie suillæ liquefactæ, singulorū
 uncias duas, uitellos quoque duorū ouorum, qui adijci
 debent quando ab igne remouentur: atque hæc omnia
 rursus cum radice & folijs prænominatis diligenter
 contusis & subactis, ac per incerniculum cretis, ad in-
 uicem miscēda sunt. Viētus ratio, epithemata, opiatæ,
 & alia id genus, quæ cordi roborando dicata sunt:
 item uacuationes, si quæ necessariae sint, ad diætetice
 30 & pharmaceuticæ omnino pertinent. Quare in ijs
 administrandis peritus aliquis medicus erit consulē-
 dus. In

Theriace.

du. In communi autem usu est apud omnes theriace, quæ ad fabæ magnitudinem exhiberi solet, ex aqua scabiosæ, uel si febris adsit admodum acuta & uehementis, ex aqua rosacea, uel buglossi: debetq; à laborante assumi sex horis à pastu. Ceterum quoniam superius facta est mentio de trochiscis Andronis, Polyidæ, Pasionis, & Musæ, quos tantoperè celebrat Galenus, non alienū fuerit eorū descriptionē hīc subijcere.

Andronis trochiscus hæc recipit.

CYTINORVM, idest, florum seu capitulorum mali Granati, drachmas decem, aluminis scissilis drachmas quatuor, chalcanti drach. duodecim, myrrhæ drachmas quatuor, thuris, aristolochiæ, galle, singulorū drachmas octo, salis ammoniaci drachmas quatuor.

Polyidæ spbragis pastillus hæc continet.

Quod sic * stel-
latim decissa-
tur; nota est de-
narij, quæ pro
drachma hic
poniuntur.

MALICORII * pōdo sex, myrrhæ * pōdo octo, aluminis scissilis * pōdo quinque, thuris * pondo quatuor, chalcanti * pondo trium, fellis taurini * pondo sex, uino dulci excipiuntur.

Polyidæ pastillus alius.

ALVMINIS fissi pondo denariūm trium, thuris pondo denariūm quatuor, myrrhæ tantundē, chalcanti pondo denariūm duūm, cytini pondo denariūm duodecim, fellis taurini pondo denariūm sex, aloes pondo denariūm octo: uino austero excipiuntur.

Musæ trochiscus hæc habet.

ALVMINIS scissi, aloes, myrrhæ, chalcanti, singulorum pondo * sex, croci, crocomagmatis, singulorum pondo * tres, cytini pondo * quatuor: mulso ex salerno facto assumuntur.

De gan-

De gangræna & sphacelo.

Gāgræna quid,
& unde ortum
habeat.

Gangræna pef-
simus tyrānus.

- G**angrænis nominat Galenus libro 2. ad Glauconem, eas quæ ex magnitudine inflammationis fiunt mortificationes, nondum tamen integrè factæ sunt, & iam confirmatæ. Eius mali tanta uis est, ac tyrannis, ut nisi celerrimè succurras, faciliè affecta pars mortis habitum repræsentet, hoc est, promptissimè uitæ, sensus, & motus extinctionem contrahat. Vbi uerò membrum sic utiatum & languens in totum sensu fuerit destitutum, ac omninò emortuum, ita ut percussum, uel sectum, uel adustum, non sentiat, quæ patitur, affectum hunc non iam amplius gangrænam, sed sphacelon Græci nominant: Latini uerò syderationē, recentiores esthiomenon appellant: quod nomen etiam ad gangrænam extendunt. Auicennas autem esthiome non uocauit, quando ad partes continuas transit corruptio, quo nomine in re alia utuntur Græci. Quidam affectum hunc modò herpeta esthiomenon, modò cancrum ulceratum nominant. Accidit autem hic affectus etiam ossibus, cum caro ipsis circumdata ac circumfusa tetros gignens ichoras, id est, deprauatam saniem generans, hoc tetro uiru ea imbuerit, ac foetidissima putrilagine consumpserit. Cum itaque membrum ita ex toto, uita, sensu, motuq; priuatum apparuerit, confestim ad uiuum usque, quamproximè sanæ parti erit refecandū. Itaque differt sphacelus à gangræna, quod ille ossibus etiam (ut dictum est) immascatur, nedum carni, & uasis: hæc uerò ossibus non adueniat: una tamen species sphaceli est, sed proprium nomen, & singulare præter cōmune sortita. Huiusmodi absolutam partem affectæ corruptionem, sensum penitus auferentem,
- uulgus

Sphacelus.

Ossium syderatio.

Syderatū membrum confestim reuocandū.

*Ignis sancti
Antonij.*

*Mortificationis
causa.*

*Que mēbrimi-
xtionem dissol-
uunt.*

uulgus Gallicum appellat ignem Sancti Antonij, aliàs Sancti Martialis. Alij uerò (ut diximus) herpeta eslibio menum, alij cancrum ulceratum uocant. Accidit autem trifariam eiusmodi membrorum mortificatio, seu uitæ in membris extinctio, ac destructio. Vno modo, quando membrum non amplius potest recipere uitam sibi à corde per arterias transmissam, propter dissipationem seu dissolutionem mixtionis, atque harmoniæ ipsius laborantis membri. Dissoluitur autem ac deperit mixtio atque harmonia partis, uel ob nimiam frigiditatem, ut aliquando contingit per hyemem ualidam, atque asperam: uel ab immoderata, et inconsultè, ac temerè molita inflammationum refrigeratione: aut ab excedenti ac supra modum uehementi caliditate, et uenenositate inflammationum, ac malignarum (ut uocant) pustularum. Altero modo gangrenam et sphacelum fieri contingit, quando uita in membro recepta præfocatur atque extinguitur, ut nonnunquam euenit in magnis inflammationibus, quæ ita interdum uenas, arterias, et poros cutis obturant conslipantq;: ut spiritus ibidem, prohibita in totum effluuij uaporosi transpiratione, et aëris externi attractione, stranguetur, suffoceturq;. Tertio modo, hæ mortificationes et uitæ extinctiones fiunt in membris, quando prohibetur transitus atque influxus uitalis spiritus, à corde ad membrum aliquod, idq; uel propter uehementem ligaturam, uel contusionem aliquam in uis, ac meatibus ipsis, per quos defertur spiritus, facta. In summa, gangrena et syderatio, quam Græci necrosis et sphacelum uocant, nostris corporibus accidunt, uel denegata 30
ac tem=

ac temperie pereunte. Cæterum signa gangrænæ & syderationis, Galeno in opusculo de tumoribus præter naturam sunt hæc. Primum quidem illud coloris floridum, quod phlegmonis, id est, inflammationibus adfuerat, in ipsis extinguitur. Deinde dolor & pulsus, seu pulsatio, hoc est, arteriarum motus ipsi agro sensibilibus, recedunt, non finita adhuc dispositione, uerum sensu iam emortuo. Vnde membrum mox nigrum conspicitur, molle quoque, & putridum, foetoremq; expirans

10 cadauerosum efficitur. Quo fit, ut cum præmitur digitis, facile cedat in profundum, nec postea reuertitur aut resilit, imò apparet cutis à carne seiuncta. Hæc autem partis affectæ mortificatio, quam Græci gangrænam appellant, tantæ est (inquit Paulus) ferocitatis, ut nisi quis rupta omni mora præsentissimas tulerit suppetias, laborans particula facile emortatur, & uicinas sedes inuadat, ac hominem ipsum iugulet. At si (ut refert Celsus) nondum planè tenet, sed adhuc incipit, eam curare non difficillimum est, utique in

20 corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nerui uel læsi non sunt, uel leuiter affecti sunt. Vbi uerò penitus insedit hoc malum, & iam in sphacelum abiit, insanabile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Signa gangrænæ & sphaceli.

Iudicia.
Lib. 4.

Lib. 5.

De curatione gangrænæ ex magnis inflammationibus genitæ, & sphaceli ex gangrænâ creati extirpatione.

Cum sanguinis copia gangrænam generet, eius curandi ratio statim auspicanda est à copiosa corrupti sanguinis, qui in membro laborante compingitur, uacuatione. Sed interim negligi non debent, quæ ad dieteticam, pharmaceuticam, uenæ sectionem, (si necessaria

Corrupti sanguinis uacuatio.

cessaria fuerit) & cordis tutelam pertinere uidebuntur, pro quibus consulendus erit chirurgus peritus aliquis medicus, qui omnia probe, & ut res exigit, norit instituire. Fit autem larga illa sanguinis ita impacti(cuius occasione fiunt mortificationes) ex parte affecta emissio, uel uena incisa, si quæ amplior ac turgens circa eandem partem conspicitur, uel cute uniuersa partis affectæ, unâ cum subiecta substantia, excisa, uel pluribus & altis scarificationibus diuisa. Alij ad eundem finem sanguisugas admouent, & uenas minores proximis aperiunt. Verum profundæ illæ ac frequentes sectiones aut scarificationes, multò sunt ad eius malitiam curationem efficaciores. Caterum pro affectus magnitudine, uel maximæ sectiones fiunt, uel incisuræ (quas scarificationes appellamus) utraq; frequentes: illa, ubi putredini uicinus malus est: hæ, ubi tantum putrescere incipit. Quo enim uitium maius est, eo maiore remedio, ut cuique constat, indiget. Vbi autem abunde sanguinem ex altis illis plagis emanare permiseris, locus aqua salsa abluendus erit, ut sanguis crassior, & qui alioqui ibidem concreseceret, foras egrediatur. Deinde medicamentum aliquod putridis consecratum, id est, quod putrefactionem prohibeat ac resoluat, induci debet, quale est farina orobi, aut lolij, (quod Fræci **IURAIA** M, quod uini modo temulentiam cõcitet, appellant) aut si harum facultas non sit, sabacea ex oxymelite, uel syrupo acetoso. Vtile etiam fuerit, locum scarificatum bis in die aceto calente, sed mulso præsertim lauare. Hæc enim sua siccitate saniem, & putrilaginein absumunt, eamq; detergunt: frigiditate uerò, quod nondum uitiatum ac corruptum est, à putredine uindicant.

Post scarificationem locus aqua salsa abluendus.

Medicamentum putridis consecratum.

uindicant. Vbi uerò iam ipse ueluti feruor subsederit, ac mali furia sese remiserit, unguentum id, quod uulgo Aegyptiacum appellatur, ex flore æris, alumine, melle, & aceto, ad æquas portiones mixtis & coctis compositum, superimponendum erit. Hoc enim putrefactionem prohibet ac resoluit, putrefactum quoque ad corruptum ab integro & sano adhuc dirimit, & decidere cogit. Denique crustam inducendo, quod sanum est, conseruat ac tænetur.

Vnguenti Aegyptiaci uis.

10 Quod si ualentius atque efficacius medicamen uelis apponere, salem prædictis adijce: aut, si malum magis adhuc increuerit, aliquem ex trochiscis paulò antè memoratis exquisitissimè tritum aceto, & uino dilutum, utpote uel Andronis, uel Polyidæ, uel Musæ, uel Pasionis, uel unum ex ijs qui in antidotario dicuntur, calidicon, aldaron, & ex asphodelo, qui ob suam uim causticam corruptum à sano dirimunt. Probatur in ea re ante omnia arsenicon quod uocant sublimatum, purum, aut correctum, idq; uel in puluere, uel ex uino dissolutum, & linamento, aut xy-

*Trochisci can-
sini.*

*Arsenicum su-
blimatum.*

20 lo, quod Galli cottonem appellant, exceptum, inter sanum & corruptum applicatum: hoc enim confestim malum sistit, & id quidem sine dolore. Quod si necessitas exigat, spatula uel specillo separandum est sanum à corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhibendis, ut res securius tractetur, attentos sedulò nos esse oportet circa naturam corporis ægroti, sicuti

, , rectè nos Gal. admonuit, inquit: Si corpus rusticum fuerit & durum natura, uehementiora desyderat medicamenta: foemineum uerò, & mollem carnem habes, imbecilliora. Infantes quoque uel pueri, & quicunque, inter uiros & balneas amant, & in otio degunt, mola-

*Lib. 2. ad
Glauc.*

F lia exigunt

lia exigunt medicamina. Consideranda insuper est partium, quæ male affectæ sunt, nedum corporis totius natura: quâdo abscindis, aut circumcidis id quod iam computruit. Quædam enim sunt, quæ citissimè ad putredinem ueniunt, si negligenter curentur: aliæ uerò tardiusculæ. Quædam item medicaminum uires ac beneficia tardius sentiunt, aliæ citius. Porro si nihil magis malum his causticis medicamentis consulerit, uri id

v. stio quâdo adbibenda.

si gangræna in
in st. bacellum
abierit.

quod est inter integrum, ac uitiatum locum, debet. Solent uerò hæc auxilia omnia, nihil interdum proficere, atque tunc unicum, tametsi (ut Celsus ait) miserum auxilium est, membrum quod paulatim emoritur, abscindere, ut cætera pars corporis tuta sit, Nam quod computruit, ueneni in modum suo cōtactu, quod adhuc sanum & integrum est, inficit, & corrūpit. Si quando autem putrefactam huiusmodi atque emortuam partem abscideris, uel quod in membro quopiam computruit usque ad sanum corpus concideris, eam quæ ueluti quædam radix est, sanæ atque integræ parti adiunctam, ob maiorem securitatem, ex Galeni consilio, eandenti ferro adurere conuenit. ita enim celeriter sanguinis profluium compesces, & putredinem arcebis. Facta uerò adustione, porri succo, uel (ut Paulus ait) sale cum porro utendum est, uel aliquo ex ijs, quæ paulo ante diximus. Hæc enim siccant, & stringunt putredinem, atque humorum affluxum prohibent. Vbi uerò tibi uidebitur, his remedijs adhibitis cessare putredo, ut crustæ citius decidant, cataplasmate utendum est ex pane uel hordeacea farina, uel triticea ex hydrelæo incocta. Item medicamento, quod cephalicum uocant, ex melle illitum. Hæc enim detergendo, crustam à subiecta

Lib. 2. ad
Glauc.

Lib. 4.

Crustæ à partibus exustis soluentia.

10

20

30

subiecta carne resoluit. Quin etiam medicamentum, quod tetrapharmacum dicitur: præterea & Macedonicum, pus mouendo, ac emolliendo, crustas à subiectis corporibus diducunt, quemadmodum & reliqua omnia, quæ ad suppurationem perducunt. Hæc enim præterquam quòd emolliunt, pus sub crusta conficiunt, quod eam resoluit, scilicet inter carnem subiectam & crustam ipsam interiaccens. Panis quoque cum apio tritus, aut ocymo, optimè crustas à sanis partibus citra erosionem detergendo detrahit. Sic & iris, uel radix panacis, uel aristolochiæ, uel acori cum melle. Solent autem uulgò ad crustas resoluendas uti butyro, aut alio quouis unctiuoso. Vbi uerò crusta exciderit, locum aceto abluunt, postea sequens emplastrum admovent, quod ad Guilielmum à Saliceto refertur. Recipit autem mellis selibram, uitellos quorum crudos tres, aut quatuor numero, farine hordei selibram: hæc miscetur in formam emplastri. Post biduum uerò uel tri-
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000
 di possunt drachmæ decem myrrhæ electæ. In teneris autem corporibus ad escharæ separationem, & for-
 dum deterfionē, abundè sufficit Galeno orobi farina cum melle, uel thure. His ritè peractis, huiusmodi ulcera ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem producant, & cicatricem inducant: synulotica, & epulotica Græci uocant.

Butyrum.

Emplastrum
Guilicmi à
Saliceto.Lib 2. ad
Glanc.

Capita curationis gangrænæ, & spbaceli.

Vitiatum sanguinem in affecta parte impactū as-
 fatim uacuato.

Post scarificatus aut sectiones, locum affectū aqua
 salsa abluito.

Deinde medicamentum putridis consecratum inducito.

- 3 Vbi mali furia se remiserit, unguentum Aegyptiacum superimponito.
- 4 Si malum ijs remedijs non cesserit, id quod inter uitiatum & integrum est, ferro candente adurito.
- 5 Quod si haec omnia nihil profecerint, & iam gangraena in sphacelum degenerauerit, membrum quod sic planè emortuum fuerit, usque ad partem sanam, ita ut nihil prorsus putridi relinquatur, ocyssimè abscindito.
- 6 Vbi quod computruit rescueris uel amputaueris, quò securius mali radicem euellas, ferramenta igne flagrantia adigito.
- 7 Post exustionem porri succum, atque alia id genus, quae siccant, stringunt, & fluxionem arcent, admoueto.
- 8 Crustam uel medicamentis adurentibus, uel ignito ferro inductam, à subiectis corporibus resolvere (solet enim inde sanguinis profluuiū sequi) ne properato.
- 9 Cùm putredo cessauerit, nec amplius sanguinis profluuium reformidaueris, ea quae crustam detrahunt, applicato.
- 10 Vbi crusta exciderint, curationē reliquis ulceribus communem adhibeto.

Qui sequuntur aphorismi, ad medicum pertinent.

- 1 Vilem tenuem et refrigerantē, gangraena & syderatione, id est, sphacelo laborantibus instituito.
- 2 Fluxionem sanguinis missione, si nihil obliterit, auertito: atque eadem plenitudinem (si adfuerit) uacuato.

Medicamento

Medicamēto quod catholicon appellatur, uel nigra
 cassiæ fistularis medulla, ad hæc tamarindorū, lupuli,
 ac fumarie decocto, sanguinē mūdificato, depuratoq;

Theriacam atque id genus alia, quæ cor uitæ
 fontem ac principium à putridis, & graucolenti-
 bus illis à parte uitata sublati effluuijs tuentur,
 laboranti sumenda exhibeto.

De erysipelare, & alijs tumoribus

à bile creatis. Cap. VIII.



AMETSI phlegma, quod Latini pituitam
 uocant, in generatione humorum sangui-
 nem consequatur, maiorq; eius humoris

Pituita in humo-
 rum generatio-
 ne sanguini pro-
 xima.

portio sit in corpore secundum sanguinē, quàm alio-
 rum humorum: quia tamen tumores præter naturam à
 bile procreati (quæ apostemata cholericæ communi-
 ter uocant) in ualde multis cōspirant cum sanguine,

20 aliorum qui à sanguine fiunt tumorum præter natu-
 ram consilientium, de ijs nunc dicamus, qui à bile ex-
 citantur, & nomine quidem communi erysipelata uo-
 cantur Græcis, Latinis uerò antiquioribus ignes sa-
 cri. Est igitur erysipelas biliosæ fluxionis germen, cir-
 ca cutim utramque maximè consistens, & eam scili-
 cet quæ foris est, omnium partium commune tegumen-
 tum: & membranosa illam ac tenuem, quæ singulis
 internarum est circumdata. Nonnunquam uerò & ali-
 quid quoque subiectæ sibi carnis occupat, sicuti &
 10 phlegmone (quæ fluxionis sanguineæ soboles est, in car-
 nosa corpora maximè incidens) etiam cutis aliquid

Erysipelas
 quid.

F iij apprehēdit.

*Erysipelas ex-
quisitum.*

apprehēdit. Itaque cū flaua bilis uerē tenuis, uel san-
guis feruens & consistentia tenuis, (qui recentioribus
cholera dicitur naturalis, Galeno uerō $\chiολη\ \xiανθη$)
per solam cutem diffusus fuerit, nihil inferiorem car-
nem molestant, particulam tamen in tumorē aliquan-
tum attollens cū inflammatione & rubore in flauum
elanguescēte, ac protinus ad tactum euanescente: as-
fectus hic priuatim ac propriē Galeno, uerum atque
exquisitū erysipelas nuncupatur. Hoc autem unius ra-
tionis est, seu (ut dicunt) uniforme, & absque ulcera-
tione incidit. 10

Spina.

Auicennas spinam uocauit. Cū uerō
amara bilis succus crassior acriorq; quā pro naturae
modo redditus fuerit, summam cuticulam (quam epi-
dermidā Græci uocant) exulcerat, excoriatue, atque
aliquando cutis exulceratio spacio temporis ad pro-
fundum peruenit, ita ut inferiorem, seu subiectam car-

*Erysipelas cum
ulceratione.*

nem attingat: tunc eiusmodi affectus etiam erysipe-
las nuncupatur, sed cū ulceratione, quod (Galeno au-
tore) eiusdem generis est cum herpete. Verū enim ue-
rō, si nec planē biliosa, nec sanguinea fluxio sit, sed ex
ambabus mixta, non iam tantū erysipelas, sed dispo-
sitio permixta erysipelate atque inflammatione no-
minatur Galeno. Ab eo autem quod in mixtura exupe-
rat, nomen uitio indetur. Etenim ubi sanguis præcellit,

*Phlegmone ery-
sipelatosdes.*

*Erysip. phleg-
monodes.*

Mediū uitium.

phlegmone erysipelatosā dicetur. Vbi uerō flaua bilis
præpollet, erysipelas phlegmonosum appellabitur. Ve-
rū ubi neutrum uincit, & æqualia utriusque appa-
ruerint accidentia, tunc uitium id phlegmones erysi-
pelatosq; medium uocabitur. Iam uerō & aliarum
mixtionum similis utiq; erit interpretatio: nempe si
multa bilis pauco humori pituitoso aut attribilario
remisceatur,

- remisceatur, erysipelas œdematosum, uel scirrhosum
 dicetur. Porro cum simpliciter bilem dicimus, uel bi- Bilis.
 liosum humorem, more Galeni & aliorum Medicorū,
 nos pallidam bilem seu flauam, & amarā, non autem
 acidam & nigram, inaudimus. Hæc autem naturalis
 cholera, & certa, alijs nominatur, ex sanguine quidem
 tenui & feruente generationem obtinens. Atram ue-
 rò bilem nunquam absolutè bilem nominamus, sed sem-
 per cū adiectione humoris, appellationi colorem ad-
 iungentes. Est igitur bilis, quæ $\chiολα$ Græcis dicitur,
 uulgò autem cholera, humor calidus & siccus, ex te-
 nuiori & calidiori parte chyli, uel ex sanguine tenui
 & feruente, ut modò diximus, procreatus. Hæc autē du- Bilis flaua du-
plex.
 plex est, iuxta neotericorū diuisionē, naturalis scili-
 cet, et nō naturalis. Naturalis est humor calidus et sic- Naturalis.
 cus potestate: substātia quidē tenuis, colore uerò fla-
 uus, aut ruber, declinans ad quandā citrinitatē seu fla-
 uitiem: sapore uerò exactè amarus, non autem acutus
 siue acris, ut quidam malè affirmauerunt. Non natu- Non naturalis.
 ralis uerò bilis dicitur, quæ à prædicto humore uerè
 bilioso degenerat, intra terminos tamen suæ latitudi-
 nis continetur, quos si egrediatur, non iam bilis, sed
 alius humor reputabitur. Hoc autem (bilem inquam
 egredi limites suæ latitudinis) contingit bifariam: uno Bilis duobus mo-
di deficit à sua
natūra.
 modo (ut sic dicatur) per se, & in se: altero modo, per
 admixtionem. Per se, & in se adhuc dupliciter: Vno
 modo, quando bilis illa naturalis putrescit, & aduri-
 tur, & talis dicitur adusta per putrefactionem. Alte- Vitellina ex me-
raca bile.
 ro modo, quando bilis nō naturalis vitellina dicta, Bilis porracea.
Acridissima.
 40 igneo calore percoquitur in hepate, aut in uentriculo,
 aut in uenis, & efficitur porracea, quam etiam prasiā

Crocea bilis.
Vitelina, ex ad-
mixture pi-
mita.

Auicenn.

Halyab.

Porracea bilis
quemodo gi-
gnatur.

Quatuor inflā-
mationum diffe-
rentiæ, ex flaua
bile oriuntur.

Verum erysi-
pelas.

Tria erysipe-
la illegitima.

nam uocant, uel æruginosa, quæ extreme quidem male sunt. Per admixtionem uerò bilis efficitur non natu-
ralis, seu præter naturam, cum alius humor illi extrin-
secus accedit. Et hoc quidem fit multifariam. Nempe
si phlegma tenue & aquosum illi admisceatur, citrina
seu crocea efficitur: si crassum & uiscosum, uitelina:
si uerò melancholia adusta illi permiscetur, efficitur
bilis adusta per admixtionem. Et sic iuxta Auicennæ
placitum, sex sunt species bilis non naturalis. Apud
Halyab. uerò quatuor duntaxat: nullam enim pror- 10
sus mentionem fecit de duabus speciebus adustis. Gale-
no autem lib. 2. de uirtutibus naturalibus, nulla bilis
præter naturam esse dicitur, præter uitelinam, quæ
uorum uitelis, tum colore, tum crassitudine est adsta-
milis. Siquidem porraceam & æruginosam ex prauis
ac corruptis humoribus, propter quorundam esculen-
torum aut olerum cruditatem, qualia sunt beta, cepa,
brassica, sæpenumerò in uentriculo ait generari. At-
que etiam interdum talibus nequaquam ingestis, ra- 20
tione ægritudinis, aut male alicuius dispositionis in
uenis ipsis generatur. Ex ijs itaque colligitur, quatuor
species seu differentias inflammationum (quæ uulgus
cholericæ apostemata uocat) ex bile ipsa generari.
Nempe ex bile uera, sincera, & laudabili (quam te-
nuem feruentemq; sanguinem appellamus) procreatur
ea species inflammationis, quæ Galeno uerum atque
exquisitum erysipelas appellatur, lib. 2. ad Glauc. quod
tanquam cutis solius passio est. Græcè autem ἀνγίβης
ἐρυσίπτελος nominatur. Ex bile uerò non naturali,
& alijs humoribus permixta, tres aliæ nascuntur dif- 30
ferentiæ, utpote erysipelas phlegmonodes, erysipelas
oedematodes,

œdematodes, & erysipelas scirrholdes, seu scirrhosum.

Ex bile autem quæ præter naturam ex adustione facta est, pro ratione tenuitatis aut crassitie, substantiæ ipsius generantur, uel herpes esthiomeni, id est, exedentes, (qui eiusdem generis sunt cum erysipelatis, quæ cum exulceratione incidunt uel phagedæne, (quæ cum cute pariter subiectam carnem altius erodunt) & exulcerati cancri, aliæque eiusmodi erodentia, & cacoëthæ, id est, maligna ulcera, quæ pustulæ corrosivæ recedunt

Herpes exedens.

Phagedæne.

Cancris exulcerati.

- 10 ribus chirurgis dicuntur. Itaque tenuissimus quidem in eiusmodi humoribus, est is, qui ulceratū herpetem excitat: crassissimus, qui cancerum. Proximum deinceps locum occupat, quod ad crassitudinem attinet, qui phagedænas creat, ut libro. 14. metho. meden. Galenus annotavit. Causæ ueri erysipelatis uti & phlegmones ueræ, sunt tres: Prægressæ, quæ & primitivæ dicuntur: antecedentes, & coniunctæ. Cæterum raro fit erysipelas à causa prægressa, frictiones tamen uiolente, insolatio, & adnotio medicaminum attrahentium ipsum nonnunquam excitant.
- 20

Causæ ueri erysipelatis.

De signis & iudicijs ueri erysipelatis.

Signa & iudicia ueri atque exquisiti erysipelatis, sumuntur ex collatione ipsius ad phlegmonem, iuxta Galeni doctrinam. 14. Therap. & 2. ad Glauconem: ex quo aperte colligitur uerum ac legitimum erysipelas ueluti quandam speciem esse phlegmones, id est, inflammationis generaliter acceptæ. Notæ igitur erysipelatis sunt, color aspectu rubidus, in flauum elangue

30 scens, qui (rubor inquam) flauescens, ad tactum, hoc est, digitorum appressu facile subterfugit, rursusque illabi-

Notæ erysipelatis.

Rubor flauescens, ad tactum subterfugiens.

tur.

Tumor parvus. *tur.* Tumor exiguus, in cute potius consistens, quàm
Calor uehemens. altè descendens. Calor uehemens febrem excitans
 maiorem, ea quæ ex phlegmone accenditur: siquidem
Pulsatio exiguua. calidius multò est erysipelas, quàm phlegmone. Pulsa-
 tio (quæ magnæ phlegmones propriū est symptōma)
Dolor pruriorius. non admodum fortis. Dolor mordicans & pungens
 nullam (ut in phlegmone contingit) inuehens tensio-
 nem, & si quæ sunt alia bilis dominium significantia.
Iudicia. Quod autem ad iudicia pertinet, erysipelas ut pluri-
 mùm faciem prehendit, incipitq; maximè in ea nasi
 parte, quæ uulgò lepus appellatur. Deinde mox in fa-
 ciem totam expanditur, gemina quidè occasione: nem-
 pe ob faciei raritatem, & ipsius bilis leuitatem. In os-
 sis autem exutione seu denudatione, erysipelas super-
 ueniens malo est, ut scribit Hippoc. Apho. 19. lib. 7.
Incomen. prædic. apho. hoc est, symptōma prauum est, si osse nudato caro cir-
 cūstans ab erysipelate occupari uideatur. Hoc autem,
 Galeno testè, rarissimè accidit. Rursus sequenti apho-
 rismo scribitur ab eodem Hippoc. quòd ab erysipelate
 putredo aut suppuratio, malum. Hæc enim (inquit Ga-
 lenus) nunquàm erysipelatis superueniunt, nisi ualde
 malignis. Verum ac legitimum erysipelas quatuor
 habet tempora, uti & alij præter naturam tumores.
 Horum autem signa ex præcedentibus sunt requiren-
 da. Exquisitum erysipelas rarò terminatur suppura-
 tione, sed magna ex parte insensibili transpiratione
 seu resolutione. In erysipelate quædam interdum con-
 tingunt accidentia, seu (ut Græci dicunt) symptōma-
 ta, quæ nonnunquam magnitudine ipsius morbi cau-
 sam exuperant, atque ideo curandi rationem interpel-
 lant, hoc est, curationis ordinē euariant, peruertuntq;
 ut etiam

ut etiam superius de phlegmone dictum est. Ad hæc erysipelas motū sequitur tertianæ febris, nam ad eius materiam quandam habet analogiam: utriusque enim materia, humor est biliosus. Ceterum erysipelas ab exterioribus uerti ad interiora non est bonum: ab interioribus autem ad exteriora, bonum, ut ab Hippoc. scriptum est aph. 2. 5. lib. 6. Erysipelata uerò quæ capiti oboriuntur, plus facessunt negotij, adeoq; (ut Paulus ait) periculosa esse solent, ut nisi efficax conseruantur auxilium, interdum affectos strangulent. Scribit etiam Hippoc. lethale esse, si erysipelas sit in utero mulieris prægnantis. Facio enim sic in utero erysipelate, foetus ex necessitate moritur. Siquidem acuta febris (ut Galenus ait in commentario) sæpe eum citra inflammationem interimit.

Erysipelas motum sequitur tertianæ febris.

Erysipelata circa caput curatu difficillima.

Erysipelas in utero prægnantis fatum enecat.

Erysipelatis curatio.

- C**um erysipelas, sicuti & phlegmone, de qua paulò antè egimus, affectus calidus sit, & ex humorum defluxione fiat, geminus etiam erit totius curationis ipsius scopus, nempe refrigeratio & uacuatio. At ueluti uacuationis indicatio in phlegmone, refrigerationis indicationem uincebat: ita refrigerationis indicatio in erysipelate, magis urget quàm uacuationis. Illa enim quantitate, hoc uerò qualitate magis premit & discruciat. Itaque erysipelas magis refrigerari, & minus uacuari, inflammatio contrà magis uacuari, & minus refrigerari debet: quanquam utriusque affectus curandi (ut inquit Galenus) commune caput sit, infestantis scilicet humoris uacuatio. Ideoq; postquam refrigeratum erysipelas fuerit, ad ea quæ digerunt seu
- discutiunt

Curationis erysipelatis, scopi uniuersales duo

Particulares cu-
randi erysipela-
tis scopi qua-
tuor.

Primus sco-
pus.

Aëris deletus.

Ambientis præ-
paratio.

discutiunt medicamenta conuertimur. Porro ut gemitum hunc scopum uniuersalem; refrigerationem inquam & humoris infestantis uacuationem; assequamur, quatuor alijs scopis particularibus iuxta posterioris ætatis chirurgorum placita, est opus. Primus scopus, consistit in recta uitæ institutione atque obseruatione. Secundus, humoris ad partem affectam confluentis, quem antecedentem materiam appellant, auersionem concernit. Tertius in humoris, qui iam in partem ægram influxit (quem materiam coniunctam dicunt) uacuatione consistit. Quartus uero & postremus circa symptomatum correctionem, ac propulsionem uersatur. Primum scopum facile assequemur, si rerum omnium, quas non naturales uocant, administratio, ad humiditatem & frigiditatem (ut in febre tertiana) spectauerit: quandoquidem erysipelas ex flaua bile ortum habet, quæ temperaturæ est calidæ & siccæ.

Ergo aërem atque habitationem, quoad fieri potest, qualem esse expedit, id est, frigidiorē & humidiorē deligito, præparatoq;.

Æstate igitur subterraneas domos frigidissimas, maximè persflatas, & ad arcum uersas, tibi deligito: Si loci huiusmodi occasio non datur, & calidior aër extiterit, ipsum sic præparato:

Aquam frigidam ex uasis in uasa subinde transfundito.

Pauimenta domus assidue aqua, quæ prorsus gelida sit, aspergito.

Rosas, & uiolas plurimas, nitium folia, & capreolos, salicis quoque ramulos, & reliquos flores ac germina,

mina, quæ frigida humidaq; facultatis sunt, humi
spargito, ac in aërem proiecto.

Turbam hominum conclaue laborantis ingredi pro
hibeto.

Pinguia, dulcia, acria, calidaq; omnia uitato. Cibus.

Lactuca, cucurbita, portulaca, oxalide, (quam aceto=
sam uocant) hordeato, oriza, & alijs id genus, quæ san
guinem incrassant, & refrigerant, lubens uestitor.

A uino in totum abstineto. Potus.

10 Cremor ptissimæ, aut aqua hordei tibi potus esto.

Vicius temperantiam seruato. Repletio.

Aluus tibi semper mollis esto. Inanius.

Ab omni motu, præsertim uehementi atque immo=
derato abstineto. Motus.

Iram, contentionem, atque omnem animi uehemen=
torem motum, aut perturbationem, tanquàm aduer=
sissima fugito. Animi affectus.

Nitida, ac munda circa te omnia sunt.

Venerem ne exerceto. Atque hæc de primo sco. Venus.

20 po dicta sufficiant.

Secundum autem scopum curationis erysipelatis Secundus sco-
pus.

consequemur, si succum in corpore delinquentem com
moda uacuatione ademerimus. Ergo in uero ac legiti=
mo erysipelate, nõ necessario, ut in phlegmone, sangui=
nem ex uena detrahemus: sed medicamento quod fla=
uam bilem exigat (cholagogon Græci uocant) uentrem
per inferiora expurgabimus, si saltem affectus magnus
sit, & corpus bile abundare uideatur. Itaque cum ery=
spelas febres accendat, & eas uehementiores quàm

30 phlegmone, medicamenta quæ impensè calida sunt, &
scammonij succum, quod recentior Græcia dacrydion

uocat,

uocat, recipiunt, (cuiusmodi est, quod uulgo in officina
 nis electuarium de succo rosarum appellatur) huic affe-
 cui minime idonea sunt. Ergo uel rhabarbarum offe-
 rendum est, uel potio, quæ Rasi aqua tamarindorum
 dicitur. Recipit autem pruna Damascena 2 4. tamarin-
 dorum recentiorum drachmas decem, sacchari uiolati
 quart. semis. Cui ut efficacior reddatur, aliquid diluti
 rhabarbari adijci potest. Quod si exigua sit affectio,
 ne hæc quidem cholagoga medicamenta necessaria
 erunt, sed abunde fuerit, tunc acri clystere uti, ut Gale-
 no uisum. At in erysipellate phlegmonoso non abs re
 feceris (modò nihil obstiterit) si curationem à sangui-
 nis missione auspicatus fueris. Tale autem sæpius faciè
 apprehendit, unde et Paulus protinus ab initio uenam
 in cubito præsertim humeralem in eo incidi iubet. Sin
 autem hæc non appareat, eam quæ se conspectui ma-
 gis obijcit. Si quid uerò sanguinis detractionem impe-
 diat, purgatione ex medicamento, quod bili ducende
 dicatum est, utendum præcipit. Non pugnat tamen Pau-
 lus cum Galeno: nempe cum Paulus secandam esse ue-
 nam præcepit in erysipellate, quod capiti seu faciei
 oboritur, de phlegmonoso erysipellate intellexit, quod
 sæpius faciè apprehendit: Galenus uerò de legitimi-
 mo erysipellate locutus est, in quo sanguinem non mit-
 tit. At in œdematoso aut scirrroso erysipellate, pur-
 gatione utendum est, quæ mixtas habeat facultates;
 hoc est, partim flauam bilem, partim uerò pituito-
 sum, aut melancholicum succum educat. Atque in ijs
 quidem omnibus consulendus est doctus aliquis ac pru-
 dens medicus, à cuius consilio et decretis, ne transuer-
 sum quidem unguem discedere debet chirurgus. Sitq;
 hoc satis

2. ad Glauce,
 In erysipellate
 phlegmonoso cõ
 petiti phleboto-
 mia.

Chirurgus in ijs
 quæ ad phlebo-
 tomiam et pur-
 gatione attinēt,
 nihil atterere de-
 bet, citra periti
 alicuius medici
 consilium.

hoc satis semel monuisse, quòd chirurgus nihil unquam in ijs quæ ad purgationem, & sanguinis missionem per phlebotomiam attinent, attentare debet, citra periti alicuius medici consilium, nisi forsàn si quandò urgeat necessitas, & ubi nullus præstò adest medicus.

Tertiam intentionē complent refrigerantia & reprimentia in principio fluxionis, exceptis cassibus in capite uniuersali commemoratis. Transactò uerò principio, & stata iam fluxione, quod membro inhæsit &

Tercia intentio.

10 impactum est, digerentibus seu euaporantibus medicamentis extrinsecus admotis, uacuandum est, per occultam scilicet sensui transpirationem. Omnium siquidem huiusmodi tumorum sic præter naturam consistentium, uacuatio duplex est Gal. 14. Therap. Vna

Hic Guido de prauitate citat Galen.

quidem repellentium ad alias partes; altera foras digerentium, per eum qui sensum fugiat halitum. At quoniam erysipelas non quantitate modò affligit, sed etiam, ex uehementi scilicet inflammatione, qualitate ipsa cruciat, ampliorem refrigerationem, quàm phleg-

20 mone requirit. Post totius igitur corporis (ut paulò antè dictum est) uacuationem, reprimentibus auxilijs utemur, afflictam particulam, seu ipsam quæ patitur cutem, ut decet, refrigerantes, præsertim cum sine manifesta aliqua occasione factum fuerit erysipelas. Est autem refrigerationis terminus, ipsa coloris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cū hoc quiescit. Quod non purum est, sed iam quodammodò phlegmonodes, si plusculum refrigeres, liuidam cutim præfert. Sin ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissi-

Quatenus refrigerandum in erysipelate.

30 mùm in senili corpore: sic ut quædam ita refrigeratorum, ne digerentibus quidem postea medicamentis ad perfectionem

Lib. 14. Tbe-
rap.

Materia refrige-
rantium ex Gal

Alie. Na ex
Païdo.

Ceratum.

perfectiorem possint sanari: sed scirrhusus quidam tu-
mor in particula derelinquatur. Ergo satius est (inquit
Gal.) ubi laborantis particule alteratum colorem vi-
deris, à refrigerantibus retundentibusq; ad contraria,
id est, dissipantia seu digerentia, & exiccantia tran-
sire, priusquam uel liuida uel nigra prorsus fiat. Ad-
hibenda autem semper cura est, ut quæ illinantur, per-
liquida sint atque humida; eaq; sæpius commutentur,
ac per spongas frigido aliquo liquore imbutas, subin-
de quæ admotæ sunt, abluantur: siquidem multius par-
ticule feruor celeriter in uaporem erumpens, hæc de-
siccatur. Cæterum inter ea quæ refrigerandi, atque re-
pellendi facultatem obtinent in hoc affectu conueni-
tem, laudat imprimis Auicennas ex simplicibus, persi-
sionem aquæ frigide. Galenus uerò commendat succi
solani, semperuiui, portulacæ, psyllij, alterci, id est,
hyoscyami, lactucæ, umbilici Veneris, (quæ herbula
Græcis cotyledon appellatur) intybi, id est, cichorij, et
lenticulæ palustris, atque alia id genus, quæ ultra hæc
à Paulo adduntur. Cuiusmodi est cucurbita, glaucium, 20
apium (quod uulgi est petroselinum) & rhamni folia,
per se, uel cum pane cataplasmatibus modò illita. Ce-
ratum quoque ex aqua admodum frigida, quod reci-
piat quadruplum rosacei ad ceram albam. Sit autem
rosaceum ex oleo omphacino, id est, immaturo, sine sa-
le confectum, quibus in pila emollitis aquæ frigide su-
perfunditur, quantum potest recipi. Si uerò aceti te-
nuis & pelludici momentum admiscueris, præstātius
atque efficacius medicamentum reddideris. Porro hæc
omnia actu frigida sunt ad mouenda, & subinde mutan- 30
da, priusquam manifestè incalcant, aut arescant. Con-
ducit

ducit etiam plurimum ad rem præsentem si pars erysipelate obfessa, illinatur cerusa sola, uel mixta cum aceto & lycio, uel terra cimolia, aut figulari cum sola no, aut argenti spuma cum rosaceo, item acacia cum aceto. Ad idem confert plurimum & sequens compositio. Succus plantaginis uncia una, rosacei uncie tres, lithargyri nutriti uncia una, cerusæ lotæ drach. tres, lactis muliebris semuncia, miscentur omnia simul in mortario plumbeo, & fit linimentum. Teri debent pri-
 10 mium lithargyrum, & cerusa: deinde oleum & succus paulatim, & sensim affundi debent, donec exactè misceantur. Quòd si ampliorem refrigerationem desideres, his & alijs prius enumeratis (ex Pauli sententia) admisceri potest, opij aliquid, uel cicutæ, uel mandragoræ. Verum ab ijs, & similibus, quæ stupefaciendi uim habent, abstinendum esse censeo, nisi maxima urgeat necessitas. Cæterum ubi inflammatio egrotantis membri iam desijt, ac feruor erysipelatis sese remi-
 20 sit, Galenus humorem in particula receptū, quam coniunctam materiam uocant, prius quàm ex refrigeratione liuor appareat, discutit, hoc est, resoluit, imposto cataplasmate, ex hordei farina, seu ex cruda polëta, ὠμὴν λυσιμ Græcè uocant, & alijs, in ratione phlegmones superius dictis. Quemadmodum enim signa erysipelatis sumebantur ex analogia signorum phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remediorum curationis phlegmones sumenda sunt. Porro talia medicamenta, quæ dissoluen-
 30 di seu euaporandi facultatem obtinent in hoc affectu conuenientem, plurima tum simplicia, tum composita referuntur à Paulo Aegineta lib. 4. cap. 21. Item ab

Compositum me-
dicamentum.

Euacuatio con-
iunctæ materie
per euaporan-
tia.

ὠμὴν λυσιμ

Lib. 14. The-
rap.

perfectiōnem possint sanari: sed scirrhusus quidam tu-
mor in particula derelinquatur. Ergo satius est (inquit
Gal.) ubi laborantis particulae alteratum colorem ui-
deris, à refrigerantibus retundentibusq; ad contraria,
id est, dissipantia seu digerentia, & exiccantia tran-
sire, priusquam uel liuida uel nigra prorsus fiat. Ad-
hibenda autem semper cura est, ut quæ illinuntur, per-
liquida sint atque humida; eaq; sæpius commutentur,
ac per spongas frigido aliquo liquore imbutas, subin-
de quæ admota sunt, abluantur: siquidem multus par- 10
ticulae feruor celeriter in uaporem erumpens, hæc de-
siccatur. Ceterum inter ea quæ refrigerandi, atque re-
pellendi facultatem obtinent in hoc affectu conueniē-
tem, laudat imprimis Auicennas ex simplicibus, persua-
sionem aquæ frigida. Galenus uerò commendat succū
solani, semperuiui, portulacæ, psyllij, alterci, id est,
hyoscyami, lactucæ, umbilici Veneris, (quæ herbula
Græcis cotyledon appellatur) intybi, id est, cichorij, et
lenticulae palustris, atque alia id genus, quæ ultra hæc
à Paulo adduntur. Cuiusmodi est cucurbita, glaucium, 20
apium (quod uulgi est petroselinum) & rhamni folia,
per se, uel cum pane cataplasmatibus modò illita. Ce-
ratum quoque ex aqua admodum frigida, quod reci-
piat quadruplum rosacei ad ceram albam. Sit autem
rosaceum ex oleo omphacino, id est, immaturo, sine sa-
le confectum, quibus in pila emollitis aquæ frigida su-
perfunditur, quantum potest recipi. Si uerò aceti te-
nuis & pelludici momentum admiscueris, præstātius
atque efficacius medicamentum reddideris. Porro hæc
omnia actu frigida sunt ad mouenda, & subinde mutan- 30
da, priusquam manifestè incaleant, aut arescant. Con-
ducit

Materia refrige-
rantium ex Gal.

Alie fla ex
Paulo.

Ceratum.

ducit etiam plurimum ad rem præsentem. si pars erysipelate obfessa, illinatur cerusa sola, uel mixta cum aceto & lycio, uel terra cimolia, aut figulari cum sola no, aut argenti spuma cum rosaceo, item acacia cum aceto. Ad idem confert plurimum & sequens compositio. Succus plantaginis uncia una, rosacei uncie tres, lithargyri nutriti uncia una, cerusæ lotæ drach. tres, lactis muliebris semuncia, miscentur omnia simul in mortario plumbeo, & fit linimentum. Teri debent pri-
 10 mium lithargyrum, & cerusa: deinde oleum & succus paulatim, & sensim affundi debent, donec exactè misceantur. Quòd si ampliorem refrigerationem desideres, his & alijs prius enumeratis (ex Pauli sententia) admisceri potest, opij aliquid, uel cicutæ, uel mandragoræ. Verum ab ijs, & similibus, quæ stupefaciendi uim habent, abstinendum esse censeo, nisi maxima urgeat necessitas. Cæterum ubi inflammatio ægrotantis membri iam desijt, ac feruor erysipelatis sese remi-
 20 sit, Galenus humorem in particula receptum, quam coniunctam materiam uocant, prius quàm ex refrigeratione liuor appareat, discutit, hoc est, resoluit, imposto cataplasmate, ex hordei farina, seu ex cruda polëta, *ὀμὴν λυσιμ* Græcè uocant, & alijs, in ratione phlegmones superius dictis. Quemadmodum enim signa erysipelatis sumebantur ex analogia signorum phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remediorum curationis phlegmones sumenda sunt. Porro talia medicamenta, quæ dissoluen-
 30 di seu euaporandi facultatem obtinent in hoc affectu conuenientem, plurima tum simplicia, tum composita referuntur à Paulo Aegineta lib. 4. cap. 21. Item ab

Compositum me-
dicamentum.

Euacuatio con-
iunctæ materie
per euaporan-
tia.

ὀμὴν λυσιμ.

*Hydrelæum est
mixtura ex aqua
& oleo, seu oleū
dilutum.*

*Si liuor iam lo-
cum occuparit.*

*Quarta in-
tentio.*

*Doloris & ardo-
ris mitigatoriū.*

*Si erysipelas
exulceretur.*

Aëtio libro de re medica decimoquarto. Satis autem fuerit, nunc unum ex multis recensere, quod omnium mihi præstantissimum uisum est. Altheæ nouellæ foliorum pondo, id est, libra assumitur, concoquuntur in hydrelæo: cocta uerò probe teruntur, adiectoq; rosacei triente, id est, uncijis quatuor, argenti spuma, & cerussa, singulorum uncijis duabus & semisse, id est, dimidia: iterum leuigantur cum succo coriani, aut semper uiui, aut solani: deinde micis panis adiunctis, ut emplastrum formam induat, illinitur. Quod si forte liuor iam locum occuparit, incisa antè cute, cataplasma superponendum est, perfundendusq; locus, plurimum quidem, (ut Galenus præcipit) aqua calida: digerit enim, & plagas abluit. Sed & aqua, & muria interim cōducet locum fouere, cum scilicet crassior est: hæc enim crassitudinem incidunt, ac detergent. Quarta intentio curationis erysipelatis, quæ est accidentium correctio, perficitur ut in curatione phlegmones dictum est, cum agebatur de reditu materiæ, de induratione, & corruptione. Item de dolore & ardore: hæc enim symptomata etiam erysipelati, uti & phlegmonæ accidere solent. Porro optimum doloris ac uehementis ardoris mitigatorium auxilium, fit ex folijs, et radicibus hyoscyami, inuolutis in stupis, & coctis sub prunis, deinde nuxtis cum unguento, quod populeon uulgò appellatur, uel cum axungia, ut superius dictum est in curatione phlegmones. Si uerò contingeret ipsum erysipelas exulcerari, curetur admotione unguenti albi, aut unguenti de lithargyro, quorum descriptiones ex antidotario requirendæ sunt. Quod si illis addetur aliquid scorie, hoc est, recrementi plumbi, optimum

num sanè atque efficacissimum foret remedium. Sed præstat ut totam curandi erysipelatis rationem, breuibus quibusdam sententijs in modum epilogi complectamur, ut quæ diffusius à nobis supra dicta sunt, memoriæ tenacius hæreant.

Septem de erysipellate aphorismi, totam ipsius curationem summam complectentes, ex Galeno.

10 **I**N exquisito seu legitimo erysipellate, sanguinem ne detrahit.

Si bile corpus abundet, & affectus magnus sit, uentrem medicamento cholagogo, id est, bilem exigente, per inferiora purgato.

Quòd si exiguus morbus sit, & corpus bile uacuum, à medicamento flauam bilem per aluum ducente, abstineto, & acri chylere contentus esto.

Vniuerso, ut oportet, corpore purgato, partem affectam per initia moderate reprimentibus medicamentis, & abundè refrigerantibus, usque ad coloris mutationem, perfundito atque illinito.

Vbi laborantis particule alteratum colorem uideris, & feruorem erysipelatis iam remissum, ac inflammationem desisse, à refrigerantibus, adstringentibusq; priusquam uel liuida, uel nigra prorsus particula fiat, ad contraria, hoc est, digerentia seu discutientia & exiccantia, transito.

Quæ ex ulceribus, alijsq; euidentibus causis fiunt erysipelata, primùm scarificato, deindè cataplasma ex hordeacea farina imposito.

30 Si erysipelas non exquisitū fuerit, sed phlegmonodes, id est, quodammodo ad inflammationis naturam uergens,

uergens, præsertim ubi sanguis in corpore exuberat,
intrepidè sanguinem mittito.

*De tumoribus, qui cum erysip. societatem habet, hoc est, de
herpete miliari, & exedente, quæ pustulæ cholerica
recentioribus chirurgis dicuntur.*

De herpete.

Tumores illos præter naturam, qui cum supra
comprehensio erysipelate societatem habent, at-
que ad ipsum quodammodo pertinere ac referri uiden-
tur: ex bile autem non naturali, & secreta, id est, alijs
humoribus minimè permixta, generationem obtinent,

*Pustula male,
& cholerica uul-
gò dicta.*

recentiores tum medici tum chirurgi, pustulas malas
cholicas appellant: Græci uerò, (ut Hip. Gal. & Pau-
lus) herpētas uocant. Quæ uox Latinis ferè sonat,

Herpetes.

malum quod serpit: ἐρπῶ enim idem quod serpo: un-
dè ἐρπῆς serpens dicitur. Herpes tamen non absolu-
tè malum quod serpit, significat apud medicos, sed cer-
tum morbi genus, de quo nunc agitur. Itaque malum
quod serpit, latius patet quàm herpes: nam & phage-

*Formica Aui-
cennæ.*

dene serpentia etiam ulcera dicuntur. Huiusmodi au-

*Herpes quan-
do fiat.
Herpetis spe-
cies duæ.*

tem uniuersas pustulas, Auicennas formicas appella-
uit: Galenus uerò eas inter inflammationes adnumera-
uit, sed Celsus sub ignis sacri nomine has intellexisse ui-
detur lib. 5. cap. 23. Fit igitur herpes, quando flaua
bilis, non naturalis, sola & secreta, id est, nullo alio
illi (saltem sensus iudicio) admixto humore, in particu-
lam aliquam confluit, decumbit, atque ibidem consi-
stit, quæ si consistentia sua crassior sit, acriorq; totam
exulcerat cutem, usque ad carnem suppositam, uoca-
turq; tunc uitium huiusmodi Hippocrati & Græcis,

ἐρπῆς ἐξεδὴς

ἐρπῆς ἐξεδὴς. Latinis uerò herpes exedens, uel
depascens:

- depascens: & decimoquarto Terap. Galeno absoluto nomine herpes. Si uero tenuior & minus acris, calidaq; fuerit bilis, pustulas exiguas per summam cutem, id est, in sola superficie cutis, (hanc enim tantum ueluti deurit) milio, hoc est, milij seminibus, similes excitat: ob quam similitudinem affectus tunc Latinis miliaris herpes nominatur: Græcis uero quibusdam post Hippocratis ætatem, κέγχρις ob eandem rationem dictus est: κέγχρος enim Græcis, milium nobis dicitur. vgo, id est, exedens, uel depascens.
- 10 tur. Atq; hæc species Galeno autore lib. 2. ad Glau. Hippoc. generis sortitur appellationem, cum simplici ter, & sine additione illi herpes uocetur. Alibi tamen herpetis nomine, Galenus herpetem esthiomenum, id est, excedentem intelligit, ut paulo post dicitur. Hic autem non protinus ulcus facit, ut alter qui exedens dicitur, sed ut dictum est, admodum exiguas pustulas ad speciem milij, quæ & ipsæ interposito spacio, ac procedente tempore, cum disrumpuntur scilicet, in ulcus abeunt. Proinde non sine ratione Oribasio & quibusdam Herpes miliaris, siue cencbria.
- 20 alijs uisum est, in eiusmodi uitio, bili esse aliquid pituitæ tenuis admixtū, quæ pustulas illas minutulas procreat. Unde & nonnullis pustulosus herpes dictus est. Lib. 14. Therap.
- Alter uero, qui esthiomenos appellatur, non ita pituitæ commixtus est, sed exactæ bilis, ac nullo alio humore infectæ, esse uidetur: ideoq; cum erosionem accedit, affectu cutis continuitatem prebendente, unde & nomen illi impositum est. Esthiomenos enim idem est quod erodens uel exedens. Atque hic affectus quidem eiusdem generis est cum pustuloso atque exulcerato
- 30 erysipelate: à quo tamen differt humoris ipsius biliosis (ex quo uitium utrumque ortum habet) tenuitate. Ex Paulo, & Gal.

Lib. 14. meth.
med. Humor bi-
liosus qui herpe-
tem excitat, ad-
modū tenuis est.

Id quod testatur Gal. his uerbis: Est enim (inquit) ad-
modū tenuis humor qui herpetem excitat, adeò pro-
fectò, ut non solum omnes interiores partes, quæ uti-
que carnosæ substantia sunt, transeat, sed etiam cutim
ipsam ad summam usque cuticulam, (epidermida Græ-
ci uocant) quam solam, propterea quod ab ea remora-
tur, tum erodit, tum exedit, quando si hanc quoque su-
doris uice transiret, haudquaquam ulcus excitaret.
Quippe id, ulcerum quæ ex mordente humore oriun-
tur, quæ nimirum spontanea uocant, cōmune est, quod
humor qui ea facit, sistitur in exitu, ac tardat. Hæste-
nus Gal. ubi nomine herpetis simpliciter & sine addi-
tione, intelligit herpetem esthiomenum, ut ex ipso cō-
textu, signis, & curatione facile est deprehendere. At-
que ita illo in loco generis sortitur appellatione, cum
simpliciter, & absolutè herpes nominetur, quemadmo-
dum & in libello, de tumoribus præter naturam, ubi
de eo sic idem Gal. ad uerbum scribit: Depascitur qui-
dem & herpes, uicina, id est, ea quæ in circuitu sunt,
erodens: uerum solius cutis est exulceratio. Cæterum
utramque herpetis speciem, id est, tam miliarem, quam
exedentem, sub nomine formicæ Barbari ferè omnes
neoterici comprehendunt. Quibus ea in re, ut & in
multis alijs erroris occasionem primus præbuit Aui-
cennas, qui in nominis similitudine deceptus, quoniam
Græci myrmecias, id est, formicas, genus quoddā uer-
rucarum uocant, eodem capite uerrucas illas cum her-
petibus errore sædissimo commiscuit. Guido tamen
discrimen ponit, inter herpetem & formicam, confun-
ditq; nomen formicæ modò cum uerrucis, (quas myr-
mecias & acrochordonas Græci uocant) modò cum
herpete

Herpes solius
cutis est exul-
ceratio.

Auicennas myr-
mecias confun-
dit cum herpe-
tibus.

Guidonis error
maximus.

herpete exedente, qui (comedens inquam herpes) modo etiam illi herpestem, modo herpes absolute nominatur, putaturque eidem aliud nihil esse, quam erysipelas pustulosum, & ulceratum. Cum tamen ille (ut ex Galeno adductum est) ab hoc differat humoris tenuitate. Tenuior est et bilis quæ herpeta creat, quàm quæ ulceratum erysipelas. Ad hoc erysipelas quod cum exulceratione incidit, non tantum cutem, sed cum ea etiam aliquid subiectæ carnis occupat. Herpes uero, quo de
 1. hic agitur, solam cutim apprehendit, exulceratque. Itaque tametsi hæc eiusdem sint generis, (ut Galeno uisum est) non tamen omnino sunt idem. Porro pustulas illas, quæ Auicennæ interpreti, & imperitæ medicorum turbæ, morbilli appellantur, sub herpete comprehendisse uidetur Hippoc. lib. 3. Epidemiorum. Fiunt autem morbilli huiusmodi à tenuiore materia, quàm pustula illæ, quæ uulgo uariolæ dicuntur. Hæ enim (ut uoluit Auicennas) ex sanguine, illi uero ex bilis sanguinisque fiunt mixtione. Si quis autem desyderat,
 2. quo nomine eiusmodi pustulæ apud antiquiores dictæ sint, diximus Latine à Plinio uocari papularum, & interdum pituitæ eruptiones: Græcè uero Hippocrati eëlbymata lib. 3. Epidemiorum: Galeno autem exanthemata. Ceterum utriusque herpetis notæ, iudicia, & causæ, ex præcedentibus satis innotescunt. Superest igitur, ut eorum curationem subiiciamus.

Herpetis curatio.

IN curandis herpetibus, sicut & in alijs eiusmodi spontaneis ulceribus, quæ ex mordenti & acri humore oriuntur, tres scopi communes sunt obseruandi.
 3. Primus est, ut humoris in partem affectam confluxio
 G iij inhibeatur.

Herpete est huiusmodi morbum & erysipelas ulceratum non omnino idem esse.

Morbilli ex herpetum sunt genere.

Variolæ.

Papularum eruptiones.

Eëlbymata. Exanthemata.

Herpetis curatio tres habet scopos siue intentiones. Primus scopus.

inhibeatur. Secundus, ut quicquid in laborantem particulam confluit, & eidem inhaeret, uacuetur. Tertius, ut sanetur ulcus. Primum scopum, seu primam intentionem assequimur, totum corpus medicamine, humorem unde uitium enascitur, educente, expurgando. Mox repurgato corpore humorem influentem reprimendo, regerendoq;. Ergo in herpete exedente, medicamento utendum est, quod flauam bilem per aluum exigit: hunc enim puris, ac syncerus (ut diximus) biliosus procreat succus. Proinde fit, ut quantum ad totius corporis euacuationem attinet, comedentes herpetas similiter ut erysipelata curare oporteat. Itaque quoniam tenuis humor est, qui id uitium creat, abunde est Galeno, etiam aluum leniter soluisse, uel urinas, per ea quae id modice efficiunt, citasse. In altero uero herpetum genere, quem à similitudine quam habet cū milio, miliarem & cenchriam Graece appellari diximus: medicamento opus est, quod mixtae sit facultatis, hoc est, quod bilem simul & pituitam educat. Quibusdam enim non sine ratione (ut Galenus ait) uisum est, in eiusmodi uitio bile esse aliquid pituitae admixtum. Porro uacuato, ut decet, eo qui in corpore redundat, ac uitium committit humore, medicamentis utendum est, quae influentem humorem reprimant, regerantq;. Tuior namque ac conuenientior tunc fuerit eorum usus. Quandoquidem (inquit Galen.) si quis exiguum uitiosi humoris, post rite factam purgationem adhuc in corpore remanens, ad uiscera & magnas uenas retrudat: nullū profectò quod sensu percipiatur malum committet. At si, inquit ille, eius non leuis quantitas sit, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit. Vbi

*Herpes exedens
medicamentum
exigit cholag-
gon.*

*Herpes miliaris
medicamentum
desyderat, quod
bile simul & pi-
tuitam educat.*

*Reprimendi
tempus.*

*Lib. 14. Tbe-
rap.*

Non esse reprimendum, si multum sit uitiosus succus.

- bit. Vbi scilicet prius naturæ uiribus totum corpus expurgantis, non sit, uel per deiectionem, uel urinas, uel cutim, quæ totum corpus includit, uacuatus. Cæterum reprimunt quidem regeruntq; non solum ea quæ adstringunt, sed etiam quæ sine adstrictione refrigerant: cuiusmodi sunt lactuca, polygonion, ex stagnis lens, portulaca, seris, semperuiuum, & id genus alia, quæ erysipelatibus ualde erant opportuna. Verum eiusmodi medicamenta, quæ scilicet præter id quod refrigerant, etiam humectare natura apta sunt, herpes præsertim depascentes, minime desyderant, sed sola ea admittunt refrigerantia, quæ etiam maximè possunt exiccare. Quæ enim refrigerandi, atque unà exiccandi uim habent, sed mediocrem (cuiusmodi est solanum) non satis illis conueniunt. Apponere igitur ipsis oportet ex Gale. cōsilio, ab initio quidem, ex uite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & arnoglossi. Post hæc uerò & lenticulam his adiungere oportet, et aliquando mel, & farinam hordeaceam. Item cata-
- 10 plasma sine semperuiuo, quod ad phlegmonas, quæ ex fluxione eueniunt, inscribitur. Repellit enim quod infuit, atque id quod in parte affecta continetur, exiccat, & membra corroborat. Proinde transacto morbi principio efficax erit remedium. Itaque fiet huiusmodi cataplasma, ex corticibus malorum Punicorum in uino decoctis, & Rhu, siue Rhoë, id est, semine coriarij fruticis, (quod posteriori medicinæ Sumach appellatur) & farina hordei. Cæterum hoc cataplasma te secundam intentionem, seu scopum curandi herpes
- 30 tis probè assequeris: quippe cū sufficienter digere re possit, quod tam in affectum locū confluxerit. Constat autem

Regerentium
materia.

Quæ refrigerāt
pariter & hume-
fiant non conue-
niūt herpetibus
excedentibus.

Reprimētia her-
petibus exceden-
tibus accommoda.

Hæc complent
secundam in-
tentionem.

Cataplasma.

Sumach.

*Vlceris curatio
in herpete, qui
tertius est scopus.*

*Vlcus omne
exiccari de-
syderat.
Lib. 2. ad Glan-
conem.*

*Loca exulcerata
quibus inun-
genda.*

*Posca uel pu-
sca.*

*Remedia ex
Paulo spon-
pta.*

*Ad herpetas
depascentes.*

stat autem, quòd in generatione ulceris exuperare de-
beant quæ reprimendi facultatem habent: ubi uerò
non amplius confluit in ægotantem particulam uitio-
sus humor, quæ digerunt. Quod ad tertium scopum
attinet, qui ulcus sanandum proponit, summatim hæc
te cognoscere oportet. Nempe quòd omne ulcus siue
sponte siue ex accidenti factum fuerit, exiccari desy-
derat medicamento (ut inquit Hippo.) non aspero, hoc
est, non mordente, neque uehementer irritante, præ-
terquàm ubi malignum, & cum putrilagine fuerit. Ta-
lia enim (inquit Galenus) acriora expetunt medicami-
na, & quæ ignis uires habeant: quale est mysi, & chal-
citis, & arsenicum, & calx, & sandaracha, atque id
genus alia, quæ non aliter quàm ignis adurant. Loca
igitur exulcerata in herpete exedente, inungenda sunt
pastillis, seu trochiscis, in libris, qui pharmaceutici di-
cuntur, ad herpetas inscriptis. Qui, cùm res exigit ut
illis utamur, passo, uel uino aliquo dulci, uel si dulce
non adfuerit, uino tenui & subaustero non nimis ue-
teri, (hoc est, quod non aliquam in gustu ob antiquita-
tem contraxerit acritudinem) aut posca aquosa (quod
oxycratum uocant) diluuntur, seu (quod dicunt) xeli-
quantur, dissoluuntur ue. Paulus his utitur remedijs
ad herpetem, qui sub cute affligit: Retrimentum plum-
bi, rutæ læuigatæ succo excipitur, aut ceratum myr-
teum in uicem rutæ. Aliud: Lanæ ueteris illotæ, circa
tedam cõbusæ, drachmæ duodecim & semissis, id est,
dimidia, ceræ drachmæ. 25. recremēti plumbi drach-
ma, seu capilli curati lotiq; ex aqua, drachmæ. 25. myr-
tei unciz. 5. Ad herpetas uerò acutè seu acriter
depascentes, hoc remedium iubet adinueniri: Corij mali
Ponici

- Punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantumdem, lanæ illotæ, tedæ seu tedaceo ligno adhærentis, , , & combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, , , cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorū , , drachma, uino aut myrteo excipiuntur. Iam uerò in longum tempus protractis ulceribus, neque uino dulci, circuli parui, id est, trochisci, & huiusmodi alia medicamenta, quæ ad herpetas scribuntur, dilui debent, sed neque pusca adhuc aquosa, quin potius uino satis austero, præcipuè uerò nigro, & si id non affuerit, albo. Medicamenta autem in hoc tempore, hoc est, inueteratis iam ulceribus, efficacia, & maxime accommodata sunt, pastilli seu trochisci Musæ, & Andronis, & Polyidæ: quorum descriptiones in fine curationis carbunculi posite sunt. Item trochisci, qui calidicon & aldaron dicuntur Auicennæ & recentioribus, quorum descriptiones ex antidotario requirenda sunt. Herpetas uerò, qui tantum summam cutem exulcerant, ut sunt, quos miliares diximus, nullo horum medicamento-
² rum superius commemoratorum (si saltem Galeno credimus) inungere oportet: uehementia enim sunt ac ualidé exiccant. Verū istis sufficiūt quæcūque uim glaucij, id est, memithæ habent, eaq; diluere oportet, maxime quidem aqua. Quod si hæc nihil profecerint, etiam acetum miscendum est. Quod si etiam solani succo intinxis, aut arnoglossi, magis adhuc iuueris. Haslenus de herpete. Caterum quoniam deformicis nonnihil obiter in superioribus attigimus, quas turpiter (ut diximus) recentiores, & Arabes
³ cum herpetibus confundunt, præsens locus expositus lat, ut de ijs, & alijs in cute eminentibus excrescentijs,

Ad inueterata
iam ulcera.

Si pustule milia-
res in ulcus ab-
eunt quid agen-
dum.

Lib. 2. ad
Glauc.

tijs, quæ Latini uerrucas uocant, paucula annotentus.

De formicis, & alijs uerrucarum
differentijs. Cap. IX.



UMMORES illos exiguos seu humiles illas
excreſcentias, quæ inſtar monticulorum
quorundam cute eminentes cõſpiciuntur,
Latini appoſitè uerrucas appellarunt: uerruca enim
proprie editiorem montis partem ſignificat. Vulgus
autem porra nuncupat: quia quandoque intra ſe fila
quædam continent porrorum radicibus nõ diſſimilia.
Græci nomen non habent, quo omnia eiufmodi uerru-
carum ſeu porrorũ genera complectantur, ſed quamq;
proprio nomine ſpeciem nuncupant. Hæ autem fere
ſunt, $\mu\upsilon\rho\mu\kappa\iota\alpha$, $\alpha\chi\rho\chi\omicron\rho\delta\omicron\nu\epsilon\varsigma$, $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\varsigma$, $\theta\upsilon\mu\iota\omicron\rho$. Ita
que Myrmecia illis dicuntur uerruca, quæ latiore ſunt
baſi, & quaſi ſeſſiles, ſimilem uellicantis, ſeu morden-
tis formicæ ſenſum, dum attræctantur, inducentes: un-
de & nomen illis factum eſt. Græci enim $\mu\upsilon\rho\mu\kappa\iota\alpha$
formicam nominant. Quare Latini eas (nomine qui-
dem ad Græcum uocabulum ſeſe accommodante) for-
micas, uerrucas dixerunt. A figura uerò & forma-
tione, ſeſſiles uerrucas. Hæ naſcuntur Celſo, aut in
palmis, aut in inferioribus partibus pedum: radices
autem altius exigunt, ac humiliores ſunt thymio du-
rioresq; maioremq; dolorem mouent: ſed minus ſan-
guinis mittunt, uixq; unquam magnitudine lupini mo-
dum excedunt. Acrochordon uerò penſilis, & angu-
ſtiore baſi uerruca eſt, hoc eſt, rotunda quædam in cu-
te eminentia ſeu excreſcentia, quæ baſim, id eſt, par-
tem

Verruca.

Porra.

Verrucarũ di-
uerſa genera.

Myrmecia.

Seſſiles uer-
ruca.
Lib. 5.

Acrochordon.
Penſilis uer-
ruca.

tem imam ad cutem angustam habet : sic quidem dista, quòd chordæ nexu suspensa pendere uideatur.

Itaque hoc discrimine acrochordones à myrmecijs distimuntur, quòd illi ima parte ad cutem angustiores sint, Myrmecia & acrochordones quibus inuicem dissident. suprema uerò latiores: myrmecia contra, basi sint (ut dictū est) latiore, suprema autē tenues. Sed & hæ non

nunquā cū summa cute prorsus sunt æquales: Acrochordones uerò semper à cute extant, ut libro decimo quarto de morbis curandis Galenus scriptum reli-

quit. Ad hæc acrochordones Celso serè plures nascuntur, pueros maxime infestant, nonnunquā subito desinunt : quandoque uerò mediocrē inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. Rarò

autem fabæ magnitudinem excedunt. Auicennæ clauiclaui.

dicuntur. Verum Latinis clauī appellantur uerrucæ albæ, rotundæ, clauorum capiti similes. Hi in digitis, plantisq; pedum maxime contingunt, ubi dolorē si non aliās, tamen ingredienti mouent. Hos Græci ἄλσος uocant; Auicenna uerò almismar. Ex confuso sæpius na-

ἄλσος.

Almismar.

scuntur, interdum etiam aliter. At thymion, uel thymon Celso & Græcis, uerrucula est, super corpus emi-

Thymion.

nens, infra seu ima parte ad cutem; & ipsa (ut acrochordon) tenuis, suprā uerò latior: subdura quoque, & in summo peraspera. Idq; summū, colorem floris thymi repræsentat, unde ei nomen est, ibiq; facile finditur, & cruentatur. Nonnunquā & aliquantum sanguinis fundit, serèq; circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, rarò maior, interdū perexiguū: modò unū, modò autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis,

Thymij magnitudo.

uel inferioribus pedum partibus, hoc est, in plantis.

Pessima tamē in obsecanis sunt, maximeq; ubi sanguinem

Thymia in obsecanis pessima.

nem

Cornua.

Calli.

nem fundunt. Auicenna uidetur huiusmodi uerrucæ genus tustum, uel, ut alia habet lectio, tarsecum nominasse. Ex uerrucarum quoque genere sunt, uocata ab Auicenna cornua, non alio à cæteris distantia, quàm quòd oblonga sunt, & instar cornuum recuruantur. A clauis non magnoperè differunt calli, quos Græci uocant τύλλας, nisi quòd per se indolorosi sunt, eodem quo cutis colore, neque spontè, sed ex labore obdurata cute gignuntur.

Verrucarum iudicia, & curatio.

10

Acrochordon.

Thymion.

Lib. 3.

Myrmecia.

Clauis.

EX his acrochordon, & thymion sæpe etiam per se (ut retulit Celsus) finiuntur, & quo minora sunt, eo magis. Myrmecia & clauis sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur quidem. Thymio clauoq; excisis, subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem, eaq; relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inharèt: ideoq; ne excidi quidem sine ulceratione magna possunt. Clauum subindè deradere, commodissimum est, & 20 aqua tepida perfundere: nam sine ulla ui sic emollescit, ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deindè imponat resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uerò genera, ut ab eodem Celso traditur, medicamentis adurèda sūt: alijsq; id quod ex face uini: myrmecijs, id quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimum. Paulus Aegineta lib. 4. cap. 15. plurima enumerat, quæ uerrucas huiusmodi, præsertim sessiles & pensiles, tollunt, & 30 exteruntq;. Cuius generis sunt, elaterium (quod succus est fru-

Myrmecia.

est fructus cucumeris agrestis) cum sale infricatum, thuris cortex cū aceto, grossi, id est, primitiæ ficus, quæ uelut præcoces non maturescunt, cum aceto, farina, & nitro. Idem quoque illi præstat succus, seu liquor fici arboris illitus: thymali, smaridis piscis caput salsum concrematum, ærugo cum sulphure uiuo, hoc est, igne non experto combusta, ocymi folia cum atramento sutorio, quod Græci chalcanthum uocant, sarmentorum adhuc uiridium ustorum quod distillat, fimus ouillus

Verrucarū per
medicamenta cu
ratio ex Paulo.

10 cum aceto, hircinum fel illitum, heliotropij magni fructus per se illitus, uel cum uino applicatus, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri impubis & nō dūm Venerem experti, stercois bouis gregarij, seu armentarij adhibitum in aceto. Cæterum hæ quæ ad myrmecias & acrochordonas exterendas commemorata sunt, ferè omnia, & ad clauos, & thymia etiam magno perè conducunt. Tradunt etiam lacertæ caput myrmecias, acrochordonas, & clauos tollere. Sunt qui decoquant capita salforum piscium in aqua illa, quæ distil-

Aqua ex fermentis distillans.

Stercus bubulium.

Lacertæ caput.

20 lat ex sarmentis uiridibus, dum comburuntur: idq; præstantissimum ad prædicta uitia remedium esse prædicant: Alij ad eadem exterenda linimentum conficiunt ex ærugine (quæ recetioribus uiride æris, & flos æris, dicitur) sulphure, & aqua, seu instillatione illa sarmentorum. Atque hic unus est curandi modus, quo uti solent ad verrucas è medio tollendas, per medicamenta scilicet erodentia adurentiaq;. Id autem unum summa cura obseruandum est, in eiusmodi medicamentis administrandis, quod Celsus monet lib. 5. nempe quod ea quæ

Ærugo quid.

30 circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur. Alij ob eandem causam circuniacentes par-

Hoc Halyab. & Guido probant.

tes

Alia curandi rationes.

Quomodo urinae sint tunc ueritatem.

Myrmeciarum cum summa cute equalium curatio.

Myrmeciarum noua curatio ex Galeno.

Alia curatio myrmeciarum. 14. meth. med.

tes illinunt, unguento ex bolo armenia, terra sigillata, aqua rosacea, & aceto. Porro acrochordonas, myrmecias, & thymia non solum praescriptis hisce adurentibus medicamentis abolemus, sed & ignis flamma, uel candente ferro, hoc est, cauterio (ut dicunt) actuali, illis rite adnoto. Ea quoque nonnunquam excidimus. Interdum uero ligatura scite illis coaptata, (ut fit in uero ficu) uel primoribus dentibus, ut quidam Romae Galeni tempore facere solebat, euellimus, ac radicitus extirpamus. 10
Ceterum si ignem aut candens aliquod ferrum uerrucam admoueris, lamina quaedam ferrea pertusa, uel simile quidpiam, ita uerrucam adurendam coaptari debet, ut foramen eam exacte comprehendat, adeo ut nihil circumpositae cutis appareat. Facta uero adustione, crusta butyro uel aliquo alio unctuosissimo illito resoluenda est. Deinde ulcus similiter reliquis ulceribus curandum erit. Quo pacto autem myrmeciae quae a cute non extant, sed illi prorsus sunt aequales, educi debeant, atque excidi, pulchre docet Galenus lib. 14. meth. med. ubi refert quendam fuisse Romae suo tempore, qui 20
nouam huiusmodi uerrucarum curationem excogitauit. Nimirum has certa primum labiorum applicatione, ceu suctu ad se trahebat, atque (quod mirum uidebatur) a radice euellebat. Deinde primoribus apprehensis dentibus, totas simul eximebat. Acrochordonas uero, utpote a cute extantes, statim mordicus prebendebat, & ita protinus educebat. Harum quoque & geminam aliam curandi rationem mox subiungit Galenus, inquit: Sed & scalpello ad myrtacei folij speciem formato, & ferramento eo, quod scolopomacherion 30
Graeci uocant, quispiam manibus exercitatus, facile 33

,, eas excidat: cum proprijs lineamentis à circumposita
 ,, cute circumscriptæ discernantur. Aequè uerò & ualen
 ,, te aliqua penna, circulo myrmeciae imposita, ipsam
 ,, educimus. Debebit porro pennæ fistulæ esse myrmeciae
 ,, crassitudini par, ut eam undique prorsus constringat.
 ,, Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsæ,
 ,, celerrimè ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totâ
 ,, educet. Constat uerò, & quòd finis ipse pennæ, quæ eâ
 ,, circulo secabit, non tenuis modò, sed etiam acutus &
 10 firmus esse debebit. Itaque tum galli ueteris penna, tum
 ,, uel magis aquilæ, ad hunc usum est accommoda. Ab
 ,, scindere uerò ab his tantum radicem uersus oportet,
 ,, quatenus reliquæ partis fistula complecti myrmeciam
 ,, possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modò scitè
 fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Hæc Galenus hæc
 nus. Vlcus uerò quod relinquitur sic auulsa uerruca,
 similiter reliquis ulceribus impleri debet, & ad cicæ-
 tricem perducì.

Scelopoma-
 cherion.
 Alia curatio per
 pennam.

Penna sciè ra-
 dicè uersus ab-
 scindenda.

20 De œdemate, & tumoribus frigidis, pi-
 tuitosis. Cap. X.



VM de tumoribus, qui succis calidioribus
 procreantur, satis disputatum sit, de ijs
 quæ à materia frigida ortum habent, nunc
 tractare rursum institutumus: principium quidem ab
 eo quod οἰδυμα Græcis dicitur, sumentes. Quemad-
 modum enim ex biliosa fluxione erysipelas, ita expi-
 tuitosi humoris confluxu œdema excitatur. Est autem
 13 œdema (definitore Gal.) laxis quidam atque indolens
 tumor, seu rara quædam atque expers doloris moles,
 H ex pituitoso

Œdema quid.

14. Ther. C. 2.
ad Glauco.
Oedema ut sym-
ptoma est, qui-
bus maximè ac-
cidat.

Oedema du-
plex.

Verum.

Illegitimum.
Pituita quid.

Pituita quando
et quomodo à
propria sua na-
tura degenerat.

ex pituitoso humore in particulam aliquam influente
exurgens. Ita quidem Galenus censuit lib. 14. The-
rap. de oedemate, quod morbus est, non symptōmata.
Equidem scimus (inquit) aliter quoque quàm ex pitui-
tosi scilicet humoris fluxione oedemata prouenire.
Nempe ex pituitoso humore aut spiritu uaporoso, ut
in cruribus et pedibus eorum, qui aquæ subter cutem
affectu laborant: et phthoë, id est, corporis habitu con-
tabescente: et cachexia, hoc est, malo habitu corporis.
In illis quippe periculosis dispositionibus, oedema, af- 10
fectus eius qui hominem prenut, symptōma est, hoc
est, accidens necessariò consequens, nullam seor-
sum propriam, præcipuamq; curationem postu-
lans, ut in sequentibus dicetur. Oedema, uti et phleg-
mone atque erysipelas, in duas chirurgis finditur dif-
ferentias, in uerum scilicet oedema, et non uerum,
seu illegitimum. Verum oedema fit ex pituita natu-
rali, quæ certè nihil aliud est, quàm sanguis cru-
dus aut diminutè coctus: qui in massa quidem sangui-
naria inuenitur, membris pituitosis enutriendis accom- 20
modus. Non uerum, seu illegitimum oedema, fit ex pi-
tuita non naturali. Est autem pituita naturalis (ne quid
obscurum relinquamus) humor frigidus et humidus,
substantia crudus, colore uergens ad quandam albedi-
nem: sapore uerò, et (si fas sit dicere) odore ad dulcedi-
nem. Non naturalis pituita, ea est quæ à modò descri-
pta degenerat, intra tamen sue latitudinis terminos,
quos si forsan petranscat, non iam amplius phlegma
pituita ue, sed alius humor dici debet. Contingit autem
bisariam pituitam ipsam à propria sua natura degene 30
rare: Vno quidem modo (ut loquuntur) in se, quando
scilicet

scilicet in propria sui ipsius substantia citra alterius admixtionem permutatur: Quod sanè multifariam accidit: ut enim in substantiam aquosam conuertitur, aut in flatusam, aut in admodum tenuem: diciturq; tunc phlegma aquosum flatusum, aut tenue. Aut crassius ac uiscosius redditur: idq; tunc phlegma crassum, & mucilaginosum efficitur, & per maiorem, seu (ut dicitur) ulteriorem indurationē, gypseum seu uitreū. Aut ipsum putrescit & alteratur, efficiturq; tunc salsum, nitrosum, & corrosiuū. Altero modo pituita efficitur non naturalis, per admixtionem. Quando scilicet alius quispiam humor illi extrinsecus accedit, uerbi gratia, uel sanguis, uel bilis flaua, aut atra. Si sanguis pituitæ peruiſceatur, hæc dulcis efficitur: si flaua bilis: salsa: si melancholia, pontica, & acida. Sunt ergo octo species phlegmatis non naturalis iuxta Auicennæ placita. Halyabbas tamen quatuor tantum constituit. Galenus autem (inquit Guido) uidetur, duo solum genera assignare, nempe salsum & acidum. Tamen si libro 2. de differentiis febriū, & lib. 2. de locis affectis, atque in multis alijs locis, mentionem faciat de uitreo, quod subindè sub acido (propter eam quam cum eo habet affinitatem ac conuenientiam) reponit. Ex ijs igitur colligitur: quod ex pituita generatur octo species, seu differentie tumorū præter naturam. Primò enim ex pituita seu phlegmate naturali, fit œdema uerū, ac certum, seu legitimū. Secundò, ex pituita non naturali per admixtionē generantur tres aliæ differentie tumorum: quippe quod tres alij humores cum ea possunt remisceri. Nominantur autē œdema phlegmonodes, œdema erysipelatodes, & œdema scirrholdes. Tertiò, ex

Gal. duo tantū
pituitæ genera
posuit.

Octo differentie
tumorū præter
naturam ex pi-
tuita.

phlegmate non naturali, per alterationem in propria
 substãtia quatuor aliæ exurgũt differẽtiæ. Primò nãq;
 ex flatuoso & uaporofo phlegmate fit tumor is, qui
 propriè Latinis inflatio, uulgò autẽ medicorũ aposte=
 ma uentosum dicitur. Secundò, ex aquoso, aquosum.
 Tertiò, ex crudo phlegmate, crasso, & mucilaginoso,
 procreantur tumores illi, qui leues nodi quibusdam di=
 cuntur, & abscessus pituitosi, quos uulgò exituras
 phlegmaticas appellant: Auicennæ uerò interpreti, du=
 belet frigida nominantur: cuiusmodi sunt steatomata, 10
 atheromata, & melicerides. Ganglia quoque (quæ Aui=
 cennæ glandulæ dicuntur) & id genus alia, quæ in se=
 quentibus declarabuntur. Ex duro uerò, seu magis in=
 durato, & (ut sic dicatur) gypseo phlegmate, fiunt no=
 di omnes duri, qui in iuncturis maximè reperiuntur:
 & strumæ, quæ uulgò scrofulæ nominantur. Quartò,
 ex corrupta & putrefacta pituita generantur fistulæ,
 & ulcera, quæ scrofulosa uocant. Cause oedematis, ut
 & aliorum tumorum præter naturam, sunt triplices.
 Primitiue, ut sunt casus ab alto, percussio, deprauata 20
 uiuendi ratio, seu (ut dicunt) malum regimen. Antece=
 dentes, ut exuberantia humoris pituitosi in partẽ ali=
 quam decurrentis. Coniunctæ, ipsa pituita in membro
 tumore obfesso iam infarctæ, & accumulata. Signa
 oedematis hæc sunt, tumor laxus & mollis, qui præ=
 menti digito cedit, & foueæ modò cauatur, nec amo=
 to digito resilit, sed prementis uestigium retinet. Do=
 lor aut exiguus, aut ferè nullus. Calor modicus. Color
 uergens ad albedinem, hoc est, subalbidus, seu (ut uolunt
 alij) inter album & pallidum medius. Et alia id genus, 30
 quæ pituitæ dominium testantur. Oedema, ut & cæteri
 tumores,

Cause oedema=
 tis tres.

Signa oede=
 ma. II.

Iudicia.

tumores, quatuor habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem. Hoc genus tumoris ut plurimum terminatur per resolutionem seu exhalationem, raro per suppurationem, sæpius per conuersionem, seu permutationem in nodos, & alias (ut uocant) excrescentias, quæ Græcis apostemata, Latinis uerò abscessus dicuntur. Harum autem terminationum notæ et agnitiones, superius in tractatu uniuersali dictæ sunt. Tumores hi œdematosi hyeme magis, quam alijs temporibus, excitantur. Plurima enim tunc in corporibus colligitur pituita. Senes quoque & crapule deditos magis ac sæpius infestant.

Oedematis ex pituitoso humore in particulam aliquam confluente, curatio.

- Q**uoniam œdemata ex humorum in aliquâ partem fluxione, aliorum tumorum more suscitantur, duplex etiam eorum curandi
- 20 scopus erit, ut lib. 2. ad Glauc. Galenus annotauit. Alter, ut horum humorum qui iam partem occupant, substantia dissoluatur: alter, ut fluxio cogatur, restringaturq; . Atque prout alter scopus alterum superat, remedia sunt miscenda, alterum quidem cum altero copiosius, aut parcius. Vbi igitur restringendi indicatio, eam quæ uacuandum seu digerendum esse suadet, superabit, augenda restringentium uis erit. Vbi uerò plus uacuandum quàm restringendum erit, digerentium seu discutientium ac exiccantium materia & facultas
- 40 præpollere in mixtione debet. Porro maiorem restringentium uim miscendam esse ostendit tum copia

Curandi oedematis scopus duplex cum ad hoc gignatur.

Oedematis inue-
rati curandi
ratio.

Oedematis ut
symptoma est
curatio.

fior fluxio, tum parcius in affecta parte materia. Con-
trà, exiccantium ac digerentium uberiores modum
adhibere oportet, ubi copiosior materia locum obsidet,
& fluxio minor est. In inueterato autem cedemate, &
quod non adhuc in gignendo est, non amplius hac curan-
di ratione, mixtam facultatem quasi scopum habente,
sed ad digerendam diffecandamq; materiam declinan-
te, utendum erit. Quod & in omnibus ferè diuturnis
affectibus obseruandum est. Ceterum cedema quod
symptoma est periculosos affectus sequens, ut tabem, 10
aquam inter cutem, & uitiatum corporis habitum,
quem Græci cachexiam uocant, nullam seorsum (ut su-
prà diximus) propriam, præcipuamq; curationem de-
siderat: curari enim, nisi affectu ex quo nascitur pro-
fligato, non potest. Aliquid tamen ex eo remittendum
est, si quidem uires demoliatur, aut primarium affectum
augeat, aut curationem impediat. Satis ergo fuerit, si-
quidem curatione egebit, ipsum tumentem locum per-
fricare, aliàs oxyrhodon, aliàs oleo cum sale, aut etià
oxyrhodino salem habente. Eiusmodi enim frictio tu- 20
morem remittit & dolorem, si ex nimia distensione
(ut aliquando contingit) excitetur, demulcet. Oxyrho-
dinon fluxionem arcet, oleum cum sale uim habet di-
gerendi, & uacuandi quod impactum est: oxyrhodon
uerò, cui sal admixtum est, partim digerit & exic-
cat, partim restringit, & humorum affluxum prohi-
bet. Sed præmissa hac uniuersali methode, ad propriam
ipsius legitimi cedematis, quod ex tenuis pituitæ influ-
xu ortum habet, curandi rationem, sermonem conuer-
tamus. Hæc autem in rebus quatuor (sicuti de phleg- 30
mone & erysipelate dictum est) posterioris huius æta-
tis chirurgis,

tis chirurgis consiſſit. Nempe in debita uiuendi ratio
ne, in pituitosi humoris præparatione, quàm æquitati
tionem uocant, & eiusdem expurgatione: in fluxi &
iam particulam occupantis humoris, repressiōe, disso
lutione, et exiccatione: & postremò in symptomatum
seu accidentium ipsum œdema consequentium corre
ctione, & summotione. Hæ itaque sunt quatuor inten
tiones particulares, quibus duas illas generales supra
positas indicationes assequimur. Prima igitur intentio

Quatuor scopi
particulares in
curando legiti
mo œdema ob
seruandi.

Prima intentio.

1. 0 perficitur, debita ac congrua sex rerum non natura
lium administratione. Porro, ritè ac commodè res ipsæ
non naturales corpori laborantis adhibebuntur, si ad ca
liditatem & siccitatem cum quadam attenuatione de
clinauerint uniuersæ.

Ergo tenuè & siccum aërè deligito, præparat' ue.

Aër.

Vinum defecatum, pellucidum, album, uel subrubel
lum (quod claretum uocant) in suo genere optimum, et
modicè aqua dilutum, in potu assumito.

Potus.

Panis probè coctus, & ritè præparatus esto.

Cibus.

2. 0 Carnibus ouillis, aut ex montanis & campestribus
auiculis lubens uestitor, ijsq; assis potius, quàm elixis.
Iusculis, oleribus, & offis parcè utitor.

Ab azymis, id est, non fermentatis, crudis quoque et
præhumidis, abstineto.

Legumina, caseū, fructus præsertim horarios & im
maturos, pisces quoque (nisi forsaxatiles, eosq; uel
assos, uel uino incoctos) ne gustato.

Assa in uniuersum meliora sunt elixis, & ijs quæ pi
storis industria præparantur. Parùm comedito ac mi

3. 0 nūs bibito.

Breuitè uitæ luxum, atque ingluuiem fugito.

Repletio.

H iij Si alius

Manitio.

Si alius nō respōdet, eā ficibus, et carthamo soluito.
Ergo ficus aridus. 5. uel sex numero accipito, easq;
medulla seminis carthami impleto, & manē uel prima
mensa comedito.

Corpus moderate exerceto, si tamē particula labo-
rans citra noxam id admiserit.

Motus.

Somnus breuis esto.

Somnus.

Balneum atque omnia humectantia prorsus uitato.

Balneum.

Secunda in-
tentio.

Secunda intentio completur præparantibus seu
æquantibus (quæ uulgò digestiua uocant) & uacuantia 10
bus materiam illam pituitosam, qua scatet corpus la-
borantis. Ergo genus aliquod oxymelitis offerendum
est, quod pituitam in corpore delitescentem possit in-
cidere & detergere. Deinde præparata hoc modo ex-
pulsioni antecedens materia, medicamento aliquo
phlegmagogo, id est, pituitam expurgante, ex periti
alicuius medici præscripto uacuanda est. Quod si (in-
quit Guido à Cauliaco) plethora adesset, tutò uena ape-
riri posset: nō citra tamen periti alicuius etiam medi-
ci consilium. At uix unquam in corpore plethorico ui 20
suntur œdemata saltem legitima: nam in eo non ma-
gis pituita, quàm cæteri humores abundant. Proinde
uix sola, & non alijs humoribus remixta in particulā
aliquam corporis plethorici influere potest. Quare ue-
næ sectio in œdemate saltem legitimo nequaquam ex
usu esse uidetur. Tertia intentio perficitur in princi-
pio, ad motis repperitibus: non ijs quidem quæ na-
tiua sua frigiditate uehementer stringendo repellunt,
sed quæ non inualidè siccandi, & modicè digerendi
uim habeant: ea aggregantia exiccationem & resolu- 30
tionem uocant. In augmento uerò discutientibus paulò
fortioribus.

fortioribus. At in statu, circa eius finem præsertim, & flata iam fluxione, puris, ijsq; fortissimis digerentibus seu resoluentibus. In declinatione autem absumentibus seu (ut dicunt) consumptiuis & exiccantibus, si resolutione saltem terminari debeat. Si uerò degeneret in abscessum, quem exituram uocant, maturantibus, & reliquis quæ in curandis abscessibus propofita sunt auxilijs, curabitur. Porro auxilia reprimentia, siccandi simul & digerendi facultate prædita, quæ competunt

Auxilia in principio ædematis admouenda.

10 initio ædematis ex pituitosi humoris influxu creati, tribus præsertim formulis comprehenduntur. Prima est Gale. lib. 14. Therap. & secundo ad Glauconem,

„ ubi inquit : At si ex pituitoso humore in particulam

Posca aquosa.

„ influente ædema constitit, abundè aliquando satisfacit

„ spongia, quæ ex aqua, in qua sit aceti aliquid, madue-

„ rit. Porro hæc ita attemperabuntur, ut uel bibi possint,

„ uel ut non multum supra hoc aceti habeant. Deligare

„ uerò spongiam debebis, ab inferiore parte incipiens,

„ ac supra finiens. Esto autem spongia modò conductu-

20 ra sit, omninò noua. Huius si occasio non est, hoc est, si

„ nouæ copia non sit, hanc detergebis expurgabisq;

„ exquisitè abluendo nitro, & aphronitro, & aqua lixi-

uia. Auicennas iubet, ut loco spongiæ aliquandò admo-

ueatur pannus lineus duplex, aut quid simile. Secun-

da formula est ipsius Auicennæ. Recipit autem aquæ

decoctionis baurach, id est, nitri uel spumæ nitri, & ci-

nerum, & aceti, ana quantum satis esse uidebitur. Ter-

tia formula est à Raze descripta ad hunc modum: R.

aloës, myrrhæ, licij, acaciæ, stes memithæ, id est, de glau-

Emplastrum Ravis.

30 cio, cyperi, croci orientalis, boli armenici, singulorum

partes æquales: pulueriscentur, & cum succo caulium,

hoc est,

Remedia incre-
menti tempore
admonenda.

Lib. 14. The-
rap. C. 2. ad
Glauc.

Status et decli-
nationis reme-
dia.

hoc est, brassicarum, & aceto misceantur, & fiat em-
plastrum. Porro eadem nuper commemorata auxilia,
in huius cedematosi tumoris incremento, etiam bene fa-
ciunt, adieclo saltem illis aceto copiosiore, uel modico
alumine, in corporibus præsertim robustioribus & cu-
tem duram habentibus, atque ubi aquosior posca non
profuerit. Ergo si sub ijs paulò ante memoratis auxi-
lijs oedema non subsidat, quiescat uel: ubi rursus deli-
gabis, paulò plus aceti miscebis, ut posca ualentior sit,
uel pusillum aliquid aluminis conijciet, ac nouā spon- 10
giam admouebis: hæc enim & copiosum medicamen-
tum excipit, duq; continet, & sua substantia affectam
partem exiccat. Si nouæ copia non sit, melius est, in-
quit Galenus, eo quod uulgus uocat elychnion, utare. Id
uerò ante omnia molle esto: quod genus Tarsicum est,
cuius si facultas est, audacter utitor: utilius enim expe-
riëre, quàm spongiam. Madeat uerò ex pusca, quæ &
aliquid habeat aluminis. Tum (ut præscriptum est)
deligetur ab inferiore sursum, hoc est, ligatura inci-
piat in imis partibus, & desinat in altioribus. Sit au- 20
tem arctatio mediocris, uelut in ossis fractura. Ac pri-
mæ quidem iniectiones fasciæ, quæ scilicet inferire in-
cipiunt, magis arctandæ: quæ deinceps sunt, sensim re-
mittendæ: cæterum non adeò, ut laxa sit aliqua deli-
gationis pars. Remedia autem, quæ post uigorem sta-
tus, ubi iam constitit fluxio, & in declinatione uniuersa-
li admonenda sunt, si oedema tendat ad resolutionem,
sub triplici etiam formula describi solent. Prima est
Auicennæ: nempe spongia imbuta aqua lixua, ex ci-
nere fici, uitis, & ilicis, quæ species est quercus, & 30
particulæ admota: siquidē huic magna uis inest exic-
candi,

candi, ac detergendi. Secunda est Bruni, quam *Spongia lixiuio imbuta.* usurpauit Theodoricus. Recipit autem aluminis, sulphuris, myrrhæ, & salis, singulorum pares portiones:

miscentur hæc omnia cum rosaceo, & aceto, & fit li-

nimentum, quod præcedenti remedio potentius adhuc

exiccat. Tertia rursus est Auicennæ, cuius descriptio

est talis: *Emplastrum Auicennæ.* ʒ. stercoris uaccini lib. semis, olibani, styracis, usneæ, id est, musci arborum, qui Græcis bryon di-

citur: calami aromatici. spicæ, absinthij, singulorum

1 o semunciam: confice omnia cum aceto, & decocto cau-

lium, siue brassicæ, & fiat emplastrum. Atque hæc qui-

dem ratio est curandi cedematis, quod resolutione ter-

minatur. Si uerò digestionem non cedat, sed ad suppura-

tionem spectet, unguentum è succis diachylon nomina-

tum, atque id maxime, quod à Rogerio compositum est,

perquam utiliter apponitur. Ad id etiam confert uel

magnoperè & sequens emplastrum, quod recipit mal-

uam, brancam ursinam, (uel si mauis dicere hircinam,

quæ & achantus, & achanta dicitur) radicem altheæ,

2 o radicem lilij, cepas assas, limaces, fermentum, & semen

lini: cocta, & subacta, & cum axungia uel butyro mi-

xta, rediguntur in formam emplastri. Aliud ad idem

summè efficax. Accipe succi ebuli, sambuci, oxylapa-

thi, quod nostrates officinæ lapathium acutum nomi-

nant: leuistici, seu ligustici, marathri, ex horum singu-

lis quantum lubet, pari tamen pondere: deinde ut opor-

tet coquito, unà cum dialthea, melle, oleo, & butyro;

atque ex ijs emplastrum conficito. Maturato aposte-

3 o niam tardè admodum, uel fortasse nunquam id contin-

geret: sed ferro candente, aut caustico aliquo medica-

mento

*Hoc ad Theodo-
ricum refertur.*

Aperio.

Unguentū mundificatiuū, quod ad Dinum refertur.

mento fiat aperio, qua pus excernatur, iuxta modum & formam superius expressam. Deinde sordes detergeantur, unguento uulgò Apostolorum dicto, uel mundificatiuo ex apio & succo absynthij, uel unguento subscripto, quod pus crassioris substantiæ attrahit, & mundificat. Accipit autem id galbani, ammoniaci, resinæ terebinthinæ, picis, sepi uaccini, olei antiqui, ana partes æquales: dissoluuntur gummi ex aceto, & liquefiunt ad ignem cum reliquis, & fit unguentū. Post hæc uerò similiter reliquis ulceribus sordidis curetur. 10
Ceterum quartam intentionem assequimur, pro ratione & natura accidentium superuenientium, ut si accidat dolor, imprimis sedandus erit, adnota (iuxta Aui cennæ doctrinam) æsipo humida, uel uino cocto, uel cerato cōposito ex oleo chamæmelino, oleo de absynthio, oleo de spica, & cera. Si uerò durities adfuerit, dissoluenda atque emollienda est, medulla bubula, uel ceruina, uel quapiam alia simili, ut in sequentibus dicitur. Galenus autem in diuturno œdemate partem oleo liniens, spongiam ex lixiuio apponebat, atque struens arctius, affectum perfectè curabat. 20

Lib. 2. ad

Glaucō.

Œdemati inueterato,

Capita curationis œdematis.

Œdema morbi accidens.

1 **O**Edemati quod symptōma est, hoc est, accidens alijs morbis seperueniens, ut aquæ inter cutem, tabi, & cachexiæ, medicamenta quæ discutiunt, & si ne molestia desiccant, adhibeto.

2 Ergo tumentem locum oxymelite, uel oxyrhodino, aut oleo cum sale, aut etiam oxyrhodino sale habente, perfricato. Hac enim frictione & dolore (si quis ex distensione excitetur) mitigabis, & tumorem 30
rem

rem remittes.

Oedemati uerò ex tenuis pituitæ influxu excitato, 3
 si nondum restitit fluxio, medicamenta quæ partim di- Oedema mor-
 gerant, partim uerò cogant, restringantq; admoüeto. bus.

Ergo spongiam nouam, uel aliam lixiuio ablutam, 4
 initio posca dilutiore, in mollioribus præsertim corpo-
 ribus, madentem alligato, uinculaq; (si artus tumor oc-
 cupet) ab inferiori parte ad superiorem, ut in fractu-
 ris, ducito, & mediocriter constringito.

10 Quòd si per hæc tumor nõ remittitur subsideat' ue, 5
 posca, id est, oxycrato, aluminis momento adijcito.

At si iam in uetustatem affectus inciderit, non am- 6
 plius remedia mixta hanc facultatē (digerētem sci- Oedema in uete-
 licet & restringentem) habentia, sed digerentia ac dis- ratum.
 secantia potius adhibeto.

Igitur, parte oleo prius inuncta, spongiam qualem 7
 supra diximus, lixiuua delibutam imposito, ac fascias
 arctius deligato.

20 De tumoribus præter naturam, qui inflatio-
 nes dicuntur Latinis, uulgò autem
 apostemata uentosa. Cap. XI.



VNC tempestiuum est ut de inflationibus
 differamus, quibus diuersa ab oedematis cu-
 ratio est. Illa namq; ut Galenus ait lib. 14.

Inflationis &
 oedematis diffe-
 rentia.

Therap. ex pituitoso succo ortum habent: proinde pre-
 mentibus nobis cedunt, digitiq; admodum alie in ipsa
 descēdunt. Inflationes uerò ex flatuoso spiritu collecto
 30 nascuntur, aliàs sub cute, aliàs sub mēbranis, quæ ossi-
 bus circumdātur, aut musculos, uiscerum' ue aliquod in-
 cludunt.

Lib. 4.

Inflationum
causa.Lib. 6. de mor-
bis & sympto.

Lib. 4.

Inflationum
mora.

cludunt. Porro colligitur aliquando non parū etiam in
uētriculo & intestinis: itemq; in medio spatio horū, &
peritonæi, ut in aquæ (inquit Paulus) subter cutem ge-
nere, cui nomen est tympanias. Differunt quoque hæc
ab œdematis, quod & pressæ digitis non retinent ue-
stigium, & sonitum ueluti tympanum reddunt: itemq;
quod in cavitare sensibili subinde continentur, atque
hac nonnunquā maxima. Causa huiusmodi inflatio-
num Gal. lib. 6. de morb. & symptōmatis, est caloris
natiui imbecillitas, in materia pituitosa, ad flatum ex-
citandos disposita. Calor nanque eiusmodi suscitare
quidem uaporem ex humida materia potest, sed non
discutere, uti asserit Galenus his uerbis: Quemadmo-
dum enim (inquit) in externis rebus uidemus, ut frigi-
dissima cōstitutio, maximè spirante Borea, Aërem se-
reniorem reddit, ac calidissima per æstatem constitutio,
ambientē nos aërem purū efficit, mediæ uerò cōstitu-
tiones nebulas pariunt: ita in animantibus accidit.
Neque enim calor per extremam imbecillitatem, ne-
que cum uehementes sunt ei uires, sed cum mediū in-
ter has affectiones obtinet, flatum gignere potest. Re-
tinetur autem flatum eiusmodi in loco quopiam, (ut di-
cit Auicennas) uel propter densitatem, seu (ut dicunt),
spissitudinem membri, uel propter ipsius uaporis seu
spiritus crassitiem. Quod & ijs uerbis Paulus ex
Galenī sententia testatus est. Membrorum (inquit)
densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem
spiritus non dissipetur.

De signis & iudicijs inflationum.

Signa inflationum sunt, tumor renitens tactui, cum
lucido quodam splendore, sonum, ut uter uel tym-
panum,

panum, dum percutitur, reddens. Adhæc persæpe sentitur flatus per totum corpus, modò huc modò illuc discurrens, ac dolorem extensuum pariens. Quod autem ad iudicia pertinet, flatulentus seu uaporosus spiritus, qui non discutitur, multa parit incommoda. Hælituosus uerò huc atque illuc per corpus discurrens, cum dolore & anxietatibus magnopere uerendus est. Quippe qui à materia aliqua uenenoſa attolli uideatur.

*Inflationum
prognostica.*

10 De inflationum, seu flatulentorum tumorum curatione.

Cum tria hæc, materia humida, caloris imbecillitas, & meatuum densitas, ad inflationis generationem (ut in præcedentibus ostensum est) concurrant: curationis ipsius scopus erit, caloris substantiam robore rare, uaporẽ seu flatulentã materiã extenuare, & meatus corporum (in quibus uaporosus ille spiritus collectus continetur) densitatem recludere. Porro posteriora duo, nempe densi corporis rarefactionem, & crassi spiritus extenuationem, iisdem omninò auxilijs assequi

20 naur, medicamentis scilicet tenuitate partium pollentibus, siue extenuantibus, & calfacientibus, magis aut minus, pro partium inflatione afflictarum densitate, uel raritate, & uaporum quoque crassitudine, uel tenuitate. Pro horum nanque differentia facultas medicamentorum quæ admouentur, intendi ac remitti debet. Itaq; raræ partes, & uapor seu spūs non admodũ crassius, minus: dẽsæ uerò, et uapor multa crassitie præditus, magis exetenuantibus & calidis egent. Caloris autem substantia, si periit aut imminuta est, pro ratione

30 ne iacturæ eius, refarcienda erit. Si uerò alterata fuerit, ad mediocritatem reducenda. Quòd si unà dolor excruciet,

*Inflationum
curatio.*

Tres scopi curandarum inflationum.

excruciet, ad anodyna transeundum erit. Non absurde igitur inflationum (quas uentosa apostemata uocant) curationem, tribus intentionibus perfici dixerunt posterioris nostræ ætatis chirurgi: prima in debita uiuendi ratione, secunda in proba concoctione, & tertia in flatulenti spiritus, qui in particula collectus est, discussione, seu (ut aiunt) in materiæ coniunctæ extirpatione, consistit. Itaque uitæ institutio talis erit. Abstinentum imprimis ab omnibus crassis, uiscosis, crudis, pituitosis, & flatuosis: cuiusmodi sunt dulcia substantia leguminum, fructus, rapum, castaneæ, & alia id genus, quæ spiritum flatuosum procreant. Utendum autem calidis & siccis: item attenuantibus, et flatum discutientibus, ut est panis hordaceus, qui aliquid salis & cumini receperit. Laborantis potus sit uinum album, uel subrubellum (quod claretum uocant) aut uinum Græcum. Utatur decocto cicerum alterato cum cepis, apio hortensi, quod uulgò petroselinum appellatur, calamintha, ruta, & cumino. Carnes sint assæ potius quàm elixæ, & præsertim ex uolatilibus, ut in præcedenti capite dictum est. Ut autem secundam intentionem assequaris, roboranda tibi est uirtus concoctrix bonis quibusdam speciebus aromaticis, & confectionibus, atque (ut uocant) electuarijs ad hoc dicatis, ut sunt diacuminum, diacalaminthe, aromaticum rosatum, & sequens confectio, quam dragetam appellant. ℞. anisi, marathri, carui, dauci, cymini, baccarum lauri, tritorum singulorum unciam unam, glycyrrhizæ, quam liquoritiam uocant, galangæ, zingiberis albi, singulorum semunciam, charyophyllorum, cubearum, piperis longi, seminis rutæ, singulorum drachmas duas, anisi saccharo

Prima intentio.

Cibus.

Potus.

Secunda intentio.

Drageta coctio nem adiuuans.

10

20

30

charo incrustati quadrantē, id est, uncias tres, sacchari selibram, id est, libram semis, fiat puluis. Extrinsecus uerò inungatur uenter oleis de spica, de costis, et ruta: uel fiat epithema, quod ea recipiat, quæ et flatus discutiunt, et inuandæ coctioni dicata sunt, atque hoc stomacho admoueat. Sed hæc ad medicinam magis, quàm chirurgiam pertinent. Tertia intentio completur medicamento, cui mixta facultas sit, hoc est, quod simul concoquat, digerat, et modicè adstringat, nec dolorem augeat. Ad hæc autem consequenda insituntur tres formulæ auxiliorum, lib. 14. Therap. Prima ad hunc modum posita est à Galeno: In artubus (inquit) et musculis, qui sub cute, aut etiam membranis, quæ ossa uestiunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarum partium, cuiusmodi est lixiuium noua spongia exceptum, satisfecerit. Sin dolor quoque irget, ungenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendiq; uim habeat. Incidunt porrò ex percussione eiuſmodi affectus, ubi uel musculus, uel membrana quæ os circuit, est contusa. Ac super membranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est spongia. Secunda formula ibidem ita descripta est.

Ad musculos uerò (nanque hi aliquando dolent) medicamentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quod sit, ut ad hos solo lixiuium non utantur, sed immissa eorum sapa, tum pauculo oleo. Satiùs autem fuerit in principio, non addidisse lixiuium, sed sapa cum uino et exiguo aceto uti, ac quod mediocre sit, olei adijcere. Vbi mixta sunt, modicè excalfacere, ac lanam non lotam, quam succidam uocant, ipsis imbutâ imponere. Quod si eiuſmodi lane facultas non sit, ipsius æsapis

Tertia intentio.

Ad inflationē ex contusione in artubus, musculis, et mēbris, quæ ossa cōtengunt.

Ad musculos cū inflatione dolentes ex contusione.

Lana succida. Æsapis.

*Ceratum ex æsi
po.*

miscellæ supradictæ est iniiciendus. Vbi uerò æsopus, præter non est, aliquid cerati, quod ex æsipo componitur, rectè admiscueris. Debent enim contusi musculi leniri medicamento cui mixta facultas sit, quippe quæ simul concoquat, digerat, & modicè adstringat. Quâdo si nihil habet adstrictionis, auget aliquando phlegmonas, ac maxime in ijs corporibus, quæ sunt plethorica. Ergo trium iam comprehensarum indicationum, concoquendi scilicet, digerendi, & modicè adstringendi, in inflatis ex plaga musculis memor, ubi dolor maior uiget, mitigatiua magis ratione uteris, plus olei & uini adiiciendo: ubi abest, maiore ui instabis. Maiorem uim intelligo, cum breui uia properatur ad finem. Porro breuis uia fit per ea quæ ualentes habent uires.

*Aceti, uini, &
lixuij collatio.*

Hæ autem maxime in lixiuio & aceto habentur, post hæc in uino. Quoties igitur de mitigando laboras, horum, lixiuij inquam & aceti, plus in mixturam conijcies. Rursus ubi repellere studes, uini plus quam horum immittes. Porro id optimum in hunc usum fuerit, si nigrum austerumq; sit. At si digerere malis, lixiuij plus mides. Acetū uerò si his miscebis, ad ambo utilis erit mixtura, propterea quod acetum mitius habet facultates. Vbi uerò musculus sine dolore est, licet sanè in lixiuij penuria, pro ea aphronitru immittere. Esto autem id minime lapidosum, sed magis spumosum. Tertia formula est emplasticū, quod fit ex strigmentis gymnasiorum, id est, sordibus, quæ à corporibus luclantium detergebantur, & calce uiua ex aqua & uino simul coctis. Gal. uerba hæc sunt, lib. 14.

*Si inueterauerit
inflatio.*

Therap. Quæ uerò huius generis inflationes neglectæ inueterarunt: primo quidem loco his, ea quæ ex lixiuio com-

- ,, uio componuntur (ut prædictum est) adhibeas. Secundo
 ,, loco emplasticum aliquod. Dicant autem & horum ex
 ,, pluri: Strigmenta gymnastorum feruē facta, percola
 ,, primum, sic ut pura sint: deinde rursum in cacabum im
 ,, missis, calcem uiuam in farinæ speciem tufam insper
 ,, ge, ad luti usque crassitudinem. Salutare his est & me
 ,, dicamen, quod ex sycomoro componitur aliq; id ge
 ,, nus. Caterum si huiusmodi flatuosus spiritus, qui in
 ,, flationem committit, fumosus fuerit, malus, corruptus,
 à materiaq; uenenosa excitatus, cum dolore intollera
 bili, & uehementi calore per membra discurrens, nul
 lum tutius ac melius consilium dari potest, quàm quòd
 ubi in parte quapiam substituerit, pars ipsa protinus
 infrà supràq; deligetur, ac in medio nouacula, uel fer
 ro candente tumor aperiatur, ita ut facile uapor ille
 uenenosus egredi possit. Deinde hians plaga implenda
 erit aloë, & bolo armenia, ex rosaceo & aceto dissolu
 tis. Transactis uerò diebus tribus aut quatuor, uulnus
 carne opplendum erit, & ad cicatricem perducendum.
- 10 Porro in uenenosis eiusmodi inflationibus, uiclus ratio
 tenuior esse debet, egetq; corpus medicamento purga
 torio. Quòd si theriace summeda daretur laboranti, re
 ctè illi consultum esset.

Si flatuosus spi
ritus uenenatus
fuerit.

Viclus ratio.

Theriaca.

Capitulum curationis tumoris flatulenti.

Imbecillam caloris affectæ partis substantiam robo
 rato, deperditam instaurato, alteratam ad mediocri
 tatem reducito.

Vaporosum seu flatulentum spiritum crassiorē, un
 de tumor eiusmodi suscitatus est, extenuato.

Densatos cutis, ac totius laborantis particulæ, me
 tus

tus medicamentis tenuitate partium pollentibus, recludito: deinde flatuosum spiritum discutito.

4 Pro locorum autem affectionum differentia, & uaporis ipsius flatuosi crassitudine uel tenuitate, medicamentorum quæ admoventur, tum materiam, tum facultatem intendito, ac remittito.

5 Porro si cum dolore & inflammatione tumor eiusmodi flatulentus inciderit, (ut contingit in musculis ob contusionem flatu repletis) mitigatoria initio admovento: procedente uero tempore, quæ discutiendi ui polleant, eorum copiam paulatim augendo, adhibeto.

6 Inflationes quæ ob negligentiâ antiquatæ fuerint, primò quidem lixiuio foueto, deinde emplastrum quodpiam ex his quæ molliunt & discutunt, admovento.

De tumore è serosa substantia creato,
quod aquosum apostema nominant. Cap. XII.

Leucophleg-
matia.
Oedema.



ITVITAM, si per uniuersum corpus increuerit, ea species aquæ intercutis, quam leucophlegmatiam uocant, comitatur, ut Gale. annotauit lib. 6. de symptomatum causis. Cum uero in una duntaxat parte pituitosa hæc substantia redundat, oedema enascitur: ita enim appellant tumorem laxum, ac doloris expertem. Serosa autem excrementa si abundant, aquam intercutem (quam ascitem nominant) generare solent. Quæ si in unam aliquam partem incubuerint, in ea phlyctænas, id est, pustulas excitant. Porro serosum eiusmodi recrementum, recentiores

Serosum recre-
mentum.

centiores aquosum phlegma nominare consueverunt.

Quemadmodum etiam & pituitam illam, quæ repe-

Pblytiæne.

ritur in pedibus & cruribus eorum, quos aqua intercu-

tem uexat, & in tabidis, & alijs qui malo habitu (Græ-

ci cachexiam uocant) laborant. Ad hæc, tumores ex hu-

iusmodi aquoso phlegmate, aut seroso tam dicto recre-

mento procreatos, illegitima ac non uera œdemata uo-

citant. Cæterum in periculosis illis dispositionibus

seu affectibus, tabe inquam, hydrope, & cachexia: œde-

10 ma (ut superius ex Galeni sententia dictum est) sym-

Lib. 2 ad Glau.

ptomatis seu accidentis rationem obtinet, non morbi,

& 14. theræ.

nulla quidem propria præcipuaq; curatione indigēs.

Sola enim frictio ex oxyrhodino, aut nōnunquam ex

sale & oleo, uel etiam ex sale & oxyrhodino, sistit ip-

sum, aliaq; huiusmodi multa. Horum autem tumorum

*Causæ tumorum
aquosorum.*

causæ sunt, alteratrix facultas frigida intemperie ui-

tiata, & alimentorum prauitas, ad aquositatem decli-

nans, ut ex lib. 6. de symptomatum causis facile est

colligere. Signa & iudicia ferè eadem sunt, quæ & ue-

20 ri œdematis. Hoc tamen differunt, quòd in istis aquo-

*Aquosorum tu-
morum notæ.*

sis tumoribus laxus magis tumor est, quàm in œdema-

te legitimo: atque ideo non tantum renititur tactui,

sonatq; non ut status uentus ue, sed ut aqua potius. Ad

hæc aliquo modo splendere uidetur, cum ad lucē quis

ipsum intuetur. Quod uerò ad huiuscemodi tumoris iu-

Iudicia.

dicia attinet, aquosus haud dubiè tumor à maiori ena-

scitur frigiditate quam flatuosus, ut Galenus auctor est,

commentario undecimo lib. 4. aphorismorum, super

hunc aphorismum: Quibus tormina, & circa umbili-

*Ascites à maio-
re frigiditate ge-
neratur, quam
tympanites.*

20 cum labores &c. Videtur autem (inquit) à maiori fri-

giditate generari aquosus hydrops, quem ascitem uo-

Quas partes ma-
ximè præbèdant
aquoſi tumores.

cant: à minore uerò tympanias, quæ ab Hippocrate aqua inter cutem ſicca nominatur. Neque enim humida ſubſtantia in flatuoſum ærem ſine calore aliquo po-
teſt tranſmutari. Tumores præterea aquoſi ſæpius in
pedibus, teſticularis, ſcroto, capite, & iuncturis accidunt,
quàm in alijs quibuſvis corporis partibus: tum quòd
humor eiufmodi in eas partes promptius irruat, tum
quòd caliditas in ipsis modica ſit: quippe quæ procul à
calidiſſimis abſunt partibus, ut ſecundo Progn. ait Ga-
lenus. Quemadmodum etiam flatuoſus ſpiritus raro
inuenitur abſq; humore aquoſo, ita uix unquam aquo-
ſus ſiue ſeroſus humor in particula aliqua concludi-
tur abſq; flatu. Haſtenus de generatione, cauſis, ſignis,
& iudicijs aquoſi tumoris, nunc de curatione.

Aquoſi tumoris curatio.

Cum aquoſi tumores ex ſeroſo (uti diximus) recre-
menti fluxione excitentur, non alia certè curan-
di uia & ratione, ſaltem uniuerſali, in illis proſtigan-
dis utendum eſt, quàm ea quæ in alijs ſuprà memora-
tis tumoribus, qui ex humorum in partem aliquam
influxu pocreantur, perſanandis, à nobis ſuprà expli-
cata eſt. Duplex igitur curandi indicatio per initia in
eiufmodi tumoribus erit: nèpe uacuandi quod influxit,
& fluxionem inhibendi. Quocirca & composita fue-
rit de talibus affectibus, ueluti & de reliquis morbis
omnibus, quicunque in generatione adhuc ſunt, meden-
tis ſollicitudo, ex ea ſcilicet quæ curat, & ea quæ pro-
uidet. Itaque prima indicatio ei medicinæ artis par-
ti ſubiicitur, quæ morbos curat: ſecunda uerò ei par-
ti ſubiacet, quæ futurum morbum præcauet. Porro ut
geminum hunc ſcopum uniuerſalem aſſequamur, alijs
quin-

Curandi aquoſi
tumoris duplex
indicatio.

quinque particularibus intentionibus est opus, à no- Quinque parti-
culares intēti-
ones curandi aquo-
si tumoris.
 stro Guidone à Cauliaco in curatione tumoris aquosi,
 hoc ordine & modo qui sequitur, expressis. Prima, in
 probæ uitæ institutione atque obseruatione consistit.
 Secunda, in concoctionis emendatione, seu (ut ait) recti-
 ficatione. Tertia, in aquosi humoris per aluū expurga-
 tione. Quarta, in eiusdem serosi recrementi per uri-
 narios meatus educlione. Quinta & ultima, in coniu-
 ctæ (ut loquuntur) seu contentæ in particula humidita-
 10 tis aquosæ, euaporatione, atque exiccatione. Cæterum
 cum primæ quatuor intentiones magis ad medicum
 spectent, quàm ad chirurgum, quem hoc opere insti-
 tuendum suscepimus, atque etiam ex ijs quæ in præce-
 dentibus dicta sunt, satis innotescant: consilium fuit,
 tantum de postrema, quæ topica desyderat auxilia, hoc
 loco agere. Quinta igitur intentio perficitur cum exic-
 cantibus & resoluentibus huiusmodi aquosas ac sero-
 sas humiditates, quæ in particula laborante continen-
 tur. Horum autem tres communiter formulæ statuun-
 20 tur. Prima est Galeni lib. 2. ad Glauconem, & 14. me-
 tho. meden. nempe quæ constat oxyrhodino & sale, ut
 superius dictum est, Secunda est eiusdem, sponsia scilicet
 noua lixiuio persusa, & reliqua alia auxilia, quæ
 supra ad œdemata scripta sunt: quibus ut potentius
 exiccent & discutiant, addenda sunt aphronitrum,
 alumen, & sulphur. Tertia formula est cuiusdā empla-
 stri, ab Auicenna descripti in curatione serofularum,
 quod Galeno attribuit in libro de compositione medi-
 cametorum κατὰ γένη, id est, secundum genera. Hoc
 40 autem (ut ille prædicat) intra hebdomadam unam ad
 summum, plerumque uerò intra triduum, omnem duritiæ

Emplastrū An-
cenna discutiēs
aquosos tumo-
res.

resoluit. Porro tanetsi emplastrum hoc apud Gale-
num libro nuper citato non reperitur, eo tamen com-
modi uti possumus ad aquosam & flatuosam duritiem
dissoluendā. Eius autem descriptio talis est Auicēnæ:
12. seminis sinapis, seminis urticae, sulphuris, spumæ
maris, aristolochiæ rotundæ, & bdellij, ana unciam
unā, ammoniaci, olei antiqui, et ceræ, ana uncias duas.
Quod si hoc emplastro non discutitur, non aliud auxi-
lium melius ac presentius excogitari potest, quàm ut
ferro aperiatur, deinde detergeatur, & aliorum sordi- 10
dorum ulcerum more curetur.

Capita curationis aquosi tumoris.

- 1 Viscum attenuantem, calsactorium, & desiccato-
rium laboranti insituito.
- 2 Vt corpus moderate exerceat, parcè edat et bibat,
non multum dormiat, uentremq; & uesticam sæpius ad
excretionem exuscitet, imperato.
- 3 Vt probè alimenta concoquat, & flatus minimè gi-
gnat, curato. 20
- 4 Serosas humiditates, quibus laborantis corpus
scatet uniuersum, per aluum, & urinarios meatus ex-
purgato.
- 5 Serosum illud recrementum, quod in affecta parte
continetur, desiccato, & per halitum digerito.
- 6 Quod si discuti non possit, scalpellum, uel potius
igne candens ferramentum, in tumorem, si artus occu-
pet, adigito, atq; eum parte procliuiore (quò facilius in
de humor emanet) reserato.
- 7 Humorē qui tumorem committebat, per emissā 30
rium uacuato, reliqua quæ ad sordidorum, & aliorum
const=

consimilis naturæ ulcerum, curationem pertinent, sine mora perficito.

De glandulis, nodis, strumis, & cæteris abscessibus, quas excrescentias phlegmaticas uocant. Cap. XIII.



RAECORVM ganglia, choerades, id est, strumæ, quas etiam scrofulas uocant: bronchocele, quod bocium, & herniam gutturis

Enumeratio abscessuum pituitosorum.

- 1^o nominant: melicerides, steatomata, & atheromata: ad hæc testudo, talpa, & nata siue napta, tumorum nomina à recentioribus medicis inuenta, & nusquam apud antiquos reperta: item fugille Auicennæ: nodi quoque & uulgaris bubo, aliq; id genus multa, quæcunque corporis parte nascantur, ferè ex pituita generationem habent: atque ob id ad pituitosos tumores meritò referuntur. Cæterum tamen si nonnulli ex ijs nuper memoratis abscessibus in tophaceam duritiæ,
- 2^o & scirrhusos affectus aliquando degenerent, radix tamen & origo illorum parte maiore pituita extitit, ut uoluit Auicennas. Quamquam non unus inficiat, quin & alius humor ipsi pituitæ, cuius eiusmodi abscessus propriè soboles sunt, interdum admisceatur, atque ita compositi & heterogeni nascantur abscessus. Verum de simplicibus solum nobis hic sermo erit, ex quorum analogia compositorum etiam cognitio facili habebitur. Hæc enim ad illa, ueluti ad quosdam certos canones, semper adigenda sunt, ut alibi quoque diximus. Ita
- 3^o que prædicti omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum, seu (ut uulgariū chirurgicorum more loquar)

Simplicia sunt regula compositorum.

Glandula Guidonis.

Glandula Auicennae, quae eadem sunt cum ganglijs Graecorum.

Glandula Guidonis dissidet à glandula Auicennae. Cap. 16. lib. 4.

Ganglium quid sit.

Ganglij notae.

quar) ex crescentiarum phlegmaticarum, reponuntur, habentq; speciales quasdam inter se differentias, ut exsequentibus patebit. Glandula enim (ut Guido putauit) à glandis forma, quam prae se ferre uidetur, nomē claturam accepit: estq; (inquit) utcumque mollis, unica, mobilis, & separata à partibus circumiacentibus, in emunctorijs plerunque nascens. Auicenna autē glandulae nascuntur uel in manu, uel in pede, uel in loco aliquo neruis & tendonibus coniuncto, & hac quidem tum uetat extirpari, ne scilicet laborans in spasmus incidat. Eueniunt quoque, ait, summae uolae manus, & fronti, uocatq; eas modò apostemata glandulosa, modò nodos. De ijs enim inconsideratè tractat in diuersis capitibus, utpote in capite de nodis ad finem, & capite de glandulis. Itaque uidentur glandulae Auicennae diuersae esse à glandulis Guidonis, & Graecorum ganglia illis (Auicennae inquam glandulis) eadem esse. Quod sequentia Pauli uerba apertè testantur: Ganglium neruorum concretio est, ex icflu aut lassitudine oboriens, in pluribus quidē corporis partibus, praecipuē motui dicatis: nempe manu summa, & pedibus. Rarius cubitum & caput occupat Aetio, ac raro eidem fonte prouenit. Et rursus idem Paul. lib. 6. cap. 39. quid sit ganglium, unde nascatur, in quibus maxime partibus proueniat, quae denique notae ipsum comitentur, aperiens, id ipsum quod diximus, confirmat, inquit: Ganglium nerui est concretio, ex icflu aut labore proficiens, plerunque uerò in manus iunctura, qua cum brachio comittitur, talo & articulamentis absoluitur: quanquam in alijs quoque partibus proueniat. Haec comites sunt notae, tumor concolor, renitens, indolensq;.

At si

- At si uiolenter premas, stuporis sensum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radices agens, & ad latera spectans: sin autem ui adigas, tum ante, tum post, nequaquã id facit. Hactenus Paul. Aegineta de gãglijs. Nunc ad reliquos pituitosos abscessus, seu (ut eorum more loquar) excrecentias phlegmaticas, sermonem conuertamus. Scrofulæ à uulgo uocatæ, nihil aliud sunt quàm indurati, & intra membranulam contenti adenes, id est, glandulæ, in collo, axillis, & inguinibus præcipuè consistentes, ubi glandulæ nasis substratæ collocantur. Nonnunquàm tamen, quamuis raro, ex carne corundem locorum fiunt, quæ affinitate quadam ad strumarum naturam uertitur, & materiæ adiectione adaugetur, ut uisum est Leonido. Has Latini strumas uocarunt. A Græcis uerò chœrades dicuntur, uel à chœradibus quidem petris per marinas aquas transparentibus, uel à suis multiparis animalibus (numerosæ enim sobolis existunt, ut sues) & eo morbo frequenter affectis. Scrofæ etenim, id est, sues, colla habent glandulosa, & magna ex parte strumosa. Struma autem Celso tumor est, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Nascuntur eidem maxime in ceruice, sed etiam in alijs, & in inguinibus, et in lateribus. In mãmis quoq; scœminarũ se reperisse chirurgus Meges autor est. De ijs etiam Paulus in eum modum: Oriuntur (inquit) strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, et melicerides. Lupia (inquit Guido) ueluti lupulus, molli, rotunda, in locis duris & siccis suam sedem præcipuè

Tumor etiã est inæqualis Phylagry, & Aëtio.

Scrofulæ.

Chœrades Græcorum.

Struma Cornel. Celsi.

Lib. 6.

Lupia.

puē deligit, ut in palpebris, & locis nervosis: vulgus gallicum vocat VNE LOUPE. Itaque si eius descriptio, atque etiā curatio, quæ in sequentibus habetur, cum ganglij Græcorum descriptione, & curatione conferatur, affectus tibi videbuntur non admodum inter se dissimiles. Verum magno errore tenentur, qui cuiusmodi lupiam eandem faciunt cum affectu, quem recentiores lupum appellant. Est enim lupus malignum ulcus, partes inferiores, sed præcipue crura infestans, celerimè depascens, & quasi lupus (à quo nomen accepisse videtur) sancticus, proximas sibi carnes exedens: quod vitium dubio procul de genere est phagedenarum. Proinde affectus sunt longè inter se diuersi, quanquam in nomine quandam affinitatem habeant. Nodus tanquam funis nodus eidem Guidoni dicitur, rotundus, durus, & eodem in loco permanens: circa loca nervosa maximè apparens. Avicenna autem nodos definit alibi cubi duobus frigidis, facitque hoc nomen genus ad steatomata (quæ à nostris adiposi, et adipini nodi nominantur) an meliceridis, id est, mellitios nodos, & atheromata, quæ materia constant pultis (quam Græci atheram vocant) simili. Ceterum cum hæc tria abscessuum genera, steatoma inquam, meliceris, & atheroma, frequentissimè incidunt, ac locis ualde multis Galenus eorum meminerit: non abs re factum putauimus, si (nacta hoc loco de ijs differenti occasione) eorum naturam, notis quibus agnoscantur, in quibus itè inuicem dissideant, & conspirent, latius aperuerimus. Atheroma igitur, tumor est concolor & indolens, in membrana, seu nervosa tunica humorem lentum continens, atheræ, id est, pultis similem, quæ ex farina decocta

- costa conficitur. Interdum quoque in atheromatibus simul cum humore pultaceo, lapidosa quædam, duræq; corpora, & alia tanquam sulphurisamenta inveniuntur, nonnunquam ueluti mansa gallinarum ossicula, sæpe etiam tanquam pili complicati tactu occurrunt. Caterum tumor atheromatis, specie & figura oblongus, & aliquantum sublatus uisitur: qui digitorum appressu ob humoris lentorem & crassitudinem tardè retrocedit, & amotis digitis, tardè quoque re-
- 1 o greditur. Meliceris autem tumor est, simili modo dolore carens, sed rotundus, in quo nervosa etiam tunica, quæ cystim appellant, inclusus humor reperitur tenuis, & mellis substantiam representans: unde & mellis fauium Latine quibusdam dicitur. Itaque meliceris ab atheromate differt figura, & humoris substantia: nam & figura rotundior est, & humoris substantia tenuior. Proinde melleus hic tumor magis quam atheroma extenditur, pressuq; digitorum celerrimè cedit, & amotis digitis pari celeritate ad situm pristinum redit. Steatoma uerò, tumor etiam est præter naturam, concolor, & tactu lenis, in principio quidem exiguus, sed temporis progressu augetur, & amplior factus: in quo humor seuo persimilis membranula similiter inclusus, subest. Hoc à meliceride & atheromate distinguitur, duritie. Nam plenum ac solidum est, tactuq; renuitur adeò, ut digitis prementibus minime cedat. Sed reliqua nunc apostemata persequamur, quæ ferè ad hæc tria, de quibus modò egimus, reducuntur. Testudo ipsi Guidoni abscessus est magnus, hu-
- 2 o moralis, mollis, latiore forma, in modum testudinis, unde nomen accepit. Quæ si in capite (inquit) nascatur,

Meliceris.

Steatoma.

Testudo.

tur,

tur, talparia uel talpa dicitur: in collo, bocium: in testibus, hernia: interdum autem cum pure, uel squaminis uel fistulis reperitur. Ceterum testudines & talpæ, apud antiquos, neque proprium nomen, neque tractatum inuenerunt. Recentiores autem testudinem uocant tumorem mollem, uel non ualde durum, satis autem magnum, in quo pinguis materia, tunica quadam obiecta continetur, quæ caluaria ita hæret (est enim cutis capitis affectus) ut ipsam plerunque uitiet. Hanc non dubium est de numero esse abscessuum, & sub meliceride, uel atheromate contineri, uidetur tamen ad meliceridem magis inclinare. Talpa uero cum albam materiam contineat, ad atheromata potius, quam ad meliceridem refertur. Guido tamen testudinis speciem, imò uero testudinem ipsam esse affirmat, quemadmodum & herniam, & bocium, quod uocat: sed uaria hæc nomina sortiri, pro uarietate locorum, in quibus reperiuntur. Ceterum quod uulgus bocium, Græci propriè inuento ab interiore parte nomine, bronchocele nunc appellant, nostri uero herniam gutturis, & gutturosos, qui eo morbo debonestantur. Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, modò humor aliquis, melli, adipi, pulti, aquæ uel similis, includitur. Interdum etiam, ut ait Celsus, in eiusmodi tumore pili minutis ossibus immixti reperiuntur. Nata (ut scribit Guido) ex crescentia est magna, carnosæ, ueluti caro natium, uel anchorarum, diuersarum quidem formarum & magnitudinum: cuiusmodi sunt melopepon & cucurbita. Itaque diuersa sortitur nomina, pro formæ, & membri in quo est, uarietate. Porro tumor hic qui

nata

Talpa.

Bocium.
Bronchocle.

Nata.

nata uel napta recentiorum turbæ appellatur, dolore caret, nisi fortè adèò magnus existat, ut partes membri trahendo, soluta continuitate, aliquem dolorè circumstantibus inferat. Est autem & de numero abscessuum, & ad stercorata (ut suprà in enumeratione tumorum præter naturam diximus) ferè spectat. Bubo, Galeno autore, laxarum partium, seu glandularum (quas Græci adenas uocant) est affectus: nempe simplex inflammatio. Quare uel malè hic inter absces-

Nata uel napta
ad stercorata
spectat.
Bubo.

10 sus pituitosos à Guidone annumeratur, uel aliud esse putat quàm Galenus. Porrò bubones, qui prolapsu, aut alijs ulceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo uacant. At qui in febribus pestilentialibus incidere consueuerunt, deterrimi sunt siue foemora, siue alas, aut ceruicem inuasierint. Fugille (inquit interpres Auicennæ) est de genere apostematum glandulosorum, & quasi hoc nomine (ait) appropriatur illud, quod fit post aurem. Ex qua descriptione non leuis est coniectura, fugille Auicennæ, cum tumorem esse, qui Græcis

Fugille.

20 parotis dicitur, affectus quidem glandularum sub ipsis auribus. Quibusdam autem idem esse putatur fugille, quod bubo, uerùm tunc illis aliud erit bubo, quàm Galeno & Paulo: nempe excresecntia multum (ut dicunt) infiltrata, & radicata, ut plurimum siue cystis, id est, folliculo, seu membrana eam inuolvente, dura in morem scrofularum, & in eo significatu (ut puto) sumitur bubo à Guidone, quando bubonem fugilinum numerat inter abscessus pituitosos. Cæterum longè adhuc plura nomina pituitosorum huiusmodi abscessuum 30 reperiuntur. Verùm de nominibus ipsis nō magna cura habenda est, modò id unum de ijs cognoscamus, & intelligamus

Bubo quid apud
Guidonem, &
alios recētiore.

*Differentia ab-
scelsum pui-
torum.*

telligamus, quòd propter eiusmodi-nominum diuersi-
tatem, curationem, & iudicium euariari contingit.
Itaque eiusmodi abscessuum seu excrecentiarum phleg-
maticarum, aliæ quidem peculiari quadam membrana
seu tunica (quam cystin uocant) includuntur: aliæ uerò
in carne sunt uasis implexæ & insertæ. Quædam ba-
sin, seu radicem habent gracilem: quædam uerò la-
tiores. Quædam item sunt resolubiles, quædam uerò
minimè. Quædam magnæ, quædam parue. Aliquæ ad
suppurationem spectant, aliquæ non. Aliæ etiam sunt
squamosæ, fistulosæ, & cancerosæ, aliæ uerò nihil
horum prorsus resipiunt: & ita de alijs.

De causis, signis, & iudicijs prædictorum abscessuum.

*Causæ absces-
sum quæ ad pi-
tuitam pertinet.*

CAUSÆ huiusmodi abscessuum sunt triplices: nem-
pe primitiue, ut casus, percussio, uita luxur,
siue intemperantia, ac deprauata uiuendi ratio. An-
tecedentes, ut sunt humores non naturales, præsertim
pituitosi, & uera oedemata, quæ in abscessus degene-
rant. Et coniunctæ, quæ sunt uariæ substantiæ, & pro-
priæ cuiusque abscessus materiæ, in parte affecta con-
tinentur. Continentur autem in huiusmodi abscessibus,
quandoque quidem humores uel serosi, cuiusmodi est
urina, uel putridi & corrupti, uel cœnosi, uel mucosi,
seu (ut aiunt) mucilaginosi, uel melli, pulti, aut adipi
similes. Quandoque uerò carnes phlegmaticæ, &
spongiosæ, atque glandulosæ. Interdum quoque lapi-
des, hærenæ, ostræ, ligna, carbones, & id genus alia
solida corpora. Frequentissima autem sunt (ut paulò
antè diximus) horum abscessuum tria genera, quorum
singula propriam appellationem Græcè sunt sortita.

*Materia pitui-
torum absces-
sum.*

Ea sunt

Ea sunt, atheroma, steatoma, & meliceris, à similitudine contentorum in his corporum dicta. Est enim aliud eorum ueluti seium, aut pingue quiddam: aliud ueluti mel: aliud pulicula tenui, quam atheram uocant, simile. Signa & iudicia eiusmodi abscessuum, quæ

Signa.

ad pituitam pertinent, ex eorum descriptionibus & differentiis supra positis, facile deprehenduntur. Indicium autem quod uelamento includantur, hoc est, cysti seu pellicula, quam & antiqui tunicam nomi-

Note abscessus uelamento inclusi.

- 10 nabant, est mobilitas, & cutis separatio. Quando uero fixæ sunt, id est, eodem in loco permanentes, & carni adherentes, nulla eas inuolui membranula indicium est. Porro recentes & tractabiles, discuti seu resolui possunt, duræ uero & iam inueteratæ nequaquam. Rubor autem, dolor, & caloris incrementum, ostendunt ipsos abscessus terminandos, uel per suppurationem, uel per fistulas, uel per cancrum. Numerosæ strumæ partes externas occupantes, & sede subinde mutata, huc atque illuc per corpus uagantes, cum aduentitia
- 20 quadam caliditate, planè testantur ac indicant, easdè germina esse ac sobolem choeradam internarum, ut Arnaldus à Villa noua quodam in loco annotauit.

Iudicia abscessuum purulorum.

Arnaldus à Villa noua.

Aucennas.

- Proinde quæ forinsecus illis admoventur auxilia, parum, aut nihil proficiunt. Hæ autem, ut putauit Auicennas, ex casu, & offensione, seu allisione ita in nostris corporibus multiplicantur. Conducunt uero uel magnoperè strumosis ipsis, medicamenta purgantia, potiones diuretica, atque electuaria (ut uocant) rescantia: item ætatis mutatio in paruulis. Cæterum pue-

Quæ ætates naturæ, & corporis constructio- nes, strumis magis sint expa- nse.

- 30 ri ipsi propter uoracitatem & gulæ intemperantiam, ac corporis raritatem, strumis frequentius corripiun-

Celsus.

Magnitudo.

Natura.

Locus.

tur. Senes uerò ob causas contrarias, rariùs. Ad hæc qui breui atque angusta sunt fronte, & compressa habent tempora, ac maxillas amplas, strumis sunt obnoxij: in talibus enim materia promptè deriuatur ad collum, ut ex recentioribus chirurgis annotauit Henricus. Strumæ uerò præcipuè (ut Celsus ait) fatigare nedicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt: & siue ferro, siue medicamentis curentur, plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus quoque accedit, quòd longo spacio detinent. Incisionis eiusmodi abscessuum, itidem & corrosio, magnoperè uerenda est circa uentrem, collum, & commissuras; propter propinquitatem uenarum, arteriarum, & nervorum, ac internæ etiam capacitatis. In incisione quoque magnarum glandularum, summoperè uitare oportet uenam, quæ ad radicem earum sita est, & illis alimoniam defert. Sæpe enim magnam hæmorrhagiam, id est, sanguinis profusionem, excitat, unde non mediocriter tandem sequitur periculum. Strumæ inter se differunt magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & uasorum complicatione, ut ex Leonida annotauit Aëtius. Itaque parue strumæ maioribus faciliùs curantur, sicut mites inflammatis. Malefica sanari nã possunt. Cùm enim omnes eiusmodi strumæ cancerosæ, ac uasis refertæ sint, dùm curantur, erumpendi sanguinis periculum adferunt; præterquam quòd cùm plerumque penitiores inueniantur, minimè abscondi possunt. Vasa enim nobilia, uenas inquam iugulares, & arterias, quæ carotides appellantur, malefica struma tanquam radices habet. Pro loci ratione, superfi-

ciaria

clariæ quidem strumæ profundis curatu faciliores sunt, deinde quæ in collo eueniunt: ubi tamen uocales nervos diligenter uitari oportet. Multi enim strumas circa asperam cannam incidendo, uocalibus nervis simul excisis, reliquo deinceps uite tempore ægrum sine uoce reddiderunt: nam præter eius nervi excisionem, uocalia instrumenta denudata, & inter curandum refrigerata, uocis functionem uiolarunt. Pro multitudine strumarum, constat unam pluribus facilius curari posse. Sicut, quantum ad ortus rationem attinet, longè citius sanescunt suspensa, quàm quæ insertæ fuerint. Hæc de strumis ex Leonida, memoriæ prodidit Aëtius.

Multitudo.

Ortus.

Curatio abscessuum ex materia pituitam referente creatorum, quas excrescentias pblegmaticas uocant.

Curatio eiusmodi abscessuum, qui ex pituita ferè ortum habent, gemina est recentioribus chirurgis: Vniuersalis scilicet, atque omnibus ex æquo communis: & particularis, hoc est, singulis differentiis propria. Atque uniuersalis curandi ratio erit, talem, tamq; accommodam laboranti uitam instituere, ut materia, quæ tales abscessus committit, in corpore minime coaceruetur, & materiam, ut uocant, antecedentem, & iam in ægroto corpore collectam, modis omnibus auertere, ne tandem uniatur coniunctæ, hoc est, ei quæ iam morbum creat. Porro priorem huius uniuersalis curationis intentionem assequemur, si laborantes eam uiuendi rationem diligenter obseruent, quæ in præcedentibus capitibus præscripta est: hoc uno dempto, quòd paulò tenuiorem uictum, & qui incidendis humoribus crassis magis sit accommodus, amplecti debent.

Duplex abscessuum pituitosorum curandi ratio.
Vniuersalis.
Particular.

Vita ratio qualis esse debeat in abscessibus pituitosis.

bent. Proinde si Auicennæ consilium sequantur, cibos omnes pachychymos, id est, crassioris succi uitabunt, frigida item potionem, nimiam satietatem, immoderatam uel repletionem, & quæ nauseam pariat. Tolleranda autem illis est quam maxime fieri poterit, inedia. Bona coctio imprimis erit procuranda, uitanda habitatio humida, in uallibus sita, paludosa, & uitatis aquis irrigata. Potus sit unum aliquod generosum atque optimum, uel aqua aluminosa, aut sulphurata. Aquæ enim eiusmodi minerales, præsertim quæ uini feculam sapore representant, non solum inter nos hoscæ strumosos, ac pituitosos abscessus, sed externos quoque, & summa corporis occupantes, immittunt ac discutunt, ut Arnaldus affirmavit. Ceterum alteram partem prioris processus, nempe materiam antecedentem auertere, ne tandem addatur coniuncta, quadruplici genere euacuationum assequimur, utpotè medicamento per aluum pituitam expurgante, & quandoque uenæ sectione. Item ijs quæ urinam cient, & denum ijs quæ collectum in alto corpore humorem tum in balitum resoluunt, tum digerant. Ad uacuationem quæ sit per aluum, laudatur à ualde multis puluis turbith, qui apud Auicennam recipit, turbith, zingiberis, & sacchari, singulorum pares portiones. Ex eo autem exhibet drachmas duas, asseritq; quòd præter hoc quòd resoluit pituitam crassam, nequaquam calfacit, neque abrasit intestina. Razes autem, qui audacior fuit in purgantibus medicamentis exhibendis, huiusmodi puluerem conficit, capite de doloribus uentris in nono ad Almanforem, ex uiginti partibus turbith, decem zingiberis, & triginta sacchari,

Aqua aluminosa uis,

Euacuatio materia antecedentis.

Euacuatio per aluum.

Puluis turbith.

Razes.

chiri, offertq; ex eo uice una drachmas tres. Benedi-
cta quoque, & hiera picra: item pillule ex agarico,
& de hermodactylis maiores appellatæ, eiusmodi af-
fectibus magnoperè conueniunt. Ad ciendam urinam,
uti consueuerat Guido à Cauliaco sequenti potione,
quam ex scriptis multorum se decerpisse ait. Conci-
pit autem, scrofulariæ partes tres, filipendulæ par-
tes duas, pimpinellæ seu bipinellæ, pilosellæ, tanacetī,
caulum rubrorum, qui nonnullis brassica marucina

Hiera picra.

Quæ urinam
citant.

For. 10 Guidonis
à Cauliaco, uri-
næ ciens in ab-
fectibus pitui-
tosis.

- 1° creduntur: rubiæ maioris, singulorum partem unam,
radicis aristolochiæ, spathulæ scetidæ, radicis rapha-
ni, ana partem dimidiam, conquassentur, & decoqua-
tur in uino albo & melle, usque ad consumptionē me-
dietatis, & fiat colatura, ex qua tertio quoque die,
hora matutina sumat æger quadrantem, id est, uncias
tres, & potio sit tepida. Ceterum pro omnibus his au-
xilij, sicuti & pro uenæ sectione (si aliquando fieri
debeat) consulendus erit peritus aliquis medicus, qui
& qualitatem, & quātitatem, ac modum usus eorum

- 2° præscribat. Ad resoluendum autem per halitum, &
digerendum humorem; qui in alto corpore collectus
est, & internas glandulas (quæ externarum sunt cau-
sæ) excitat, Gal. lib. 14. Therap. consulit theriacen,
athanasiam, ambrosiam, et medicamentū quod quia ex
Cretica calaminthe est compositum, Græci diacala-
minthen uocant: cuius compositio requirenda est ex
lib. 4. de sanit. tuen. Multa alia auxilia ad huiusmodi
affectus instituuntur: nempe potiones, electuaria, &
etiā olea, quæ in aures injiciuntur. Empirica quoque
3° permulta, à ueteribus descripta & celebrata sunt;
quorum usus mihi non probatur. Proinde non duxi

Quæ per halitū
digerant.

*Galliarū reges
diuino quodam
munere strumas
curant.*

*Quæ particula-
rem pituitoso-
rum abscessuum
curationem cura-
runt.*

*Tempus quod
insinuat.*

illa nostris commentarijs esse inferenda. Hoc unum
tamen confidenter adfirmo, Christianissimo Franco-
rum Regi diuinitus peculiari dono esse indultum, ut
quamplurimos strumosos, seu (ut uocant) scrofularios,
solo manuum attactu, integræ sanitati restituat. Rex
etiam Eduardus (ut referunt historia) solebat diui-
nitus solo tactu sanare strumosos. Quod immortale
munus iure ueluti hæreditario ad Reges posteriores
manauit. Nam Reges Angliæ etiam nunc tactu, ac
quibusdam hymnis non sine ceremonijs prius recita- 10
tis, strumosos sanant. Atque hæc quidem in omnibus
supradictis abscessibus cōmunia sunt. Quæ uerò se-
quuntur, particularem ac propriam cuiusque diffe-
rentiæ curandi rationem concernunt. Hanc autem cu-
randi rationem propriam ac particularem, in hisce
abscessibus diuersam efficiunt atque immutant, tum
materiæ, ex qua ortum habent, substantia, tum uerò
eorum quantitas, uel minutula, uel quæ in molem ual-
de magnam excreuit. Adhæc partis ipsius laborantis,
atque etiam totius corporis natura. Temporis autem 20
duratio licet non indicet curationem, indicat tamen
nobis aliquando atque insinuat, qualis sit ipsa dispo-
silio, ut Gal. annotauit lib. iij. de morbis curandis.
Itaque tametsi à prædictis multæ sumi possint curan-
di indicationes ac intentiones, eas tamen, quantum ad
rem præsentem attinet, ad sex reduximus, quas & ijs
sex sequentibus ueluti canonibus expressimus. Quo-
rum primus ad hunc modum habet: Pituitosos absces-
sus, molles, & paruos, quæ lupiæ uulgo, & Arabicæ fa-
ctionis principi Auicennæ, glandule appellantur, si 30
in particulis firmioribus consulerint, & (quia nondū
inueni-

inueterauerunt) tenellam adhuc cystam, id est, membranam qua includuntur, habuerint, comprimito, & atterito, postea desiccato. Secundus: Maiores non multum duros, neque inueteratos, more tumorum cedematosorum (de quibus supr. egimus) emollito, discutito, consumito. Tertius: Pituifosas eiusmodi excrecentias, saniosas, & apostematosas, hoc est, quæ in suppurationem spectant, maturato, aperito, detergito. Quartus: Strumas quæ ex prædictis auxilijs curationem non recipiunt, & mobiles sunt, blandæ, morigeræ, ac tractabiles, incidito atque extrahito. Quintus: Immobiles, insertas, irretitasque, seu (ut loquuntur) infiltratas, hoc est, uenis, & arterijs multum implicatas, ad radicem & intus latas, corrodito detergetoq;

Sextus: Tenui ac gracili radice innixas, deligato, ac euellito. Primus canon, iuxta Auicennæ sententiam, absoluetur, si ubi molles ac minutos eiusmodi abscessus, quos Auicennas glandulas, & recentiores lupias appellant, contriueris, ac uehementer compresseris, 2^o laminam plumbeam tumori æqualem superponas, & ne hinc inde labatur, arctis uinculis in medio constringas: hæc enim (ut ille ait) huiusmodi excrecentias digerit. Primum igitur lupia tādianu molliter perfricetur, usque dum aliquantulum incalascit, & seipsa mollior quodammodo fiat: postea laborans partícula firmiter manibus apprehendatur, & fundo scutellæ, aut re aliqua solida lignea, toties ac tam uehementer percutiatur, ut dispareat, & interior eius cystis, id est, membrana qua includitur, dilaceretur, 2^o rumpatur, & atque ita materia ibi contenta dispergatur. Quo facto protinus lamina plumbea supra lo-

Compressio, &
attritio.

Lupie curatio.

Lamina plumbea.

Unguentum
Rogerij.

Ganglij curatio
ex Philagrjo.

Lupiam & gan-
glion eundē ef-
fe affectum.

cum applicetur, & fascia duarum extremitatum, seu
(ut dicunt) duorum capitum arctissime deligetur, nec
amoveatur ante nouem aut decem dies. Lamina au-
tem ea sit magnitudine (ut modò dicebatur) quæ pro-
portione respondeat lupiæ. Sunt tamen qui ante lamina
eiusmodi plumbeæ applicationem, unguentum ad-
mouent ex plumbo usto, fuligine sambuci, aut ficus
arboris, oleo, & aceto. Alij prius utuntur emplastro
composito ex aloe, acacia, myrrha, olibano, sarcocol-
la, adiecto aceto, uel oui candido, quantum ad alia ex-
cipienda satis esse uidebitur. Henricus superponere
solebat paruas (ut ipse, & alij eiusdem farinae chirurgi
loquuntur) plagellas, ex stupis confectas, oui candido
liquore, sale, & alumine zacccharino inspissato deli-
butas. Porro Philagrius ratione non admodum dissi-
mili, apud Aëtium ganglia (qui nerui, ut supra dixi-
mus, tumores sunt inæquales) curare solebat, inquit
enim ad hunc modum: A ganglijs chirurgicum opus,
id est, sectionem, arcemus, præsertim si in manibus,
aut pedibus euenerint: sed medicamentis tantum cu-
rabimus. Ammoniacum enim prope ignem ad empla-
stri consistentiam emollitum illinimus, deinde lami-
nam plumbeam tumori æqualem superponimus, &
ne hinc inde labatur, arctis uinculis in medio constrin-
gimus. Iam uerò diebus aliquot transactis, ubi prius
ganglium emollitum nouerimus, nihil ægro præfati, sta-
tim sublatis uinculis, dum adhuc locus incalescit, pos-
licem dextræ manus ganglio insigimus, ac reliquis
quatuor digitis membro inuicentibus uehementissime,
comprimimus, & ganglium confestim dissoluitur. Ha-
tenus Philagrius. Itaque ex hac curandi ratione, fa-
cile

- cilè est colligere recentiorum lupiam, Auicennæ glandulam, & Græcorum ganglion, eundem omninò affectum esse: quod & præcedentes etiam eorum descriptiones apertè satis ostendunt. Archigenes in hoc uitio calcem una cum adipe anserino & terebinthina resina, apponi iussit. Idem uerò & medicamine, quod lapide achatem recipit, sæpius utebatur, ut refert Paulus. At Oribasius eo frequenter usus est, quod recipit cerussæ, resinæ piceæ, olei ueteris, singulorum unciam
- 10 unam, ammoniaci thymiamatis, galbani, singulorum parem modum, ceræ uncias quatuor. Extat idem medicamentum apud Aëtium, sed in quibusdam pondera euariant: habet enim cerussæ, olei antiqui, & resinæ piceæ, singulorum lib. unam, ceræ uncias duas, ammoniaci thymiamatis, chalkanæ, id est, galbani, singulorum unc. unam. Cerussam cum oleo decoquit, quousq; inquinandi finem fecerit, deinde tritum ammoniaci, postea resinam piceam, & ceram, postremò galbani præmollitum conficit. Porro insignis illæ Græcæ familiæ medicus, Oribasius inquam, non laminam plumbeam, ut Philagrius, Auicennas, & recentiores chirurgi, sed plumbeum orbiculū crassiorem, ad instar spondylorum, id est, uerticillorum, quæ fufis mulierum appenduntur, ganglio ipso ampliorem imponebat, deligabatq;: Siquidem (inquit) pondere suo longiori temporis spatio, ipsum dissoluit. Itaque satius est multò eiusmodi emollientibus & discutientibus medicamentis uti in ganglijs, seu (ut communiter loquuntur) lupijs curandis, quàm chirurgico opere, id est, excisione,
- 30 ne, præsertim cum in cruribus, aut brachijs, aut summis partibus oriuntur. Periculum enim est, si ea excindantur

Archigen.
Lib. 4.

Oribasij medicamentum mollitiorum ad gaglia.

Verticellum plumbeum.

Gangliorum per
chirurgiam cu-
ratio:

Discussio per di-
gerentia medi-
camenta.

Gal. hanc cōpo-
sitionem acce-
ptam refert
Hera.

dantur, ne particula mutila reddatur. At quæ caput
aut frontem occupant, manu tutò curari possunt, hoc
est, præcidi, aut euelli. Ergo summam cutem scalpello
diuidito; deinde si parua sunt, uulsella comprehensa
ex basi, hoc est, à radice excindito: si maiora, hamis
transfixa, & sublata, circumcirca diducito, excoria-
toq; & extrahito: postremò suturis oras coniungito,
medicamētoq; ūritor, quod cruentis uulneribus adapta-
tur. Sed hæc ad quartum canonē pertinent. Secun-
dus canon completur (ut interim taceam medicamen-
ta pituitosis, hoc est, œdematosi tumoribus, dicata,
quæ supra posuimus, ad hos etiā de quibus nunc
agimus, abscessus, & herniarum omne genus, appri-
mē unī cum sequentibus remedijs utilia) admotione
cuiusdam emplastri, quod à Galeno descriptum est lib.
6. de compositione medicamentorum κατὰ γέννην: hoc
enim, ut ipse testatur, per halitum digerit, & phlegmo-
nas propulsat, ualet ad strumas, panos, parotidas. Con-
fert etiā podagricis, & multis alijs uitijs beneficit.
Recipit autem olei ueteris denariūm pondo centum,
argenti spumæ denariūm pondo quinquaginta, picis
siccæ denariūm pondo quinquaginta, ladanū denariūm
pondo uiginti quinque, æruginis rase denariūm pondo
octo, galbani denariūm pondo quatuor. Argenti spuma
(quod lithargyrum uocant) ex oleo trita coquitur: cum
autem coeunt, id est, inspissata sunt, pix & ærugo im-
mittuntur: deinde ladanum, galbanumq; , atque sic in
mortarium transfusa subiguntur & molliuntur, atque
usui reseruantur. Quidam, ut boni coloris sit et fuscū,
miscēt etiā squammæ denariūm pondo octo: nam
alioqui sit nigerrimum. Aliter inuenitur descriptum
in Guidonis

- in Guidonis commentarijs. nempe sub hac forma:
 ℞. olei antiqui unc. 12. uiridis æris, siue æruginis,
 drach. 14. picis siccæ unc. 6. ladanii uncias. 3. lithar-
 gyri unc. 11. galbani uncias. 3. Ad idem benefacit
 diachylon commune, & ireatum nominatum, quorum
 formulæ & compositiones in antidotario infra descri-
 bentur. In diachyli autem ireati libra una, malaxan-
 da est uncia. 1. pulueris radices ireos. Idem efficit dia-
 chylon magnum Mesues, cuius descriptio etiam infra
 1^o habetur. Sunt qui consulant ad digerendos eiusmodi
 abscessus, antiquum stercus caprillum, cum melle &
 aceto supra ignem in unitatem ad formam emplastri
 redactum, dolenti loco esse adinouendum. Item, empla-
 strum ex scænogreco, semine lini & brassicæ, cum ui-
 scillagine radice altheæ confectum. Hoc etiam si sup-
 purationis spes adfuerit, pulchrè maturat. Halyabbas
 quoque subsequens emplastrum ad eundem usum plu-
 rimum commendat: ℞. farine fabarum, & hordei, ana
 drach. 10. radice glycyrrhizæ, radice altheæ, & pi-
 2^o cis, singulorum drach. 5. cereæ albæ, adipis anserini,
 cuiusque drach. 10. terantur, & in unum redigantur
 ex oleo ueteri, & urina pueri nodum Venerem exper-
 ti, & supra moderatum ignem fiat emplastrum. Aliud
 Auicennæ, quo Guido utitur: ℞. stercoris bubuli unc.
 2. radice caulium, id est, brassicæ, radice capparum,
 squillæ, siccum pinguium, singulorum semūciam, lupi-
 norum, bdellij, ana drach. 2. aceti, mellis, axungie sul-
 læ, facis olei antiqui, ana quod satis est, fiat empla-
 strum. In omnibus duris tumoribus Brunus hoc sequens
 3^o remedium approbavit, cuius sententiam secutus est &
 Theodoricus. Sume ammoniaci, bdellij, galbani, singu-
 lorum

Diachylon.

Razes.
Stercus capril-
lum uetus.Halyab. empla-
strumEmplastrum
Auicennæ.Bruni & Theo-
dorici empla-
strum ad stru-
mar.

Rogeriij empla-
strum.

Emplastrū prae-
ceptoris. Guido
nris ex limaci-
bus.

lorum partes aequales: macerentur triduo in aceto: qui-
bus dissolutis, & igni iam appositis, addatur surfuris
subtilis, quantum satis esse uidebitur, & fiat empla-
strum. Rogerius hoc auxilio utebatur ad strumas,
quas uulgò scrofulas appellant. Accipe radicis filicis,
asphodeli, & si uis ebulorum, ana quantum lubet, co-
quantur in uino optimo, & tundantur in mortario, ad-
dendo sulphuris uiui momentum, fiat emplastrum.

Qui Guidoni contingit praeceptor in Montepessula-
no, efficacissimum saepe expertus est emplastrum, quod 10
constabat ex duodecim cochleis (quos & limaces uo-
cant) uino incocti, aut lixiuio cinerum, dictorum uul-
gò clauelatorum, aut ex capitello, ut dicunt. Imò (quod
ualentius erat) quotidie cochleam unam uel siccam,
uel aliter praepratam, & (ut loquuntur) confectam, ip-
sis laborantibus per os sumendam offerebat. Probè etiā
strumas discutit Paulo calx uiua, id est, aqua non ex-
tincta, melle, uel gymnasiolorum sordibus, seu balnearum
strigmento excepta, uel oleo, uel adipe suillo. Idè prae-
stat Aetio sola palaestrae sordes, à parietibus derasa, et 20
probè subacta, super linteolo extensa, & emplastri mo-
dò applicata. Ad id etiam efficaciter auxiliatur, cal-
cis, natriq; par modus, cardamomi, & foenugraeci qua-
druplus cum melle, malaginis modò impositus. Stru-
mas quoque discutit, lupinorum amarorum farina ex
oxymelite cocta & illita. Ad idem praeclare facit bu-
bulum stercus aceto incoctum, & delinitum: id enim
tumores scirrhosos omnes instar cataplasmatidis appo-
situm, mirificè dissipat. Grossi etiam praecipue caprifi-
ci cum axungia apposti, omnem tumorem discutiunt. 30
Hac igitur curandi ratione, strumis inchoantibus, &
nondum

nondum inueteratis, medebis: tum in pueris, tum in his, qui manu opus refugiunt, medicamentis scilicet dissoluentibus, ac per balitum discutientibus. Verum primò mollire, deinde discutere oportet, uel utrumque simul, medicamentis mixtam facultatem habentibus, efficere. Eius autem generis fere sunt auxilia omnia superius descripta. Porro si digerentia medicamina nihil in eiusmodi abscessibus profecerint, uel ad suppurationem ducendi erunt, uel exedendi, uel manu curan-

- 1^o di, ut in sequentibus dicitur. Caterum silentio præteriri non debet, quod à quibusdam memoria proditum est, nempe strumis laborantes, sicuti & elephantiasis, uiperarum ac serpentum usu mirificè adiuuari. Item si laserem ad ciceris quantitatem singulis diebus ieiuni potauerint. Ergo serpentem extinctum in ollam conijcito, eamq; gypso probè oblitam ac circummunitam in fornacem mittito, concremati cinerem equali fœnugraci pondere misceto, & melle excepto utitor: hoc enim strumosis eximie subuenit. Alium etiam facilem reddi, tenuemq; uelut adhiberi oportet strumis laborantibus, uomitumq; assidue prouocare, & per os pituitam ducere, caputq; desiccare, ac cataplasmata scincipiti applicare, quæ mediocres pustulas in cute excitare possit, ueluti capparis radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi, smegmatisq; eiusdem facultatis, & puluisculis uti. Tertiij canonis intentionem communiter etiam assequimur, usu auxiliorum præcedentium. Omnia enim mollientia & resoluentia, si locum aut materiam inueniant resolutioni contumacem, ac repugnantem, materiam ipsam haud dubiè maturant, & ad suppurationem perducunt: præsertim si mittis ac benigna

Viperarum ac serpentum usus, mirè strumosos iuuat.

Tertiij canonis declaratio.

Suppurācia seu
maturantia.

benigna satis fuerit, aut sanguini permixta. Halyaba-
bas autem ad maturandos huiusmodi abscessus, admo-
uet emplastrum compositum ex farina hordei, pice, et
olibano, ex pueri impuberis lotio, in unum corpus re-
ductis. Auicenna uero ad infrenandam caliditatis uehe-
mentiam, consuluit decoctum coriandri præfatæ fari-
næ esse remiscendum. Quod si parum hæc proficiunt,
et fortius atque efficacius medicamentum desideres:
accipe myrrhæ partem unam, licij partes duas, et mi-
sce cum prædicto decocto. Strumis ad suppurationem 10
perducit, aut diffundit subscriptum medicamentum, à
Paulo Aegineta lib. 4. relatū. Myrrhæ drach. decem,
ammoniæ thymiamatis drach. septem, uisci quercini
drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis
drachma, in pila contunduntur. Ceterum ipsis iam
maturatis, et ad suppurationem perductis, (quod ex
notis ipsius puris facile deprehendes) aperiri debe-
bunt, et detergeri. Detergio autem optime fiet admo-
to unguento Apostolorum uulgò nuncupato, quod ad
Christianos (ut putant) relatum est: hoc enim magnæ 20
est efficacie in strumis malignis, et ulceratis. Ad idē
multum efficacia sunt, unguentum Aegyptiacum Ra-
zis, emplastrum de succis, diachylon nominant: et dia-
palma, quod Græcis Φοινικίον appellatur, quorum
descriptions ex antidotario sunt requirendæ. Quod
si huiusmodi abscessus locum aliquem occupauerint, in
quo caries, et quædam corruptela ossium subest, aut
prauum aliquod symptoma illis accesserit, ea ulcerum
curandi ratione tractentur, cum quibus affinitatem et
commercium habent. Quod ad quartum canonem 30
attinet, blandas, morigeras, superficiarias, et sanabiles
strumas

Pauli medica-
mentum ad stru-
mas maturan-
das.

Detergentia.
Vnguentū Apo-
stolorum.

Vnguentū Ae-
gyptiacum.
Diachylon.
Diapalma.

Modus inciden-
di & uellendi
strumas, ex Al-
bucasi, & Leo-
nida.

strumas, manuum artificio, & chirurgico conatu, ita
optimè ac breuissimè tractabis. Aegrum imprimis pro-
stratum, recumbere iubeto: sedens enim, animi deliquio
facillimè corripereetur. Vbi laboras sic decubuerit, cru-
ribus inter se inuicem, & ad lecti fulcra innixis, ca-
put à ministris firmiter detineri imperato. Deinde cu-
tim tumori adiacentem, recta, uel subobliqua sectione
incidito. Quæ enim in collo per transversum fit sectio,
prorsus inutilis est: in eo siquidem uasa & nerui recta
10 porriguntur. Ceterum non affatim, neque unico im-
petu, totam cutis crassitudinem secabis: nihil enim uio-
lenter in hoc opere fieri uolumus. Atq; in paruis qui-
dem tumoribus, hoc est, strumis minutioribus, simplicem
sectionem facito, hoc est, simplici linea cutem diuida-
to: in maioribus uerò, cutim ad myrtei folij figuram
abscindito: tum uasa, id est, uenas & arterias, paula-
tim & blandè denudata seponito. Post hæc uerò sectio-
nis labra, seu oras cutis incisa, uolsellis, seu hamulis di-
stendito ac dilatato, ac membranas digitis, & scalpri
20 capulo, uel spatula, excoriato, strumamq; ubi nudata
& explicata membranis apparebit, paulatim eximito.
Ceterum si struma inserta, seu uasis implexa fuerit,
summa attentione opus tractandum est, ne per incu-
riam copiosa sanguinis profusio sequatur. Propterea
in agendo, unam duntaxat sectionis labium uulsela
protrahatur, & ita sensim à connexis corporibus
scalpelli acie separetur. Cumq; ab uno latere connexio
diuulsa ac soluta fuerit, in altero idem penitus repeta-
tur: deinde tota basis propter nervos, & subiecta uasa
30 excidatur. In strumis uerò, quæ circa alas & inguina
contingunt, ob cutis reduplicationem, sectio transversa
ducitur.

ducitur. Porro in sectione quæ fit in strumis collum occupantibus, summa cura adhibenda est, ne uel arteriæ, quas carotidas uocant, uel recurrētes nerui attingantur uioleturq; . Si autem uase aliquo inter secandū diuiso, sanguinis profusio tuum opus remoretur ac obturbet, uas ipsum funiculo excipito, uel nisi magnū admodum fuerit, penitus (ut Paulus consulit) abscindito, uel præsidia sistendo sanguini (si non magno impetu prorumpat) dicata, applicato. Deinde ad inceptum opus reuertitor. Itaque ubi in arctum strumæ basis uenerit, dextrè ac peritè ipsam præcido, inmissoq; indice, locum pertractato, ac diligenter scrutato, num et aliæ sint strumæ adiectæ, quas et eodem quo supra diximus modo, si quæ inuenta fuerint, extrahito. Porro modicum sanguinis fluorem facile compesces, admotis ijs quæ facultatem habent exiccandi, ut stupis, spongia, aut linamentis ex xylo, id est, cotone factis in aquam frigidam, uel acetum, aut in miscellam ex utroque (quam oxycraton uocant) insusis, et postea expressis. Sin sectio incruenta persluterit, thuris polline eam repleto, linamentaq; imposito, ac pro linamentorum custodia, lanam uino madentem alligato. Quod si uel aliqua amplior, et effatu digna, cum radice seu flogandula, uel strumæ, aut consimilis excrescentiæ pituitosa connexa sit, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere ac constringere conuenit, quò particulatim citra periculum sua sponte excidat. Quo in casu per linamenta postmodum curatio adhibenda erit. Esto autem uinculum ex materia aliqua non facile putrescibili, cuiusmodi sunt fila, quæ serica nuncupantur, aut graciles chordæ testudinum, aut aliorum instrum-

Si uena strumæ sit annexa, quid faciendum.

- instrumentorum muscorum : quæ enim facile putrescunt, ea citò ab ijs quæ exceperunt, decidunt. Cæterum si peracto opere, aliquid ex folliculo seu membrana materiam prædictorum abscessuum obuoluente, uel aliud extraneum quodpiam remanserit, iubet Albucasis illud absumendum esse, implendo uulnus primis diebus xylo, id est, cotone, uel alio consimili, aqua salsa imbuto. Guido autem ut reliquias illas absumeret, hiantem sinum implebat, primum quidem oui candido, alio mine resperso, & inspissato. Postea uerò unguento Aegyptiaco, uel aliquo ex erodentibus, quæ in antidotario describuntur. Porro in omnibus huiusmodi operationibus apponenda sunt, quæ dolorem leniunt. Inter cætera autem communiter admovent stupas oui candido liquore, & rosaceo imbutas. Quinti canonis scopum ita assequeris: cutim caustico, id est, urente aliquo medicamine pro ratione magnitudinis excrescentiæ abrupto. Verum dum id moliris, summa cura obseruandum est, ne partes alias circumiacentes medicamentum adurens attingat. Perbellè autem opus hoc absolues, admoto caustico ex calce, aut sapone. Hæc enim effectum suum intra duodecim horarum spatium feliciter adimplent. Quod si diutius permanserint, nihil inde tamen periculi aut incommodi sequetur. Itaque caustico iam abrupta cute, & inducta eo in loco eschara, id est, crusta, per medium ipsius crustæ, abscessum resecta linea in lōgum diuidito (incides autem uersus profundum, ferè ad uivum usque) & infectionē, seu hians uulnus, linamentum, aliquo exedente medicamento cuius generis est pulvis asphodelorum respersum, imposito. Porro tametsi plerique ualde multa admovent,

Albucasis.

Corrosio et mundificatio.

Causticum ex calce et sapone.

*Arsenicum.**Quantitas at-
semit.**Quando crusta
à niuo resoluenda.*

quæ postea in antidotario recensentur : arsenicum
tamen in hac re primatum obtinet, modò quis nouerit
eo rectè uti. Vñus autem ipsius certus modus describi
non potest, ut lib. iij. Therap. Galenus annotauit :
proinde non temerè eo utendum est, quandoquidem
medicamentum est supra modum uehemens ac uiolen-
tum, febres excitans, & multa alia praua sympto-
mata inducens. Adde quòd minima etiam quantitate
adhibitum, mirum, & ferè incredibilem effectum præ-
stat. Communis tamen eius modus seu quantitas, est 10
medietas grani unius frumeti triticei, in corpore qui-
dem robusto, & particulis à principibus membris lon-
gè semotis : in debilibus uerò naturis, & locis iuxta
principes partes sitis, minor quantitas admouenda
erit. Vt autem in uniuersum pronuncietur, melius ac-
tutius est, parum & sepius ex eo offerre, quàm se-
mel & uice una quantitatem immodicam. Eius au-
tèm operatio seu effectus, durat tres dies integros.
Quare toto eo tempore, laborans uicium febricitan-
tium seruare debet. Membrum uerò affectum, & par- 20
tes circumiacentes, ad tutelam sui, & fluxionem (quã
immoderatus calor excitare posset) prohibendam, un-
guento quod populeon appellatur, aqua quoque uel
succo solani, & aceto, alijsq; id genus refrigeranti-
bus illini, ac perfundi debent. Quando autem certò
tibi constabit, glandulam iam corruptam esse, atque
absumptam, (quod ex duritie & tumore crustæ indu-
ctæ deprehendes) tunc crusta à uiuo resoluenda erit,
admoto scilicet butyro loto, & momento farinæ tri-
ticæ inspissato, uel aliquo alio pingui & unctioso 30
non salito, ut axungia suilla. Vbi uerò crusta excide-
rit, si

rit, si quicquam adhuc ex glandula, lupia, aut struma remanserit, id absumendum erit erodente medicamento, ut puluere asphodelorum, aut unguento Aegyptiaco. At si nihil amplius supersit, more aliorum ulcerum ad cicatricem perducetur. Ut sexti canonis scopum assequaris, uinculo serico, aut crinibus equinis deligandi sunt huiusmodi abscessus, qui bases seu radices habent in angustum uenientes, atque in dies magis ac magis prioribus uinculis, aut nouis adhibitis, stringendi, donec scilicet resiccati appareant, & sponte sua (ut de insertis, ac maioribus uassis implexis diximus) excidant. Adiuuandum autem erit uinculum aliquo exedente medicamento & desiccante. Demulcendus quoque erit dolor oui candido, liquore rosaceo, unguento populeo, aut quouis alio doloris mitigatorio. Vbi autem sponte deciderint funiculi, modo quem supra explicuimus, persanentur. Atque hæc in uniuersum de abscessibus toto genere præter naturam consistentibus, à pituita præsertim ortum ducētibus, dicta sufficiant. Post quæ, non abs re factum putauimus, si propriam ac peculiarem meliceridum, steatomatum, ac atheromatum curandi rationem subiecerimus: hæc enim & frequentissimè nostris corporibus incidunt, & alias quasdam sub se tumorum præter naturam species seu differentias, nouis quibusdam, atque apud ueteres prorsus inauditis nominibus, à neotericks appellatas, complectuntur, ut talpam, testudinem, natam, & id genus alia, quæ in præcedētibus à nobis explicata sunt.

De curatione atheromatis, steatomatis, & meliceridis.

130 **I**N hisce tribus abscessuum generibus, quæ frequen-

L ij & melic=

Ligatura &
cuulio.

Quot, & quibus
modis curentur
prædicti ab-
cessus.

Curatio per di-
gencia.

Lib. 4.

Lib. 15.

Curatio per ex-
dencia.

Et meliceride; unum commune curationis consilium
est, ut quod tunica illa, quam cystim appellant, conti-
net, discutiatur, aut medicamentis totum una cum tu-
nica ipsa exedatur, aut sectione auferatur. Quidam
autem ex ijs tumoribus triplici hac ratione curantur,
ij nimirum qui liquidiorum humorem continent, qua-
lis est meliceris: aliqui duplici tantum, ut atheroma,
quod & sectione tollitur, & medicamentis exeditur.
Steatoma uero nec discuti, nec exedi potest, sed sola
manus opera, hoc est, sectione duntaxat, curatur. Por- 10
ro medicamentorum, quæ discutiendi ac dissipandi uim
habent in huiusmodi affectibus, materiam, inter hæc
quæ de strumk supra edocuimus, reperies. Priuatim
uero, ac proprie meliceridas dissipat Paulo, quod con-
tinet uuas passas exemptis acinis uiginti, squammæ
drachmas quatuor, parte fomentis prius nutrita im-
ponitur. Aliud emplastrum ad meliceridas, quod ad
Leonidam retulit Aëtius: accipit passularum detractis
uinaceis, libram unam, cuminu minutissimè triti, uncias
sex, nutri uncias tres: omnia simul in mortario subacta 20
conficito, & alligato. Aliud eiusdem discussorium ad
meliceridas, concipit salis ammoniaci, spumæ argenti,
cerussæ, singulorum lib. unam, ceræ, terebinthinæ, chal-
bani, oppanacis, singulorum unciam unam, rubricæ
sinopicæ unc. 6. aceti heminam, hoc est, unc. 7. & se-
missim: spumam argenti, cerussam, & sal ad exactum
leuorem tritum, simul decoquito, deinde rubricam prius
ex aceto tritam inijcito, & cum uniuersis liquabilia,
postremo omnibus simul confectis & refrigeratis,
opopanacem & chalbanum aceto soluta admisceto, 30
& utere. Cæterum si medicamentis exedentibus, quæ
Græci

Græci septica uocant, humorem in eiusmodi abscessibus absumere uolueris, eos sicuti etiam & strumas, medicamentis adurentibus cute superposita prius denu-
 dare expedit, è quorum numero (inquit Paulus) simpli-
 cius quidem est, quod constat calce uiua, id est, aqua
 non extincta, sapone, & cinere lixiuæ stillaticio. Lib. 4.

Aliud uarium magis, quodq; reconditum diu seruari
 pōt, capit calcis uiuæ drach. quatuor, sphecles, id est,
 feculæ uini combustæ, nitri liquidi tostæ, singulorum
 20 drach. duas, minij, seu rubricæ sinopicæ drach. unam;
 cinere lixiuij stillaticio teruntur: ubi ad mellis liqui-
 dioris crassitudinem reducta fuerint, ter seruefacito,
 ut mediocrem consistentiam habeat, & pixide plum-
 bea reponito, lixiuiam super distillans, ne citò nimis
 exarescat. Ergo circūfusam cutem eiusmodi medica-
 mentis crustam inducentibus, primū abrupto,
 postquā uerò crusta deciderit, exedentia adhibeto.

Erodit autem ualidè citra uellicationem & morsum,
 quod habet squammæ æris drachmas quatuor, sanda-
 20 rachæ, id est, arsenici rubri, drach. duas, ellebori ni-

Medicamentum
 ualidè exedens
 absque morsu.

gri tantūdem, cum rosaceo utitur. Aliud ad idem ual-
 de efficax: cynaccorum combustorum, testæ sepiæ,
 auripigmenti, singulorum æquale pondus, rosaceo mi-
 scentur. Sed quæ adiacent, atque in ambitu sunt par-
 tes omnes, prius cerussa cum oleo delinito. Verū enim
 uerò si tales abscessus chirurgico conatu, hoc est, se-
 ctione, curare uoluerimus, in ea quidem curandi ra-
 tione, siue pultaceus, siue melleus, siue adposus, siue
 cuiusdam alterius substantiæ humor in eis contentus

Curatio per chi-
 rurgiam.

30 fuerit, una nobis intentio perpetua est, ut scilicet tu-
 nicam quæ humor concluditur, auferamus. Sed dum

L iij hoc

hoc molimur, impenso studio cauendum est, ut de strumis supra diximus, ne temerè membrana uulneretur, aut dilaceretur, unde humor qui in ea continebatur effusus, operationem impediat, & portio ipsius relinquatur. Si enim dissecta tunica ac humore profuso, tumor subsederit, difficulter admodum tunica excoriari curariq; poterit. Si uerò humoris aliquid relictum sit, periculum est ne morbus reuiuiscat, & renascatur, quemadmodum & struma, cum portio ipsius relicta est. Quòd si tale quid incidit, melius est non consuere, & exedentibus medicamentis supra positis, aut consimilibus, reliquias absumere. Ceterum si steatomatosa latiore sit apice, basti uerò angustissima tenuissimaq; omnis reliquis alijs superuacaneis auxilijs, totum à radice ipsa amputandum est. Ita enim (inquit Aët.) chirurgicum opus expeditissimum erit, & ulcus parvissimum planumq; reddetur, et curatio breuissimè absoluetur.

Lib. 15.

De scirrholis tumoribus, ex atra bile creatis. Cap. XIII. 20



INXIMVS de tumoribus ex sanguine, flaua bile, & pituita excitatis: de uerrucis quoque, & ijs quos serosus humor, aut flatulentus spiritus procreauit: ad hæc, de abscessibus qui ex pituitosa substantia maximè ortum habent, atque alijs toto genere præter naturam consistentibus. Proinde reliquum est ut de ijs tumoribus agamus, quibus atra bilis, seu melancholicus succus generationis materiam præstat, cuiusmodi sunt scirrholi, id est, indurati tumores, 30

tumores, & cancerosi, quos cancras apostemofos uocant. Itaque scirrhi, sicuti & phlegmones, erysipelatis, & œdematis, gemina est recentioribus chirurgis differentia, uno scirrhi nomine comprehensa, nempe scirrhus uerus seu legitimus, & non uerus atque illegitimus. Porro uerus scirrhus seu legitimus illis appellatur, qui ex melancholia naturali procreatur.

Scirrhus duplex.

Est autem melancholia naturalis, boni sanguinis sæx, ac ueluti limosa quædam superfluitas, hoc est, crassior

Scirrhus legitimus.

Melancholia naturalis.

10 quidam sanguis, cuius color niger est, sapor uerò acerbus, uel acidus, ut uomentibus eum non rarò innotescit, in massa quidem sanguinaria (in qua humores uersi continentur) existens, alendis partibus melancholicis à natura factus. Scirrhus uerò non legitimus, iuxta neotericorum placita, is est qui ex melancholia non naturali procreatur. Est autem melancholia non naturalis, quæ à modò descripta naturali degenerat, intra tamen limites suæ latitudinis permanens: quos si prætergrediatur, non iam amplius (inquiunt)

Scirrhus illegitimus.

Melancholia non naturalis.

20 melancholia, sed alius humor dicetur. Verùm melancholia, si in uniuersum definiatur, humor est frigidus & siccus, ex crassiore (ut ait Guido) ipsius chyli portione progenitus. Cæterum, non naturalis melancholix quatuor differentiæ communiter statuuntur. Prima est, quando humor ipse melancholicus, qui naturalis dictus est, & quotidie gignitur in corpore dum animal sanitate fruitur, in propria sua essentia torretur adurit'ue, & putrescit, fitq; bilis atra exquisitè.

Non naturalis melancholia. 4. differentiæ.

40 Talis enim (ut ait Galenus) ex humore atro supra modum adusto conflatur, habetq; splendidum aliquid ueluti bitumen, & pix. Hæc autem (uerè inquam atque

Bilis atra exquisitè.

exquisite atra bilis nominata) acida est, & in terram effusa uelut acetum feruet, & ipsam fermenti ritu eleuat, tum omni animanti inuicunda, adeò, ut ne mures quidem ipsi, aut muscæ eam gustauerint, non magis quidem, quàm copiosum salem, in quo nullum animas uitam peragit, ut mare quod mortuum appellatur in-
 dicat. Porro tùm gignitur huiusmodi nigra bilis, cùm ille ueluti sanguinis limus, (quam melancholiam naturalem diximus) diutius moratur in corpore, & neq; per aliquem sensibilem effluxum, neque occultum ex-
 cernitur, uerùm transmutatur, corrumpitur, & putrescit. Siquidem (inquit Galenus) hic humor ubi amplius incaluerit, aut propter putredinem, aut febrem inflammantem, nigram efficit bilem. Quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris non expers, quæ admodum & cinis, & acetum, apparetq; dum per alium (ut contingit aliquando dysentericis) excernitur, splendidior ac nigrior ipso sanguine crassiore & nigriore, quem humorem melancholicum appellamus. Splendet enim ueluti mortui maris bitumen, quod lu-
 daicum uocant. Secunda species, seu differentia bilis atræ non naturalis est, quæ ex adustione aliorum humorum nascitur, ut illa quæ fit ex flaua bile uehementer usta. Quæ etiamnum tantæ est malitiæ, ut & terram radat, & eam, more bilis exquisite atræ, in altum attollat. Sed & muscæ ipsam, non secus quàm uerè nigram bilem, refugiunt. Si sanguis quoque aut pituita in corpore uehementer incaluerint, & exurantur, efficitur etiam melancholicus humor, non naturalis per adustionem dictus, ut uoluit Auicennas. Verùm due
 istæ postrimæ species (quæ scilicet per sanguinis aut pituitæ

Ex inmodicè
 afflato sanguine
 melancholico,
 fieri bilem ex-
 quisitè nigram.
 Lib. 14. Tbe-
 rap. & lib. de
 atra bile.
 Gal. com. 21.
 Lib. 4. apb.
 Lib. 14. Tbe-
 rap.

Bilis atra ex
 adustione alio-
 rum humorum.

pituitæ affationem fiunt) Auicennæ mitiores sunt.

Scribit autem Galenus illam bilis atræ speciem, quæ ex flaua bile uehementer affata generatur, deterio-
rem esse, quàm ea quæ ex crassiore sanguine genera-
tionem habet, qui subsidenti in dolio uini sæcula aut
amurcæ, hoc est, feci olei proportionem respondet. Hæc
enim mitior est, sed potissimum, quoties nondum tra-
xit in animali moram cum aliquo calore abundanti
præter naturam. Verùm priusquàm in exactam atram

Comen. 29. Kb.
3. prædictionū
Hippoc.

1. bilem transmutetur, primò in uitellinam, secundò in
porraceam, tertio in æruginosam transit. Tertia spe-
cies melancholiæ non naturalis, est quæ originem for-
titur à lapidosa quadam concretionem, ut cum ab im-
peritis medicis uel chirurgis, erysipelata, & inflam-
mationes (quas Græci phlegmonas uocant) aut quilibet
alij tumores ex naturalibus humoribus procreati, ad-
motis extrinsecus præsidij, nimis uehementer refri-
gerantur, astringunturq; : uel cum iisdem tumoribus,
ea quæ ualenter nimis trahunt, digeruntq; medicamen-

Bilis atra per
cōgelationē (ut
uocant) & in-
durationem.

2. ta, adplicantur. Tunc enim toto, quod in eis subtilissi-
mum erat, dissipato, id quod reliquum est (nempe cras-
sius) plus iusto desiccatur, lapidis duritiem conseque-
tur, atque in melancholicum humorem uertetur. Quar-
ta melancholiæ nō naturalis differentia exurgit, quan-
do alius humor ipsi melācholiæ naturali permiscetur.
Quod dum fit, dulcoratur, ac mitescit magis, nisi dū
alterutra bilis adusta, huic commiscetur. Siquidem
tunc uel accessit, uel amarescit, & erosionis non modi-
cæ particeps efficitur. Ex præcedentibus igitur col-

Bilis extra ex
admixture.

3. ligere licet, quatuor tumorum præter naturam diffe-
rentias nasci ex melancholia, seu atribilario humo-

Quatuor tumo-
rum differentias
fieri ex melan-
cholia.

re. Primo

re. Primò namque ex melancholia naturali(quã quodidie gigni in sanis diximus) fit uerus , ac legitimus scirrhus , apud Arabes sephiros nominatus , Græcis uerò σκίρρῳς, & σκληρὸς ἢ ἀκριβὴς, hoc est, *Verus scirrhus non exactus, seu non exquisitus.* scirrhus non exactus, seu non exquisitus, qui tumor quidem est prædurus, & doloris expers, non omninò tamen insensibilis. Auicennæ impurus appellatur. Galenus tamen libro decimoquarto metho. med. tumorem ex humore melancholico conflatum, tunc propriè scirrhum, his qui de nominibus contendunt, condonat esse appellandum, cum omninò sensus est expers. Cum uerò nondum omninò factus est insensibilis, scirrhum sum potius tumorem, quàm scirrhum(si uelint) nominari. Secùdò ex melancholia non naturali dicta per admixtionem, tres aliæ tumorum differentie enascuntur: nempe scirrhus phlegmonodes, œdematodes, & erysipelatodes, quæ pro una tantùm differentia, hic numerantur. Tertiò ex melancholia nò naturali facta per lapidosam quandam concretionem, generatur σκληρὸς ἀκριβὴς, id est, scirrhus exquisitus uel exactus, durus quidem, & omninò sensus atque doloris expers, ab Auicenna purus nominatus, qui curatione non admittit. Quartò ex melancholia non naturali per deustionem omnes cancerorum species procreantur, tam ulcerati scilicet quàm non ulcerati, de quorum genere est scirrhus canerosus nominatus. Itaque scirrhus propriè dictus, tumor est durus & indolens, non tamen omninò sine sensu, ab humore melancholico naturali, & minimè corrupto procreatus, ut recentiores definiunt chirurgi.

De causis, signis, & iudicijs, scirrhi legitimi.

Causæ scirrhi, ut & aliorum tumorum præter naturam, triplices sunt. Primitiua scilicet, ut est praua uiuendi ratio, crassum & melancholicum sanguinem generans, coaceruansq; Antecedens, ut succus melancholicus in corpore collectus, à liene (cuius officium est hepar à crasso illo, & luto sanguine expurgare) malè attractus, & extra corpus minimè, ut debebat, expulsus. Coniunctæ, humor ipse melancholi-

Causæ scirrhi legitimi tres.

Nota scirrhi.

10 **cus in laborante particula impactus.** Signa ipsius scirrhi præsentis, Guidoni sunt, tumor durus & ualenter renitens, color inter rubrum & nigrum medius, cuiusmodi color fuscus est. Hunc cum in corporis partibus sæpe incidat, plerique medicorum (ut Galenus inquit) pelidnon, hoc est, liuidum uocant. Ad hæc, si uenas euidentiores membrum laborans habet, exaltatas eas à crasso, & nigriore quodammodo sanguine, cuiusmodi per aluum aliquando non paucis hepaticorum excernitur, uidere licebit. Sed iam scirrhus impurus, &

14. metho. med.

20 **cancerosus erit.** Hæ enim notæ, quas hic ad scirrhum accommodat Guido, canceri propriè sunt notæ apud Galenum lib. 14. meth. Non ineptè tamè scirrhus adaptari possunt, hoc uno dempto, quòd uenas tumentes, & exaltatas non habet scirrhus, ut cancer, nisi scirrhus fuerit (ut diximus) cancerosus. Quippe non rarò scirrhus in cancerum degenerat, cum ab eadem fiant materia, succo scilicet melancholico. Propriè igitur scirrhi legitimi notæ sunt, tumor durus pertinaxq; ac tactui resistens, in quo & hebes sensus adest. Adde, quòd &

30 **aliæ notæ apparent, quæ melancholicum humorem in corpore subesse testantur.** Tumores uerè scirrhosi ab

Guido notas canceri tribuit scirrbo.

Iudicia scirrhi.

initio,

initio, et dum adhuc prima rudimenta concipiunt, magna ex parte exigui apparere solent, procedente uero tempore, paulatim augentur, & maiores fiunt. Ex ijs quidam unum dumtaxat membrum occupant. Alij uero eo membro, quod prius infestabant, relicto, ad aliud postea transferuntur. Quod dum fit, nominatur tunc uitium ferinos Auicennæ. Præterea huiusmodi tumores melancholici, ut plurimum si rite tractentur, resolutione terminantur, nonnuquam indurata manent, et non raro in cancrum (quod pessimum est) degenerant, ac transmutantur.

Ferinos.

Veri ac legitimi scirrbi, non tamen exquisiti, & in topheam duritiem omnino insensilem concreti, curatio.

Tres intentiones in curatione scirrbi legitimi obseruandæ.

Cæterum absolutam indurationem huiusmodi tumorum præter naturam, qui ueri scirrbi, non tamen exquisiti nominantur, curationem tribus intentionibus assequemur. Prima conuenientem uiuendi normam præscribit. Secunda materiam antecedentem, seu præcedentem, (id est, quæ parata est statim morbum efficere) tollendam monet. Tertia coniunctæ (ut uocant) materiæ, & morbum iam committentis uacuationem moliendam esse nobis insinuat. Itaque (ut in uniuersum dicatur) uitam eorum qui scirrbo laborant, sobriam & moderatam, & quæ ad calidum & humidum declinet, in rebus seu (ut dicunt) non naturalibus instituito. Ergo alimenta euchyma, id est, boni succi, & probû sanguinem generantia exhibeto. Panem igitur triticeum, probe subactum, & moderato igne in furno coctum, quicquid fermenti aliquid habeat, & salis quod satis est,

Viuenti ratio.

Euchyma.

Panis optimus.

tis est, præscribito. Vinum substantia tenue, & odora-
tum deligito: crassum uerò, nigrumq; uitato. Oua for-
bilia, pullos, capos, gallinas & eorum iura præbeto.
Perdices, phasiani, coturnices, capreoli iuuenes, uituli
lactantes, & anniculi uerueces, laboranti in delitijs
sunt. Ex oleribus, id quod Arabes aspanar, nos uerò
nomine paulum mutato, spinacium diximus: lactucas
item, lupulum, boraginem, & buglossum, atque id ge-
nus alia, quæ sanguinem expurgant, & puriorem red-

Vinum.

Oua.
Carnea.

Olera.

Carnea.

Leporum.

Limaces.

Pisces.

Olera.

ὄξυλον fit ex
aceto, & sale.

Legumina.

Panis,
Typha exilis est
triticeum, specie
filigini non dis-
simile.
Vinum.

- 1 o dunt, ne aspernator. In summa, ea omnia quæ sangui-
nem melancholicum suapte natura pariunt, fugito. Ea
autem Galeno libro tertio de locis affectis capite sex-
to ferè sunt, caprina, bubulaq; caro, magisq; hircina,
& taurina. Sed maximè asinorum, camelorumq; car-
nes: item uulpinæ, caninæq;. Leporum quoque, sed mul-
tò magis aprorum. Præterea limaces, si frequens sit
eorum usus: atque omnes terrestriū animalium carnes
sale conditæ. Aquatiliū quoque carnes, ut tibunni, ba-
lenæ, uituli marini, delphini, canis atque cetaceorum
- 2 o omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola huiusmo-
di sanguinem gignere consuevit: quemadmodum &
arborum germina, ubi uel muria uel oxalme condiun-
tur, præcipuè lentisci, terebinthi, rubi, & rubi canini,
qui Græcis cynosbatos appellatur. Leguminum uerò
omnium maximè lentes inter melancholicos cibos nu-
merantur. Mox panis fursuraceus, & qui ex typha
atque uitatis seminibus factus est, quorū apud quas-
dam nationes usus, loco frumenti habetur. Præterea
uina crassa, nigraq; aptissima sunt, ut ex ipsis melan-
cholicus humor fiat: præsertim, si quis abundè ipsa ui-
gerens, oblata occasione in multo calore corpus conti-
neat.

Casus. neat. Vetus denique casus, ubi forte fortuna in corpore fuerit supercalesfactus, facile huiusmodi parit humorem. Hæc ex Galeno hætenus. Cauendum insuper est, à retorridis, asis quoque, & frixis uehementer exiccatis. Item salitis, acidis, & acribus (ueluti sunt allia, cepe, piper, sinapi) & alijs id genus omnibus, quæ sanguinem adurunt. Vitare etiam oportet iram, moroseiciā, iugilias, sollicitudines, atque immoderatas exercitationes. Animi tranquillitas, ac lætitia magnopere est expetenda: summaque ope nitendum, ut quotidie uenter deiiciat. Hætenus de primo scopo. Ut autem quod secundus scopus nobis proponit, consequamur, præcipit Auicennas, corpus uniuersum uacuandum esse, tum uenæ sectione, si sanguis niger admodum, & crassus apparuerit: tum medicamento purgante, quod bilem atram exigat: cuiusmodi sunt Mesuæ, epithimum, senna, polypodium, fumus terræ, (qui Græcis capnos uel capnios, & fumaria Latine appellatur.) lupulus, uolubilis. Item castia fistula, myrobalani indilapisi lazuli, qui Græcis cyaneus, Romanis ceruleus dicitur, diasene, diacatholicum, hiera Ruffi. Hæc enim omnia humores melancholicos per aluum expurgant. Sed hæc, quæ ad pharmaceuticam & dieteticam attinent, chirurgi metas excedunt. His igitur medicæ artis professoribus relictis, ad tertium scopum properabimus, quem sanè nos assequemur, si quod præter naturam in particula est: totum uacuetur. Quæ communis quidem ac prima indicatio est, omnium qui præter naturam consistunt tumorum, in quibus utique adhuc non sunt geniti pori. Modus autem uacuationis eius prius est, circa quem circumspectum, & maxime attendi

tum

tum esse curantem oportet. Siquidem materia eiusmodi tumorum naturæ tam malignæ est, ut in duritiem ueluti lapideam abeat, si temerè resoluitur. Si uerò plus quàm par est eam emollias, periculum sanè imminet, ne ipsa corrumpatur, & scirrhus in cancrum degeneret. Sequendum igitur in hac re Galeni ac Pauli, (qui de hac re ante Auicennam scripserunt) consilium est: nempe ut scirrhis ipsis affectibus, nullum uehementer excalfaciens siccansq; medicamentum appli-

Materia scirrhorum causa tractanda.

1 ° cetur. Nullum item quod duntaxat emolliendi, atque humectandi uim obtineat. Quod enim (inquit Galenus libro secundo ad Glauconem) superfluum humorem habet, nihil omninò dissoluit: quod uerò minimum, plus quàm oportet, exiccat. Hinc non omninò absurdè præcipiebat Auicennas, alternatis uicibus ad hos induratos tumores, modò emollientibus, modò digerentibus per halitum, utendum esse. Verum quoniam id & tædiosum, & factu, ut oportet, perdifficile est, satius ac tutius Galeno uisum est, medicamentis mixtâ

Galenus.

Medicamenta scirrhis accommodata.

2 ° facultatem habentibus, ad horum curationem utendum esse. Eodem enim tempore, quod induratum est molliemus, & sensim per halitum digeremus. Illis tamen ab initio, aliquid quod modicè reprimat, erit admiscendū. Porro ad hanc intentionem Auicennas, quamplurimas remediorum formulas instituit: uerum quoniam ea magis dicata sunt scirrhis ex pblegmone, aut erysipelate impendio refrigeratis (ut in sequenti capite ostendemus) procreatis, illis relictis, assume medicamentum à Rase libro septimo ad Almansorem descriptum: facta

3 ° tamen prius ab initio aliquali influentium humorum (domesticis quibusdam repellentibus admotis) repressio.

Rasis medica-
mentum ad scir-
rhus emollien-
dos & discu-
tiendos.

Galenī cata-
plasma. 24.
Therap.

Si scirrhus ad
suppurationem
speciet.

sione. Rasis autem medicamentum ad hunc modum
habet: Accipe bdellij, ammoniaci, galbani, singulorum
partes æquales: terantur in mortario cum oleo de ben
(quod Græci balanum myrepsicen, Latini glandem
unguentariam uocant) aut de lilio. Deinde sume mucila-
ginum sœ nigræci, seminis lini, & ficuum, pondus om-
nium prædictorum: terantur omnia simul, donec in
unum coëant, & fiat emplastrum. Galenus ad eam
rem magnoperè commendat corticem radicis altheæ
(quam, inquit, uulgus anadendromalachen, quasi dicas, 10
arborescentem maluam uocat) anserino, uel gallinaceo
adipe liquatam, & cum eo contusam, atque in cata-
plasmatis formam redactam. Quòd si tumor ad sup-
purationem speciet, summoperè cauendum est, ne par-
ticula laborans calorificis auxilijs, aut quouis alio mo-
do irriteretur: ita enim facile cancer accerseretur. Si
uerò aperiatur tumor, materia iam in pus conuersa,
ab usu unguenti, quod diachylon nominatur, minime
tibi discedendum fuerit. At si in lapideam duritiem
degenerauerit, ad ea auxilia quæ sequenti capite 20
describentur, erit recurrendum.

De scirrho illegitimo non exquisito, ex uehementi
refrigeratione, aut exiccatione
originem sortito.

Scirrhus illegi-
mus quomodo
generetur.

Quando medicorum imperitia, inflammatio-
nes, (quas Græci phlegmonas appellat) aut
eryspelata impendiò refrigerantur, & ad
stringuntur, aut admotis medicamentis, uehementer
trahentibus, & per balitum digerentibus, temerè resol- 30
uuntur, tunc totum id quod in eis tenuè magis, ac subti-
le erat

le erat dissoluitur, dissipaturq;: quod uerò reliquū est, uelut congelatur, atque impensius resiccatur, lapideam duritiem assequitur, sitq; tandem affectus, qui Græcis scirrhusis nōcatur. Cæterum contingit quandoque particulam aliquam indurari propter tensionē, quam sustinet ex flatibus, aut humore quopiam aquoso, ut supra dictum est, dum de tumoribus flatusosis & aquosis ageretur. Nonnunquam & tephacea durities in particulis quibusdam oboritur, propter priuationē humiditatis, & nimiam desiccationem, ut in duritiā iuncturarum, et poris, in articularijs morbis ac doloribus, procreatis. Verumenimuerò hīc duntaxat agemus de scirrhis, seu induratis tumoribus, qui ex phlegmone, aut erysipellate, paulò antè commemorato, ortū traxerunt, aut etiam ex œdemate impendiō refrigerato, & adstricto. Atque eos non absurdè scirrhos ex coincidentia procreatos nominauerimus.

Duritiæ in particulis causæ.

- 20 De signis & iudicijs scirrhi non legitimi, ac non prorsus exquisiti, ex coincidentia creati.

Scirrhi non ueri seu illegitimi, & non omnino exacti, notæ sunt, tumor durus, uix sensibilis, id est, quasi sensus & doloris expers, corporis colorē ad unguē representans, ex melancholia non naturali ortū ducens. Hic nec prorsus incurabilis est, nec facilē sanē curationem admittit. Siquidē humor, unde huiusmodi uitium cōtrahitur, lentus seu glutinosus, crassusq; est: aut (ut Galenus ait) utriusque rationis particeps, qui particulis induratis infarctus, solui cōtumaciter repugnat. Vbi præsertim resoluta ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquū est, exiccatur lapidosumq; efficitur.

Scirrhi illegitimi. & non exquisiti notæ. Iudicia.

Scirrbus exqui-
situs curationē
non admittit.

Scirrhi incur-
biles.

Summa curan-
dorum scirrbo-
rum.

Medulla.
Seua.

Scirrbus uerò exquisitus, & qui omninò sensu uacat, curationem non recipit. Si tamen aliquo modo iuuari possit, humectandi ratione id præstari debet. Durities quoque ex nimia exiccatione, & marasmo, hoc est, cōsumata prorsus siccitate, insanabilis est: satis enim est prohibere, ne ultra siccitas procedat. Sed & scirrhi in quibus pili enascuntur, quiq; magni sunt, ac uehementer duri, & corporis colorem referunt: nec sanantur, nec unquam permutantur, ut scriptum reliquit Auicennas.

Curatio scirrhi illegitimi, & non exquisiti.

Curandi uerò eius communis indicatio est, ut quod præter naturam in particula est, totum uacuetur. Modus tamen uacuationis eius proprius est, ut lib. 14. meth. Galenus annotauit. Nam detergere (inquit) id quod contumaciter inhaeret, oportebit. Quòd si quis ijs quæ uehementer trahunt, digeruntq; medicamentis uacuare tentet, nec ijs quæ excalfaciant & humectent, molliat ac liquet: huic paucis primis diebus egregiè processisse curatio uidebitur: scirrhus enim manifestò decreuisse apparebit. Ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit: siquidem toto, quod in eo tenuium partium erat, digesto dissipato ue, quod reliquum est, ueluti lapidosa concretio linquitur. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum uehementer excalfaciens, siccans ue medicamentum idoneum est. Sed ea tantum, quæ cum molliendo, hoc est, præter quod molliant, digerere etiam commodè possunt. Cuiusmodi sunt, tum ceruina medulla, tum uitulina, tum seuum hircinum, taurinum, pardale, & leoninum.

ninum. Ex adipibus uolucrum commendatur imprimis anserina, quam proximè sequitur gallinacea, & phasianica. Adhæc, ammoniacum thymiana, id est, suffimen, galbanum, & bdellium utrunque, magisq; Scythicum, quantò uidelicet est humentius. Styrax quoque qui humentior est, & pinguis. Radix etiam altheæ, quam uulgi more anadendromalachen, id est, arbore-scentem, siue arboream maluam, (quòd aliè à terra erigatur, & in hortis consita, arbore-scat) Galenus appel-

Adipes.

Gal. 14. meth. med. Anadendromalache.

1 o lauit: & sylvestris maluæ, quæ passim nascitur, folia, modicè antè decocta, cum anserino adipe aut gallinaceo, uel si horum facultas non sit, suillo contusa, ad hanc intentionem apprimè sunt idonea. Prohibet autem Auicennas axungias salitas, & prædictis addit mastichen, ladanum, cespum humidam, strygmenta gymnastorum, quæ sordities balneorum appellant, ster-cus asininum, & fæces oleorum de lilio, de alchanna, quod cyprinum uocant, et de cherua, quod Græcis κί-κιστον, Latinis uerò ricinum dicitur. Cæterum cura

Strigmētis gym-nastorum.

Oleum ricinini. 14. meth. med.

2 o tio quæ per acetum administratur, utilis est huic uitio, hoc est, scirrhus iam adulto, et cum præparata iam sub mollientibus pars fuerit, ut etiam Galenus annotauit. Siquidem (inquit) aceti uis, modò ea quis modicè & debito tempore utatur, salutaris eiusmodi affectibus est, seu crassos humores diffecans, ac resoluens. Sin uel immoderatus, uel in tempore non idoneo, tenuiores partes uiolenter absumens, id quod reliquum est, lapidescere sinit. Sed & si quis eo diutius utatur, substantiam ipsam neruorum delibauerit. Ob id igitur nec sepe ac inter initia, nec longo tempore, medicamentis quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones est

De aceti usu in uarijs scirrhis partibus.

Lib. 2. ad Glau-
cenem.

Oleum sabinū.

Tendonum &
ligamentorum scir-
rhoformum cura-
tio ex Galen. &
Paul.

Lib. 14. The.
& 2 ad Glau.
Pyrites lapis.
Lapis mylites.

2 ad Glau.

utendum. Eam ob rem Galenus Cercilij puerum, cui
ex erysipelate nimis infrigidato, & uehementer ad-
siccato, tumor durus ac scirrhus in toto femore reli-
ctus fuerat, ita curabat. Imprimis femur perfudit oleo
sabinō, quod omnium est tenuissimum: cuius loco hodie
utuntur oleo sambacino, quod uulgo isfminum uocat.
Postquam uerò partem sic fouisset, ammoniacum thy-
miama, hoc est, suffimentum, quod pingue, & non ue-
tustum esset, prædictis medullis, & adipibus remixtū
adhibuit. Post hæc ammoniaco pinguisimo, aceto acer-
rimo dissoluto, circumleuit totū femur, iussitq; puerū
altero crure salire, quò plus in id alimenti ferretur. Ita
que relaxantibus, quæ molliorem tumorem reddebant,
& digerentibus, seu resoluentibus ita uicissim ac mo-
deratè utendo, puerum curauit. Verum in tendonibus,
ligamenti scirrhus obductis, aceto ex Galeni consilio
ad hunc modum utendum est. Lapis igne candens, ace-
to acerrimo extinguendus est, & siquidem haberi po-
test, pyrites: sin eius copia non est, molaris, quem Græ-
ci mylitem uocant. Deinde ascendente post infusum la-
pidi acetum uapore calido, in hoc pars affecta commo-
uari debet, ut uaporem ascendentem recipiat, à quo
scirrhus dissoluatur: atque exinde rursus medicamen-
tum quod emolliat, imponendum. Oleo tamen, non aqua
quotidie ab initio omnino laborans particula perfundē-
da est. Esto autem id oleum haudquaquam adstringens,
sed planè tenuium partium, cuiusmodi sabinum est. In-
terdum autem incoquenda oleo est, altheæ radix, ac
sylvestris cucumeris, & si qua est eius generis alia. Sa-
nè plurimi hac curationis ratione pauco tempore per-
fectè sanati sunt, adeò ut multis ferè (inquit Galenus)
magicum

magicum opus uideretur. Ex his igitur constat, curationi quæ per mollientia fit, tum in tendonibus, tum in ligamentis, cum scirrhus fuerint, aliquid incidentium debere admisceri. Ex quorum numero uel im- Lib. 6.
primis acetum est. De medicamentis autem, quæ uim molliendi durities obtinent, diffusius alibi tractabimus.

Capita curationis scirrhorum tumorum.

10 **S**cirrhum, qui resoluta atque absumpta humiditas
ste, in tophaceam duritiem concreuit, sensuq; omnino caret, cuiusmodi est, quem exquisitum Galenus uocat, tanquam immedicabilem curare ne aggreditor.

Scirrho non exquisito (qui non sine sensu quidem, omnino est, sed ægrè admodum sentit) medicamenta, quæ tepido calore, ac mediocri humore prædita sunt, hoc est, quæ emolliendo moderatè digerant, adhibeto.

Vehementer digerentia, atque immodicè exiccantia partibus scirrho laborantibus, ne unquam admouetorij. enim subtilior humiditas resoluitur, quod uerò
20 reliquum est, exiccatum lapidosumq; efficitur.

In duris ac densis partibus scirrho obsessis, cuiusmodi sunt tendones, atque alijs etiam in locis, si affectus iam inueteratus est, medicamenta quæ dissecant, atque incidant, cuius generis est acetum, emollientibus & moderatè digerentibus misceto.

Scirrhosam quoque partem hanc, durā ac densam, & quamuis aliam diuturno scirrho affectam. super uaporem calidum, quem molaris lapis, id est, quo frumentum molimus, igni candens, acerrimo aceto persusus,
20 emittit, collocari subindeq; uersari iubeto.

Quotidie etiam oleo aliquo tenuium partium, in quo

cucumeris sylvestris, aut altheæ radix, aut anethum uide & recens, aut id genus aliud incoctum fuerit, affe-
ctam partem perfundito.

7 Eiusmodi desiccata incidentia, ac crassos humores resoluentia, modicè, id est, non saepe, nec longo tempo-
re, atque opportunè, hoc est, non inter morbi initia, &
interposito remollientium usu, prædictis scirrhis par-
tibus admovento.

8 In summa, scirrhus omnes, qui nondum callū contra-
xerunt, medicamentis, quæ commodè digerendo emol-
luunt, curato.

9 Scirrhus lienis, atque etiā iecinoris curationem, me-
dicorum prudentiæ committito.

De cancroso tumore, quem uulgò can-
crum apostematofum uocant.

Cap. XV.

Cancer nomen ad
duo morborū ge-
nera extenditur.



CANCRI nomen, medicis & chirurgis æquiuocum est: eius enim significatio ad 20
duo morborum genera extenditur. Nempe
ad cancrosum tumorem (quem uulgò cancerum aposte-
matofum uocant) tam euidentem, hoc est, in summa cor-
poris parte hærentem, quàm absconditum, hoc est, in
penitioribus & latentibus corporis partibus, ut in se-
de, palato, aut sinu muliebri conditum: & ad cancerum
ulceratum. Porro uterque affectus gignitur ex atra bi-
le, seu melancholico humore, hoc est, eiusmodi naturæ
succo, cuiusmodi est fex in uino, & amurca in oleo, ut
14. Therapeutices, & libello de tumoribus præter na- 30
turam, Galenus testatum reliquit. Vbi autem mitior

Cancer ex quo
humore gigna-
tur.

fuerit

fuerit humor huiusmodi melancholicus, latentem seu occultum, ut appellant, cancrū sine ulcere progignit. Si uerò acrior maligniorq; contingat, cutim erodit, & cancrum facit cum ulcere, de quo in sequentibus dicemus, quando scilicet de ulceribus agemus. Hic autem solum sermonem faciemus de cancro non abdito, id est, in extimis partibus constituto, & nondum exulcerato, qui & ipse quandoque occultus Galeno dicitur.

Cancer sine
ulcere.
Cancer cum
ulcere.

Est igitur cancer, quo de hic agitur, tumor durus, inæqualis, rotundus, uenosus, id est, uenas habens in circuitu turgidas & exaltatas: liuescens, siue fuscus, & (ut Paulus ait) colore magis, quàm inflammationes, nigricans: calidus, sed non adeò, ut inflammationes: subito accrescens, egros maximè fatigans, & perpetuo ferè dolore affligens, Græcè καρκίνος & καρκίνωμα dicitur. Hanc autè appellationē huic morbo indiderunt tam Græci, quàm Latini, à cancro aquatico animali, quoniā circa hunc implètur & intèduntur uenæ, cancrorum pedibus, à glomere illo corporis descendentiæ

Cancerosi tumo-
ri descriptio.

bus, persimiles. Nonnulli uerò inde sic nuncuparunt, quòd difficillimè ab his partibus, quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animans. Hic enim loco, quem semel apprehenderit, pertinaciter hæret. Adde quòd & hic tumor cancri animalis colorem representat, nempe subnigrum. Caterum prima cancri istiusmodi rudimenta, tam confusa interdum exiguasq; sunt, ut uulgus ipsum latere possint: uix enim dum adhuc incipit, ciccris aut fabæ magnitudinem æquat. Quare nihil miri est (inquit Galenus) si uulgus tunc lateat, non secùs profectò quàm stirpes, quæ è terra iam exeunt: quando hæ quoque peritis tantum agri

Quare cācri no-
men hoc uitium
sibi adoptara.

Cācri notæ per
initia cōfusa at-
que obscuræ.

Lib. 14. The-
rap. med.

colis agnoscuntur. Postea uero in tantam molem attol-
litur, tamq; uehementia, & magna, & cunctis euiden-
tia adfert symptomata, ut ne puerum quidem clam
sint. Itaque tunc nemo de appellatione ambigit, sed no-
minant uno assensu omnes eiusmodi affectum, canceru:
quoniam (ut diximus) uenae in hoc morbo ex utraque
parte intumescunt, distendunturq; ac figuram omnino
similem cancro representant.

Signa & iudicia canceri euidens, & non ulcerati.

Nota cācri eui-
dētis nō ulce-
rati.

Cancerosus tumor (ut superius dictum est) duritiē
habet, & inaequalitatem, quae tactu facile depre-
henditur. Colorem praese fert liuidum, qui inter ru-
brum & nigrum medius est, Graeci pelidnon uocant.
Circa locum cancro affectum, aliqua quasi puncta sen-
tiuntur: interdum etiam torpet Celsus. Venas ostendit
in circuitu tumentes & exaltatas, canceri animantis
pedum modo. Nonnunquam etiam in quibusdam deli-
tescunt. Tactusq; is locus, alijs dolorem adfert, in alijs
cum non habet. Renixus quoque huc tumori ualens
est Galeno. 14. Therapeut. Ad haec, extraneam quan-
dam caliditatem habet. Cancer, seu carcinoma à toto
genere morbus est grauis, & perniciosus. Vix enim
uiquam propter succi crassitiem consanescit, utpote
quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis
purgatione cedat. Sed & tanta eius uitij est maligni-
tas, ut mitiora plane contemnat remedia, illisq; (ut di-
ci solet) medium unguem porrigat: uehementioribus
uero, ueluti crabro irritetur, excandescatq;, atque
effretur. Id uitium in qualibet corporis parte oriri
consuevit, sed maxime (ut Celsus ait) in partibus supe-
rioribus

Iudicia.

Lib. 5.

- rioribus circa faciem, nares, aures, labra, & mammas
fœminarum, atque earum præcipue, quæ à natura pur-
gationem menstruorum non habent. Sed & uiris plæ-
runque accidunt cancri, quibus assuetæ per mariscas
purgationes suppressæ sunt: per has enim turbidus, ac
crassior sanguis (unde prima uitium hoc rudimenta
accipit) expurgari à natura consuevit. Porro cum hu-
mor ipse melancholicus fœci uinariæ proportionem re-
spondens, in particulam aliquam desluit, ibiq; impactus
1^o manet: interdum uarices facit, aliquando uerò cancrum,
ut pote cum ipse deferbuerit. Cum uerò ad cutim uni-
uersam expellitur, fit is morbus, quem elephantem no-
minant, ut lib. 2. ad Glauconem Galenus annotauit.
Est itaque cancer particularis quedam elephantiasis,
quam uulgus malè lepram appellat. Quantò autem
sanguis, ex quo ortum habet cancer, crassior fuerit, ac-
nigrior, tantò (inquit Galenus) deterior passio erit. Cã-
cer autem confirmatus (ut dicitur) atque inueteratus,
curationem nõ admittit, nisi radicitus extirpetur, aut
2^o per sectionem scilicet, aut per uisionem: uerum qui in
penitioribus corporis partibus constituti sunt cancri,
talem curationem non desyderant, ut sequente apho-
rismo nos edocuit senior ille, medicorum facile prin-
3^o cept Hippocrates, inquiens: Cancros occultos omnes
melius est non curare: curati enim citius pereunt, non
curati uerò longius tempus perdurant. Experientia
nanque (ut in commentario huius aphorismi Galenus
testatur) compertum est, omnes qui huiusmodi cancos
sectione, aut uisione curare tentarunt, illos magis ir-
3^o ritasse, & breui homines interemisse. Soli itaque cari-
cri illi curationem huiusmodi admittunt Galeno, qui
in summa

Galenus lib. 2.
ad Glauc.

Aph. 38. lib. 6.

Qui canerem
dicitur tolli de-
beat, & qui nõ.

Radices cæcri.

Cæcer exulceratus pessimus affectus.

Quæ nota in cæcro futurâ exulcerationem portendant.

Triplex curando cancro scopus proponitur.

in summa corporis parte hæret, quiq; exulcerati sunt, & adeo laborantes fatigant, ut ipsi ultrò chirurgi manum efflagitent : & simul in talibus partibus consistant, quas refecare & exurere unâ cum radicibus possis. Voco autem radices cancri cum Galeno, eas, quæ plenæ sunt sanguine melancholico, uenas, & undique uersum ad loca circumstantia extenduntur. Cæterum ex cancro non ulcerato, non raro fit ulceratus, putrescente scilicet spacio temporis humore, in uasis delitescente, uel irritato à medicamentis inconsulte admotis affectu. Hûc autem exulceratum cancrum pessimum esse iudicant omnes, & ueræ curationi (quæ omnia molitur, & agit, ut laborans particula ad sanitatem perducatur) prorsus ineptum. Hic enim ad perfectam atque absolutam sui curationem, mordetia, aspera, ac uehementia desyderaret medicamenta. At qui (ut diximus) talibus magis irritatur, efferturq; tantum abest ut sub ijs uel mitescat, uel consanescat. Proinde satis fuerit, si cancos non ulceratos, etiamnû summa corporis occupantes, præsertim maiores, & iam inueteratos, prohibeamus augeri, à perfecta quidẽ curatione manum subtrahentes. Quod & superiore aphorismo nos commonuit Hippocrates : cancos enim eos, qui sine exulceratione fatigant, etiam (Galeno autore) occultos nominauit. In quibus sanè exulcerationem minantur, uehemens caliditas, & pulsatio.

Curatio cancri non exulcerati adhuc incipientis, & nondum inueterati, summa corporis occupantis.

Curatio cancri non exulcerati, & adhuc recens
tis, tres habet scopos præcipuos. Primus est,
humoris

humoris melancholici generationem prohibere. Secundus est, succum melancholicum per totum corpus dispersum uacuare. Tertius, humorem qui locum affe-
 flum occupat, uel reuerendum, uel digerendum omni-
 nò, adhæc, particula laboranti robur adferendum esse
 insinuat. Primus scopus, seu prima intentio, quæ est
 prohibere, si fieri potest, ne de cætero succus melan-
 cholicus in uenis colligatur, perficitur ea uiuendi ra-
 tione ad unguem obseruata, quæ supra in capite de

Primus sco-
 pus.

1. Scirrhus legitimo nominato præscripta est. Id autem
 inter cætera maximè ac præcipuè obseruandum est,
 ut ijs qui hoc affectu laborant, ea alimenta offeran-
 tur, quæ refrigerandi, atque humectandi uim sortita
 sunt: quæq; probum ac tenuem succum in corpus
 ingesta, generant. Cuiusmodi sunt cremor hordei, pi-
 sces saxatiles, omnis generis aues, præterquàm palu-
 stres: ouorū. sed maximè sorbiliū (quæ Græci ποφύρον
 uocant) lutea, & quæ eius generis sunt alia. Quod si
 caliditas effatu digna, citra febrem tamen, in parti-

Vultus ratio te-
 nuis sit, boniq;
 succi.

2. Oculi laborante adfuerit, lac bubulum, à quo butyrum
 fuerit extractum, uel serum lactis tutò offerri potest.
 Sed & olera, quæ refrigerantis atque humectantis na-
 turæ sunt, ueluti malua, atriplex, blitum, & quando
 tempus tulerit, cucurbita, item citrulli, & borago, illis
 in cibum permittuntur. Secundus scopus qui est, to-
 tum corpus ab humore melancholico, unde uitium hoc
 originem traxit, repurgare, completur purgantibus
 medicamentis uacuandæ atræ bili accommodis, in ca-
 pite de scirrhus superius enumeratis. Inter quæ (quod

Secundus sco-
 pus.
 Humor melancholici uacua-
 tio.

3. Ad rem præsentem attinet) principatum obtinet epi-
 thymū (quod Romani inuolucrū uocant) pondo drach-

Epithymum.

Sensim ac blande, nō semel, atque assatim purgandum in cancro.

Hiera Ruffi. Hiera Aiacenna. Sanguinis misfio.

Lib. 14. metho. meden.

marum quatuor, in sero lactis mulsaeue exhibitum, ut Galenus praecepit libro decimoquarto methodi medendi. Ea autem quantitas epithymi, uel paulo maior, tertio quoque die offerenda est, ut scilicet melancholicus humor, qui in uenis collectus est, & cancro generationem dedit, sic sensim atque ex interuallo uacuetur: quandoquidem uniuersum simul euacuare uix datur. Sed nec semper prohibere possumus, ne deinceps eiusmodi succus in corpore generetur, & in uenis colligatur. itaque materiae eiusmodi antecedentis purgatio, sic per initia quidem simplicium aliquo, per uices molienda est. Deinde (si res ita exposulet, & simplicium exhibitione parum proficitur) compositorum aliquo, cuiusmodi est Galeni medicamentum atrabilis uacuandae dicatum, quod ex duobus & triginta simplicibus est compositum, uel hiera Ruffi, & Auicennae, quae nigrum ueratrū recipit. Nec ab ijs quidem ita repetitis purgationibus prius desistendum est, quam totus ille succus melancholicus in uenis collectus editus fuerit, & pars tumore eiusmodi cancroso obfessa, ad naturalem statum omnino sit reducta. Quod si nihil oblitterit, hoc est, si aetas, & uires permiserint, non inutile etiam fuerit in canceris ipsis sanguinem mittere, demum (ut dictum est) purgare: & si fuerint mulieres, menstrua euocare, siquidem nondum quinquagesimum annum attigerint, ut libro secundo ad Glauconem Galenus nos admonuit. Haec secunda indicatio omnium prima est Galeno, quae uerò primo loco posita est, secundum ordinem sibi iure uendicat. Communis namque (inquit) indicatio curationis in cancro est, humorem, unde uitium est natum, illico uacuare: mox uerò prohibere,

bere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eiusmodi succus melancholicus in uenis colligatur. Sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex interuallis uacuare, & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantie ad eam confluat. Tertia igitur indicatio (quæ omnibus eiusmodi affectibus ex fluxione creatis, communis est) nobis insinuat humorem, qui in particulam affectam procubuit, uel regerendum esse, uel digerendum omnino: adhuc particulam firmandam esse, ne quid hu-

Tertius scopus.

1. morum redundantie ad eam confluat. Porro repellendi quod influxit tempus accommodum erit, in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, quam ante. Vbi uero iam totum corpus exquisitè purgaueris, tunc digerendi dabitur occasio. Verùm si mediocris tantum purgatio præcessit, mixtam habere facultatem quod applicabitur medicamentum conueniet, reprimentem scilicet, & digerentem. Sanè, ut his intentiones ritè assequaris, deligenda tibi erunt medicamenta, quæ uribus quidem sunt mediocria, qualitate ue-

Quid in principio, et simul ipso purgationis tempore agendum.

2. orò minime mordentia: talia enim huiusmodi affectibus solum sunt idonea. Nam quæ imbecillas uires habent (ut Galenus ait) nullum operæ precium efficiunt, sed uincuntur: Quæ uero ualentiores sunt facultate, uehementer quidem tenuiores, quæ in uenis sunt sanguinis partes, uel digerunt, uel retrudunt: crassas uero & melancholicas, quas feci prius assimilauimus, nec euocant, nec reprimunt: quin potius eas ad soluendum ac discutiendū contumaces reddunt. Ad sanandos igitur incipientes caneros, mediocrium uirium medicamen-

Quod aptum medicamentum cancri.

Lib. 14. Therap.

3. omentis est opus, quæ scilicet nec propter imbecillitatem uincantur, nec propter effectus uehementiam, ualenter

lenter sanguinem incrassare ualeant. Adhæc item (ut dictum est) quæ omninò haud mordeant. Quandoquidem uitij malignitas ab ijs quæ mordent, irritatur, ac (ut dici solet) efferatur. Cæterum cum materia ex qua ortum habent cancri, magna ex parte crassa sit, repulsiō, ac etiā resolutioni contumax, siue inobediens, multæq; malignitatis particeps, sat fecerimus (ubi saltem periculū ex chirurgia timuerimus, nec curari affectus aliter possit) si usu præcedentium medicamentorum, ex uistis clotisq; metallicis (ut Galenus consulit) 10 acceptorum, ipsos augeri prohibeamus, & præsertim si maiores fuerint: aut iuxta Auicennæ sententiam, eos ab ulceratione uindicemus. Ad quas intentiones libro secundo ad Glauconem, succum solani, & medicamen ex pompholyge constans, aut quod ex chalcite fit (diapalma uulgò appellatur) magnoperè Gal. cōmendauit. Proindè & Theodoricus ad eam rem unguentum instituit diapompholygos nominatum, quod eidem recipit olei rosarum, ceræ albæ, ana uncias quinque, succi granorum rubrorum, solani, uncias quatuor, cerussæ 20 lotæ uncias duas, plumbi uisli & loti, pompholygos, (quæ tuthia uulgò dicitur) ana unciam unam, thuris unciam semis. Refert quoque Galenus libro primo, περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων κατὰ τόπους, id est, de compositione pharmacorum secundum loca, qui myamir ueteri interpreti inscriptus est, unguetum quoddam ex Appollonio, ad manantia capitis ulcera, quæ Græci achoras uocant, institutum: quod ad eiusmodi cancrōsos tumores adprimè utile esse adfirmat. Recipit autem olei uel rosacei uel omphacini, id est 30 immaturi hemina, quæ Græcis cotyle dicitur, quod, in pilam

Succus solani.

Diapompholygos.

Diaphenicina seu diapalma.

Unguentū Diapompholygos Theodorici.

Appollonij medicamentum.

Hemina capit uncias. 7. & semissem.

- 2 in pilam plumbeam infusum tantisper sub sole cochlea
 2 rio etiam plumbeo agitari debet, aut pistillo plumbeo
 2 teri, donec crassescat, nigrescatq; , adeò ut plumbi co-
 2 lorem referat. Deinde seorsum conterito, lythargyri
 libram unam, cerusæ tantundem, & cum oleo commi-
 sceto, ac fiat unguentum. Porro quantum ualeat sa-
 cultas plumbi, præsertim combusti & eloti, in omni-
 bus cancris dispositionibus, satis superq; nouerunt
 omnes, qui de hac re periculum aliquando fecerunt, &
 1 qui attentè legerunt, quæ scribit Galenus de plumbo
 (quod molybdos Græcè eidem dicitur) libro nono de
 simplicium medicamentorum facultatibus. Ad eandem
 morbosam dispositionem laudarunt Paulus & Auicen-
 nas emplastrum ex cancris fluuiatilibus, præsertim si
 parem modum cadmiæ receperit. Cancrorum igitur
 fluuiatilium crematorum, & cadmiæ, par modus in pol-
 linem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis unà
 cum cerato inspergitur. Sed & idem Auicennas iubet
 minutos cancos, in quibus locis apprehendi possunt,
 2 radicitus esse extirpandos, excidendos uel: facta uerò
 excisione, huiusmodi crassiorem sanguinē circumqua-
 que exprimendū esse, deinde cauterio locum esse adu-
 rendum. Hoc enim reliquias materiæ dissipat & absu-
 mit, membrum roborat, & hæmorrhagiam prohibet.
 Galenus etiam ante Auicennam cancos interdum per
 chirurgiam extirpandos esse permisit, libro decimo-
 quarto methodi medendi, ut de cancro ulcerato postea
 dicemus. Verum enim uerò, tametsi curationem hanc,
 quæ per chirurgiam fit, Galenus & Auicennas per-
 3 mittunt: ad uitandum tamen hæmorrhagiæ, & ulce-
 rationis, imò uerò & uitæ agrotantis periculum, ea
 omissa,

Plumbi uis mi-
rabilis in can-
crosis tumori-
bus.

Paulus libr. 4.
ex Archigene.

Chirurgia in câ-
cris temerè non
adhibenda.

omissa, curandi rationem præscriptam, quæ solis leui-
 bus, & quasi adblandientibus medicamentis sit, tan-
 quam tutiorem, & minus calumniæ oppositam ample-
 li, atque ea sola contenti esse debemus. Quandoqui-
 dem, si eiusmodi tumor cancrusus, qui iam in molem
 insignem creuit, qua sanis partibus coniungitur, totus
 circumcidatur, statim immodicæ profusionis sanguinis,
 propter uasorum magnitudinem, maximeq; arteria-
 rum periculum imminet. Quas si laqueis (inquit Ga-
 lenus) intercipias, consortij iure aliæ partes afficien- 10
 tur, & ingenti dolore cruciabuntur. Adde, quod exci-
 sa carcinomata (ut Celsus ait) etiam post inductam ci-
 catricem tamen reuenterunt, & causam mortis attu-
 lerunt. Sin eius mali radices exurere uelis, neque hoc
 quidem sine graui iactura uicinarum partium fiet, præ-
 sertim si iuxta principes partes exustio fiat. Itaque
 cancri maiores, & qui iam inuetauerint, neque ferro
 temerè adurendi sunt, neque scalpello excidendi, sed
 blandè potius, ac leniter (uti diximus) tractandi. Plæ-
 rique enim nullam uim adhibendo, qua tollere id malum 20
 tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta,
 quæ quasi blandiantur, quo minus ad ultimam sene-
 ctam perueniant, non prohibentur. Reliqua quæ ad
 huius operis complementum, seu absolutam de can-
 cro tractationem attinent, ex tractatu de ulceribus,
 capite de cancro ulcerato requirenda sunt.

Capita curationis cancri non ulcerati adhuc incipien-
 tis, summa corporis occupantis.

1 **I**N cancro incipiente, & qui ex humore non admo-
 dum crasso constat, nec uenis ualde tumentes exe- 30
 rit, humorem melancholicum, unde hoc genus uitij na-
 scitur,

scitur, à toto corpore imprimis uacuato.

Ergo si ætas & uires serant, secta in cubito uena, 2
sanguinè primùm, quantũ res ipsa efflagitat, mittito.

Deinde medicamēta bilem atrā per aliũ exigētia, 3
initio quidem blāda & mitiora, postea uerò uehemen-
tiora, paulatim uim corũ augēdo, laboranti exhibeto.

Si menstruæ purgationes in mulieribus ante quin- 4
quagesimũ annum, aut mariscæ, tum in eis, tum in ui-
ris, ex interuallis sanguinem fundētes, suppressæ sint,
10 illas modis omnibus prouocato.

Interim tenuem uictus rationem, & quæ probum 5
succum ac minimè melancholicum generet, instituito.

Si prohibere nō possis, quò minus succus crassus et 6
melancholicus in uenis colligatur, eum ex interuallo,
tum simplicibus tum cōpositis medicamētis uacuato.

Præcedentes aphorismi ad medicum spectant: qui uerò
sequuntur, ad chirurgum pertinent.

Remedia affectæ parti ante purgationē, & in ipso 7
purgationis tempore, repellentia: ubi uerò corpus in-
20 tegre repurgatum est, digerentia: uiribus mediocria,
& qualitate minimè mordentia, adhibeto.

Ergo solani succum, uel medicamentum ex pompho 8
lyge, aut quod ex chalcite cōstat, (diapalma uulgò ap-
pellatur) atque id genus alia, dolenti loco admooueto.

Quòd si per chirurgiam cancrum sanare aude- 9
bis, melancholico humore prius medici consilio repur-
gato, quod uitiatum est prorsus excindito, & sangui-
nem satis multum effluere sinito, crassioremq; ex ui-
cinis partibus exprimito, atque affectum tandem si-
30 militer reliquis ulceribus sanato.

FINIS PRIMI LIBRI.

N GENERALIS

GENERALIS DIVISIO

VVLNERVM, IN LIBRVM

SECYNDVM CHIRVRGI-

carum Institutionum Ioan.

Tagaultij Medici.

V Nionis solutæ nomina ac differētiæ Ga
leno lib. 4. metho. meden. sunt.

Trauma,

Helcos,

Catagma,

Spasina,

Apospasina,

Rhegma,

Thlasina,

Solutio quædam ex uulne-
rando in carnosâ parte
relictâ. 10

Vlcus, etiam in carne.

Fractura, in osse.

Conuulsio, siue distensio,
in neruo.

Auulsio, in ligamento.

Ruptio, in musculis.

Collisio, uel contusio, in
uasis propriæ.

Soluunt etiam continuum. 20

Ecchymosis, siue

Ecchymoma,

Dicitur quasi inhumoratio, que
fit cum sanguis subter cutem
effunditur, & coit: affectus plu-
rimùm unâ cum contusione ru-
ptioneq; incidens.

Anastomosis, id est, Oris uasorum apertio.

Diapedesis, } id est, Trāscolatio subsultus, aut exili-
tio. Fit tunica ipsa uasorum sanguinis
rarefacta, aut gracilium uasorum ore
adaperto, & sanguine tenuato. Ad 30

1) anastomosisin ferè reducitur.

Anabrosis,

id est, erosio. Venis aut arterijs
 Anabrosis, seu } intrinsecus accidit, ex succo ali-
 Diabrosis, } quo, cui mordens natura insit.

Species solutionis continui apud Auicen-
 nam, sen. 2. libri primi, sunt:

Nihil refert si
 specie, vel diffe-
 rentiam hic di-
 xeris.

10	Excoriatio, & Scarificatio, Vulnus, siue Plaga, Vlcus, Punctura. Incisio, Apertio, Scissura, Contusio, Attritio, Ruptura, Fractura, Et quedam alie.	in	Cute. Carne, recēs et cruēta, Carne cum pure. Neruo. Osse, secundum latum. Venis & arterijs. Osse, secundum longū. Osse, numerosa conti- nui solutio. Extremo musculi. Panniculis, & dia- phragmate. Osibus.
20			

VVLNERVM DIFFERENTIAE.

Plagarum, seu cruentorum adhuc uulnerū,
 differētiæ Guidoni, & alijs nostræ ætatis chi-
 rurgis, à tribus potissimū sumūtur: Nempe,

- 1 A natura particularum, in quibus consistunt.
 - 2 Ab essentia ipsius solutionis continuitatis.
 - 3 A proprijs differentijs ipsius solutionis unita-
tis, ex uulnere excitatæ.
- 1 Vulnerum differentia, à natura particula-
 rum sumptæ.
- 20 Vulnus in parte similari.

Vulnus in parte instrumentaria.

Vulnus in parte similari.

Molli.

Dura.

Mediocri.

Vulnerum disse-
rentie à parte
similari affecta.

Vulnus in parte similari molli.

Vulnus in carne.

Vulnus in pinguedine.

Vulnus in parte similari dura.

Vulnus in osse.

Vulnus in iunctura.

Vulnus in parte consimili mediocri.

Vulnus in nervo.

Vulnus in tendone.

Vulnus in ligamento.

Vulnus in arteria.

Vulnus in uena.

Vulnerum disse-
rentie à parte
organica affe-
cta.

Vulnus in parte organica, seu instrumētaria.

Vulnus in parte principe.

Vulnus in parte principi seruiente.

Vulnus in parte principi non subministrante.

Vulnus in parte principe.

Vulnus in corde.

Vulnus in cerebro.

Vulnus in iecinore.

Vulnus in parte principi parti ministrante.

Vulnus in aspera arteria.

Vulnus in cesophago sive gula.

Vulnus in uestica, &c.

Vulnus in parte principi alicui membro non
subseruiente.

Vulnus in

Vulnus in nafo.

Vulnus in aure.

Vulnus in oculis.

Vulnus in manu.

Vulnus in pede, &c.

2 Vulnerum differentia, sumptæ ab effen-
tia ipsius solutionis continuitatis.

Has et sequen-
tes differentias,
latius prosequer-
mur in tractatu
sequenti de ul-
ceribus.

10

Vulnus simplex,

{ id est, Cum nullo alio affe-
ctu complicatum.

Vulnus compositum,

{ id est, Cum alio quo-
piam uno, multis ue af-
fectibus consistens.

3 Vulnerum simpliciū differentia, sumptæ
à proprijs differentijs ipsius solutionis
unionis, seu diuortij continui.

Vulnus magnū,

Vulnus paruum.

20

Vulnus breue,

Vulnus longum.

Vulnus latum,

Vulnus angustum.

{ Spatium, quantitas,
seu magnitudo diui-
sionis.

Vulnus in superficie,

Vulnus profundum.

30

Vulnus æquale,

Vulnus inæquale.

Vulnus rectum,
Vulnus obliquum.

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4

Vulnus retortum,
Vulnus uncum.

Sunt & aliæ adhuc differentiæ uulnerum, sed extrinsecus accidentes Galeno, sumptæ.

1 A generationis ratione.

2 A situ seu loco in eadem parte affecta.

1 Differentiæ uulnerū à generationis rōne. 10

Vulnus disruptum.

Vulnus incisum.

Vulnus partim incisum, partim disruptum.

Punctio nerui.

Præcisio nerui.

Præcisio uenæ.

Præcisio arteriæ.

2 Vulnerum differentiæ à situ, seu loco in eadem parte affecta.

Vulnus secundum longitudinem.

Vulnus secundum transversum.

Vulnus in principio musculi.

Vulnus in fine musculi.

Vulnus in medio musculi.

His accedunt & aliæ differentiæ, sed improprie dictæ à complexu uulneris.

1 Cum symptomate.

2 Cum morbo.

1 Vulneris differentiæ à cōplexu cū symptō

Vulnus crucians, seu dolorosum.

Vulnus dolore uacans.

Vulnus prur-

Vulnus pruriens, id est, cum pruritu affligens.

Vulnus cum delirio.

Vulnus cum impotentia membri.

Vulnus cum syncope.

Vulnus cum sanguinis profusione.

Vulneris differentia à cōplexu cū morbo.

Vulnus cum intemperie.

Vulnus cum phlegmone.

Vulnus cum erysipelate.

Vulnus cum carne supercrescente, &c. Reliqua ex diuisione de ulceribus sunt requirenda.

INSTITUTIONVM

CHIRURGICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER SECVNDVS,

In quo generatim de Plagis, seu Cruentis uulneribus, tractatur.

Quid uulnus, quæ sint species solutæ unitatis, quot uulnerum differentia, & à quibus sumantur. Cap. I.



VULNUS (VT RECENSIORES definiunt chirurgi) solutio est continuitatis, recens, cruenta, sine pure seu putrefactione, in particulis mollioribus extrinsecus incidens.

Vulneris diffinitio.

Hanc unionis continuitatis uel solutionem, non modo Auicennæ interpretes, sed & omnes communiter plagam etiam appellant. Cæterum in hac definitione, so-

Definitionis uulneris exaninatio.

Genus.
Gale. lib. 1. de
morb. & sympt.
Auer. 2. &
3. col.

Differentia.

Solutæ unitatis
varie species a-
pud Auicenn.

Nomina solutæ
unitatis.
Gale. lib. 4. me-
ibo. med.

lutio cōtinuitatis, (quæ & unitatis diuortium, ac diui-
sio appellatur) generis locū sibi uendicat: quippe quæ
communis morbus sit, tum simplicibus (quas & simi-
lares uocamus) tum compositis, seu organicis particu-
lis. Primò tamen ac magis propriè similaribus par-
ticulis conuenit, atque attribuitur, quàm compositis.
Reliqua quæ in diffinitione subnectuntur, differentiæ
rationem habent: nempe, recens, cruenta, siue sangui-
nolenta, sine pure seu putrefactione, quæ omnia ad
differentiam ulceris posita sunt: quòd quidem, iuxta 10
recentiorum placita, iam antiqua est unitatis solutio
siue diuisio, cum putri quadam humorum colluie, seu
putrefactione, & absque sanguinis profusione. Postre-
ma diffinitionis particula, utpote, in partibus mollioribus
facta siue incidens, adiecta est propter fractu-
ras, quæ in duris partibus, cuiusmodi sunt ossa, contin-
gunt. Porro iuxta hanc generalem particularum cor-
poris humani diuisionem, quidam chirurgiam bimem-
brem fecerunt. Alia enim est (inquiunt) quæ in carne,
alia quæ in osse suas operationes exercet. Carnis enim 20
nomine, musculos, nervos, uenas, & arterias etiam in-
telligunt: quæ omnia sub mollibus & mediocribus
particulis alij comprehenderunt. Dictionem, extrinse-
cū, in fine definitionis adiecimus, ad differentiam so-
lutionis unitatis, quæ fit à causa interna. Ceterum so-
lutionis cōtinuitatis multæ sunt species, in secunda
sen. primi canonis Auicennæ enumeratæ. Vulnus, in-
quam, ulcus, apertio, scissura, excisio, punctura, inci-
sio, fractura, contusio, & id genus alia: quorum de-
scriptiones, & differentie suis locis addentur. Nomi- 30
na autem solutæ unitatis apud Galenū sunt, ἑλκεῖς,
id est,

id est, ulcus, quod in carne est: κατάργμα, id est, fractura, in osse: σπασμα, id est, conuulsio, siue distensio, in neruo: αὐτὸσπασμα, id est, auulsio, uel diuulsio, in ligamento: ῥήγμα, id est, ruptio, in musculis: θλάσμα, id est, collisio, uel contusio, in uasis proprietas.

- Soluunt etiam continuum ἐκχύμωσις, siue ἐκχύμωμα, id est, sanguinis subter cutem effusio, et coitus, plurimum una cum contusione ruptioneq; incidens, de qua latius in sequentibus dicemus: ἀνασφύμωσις, id est, oris uasorum apertio, quatenus facit ecchymosin διαπύμωσις, id est, transcolatio, subsultus, aut exilitio, quæ ad anostomosin reducitur: ἀναβρωσις, id est, erosio, et quæ διάβρωσις dicitur. Porro non adeo magna, atque anxia cura ipsorum nominum habenda est, modò res ipsa de qua agitur, intelligatur. Itaque scæpius nomen unū pro altero ponitur. Vulnus enim et ulcus apud eos, qui Græcorum libros in Latinum sermonem conuerterunt, idem omnino significant, modòq; unum, modò alterum pro re eadem usurpatur.
- 20 Apud eos uerò, qui Arabica Latina fecerunt, uulnus et ulcus aliquid inter se discriminis habent. Hi namque uulnus uel plagam appellant, ubi nondum est pus: ulcus uerò, ubi iam pus adest. Et sanè qui Græcos secuti sunt, rectius quàm qui Arabes sunt imitati, censerunt. Vulnerum, siue ulcerum due sunt duntaxat primæ ac maximæ differentię Galeno, in quarto libro Therapeutices. Omne nanque ulcus siue uulnus, uel absente causa, quæ ipsum excitauit, cōsistit, uel efficiētem ipsam causam secū annexam habet. Solutionis autem huiusmodi cōtinuitatis species, sed præsertim uulneris, potissimas ac præcipuas suas differentias à tribus

Vulnus et ulcus pro eodem.

Vulnerum due differentię primæ.

Differentię uulnerum à tribus potissimè sumuntur.

A natura partium.

Divisio partium.

*In his libris
de morbis*

*Ab essentia
morbis.*

bus Guldoni, ac illius ætatis chirurgis desumuntur. Primo à natura particulari, siue à locis affectis, in quibus consistunt. Quædam enim (ut libro tertio artis parue refert Galenus) sunt in partibus consimilibus siue homocomeris: quædam uerò in organicis, siue instrumentarijs. Aliæ item in mollibus particulis; aliæ in duris, aliæ uerò in mediocribus, id est, in ijs quæ inter duras & molles ambigunt. Quæ in particulis mollibus contingant: aliæ quidem sunt in carne, aliæ in adipe siue pinguedine. Ex ijs uerò quæ in duris sunt partibus, aliæ ossium substantiam occupant, aliæ iuncturas ipsas. Denique quæ in mediocribus particulis incidunt, quædam in nervis, tendonibus, & syndesmis, id est, nerviculis ligamentis, siue copulis: quædam in uenis, & arterijs consistunt. Quæ autem organicas partes inuadunt, aliæ in principalibus membris sunt, ut in corde, cerebro, & hepate: aliæ uerò in ijs, quæ principibus ipsis particulis ministrant, ut in aspera arteria, œsophago siue gula, & uestica: aliæ item in non subseruientibus ipsis principijs seu principalibus membris, ut in auriculis, pedibus, manibus, oculis, naso, & id genus alijs. Disscunt quoque uulnera, siue plagæ, pro telorum ac rerum à quibus inferuntur uarietate, ut in sequentibus dicitur. Secundo sumuntur differentie solutionis continuitatis, sed præsertim uulnecum, ab ipsius morbi essentia, ut Galenus docuit libro tertio methodi medendi. Quædam enim solutio unitatis simplex est, quædam uerò composita. Ac simplex quidem appellatur, si nec morbus ullus, nec symptoma simul adsit cum ipsa. Composita uerò, quando duos uel plures affectus secum adiunctos habet, ut à Galeno scriptum est libro

est libro quarto Therapeutices: quod & in sequenti ca-
pitate, ac rursus in tractatu de ulceribus, dicitur. Scri-
bit autem ad hunc modum Galenus loco nuper citato:

- „Omne ulcus siue uulnus aut solum est, ipsumq; per-
„se, nullo nec cum eo simul inuadente, nec ipsum præ-
„cedente, aut sequente alio affectu: aut cum alio quo-
„piam uno, multis uel consistit. Quorum alij non modò
„statim ab initio ulcus excitant, sed etiam nunc maius
„efficiunt: alij eius sine quo non, ut ad curandi opus ra-

- tionē obriēt. Tertiò desumuntur uulnerū differētiæ,
à proprijs differētijs ipsius solutionis unitatis ex uul-
nere excitatæ. Caterum propriæ eiusmodi differen-
tiæ sumuntur rursus ab ipsa uulneris natura, ut Gale-
nus nobis indicauit libro tertio methodi medendi: nē
pe à spacio seu quantitate diuisionis, ut à magnitudine
& paruitate, æqualitate & inæqualitate, profundita-
te & superficie, breuitate & longitudine. Item à figu-
ra, ut à reclinatone, & obliquitate. Adhæc à generatio-
nis ratione, ut quia totum sit incisum, uel totum diru-
ptum, uel pars incisa pars dirupta: & ab id genus
alijs, quæ fustius in tractatu de ulceribus, qui hunc pro-
ximè sequitur, explicabuntur. Porro ab huiusmodi dif-
ferentijs, iudicia, curandi indicationes, auxilia quoque,
& modus curationis, omninò desumuntur, ut ex sequē-
tibus manifestum euadet. Itaque non satis est primas
illas indicationes, quæ ex affectibus desumuntur, no-
uisse. Hæ nanque principium tantum sunt, & (ut sic
dicatur) carcer, unde medendi ratio promouet. Nulla
autem prorsus ipsius medicinæ artis portio, aut certè
nec magna nec propria, aut ratione digna, sed quæ
etiam (ut tertio Therap. ait Galenus) plebeis sit com-
munis,

Differētiæ sum-
ptæ à natura
uulneris.

Galenus
3. Therapeu.
Indicatio quæ à
morbo sumitur,
principium tan-
tum est metho-
di, quæ de me-
dendo instituitur.

Cognitio, quæ habetur per ipsius rei naturā, quæ perpendat.

Morborū nerus curator quis.

Primum artis opus esse, ut cognoscas an sperari possit quod desinas.
Lib. 3. metho. meden.

munis, & nota. Non ergo satis est nosse, quid ex prima indicatione agendum sit, sed & particulares indicationes diligenter considerandæ sunt: cuiusq; scilicet particule substantiam æstimando, tum actionem, tum usum, situmq;. A quibus procedens, non solum quod sanari non potest, præuidebis: sed etiam quod recipere sanitatem potest, de inueniendis ei remedijs facile delibe-
rabis. Solus igitur is merito morborum est curator, cui facultas est illa remedia inueniendi, ex quibus perfici possit, quod à prima indicatione suggeritur. Eritq; hoc ipsum primum artis opus, ut intelligas, sperare ne id quò tendis debeas, an secus. Eius autem rei duplex cognitio est Galeno, nec potest addi ratio tertia. Altera per experientiam, cui longo usu est opus. Altera per ipsius rei naturam, quam ratione quadam & methodo disquirimus, perpendendo scilicet non modò corporis uniuersi, sed etiam afflicte particule temperamentum, & reliqua quæ modò diximus.

De causis, signis, & iudicijs uuln- rum. Cap. II.

Solutæ continuæ
tatis causæ uni-
uersales.



AMBT SI Galenus lib. 1. de morbis & symptomatis, omnes solutæ unitatis (qui morbus est omnibus partibus communis) causas summam in duas reuocat: (aut enim, inquit, extrinsecus irruunt, aut ex ipso corpore oriuntur.) recentium tamen uulnorum, prout huiusmodi, id est, quatenus recentes ac cruētæ plagæ sunt, causæ censentur quæcunque extrinsecus aduenientia, uulnerare, perforare, incidere, abrūpere, cōtundere, ac discendere possunt.

- sunt. Has autem uulnerum causas speciatim expressit Halyabbas, sermone quarto regalis dispositionis, dum *Halyab.*
- ait: Vulnera fiunt, uel à corpore inanimato, ut ense, baculo, lapide, aut alio quouis simili: aut ab animato, ut uenenatorum animalium punctura, aut ferarum morsu. Ex quibus aliæ rursus sumuntur uulnerum differentia: quandoquidem alia incisiones, alia contusiones, alia uero morsuræ dicuntur. À quibus etiam curandi indicationes nobis suggeruntur, per accidens tamen.
- 10 Demonstratum nanque est à Galeno lib. 4. meth. med. nullam externarum, uel (ut nunc loquuntur) primitiuarum causarum, curationis indicatricem esse, sed huius indicationem ab ipso affectu initium habere. À nullo enim, inquit, eorum quæ adhuc non permanent, indicatio sumi eius quod ex usu sit, potest. Verum quoniam ad eum affectum noscendum, qui omnino tum rationem, tum sensum lateat, sæpe cogimur de externa causa inquirere: opinatur uulgius hanc quoque sanationis rationem indicare: quod planè secus est. Nam
- 20 quod adhuc nō est, (ut causa externa) curationem non desyderat: quippe, rei præsentis tantum est curatio, ut eius quod futurum est prouidentia. Quòd si id quod amplius non est, curationē non postulet, neque sanè ab eo ulla sumi potest curandi indicatio. Siquidē absurdū sit (ut Galenus ait) aliud esse quod curandi rationem præscribat, aliud quod curetur, & econtrā. Nihil igitur ad curationis indicationem conducit, externa causa cognita, sicuti nec tempus ipsum, sed ad præsentis duntaxat affectus (qui nostram fugit notitiam) cognitionem.
- 30 Quare dicere indicationem curationis ab externa causa, quæ uulnus excitauit, desumi, omni modo est absur-

Externe causa
curationem non
inducit, sed
affectum.

Rei præsentis
est curatio, non
absentis.

3 metho. statim
ab initio.

est absurdum. Quod enim nec nunc ledit, nec lesurum
timetur, id ab utroque artis munere, tum eo quod cu-
rat, tum eo quod prouidet, excessit. Itaque (ut breuiter
dicam) ubi presentis affectus nihil latet, nulla iam ex
terne causæ, sicuti nec temporis, est utilitas.

De signis, & iudicijs uulnerum.

Cap. III.

Nota & iudicia
à uulnere un-
de petantur.



NOTAE uulnere non aliunde petendæ
sunt, quàm ex iudicio sensus, sed uisus ma-
ximè. Iudicia uerò seu signa prognostica
ipsorum, sicuti etiam & omnis solutionis continuita-
tis, desumuntur ex substantia, usu, atque actione affectæ
cuiusque particule. Et præterea ex propria ipsius dis-
positionis, siue affectus essentia. Itē ex symptomatis,
quæ uulneribus ipsis accedunt, ut ex sequentibus pate-
bit. Itaque iudicat Gal. lib. 4. Therapeutices, quòd
magna & graua uulnera non mediocriter adferunt pe-
riculum. Trifariam autem uulnera ipsa, ut & reliqua
omnia uitia, graua magnaq; redduntur: nempe uel
propter afflictæ partis præstantiam siue præcellentiam,
uel propter affectus magnitudinem, uel propterea
quòd sunt cacoëthe, id est, maligna, contumacia, ac re-
bellia. Hinc uulnera quæ in capite accepta sunt, aut in
tra thoracem, intra uel etiam peritonæum penetraue-
runt, non paruum periculum aduehunt, potissimum si
quid interiorum unum sit uulneratum. Quinetiam cacoë-
the esse, quæcunque in articulis accepta uulnera sunt,
id quoque (ut Galenus insit) omnes ferè sciunt. Empiri
ci quidem ex sola ipsa experientia: qui uerò corpo-
ris na-

Uulnera trifari-
am magnam &
grauiam reddi.

Uulnera in ar-
ticulis cacoëthe
esse.
Lib. 14. The-
rapen.

ris naturæ scientiam comparare studuerunt, ex ipsa uulneratarum partium natura. Vbi enim tendones, & nerui, & carne uacua, atque ossea loca sunt, hic doloris, uigiliarum, conuulsionis, & delirij periculum instat. Adhuc uulnera quæ adeo magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, certe deligatura, periculo non uacant: cuiusmodi sunt ea, quæ principales musculos per transversum penitus diuidunt, magnasq; uenas, nervos, & arterias, atque etiam medullas ipsas discin-

Vulnera quæ futuris indigēt, periculo non uacant.

1. 0 dunt, ac contundunt. Primum (nempe partis læsæ præstantiam) hoc aphorismo nobis expressu Hippocrates;

Præstantia partium.
18. lib. 6.

2. 0 Vesica descissa, id est, magno atque profundo uulnere diuisa, aut cerebro, aut corde, aut septo transverso, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut uentriculo, aut iecore, lethale est. Tertij uero, utpote cacoëthiæ, mentionē fecit ille idē ap. 19. 7. 0 s alijs in aphorismis: ubi

Ap. 63. lib. 5.

tradit eos, quibus tumores in ulceribus apparent, non admodum conuelli, neque insanire: uerum his de repente euanescentibus, quibusdam conuulsiones, & distensio

Tumores de repente deuenscentes, malum portendunt.

2. 0 nes fieri, quando scilicet uulnera à tergo infestant: quibusdam uero insaniam, uel lateris dolorem acutum, uel suppurationem, cum scilicet in partibus anterioribus, quæ uenosæ sunt atque arteriosæ, uulnera contigerint: uel intestinorum difficultatem (quam sanguineam nominant) si tumores sunt rubicundi, id est, sanguinei. Idē mox subiungit: Quod si in uulneribus præualidis, siue fortibus & prauis, tumor non appareat, malum est ingens, hoc est, noxa est magna. Etenim in his suspicari licet materiam, quæ uulneribus decumbere asso-

Ap. 66. lib. 5.

3. 0 let, auerti, ac transmutari in sedem aliquam principē. Vulnera autem praua hic appellari, ab Hippocrate (ut

Præua uulnera.

mentario aphorismi paulò antè citati, uestica discissa, &c. uulnerum quædam esse ualde & ex necessitate lethalia: quædam uerò non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse: contrà uerò quædam omninò sanabilia, quædam ut plurimum. Lethalia sunt ex necessitate ac insanabilia, quæ cordis substantiam penetrant: hæc enim protinus hominem à uita tollunt. Quandoquidem corde sic percusso, totus sanguis, ita imperante natura, affatim ad ipsum, uelut ad præcipuam uitæ

Vulnera ex necessitate lethalia.

Cordis uulnus cur letale.

1. arcem, confugit, ac ex omnibus corporis partibus, ut læsæ parti ferat suppetias, transmittitur: unde maxima statim fit sanguinis profusio, quam & spirituum resolutio mox consequitur: uel in percusso uiscere tumor præter naturam, maximè autem phlegmone, excitatur: uel tanta fit sanguinis collectio, obstructioq; tā insignis, ut uitalis spiritus in corpus uniuersum, ut oportebat, amplius diffundi non possit. Quò fit ut uenis & arterijs languescētibus, palleſcēt uultu, & frigido malig; odoris oborto sudore, extremisq; partibus

2. frigidis apparētibus, matura mors sequatur. Cor enim neque solutionem continui diu, neque (ut inquit Aui- cennas) apostema, uita permanente, perferre potest. Sed & mortem etiā adferunt ineuitabilem magna ac profunda uulnera substantiæ cerebri, iecinoris, diaphragmatis, stomachi seu œsophagi, uentriculi, asperæ arteriæ, pulmonis, lienis, cystis fellis: renum quoque, et tenuium intestinorum, præsertim eius quod ieiunum appellatur, atque id genus aliorum membrorum principalium, aut ipsis principalibus membris seruientium,

2. primi. c. 5.

Cerebri uulnera.

3. ministerio quidem, ceu ad uitam necessario. Ideò autē

○

uulnera

Vulnera magna ex parte lethalia.

Guido.

*Comment. 18.
lib. 6. aphor.*

vulnera eiusmodi lethalia ex necessitate dicuntur, quoniam nullus ex eis servatur unquam, mortemque concinnant inexcusabilem, ut in sequentibus demonstrabitur. Servari etiam non possunt Celso, quibus in spina medulla percussa est, et quibus circa fauces grandes venae uel arteriae praecisae sunt. Vulnera uero ea non ex necessitate, sed secundum plurimum mortalia dicuntur, quae ad regionem praedictarum partium perveniunt, uel eas leuiter, ac superficietenus duntaxat attingunt, non autem praecipue adiguntur, nec effatu digna sunt. 10
Adhaec quae in capite musculorum accepta fuerunt. Ob id autem mortalia ut plurimum ac non ex necessitate dicuntur, quoniam uulneratis, nisi rite tractentur, prorsus ex eis commoriendum sit. Si uero in nullo peccatum sit, illos interdum sanari contingit. Hinc Guido se quendam uidisse affirmat, qui in parte postica capitis uulnus acceperat, ex quo parua quaedam portio substantiae cerebri exierat, (ut ex memoriae lesione cognitum est) et tamen is a tali uulnere conualuit, restitutaque est illi ex integro post curationem uulneris, memoria. 20
Non tamen asserit illum superstitem permanere potuisse, si tota una cellula, seu totus unus uentriculus, per uulnus exiisset: ut de quodam Cellario refert Theodoricus: Sed nec Galenus etiam adfirmat, in illo adolescente, quem uulneratum uidit Smyrnae in Ionia, uiuente adhuc praefectore suo Pelope, aliquid substantiae cerebri ademptum fuisse, sed duntaxat eum uulnus effatu dignum accepisse, in alterum anteriorum uentriculorum cerebri: quos ob id geminos natura condidit, ut si alter ipsorum laesus fuerit, reliquus adhuc 30
subseruiat.

subseruiat. Sed & hoc tanquàm admirabile ac stupen- *Adolescens ex*
dum quoddam, incredibileq; spectaculum, seu naturæ *uulnere cerebri*
miraculum narrat idem Gale. libro octauo de usu par- *conualuit.*
tium corporis humani : ipsumq; adolescentem tan-
dem sanatum fuisse refert, Dei potius, ut credeba-
tur, uoluntate, quàm arte. Quòd si (inquit) ambo uen-
triculi simul fuissent uulnerati, ne tēporis quidem mo-
mentum is uiuere potuisset. Vnde colligit ibidem ge-
minitatis (ut sic dicam) quorundam organorum neces-

1 o sitatem. Cerebrum itaque insigniter, & ad uentricu-
los usque uulneratum sanari, rarissimum est, & penè
incredibile, ut in commentario aphorismi superius ci-
tati, Galenus adseruerat : ubi uerum esse scribit, quòd 18 12.6.

magna uulnera, quæ consuevit Hippocrates nomina-
re discisiones, & præcisiones, in prænominatis par-
ticulis mortem adferunt ineuitabilem : fateriq; omnes,
quòd uulnera, quæ usque ad aliquem uentriculorum
cerebri penetrant, procul dubio internecant, mortēq;
adferunt præproperam. Porro uulnera cerebri, &

2 o membranarum ipsum obuoluentium (quas Græci $\mu\lambda\lambda\upsilon\gamma\gamma\alpha\varsigma$ uocant) ideò lethalia sunt, quoniā ad læsionē
ipsius cerebri, et membranarum ipsum continentium,
sequitur læsio, & interdum abolitio actionis muscu-
lorum thoracis, & aliorum membrorum respirationi
subseruientium. Horum autem actione deperdita, pe-
rire simul respirationem necesse est : unde cordis quo-
que temperamentū soluitur. Quo fit tandem, ut etiam
animalis ipsius necessariò sequatur interitus, ut libro
quinto de locis affectis, scribit Galenus. Cerebro igitur

3 o tur læso insigniter, aut meningibus ipsum continenti-

*Uulnera cere-
bri aut lethalia.*

Hepatis vul-
nera.

bus disciſſis, homini, atque omni animanti prorsus cō-
moriendū est. Guido à Cauliaco aſſerit hepatis uul-
nera, etiam circa fibrās ipsius, non admodum tamen
profunda, nec cum ablatione alicuius portionis sub-
stantiæ ipsius, glutinari, & prorsus sanari. Qua in re
Galenum secutus est, qui in cōmentario decimooctā-
uo libri sexti aphorism. haudquaquā ueritati consen-
tanea eos dixisse refert, qui non solū uulnera, quæ
in summa iecinoris parte consistunt, sanari posse ad-
firmabant, sed & profunda quoque in fibris eius fa- 10
cta, imò & fibras ipsas abscissas. Causa autē ob quam
uulnera iecinoris magna ex parte lethalia sunt, est,
quia propter defectum nutritionis cor languet, ac emoritur,
atque ita tandem deperit animans, sed non illi-
cō. Quandoquidem ob uirium hepatis imbecillitatem,
sine alimento permanens, diutius etiam sufficere po-
test: ut Galenus est autor libro quinto de locis affectis,
sic inquit: Vbi iecur affectum est, tum ob inedia, 2
moriuntur animalia: uerū per longa temporum spa- 3
cia, in huiusmodi affectibus uitam protelare possunt. 20
Sed de intemperie & morbis in compositione, hoc lo-
co potius agit Galenus, quā de uulnere. Si autem uul-
nera hepatis magna ac profunda sint, uenāq; porta di-
cta iecinoris cauo cōmissa, uel concaua ab ipsius giba-
bo prodiens, dissecta fuerit, largā sanguinis profusio-
ne moriuntur, qui ita sunt uulnerati, priusquam uul-
nera agglutinentur. Vulnere quoque diaphragmatis,
prorsus incurabilia sunt, maxime si in parte eius ner-
uosa fiant. Hac enim parte exangue est: adhuc, in con-
tinuo est motu. Quæ duo sanè prohibent, ne labra uul- 30
neris

Vulnera dia-
phragmatis quā-
do insanabilia.

neris agglutinentur, coalescant'ue. Neruosa namque corpora semel diuisa, nunquam coeunt, ea praesertim, quae in iugi, seu perpetuo sunt motu, cuiusmodi est septum transuersum. Quippe tametsi dici solet, quod uulnera quae sananda sunt: utique quietem requirunt, non solus tamen motus diaphragmatis, etiam si perpetuus, uulneris agglutinationem impedit, sed & neruosa quoque cum ipso substantia. Quod abunde testa-

Neruosa subst^a
tia. & motus,
agglutinatione
impediunt.

Lib 5. metho.
meden.

Pulmonis uul-
nera.

Tracheae arte-
riae uulnera.

- , tur Gal. his uerbis: Transuersi septi uulnera, in carno-
 1 o sis quidem partibus subinde coalescere sunt uisa, eius
 , motu non obstante. Quae uero in neruosis eius haerent,
 , insanabilia sunt. Sane difficilis, grauisq; curatio est
 , etiam eorum, quae in carnosissimis partibus, si has iam
 , phlegmone occupauit. Accidit autem haec curandi dif-
 ficultas ob eam rem, quod in ea uulnera sanies defluat,
 quae impedimento est, ne labra solutae unitatis coale-
 scant. Vulnera autem, quae pulmonibus incidunt, ideo
 curatu sunt difficillima, imo magna ex parte insana-
 bilia: quoniam promptissime phlegmonem excitant, quae
 2 o si semel occupauerit, exigua (inquit Galenus) uulneris
 glutinandi spes est. Adde quod ea quae sanandis ulcere-
 bus idonea sunt medicamenta, contingere illa integris
 saltem uiribus non possunt. Accedit praeterea & illis
 sanandi difficultas, quod respirando mouetur, & tus-
 siendo lacerantur. Ceterum uulnera tracheae, id est,
 asperae arteriae effatu digna, & maxime quae cartila-
 gineam eiusdem substantiam occupant, raro etiam ad
 sanitatem perducuntur. Particula enim haec dura est,
 & exanguis, assiduaq; per uulnus fit respiratio, quae
 3 o sane impedimento est, quominus labra coalescant. Ma-

Œsophagi uul-
nera.

Lib. 6. metb.

Venarum iugu-
larium uulnera.Ventriculi uul-
nera.

Ieiuni.

Matricis.

Renum.

Vesicæ.

Cystis fellis.

Gal. cōmen. 17.
lib. 6. apborisf.

gna quoque Œsophagi uulnera, inter exitialia atque insanabilia numerari solent, tum ob cibi ac potus per eum transitum, qui sanè agglutinationē prohibet: tum quod eiusmodi uulnera duntaxat (ut Galenus ait) con- tactu medicamentorum in transitu fruuntur, sicuti & quæ in ore, seu orificio uentriculi consistunt. Verùm his quæ ori ipsius uentriculi insident, sensus quoque acumen sanationi obstat. Iugulares uenæ (quas & or- ganicas uocant) grandi uulnere percussæ, ægrè & ra- rō curationi cedunt: tum quòd larga sanguinis profu- sione, hominem uitali spiritu exhauriant: tum quòd li- gaturam stringendo ac sistendo, sanguini necessariam, propter imminens suffocationis periculum, sustinere non possint. Ventriculi discissiones, & tenuium quo- que intestinorum, sed omnium maximè ieiuni, matricis, renum, uesicæ, & folliculi fellis, modo quo suprà diximus, ob id lethales sunt, quòd hæ omnes particu- læ nervosæ sint & exangues, per easq; uitiosarum ac superuacanearum humiditatum transitus fiat. Adde quòd earum usus perpetuò uitæ conseruandæ est ne- cessarius, nedùm utilis. Adhæc medicamenta his locis penitioribus non possunt commodè admoueri. Porro per uerbum, discissiones, magna (uti superiùs diximus) ac profunda uulnera intelligimus, & ad sinum usque interiorcm longè lateq; penetrantia, qualia esse cer- nuntur in ijs, quæ penitus sunt excisa. Hac autem di- scissione ex industria usi sumus, ne quis putet uulnus quodcunque in prænominatis partibus exitiale esse atque insanabile. Venter nunc & tenuiora intestina, quia non parùm participant carnosæ sub- stantia,

stantiæ, si in summa parte duntaxat uulnerata sint, sæpenumerò agglutinantur, & uelut collato fœdere in robur substantiæ corpulentæ concordī concretionē coalescunt. Sic & uesticæ ceruicem siue collum quoti-
diè sanari uidemus, cum ex ea lapis extrahitur: quoniam ea parte carnosā est. Idem & de alijs partibus iurè credi potest, si per summa corporis seu substantiæ earum uulnus duntaxat acceperint. Verumenimvero

*Ieiuni uulnus
cur insanabile,*

10 ter tenuia incurabile esse, omninò à Galeno & Paulo prædicatur, tum propter uasorum, quæ in eo sunt, magnitudinem multitudinemq;: tum quòd tunica præternaturalis, nervosaq; existat. Adde quòd & bilem syncretam hoc intestinum ex cholagogis poris recipit uniuersam, & omnium maximè icori uicinum habetur.

*Lib. 6. ther.
Lib. 6. cap. 42.
Galen. lib. 5. de
usu partium.*

Lienis uulnera, cum munus habeat toti corpori apud primè utile, ac propè necessarium, sitq; ut nonnulli dixerunt ueluti alterum hepar, periculosa sunt, non admodum tamen, ut aliarum modò dictarum particularum. Hi

Lienis uulnera.

20 quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad cavitatem membrorum intus conditorum uulnera perueniunt. Hæc enim ut plurimum lethalia sunt, tum quia aer externus & nos ambiens, per ea non alteratus ingreditur, internas partes non parum offendit: tum quia per eadem internus exhalat spiritus, quo sic expirante & euanescente, uirtutis robur insigniter offenditur & dissoluitur, multoq; imbecillius redditur. Accedit huc, quod huiusmodi uulnera haud commodè detergeri possunt: quodq; ea tandem degenerant in fistulas, &

*Vulnera periculis
transientia.*

30 empyemata, id est, purulentas collectiones excitant:

O iiij unde

Vulnera in capite musculorum.

Nervi & tendones punctura.

Spasmus ex uulnere lethalis, id est, ualde periculosus.

Spasmi ex uulnere causæ.

Vulnera mem-

unde & mors ipsis uulneratis demum accidit. Signa autem, quibus prædictarum partium internarum uulnera, deprehendi possint, tædiosa prolixitatis uitandæ gratia, in hac uulnerum uniuersali methodo, consultò prætermisimus. Caterum uulnera, & puncturae, quæ in capite musculorum fiunt, ubi nervi, tendones, & ligamenta ferè carne nudantur: item quæ tribus digitis à iunctura distant, & quæ prope tempora accepta sunt, magna ex parte lethalia existunt. Nervi uerò, & tendonis punctura, propter sensus uehementiam, & quoniam hæc pars principio, id est, cerebro continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam: ac tum præsertim, cum nihil extrorsum expirat, obcæcato cutis uulnere: ut Galenus annotauit in opusculo cui titulum fecit $\mu\iota\chi\rho\tau\epsilon\chi$ vii. Proinde huiusmodi punctio mortem accersit. Noxa enim quæ cerebro illata est, statim communicatur organis respirationi seruientibus, ut iam supra dictum est. Quocirca quinto libro aphorismorum scripsit Hippocrates: Conuulsio ex uulnere lethalis est. Non quidem (ut Galenus ait in comment.) ex necessitate, sed admodum crebrò: lethalis enim nomine hic, ut & in plerisque alijs aphorismis, usus est Hippocrates pro periculosa, & ad mortem sæpius perducente. Fiunt autem ex uulneribus conuulsiones, siue spasmi, ratione subsequæ inflammationis, ubi neruosas partes attigerit. Et primum quidè uidentur conuelli, quæ è directo sunt partium inflammatione laborantium: deinde sic postquam & principiū attigerit passio, ad totum extenditur corpus. Membra autem particularia ex accepto uulnere iudicantur

iudicantur emortua, quando principes ac maiores uenæ, arteriæ quoque & ossa, à quibus uitam, nutritio nem, & fulcimentum accipiebant, penitus excisa sunt & destructa: incipiuntq; liuescere aut nigrescere, mortis habitum induere, ac cadaueris formam repræsentare, non secus quàm in gangræna & sphacelo, ut uidere est in excisione brachiorum & tibiærum. Iudicantur itidem membra ad usum à natura institutū fore inepta, & perpetuò impotentia, quando nervi, ten-

brorum particulæ quando ipsis mortalia.

Vulnera quædo membris impotentia adferūt.

1. 0 dones, & ligamenta (quos Græci syndesmos uocant) penitus sunt abscissa & destructa: suamq; protinus actionem perdunt, ac resiccare, et tabescere incipiunt:

Vulnera ea omnium tutissima sunt, & omninò (ut dicunt) sanabilia, quæ in euchymis, id est, boni succi corporibus, & in locis carnosiss accepta sunt, ubi & nervi pauci, & uenæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Adhæc, quæ diuisionis magnitudinem non habent, hoc est, longitudinem, latitudinem, aut profunditatem non multam. Periculū enim facit uulnus, quodcunque

Vulnera tutiorem curationem habentia.

2. 0 magnum est. Ratio autem ob quam hæc uulnera tutiorem habent curationem, omniumq; minimè formidanda sunt, est, quoniam ea nec febris, nec praua aliqua symptomata sequi consueuerunt, modò saltem rectè, & ut res exposulat, tractentur. Quocircà rectè ac prudenter feceris, si in tuis assertionibus, seu (ut dicunt) de positionibus hoc præfatus fueris, atque etiam addideris: dummodò nihil aliud superuenerit, quod nec impræsentiarū apparet, nec in talibus accidere solet.

Cor. Cel.

3. 0 mediamq; inter duo dicta extrema (nèpe omninò sanabilia,

Vulnera ut plurimū sanabilia.

bilia, & ex necessitate lethalia) naturā sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorū carnosorum longē à iuncturis & tēporibus, item quæ in caluaria, quam Græci *ὑπόκρυον* nomināt: thorace & uētre incidunt. Hæc, nisi ritē atque ex arte tractentur, adhibeaturq; diligens cura, & laborans obedientem se præstiterit, in nullo propriē indulgens uoluptati, exterioraq; omnia ritē adsint apparatus, curationem indubiē recipere possunt. Si uerò in ijs peccatum sit, eorum curationem intercipi contingit, hominemq; tandem ad interitum deduci. 10
Proinde cum de illis ferre iudiciū uolueris, huius rei mentionem (ut nomini tuo consulas) te facere oportet. Ceterum si coactus fueris à magistratu, super aliquo uulnere sententiā ferre, eiusq; euentum, quantum ars permittit, prædicere, imprimis annotandum tibi est, in schedis tuo chirographo obsignandis, quòd ex mandato ipsius magistratus uulneratum inuiseris, & uulnus seu uulnera omnia, si plura fuerint, diligenter & accuratē inspexeris. Deindē uulnus aut uulnera nomine expresso ac proprio, unā cum affecto loco exprimere 20 debes. Postremò tuæ censuræ causam, ac iudicij per te lati, rationem te subijcere oportet. At uerò interim te admonitū uelim, ne iudicium tuum in hac re præcipites, sed maturē, prudenter, ac circumspectē omnia definias. Quandoquidē (ut ait ille) omne in præcipiti uitium stetit, et, ut à seniore illo Hippocrate bonarū artium primario autore scriptū est: iudiciū est difficile, Itaque tametsi terminus ultimus uulnerum sit quadragessimus dies: primus uerò intra septem dies consistat, & medius (iuxta formam & naturam acutorum mor- 30
borum)

Formula ferēdi
iudicium de uul
neratis ex scri
pto.

Asporis. 1.

- borum) ad decimumquartum protendatur, in suspectis nihilominus ac dubijs uulneribus, expectandus est dies septimus, priusquam aliquid de illis decernas, aut iudices. Solent enim ut plurimum intra id tempus apparere accidentia, tum bona tum mala, quæ post accepta talia uulnera superuenire consueuerunt: febris inquam, syncope, mentis alienatio ac perturbatio. spasmus, & id genus alia. Sed & interim diligenter considerandæ sunt uirtutum actiones ex pulsu, lotio, uomitionibus, et
- 10 alijs id genus, quæ foras excernuntur. Contemplari etiam oportet laborantis appetentiam, tollerantiam, uultum siue faciem, & consimilia. Ex ijs itaque & consimilibus præfagijs, quæ ab Hippocrate & Galeno memoriæ prodita sunt, diligenter perpensis & examinatis, robur uirtutis, morbi magnitudini conferes. Deinde tacitus apud te omnia recolliges, ut præfagire possis, ac iudicium ferre, num moriturus sit æger ex accepto uulnere, an tandem conualiturus. Qua in re cautè ac prudenter te geres. Nec est quòd dicas, si
- 20 non fuisset uulneratus, nunquàm interisset, quantumuis in uictus ratione peccasset. Sed nec satis fuerit, si dixeris, uulneratum mortem nunquàm oppetisse, si sibi cõsulisset, ac omnia effecisset secundum rationem: scriptumq; esse ab Hippocrate, quòd non solum medicum præstare se oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes, &c. Quandoquidem non solum famæ tuæ consulere, & te ab obloquentium calumnia uindicare debes: sed nihil etiam uel dicere coram magistratu, uel scripto annotare, quod cedat in damnum
- 30 uel detrimentum laborantis, & consanguineorum, aut liberorum

Asperis. 1.

liberorum eius, culpam omnem sic in eum reijciendo. Eorum nanque quæ fortuitò contingunt, tametsi nulla sit ars præseruatric, est tamen ars aliqua curatrix. Siquidem ut uarijs periculis nostra corpora exposita sunt, ita et modis plurimis, ubi in ea inciderint, seruari possunt. Itaque, ut scribit Auicennas lib. 4. de extractione sagittarum, licet uulnera quædam sua natura lethalia sint, nõ tamen ob id relinquendus est uulneratus absque auxilijs: quin omnia aggredi ac tentare debet chirurgus, quæ ex arte, & secundum rationem fieri possunt, dummodò saltem ab assidentibus amicis & consanguineis ipsius ægotantis obnixè rogatus fuerit, ac de futuro rei exitu coram eis antequàm uulneratum attingat, præfagiuerit, ut se ab indoctorum & oblocutuleiorum calumnia & maledicentia uindictet. Plerique enim præter spem medicorum modo quodam mirabili, ac stupendo, mortem interdum euadunt, ac sanitati restituuntur. Igitur cum sæpe etiam præter expectationem quædam euemant, curatio aggrediunda est. Quòd si uulneratum ipsum omni auxilio destitutum relinqueremus, & inde mors sequeretur, impij, ac inhumani meritò & diceremur, & haberemur. Sed ijs omis-
sis, reliqua uulnerum iudicia persequamur. Igitur præter hæc te nosse oportet, quòd unio in partibus instrumentarijs, semel continui diuortium perpeßis, est impossibilis, ut Galenus adserit libro artis medicinalis cap. nonagesimo. Cuius assertionis ratio est, quia ab-
scissis omninò poris seu meatibus, uenis inquam, ner-
uis, & arterijs, per quos ueluti per canales quosdam, alimentum, sensus, & uita, in ipsam membrum organi-
cum

Auicennas.

*Vulnerati non
sunt relinquen-
di sine auxilio.*

*Plurima in mor-
bis præter ex-
pectatione con-
tingunt.*

*Unio in parti-
bus organicis se-
mel diuisa est
impossibilis.*

Cum diffundebatur, promptissime expirat, exhalat ue-
 tum spiritus, tum uirtutes, ob substantiæ scilicet quam
 habent tenuitatem: (quod non contingit in animalibus
 ijs quæ imperfecta uocantur, atque etiam in plantis
 ipsis) non autem propter impotentiam, aut repugnan-
 tiam medicamentorum, ut recte adstruebat Haly. in
 commentario loci nuper ex Galeno citati. Adhæc unio
 in parte carposa possibilis est, etiam iuxta primam in-
 1 o tentionem, ut dicunt. In osse uero ex secunda duntaxat
 intentione. Vocatur autem hæc prima intentio,
 quando partes diuise, atque inuicem distantes, rursus
 uniuntur, & coalescunt, ut prius unitæ erant, idq; ab-
 sque medio aliquo heterogeneo, sed ratione quadam ac
 beneficio nutrimenti, facta scilicet modica quadam
 conuersione ipsius alimonij in carnem omnino unifor-
 mem, & consimilem priori. Secunda uero intentio hæc
 intelligitur, quando ea quæ diuisa sunt, & unionis di-
 uortium perpeffa, alia quapiam interueniente substan-
 tia, ceu glutino quodam alligantur, atque inuicem con-
 2 o iunguntur. Porro huiusmodi medium, cuius interuen-
 tu partes ossis fracti, seu diuisi adalligantur, adgluti-
 nantur uel, Latine callus, Græcè uero *porus sarcoides*
 nominatur. Quisquidem ex succo paulò crassiore fit,
 quàm is ex quo os concreuit. Causa autem propter
 quam fractum os nequeat coalescere, prima saltem in-
 tentione, est ipsius ossis durities: cum mollium tantum
 corporum (ut Galenus ait) in unum coeundi sit habili-
 tas: ut tum in externis uidere licet, nullo nec lapide cū
 lapide, nec testa cum testa coeunte: tum uero in nobis
 3 o ipsis. Altera causa est, imbecillitas facultatis alteratri-
 cis, quæ

Callus.

Porus sarcoides.

Quare os fra-
 ctum non coa-
 lesceat.

Nervi, uenæ, &
arteriæ interdū
diuise cōiunt.

Arteriam inci-
sam aliquando
uniri.

cis, quæ altrix nuncupatur, (ossa enim particulæ sunt exangues ac frigidæ) non autem inopia materiæ seminalis, seu spermaticæ, ut quidam putauerunt. Ossa namque præsens semper habent alimentum spermaticum, quod quidem alterant, & in suam conuertunt substantiam, ac sibi assimilant. Nervi autem, uenæ, et arteriæ, inquit Auicennas Galeni autoritate fretus in quinto Therapeutices, mediam sortiuntur naturam inter carnem & ossa. Neque enim tam facile cōiunt ut caro, neque tam difficile conglutinantur ut ossa. Siquidem eorum natura mediocritatem obtinet inter molli-¹⁰ tiem & duritiem. Proinde de unienda eorum sectione, utique desperandum non est, ubi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle: si uerò sectio magna fuerit, & in duro corpore, nulla prorsus eius glutinandæ spes est. Vnde Galenus loco nuper citato ad hunc modum ait: Videtur autē experientia quoque ipsa ratio, ni subscribere: cū & in pueris et in mulieribus, propter corporū humiditatem & molli-²⁰ tiem, eam (arteriā, intelligit) uiderim glutinari, & in uno iuvene agresti, cui exiguè erat incisa. Qui autem eam inciderat, inquit ille, medicus admodum iuuenis erat, & operum artis parum peritus, uenāq; se incidisse putabat. Cū enim brachium hominis, uenam incisurus, deligasset, contigit attolli ueluti in gibbum arteriam, atque ita hanc pro uena diuisti. Hanc autem incisionem Galenus curiosè coniunxit, conglutinauit, & persanauit. Verū breuis sanè (ut dictum est) incisio erat. Quòd si utique magna, atque effatu digna fuisset, nulla certè ratione persanari potuisset. Quod Hippocratis testimonio cō-³⁰ firmatur

, firmatur sexto aphorismorum sic inquentis: Cum di-
 , scissum fuerit os, aut cartilago, uel neruus, aut gene-
 , particula tenuis, uel præputiū, neq; augetur, neq; coale-
 scit, hoc est, neque talis aliqua regignitur substantia,
 qualis abscissa est, neque unquam discissi corporis la-
 bra agglutinantur. In hoc autem aphorismo, uox di-
 scissum, diuisionis magnitudinem significat. Discissa nā
 que (ut Galenus ait in comment.) diuisionem habent
 usque ad finem peruenientem. Cæterum nihil aduer-
 sus prædicta pugnat obiectio, quæ de ossibus puerorum
 adferri posset, quod scilicet coalescere possunt, ut libro
 artis medicinalis Gal. adserit: quia molliorem habent,
 & uirtutis robur, ob propinquitatem suæ natiuitatis.
 Sed nec prius asserta infirmat, quod de dentibus obijci
 solet, quod scilicet renascantur, non solum in pueritia,
 sed etiam in alijs ætatibus. Quoniam non generantur
 (inquit Albertus) ex materia ordinata, sed ex super-
 fluitate: non quidem à uirtute prima cōformatrice, sed
 nutritoria inducente actum generatiuæ. Postremò iudi-
 cat Hipp. lib. aphorif. quod uulnera in corpore eorum,
 quæ aqua inter cutem laborant, non facile sanantur.
 Non prius enim curantur uulnera aut ulcera, quàm ad
 cicatricem perducantur. Non possunt autem ad cica-
 tricem perducì, nisi sufficienter exsiccentur: quod non
 factu est facile in ijs, quos aqua inter cutem malè ha-
 bet, ob humiditatis immoderantiam, ut docuit Hippo-
 crates in libro de ulceribus: & Auicennas his uerbis:
 , Solutio continuū, & ulceratio, & id genus alia, facile
 , ac citò curationem recipiunt, cum in particulis fiunt,
 , quæ bona prædita sunt temperatura. Contrà uerò, si
 membra

Aphorif. 19.

Discissa quæ di-
cantur.Ossa puerorum
fracta coale-
scunt.Albertus Bono-
niensis.

Auicennas.

membra cacochyma occupauerint, plurimum renitun-
 tur curationi, nec nisi tempore longo possunt ad sani-
 tatem perducī. Sed multò adhuc difficilius curantur,
 quando corporibus eorum incidunt, qui uel hydropē
 laborant, uel lepra, id est, elephantiasī, aut aliqua alia
 praua temperatura. Præterea in. 5. aphorif. Hippoc.
 sic ait: Ulceribus frigidum quidem mordax, cutim ob-
 durat, dolorem insuperabilem facit, liuorem obducit,
 rigores febriles, conuulsiones, distensiones. Adh. ec iudi-
 catur, quòd insignes continui solutiones malè curatæ,
 præsertim circa iuncturam, maciem inducunt sequen-
 ti particulæ. Et hoc quidem propter obstructionem, et
 uirtutis debilitatem, ut iam semel dictum est, & infra
 adhuc dicetur. Plurima adhuc alia, præter supradicta,
 iudicia diligenti animaduersione obseruanda sunt, quæ
 in sequentibus, & in tractatu de ulceribus (quòd tam
 his quàm uulneribus sint communia) recensentur.
 Itaque finem his de uulneribus iudicijs imponemus, si
 quæ de ijs doctè, breuiter, atque ornatè scripsit Cel-
 sus, subiecerimus. Hæc enim uice anacephaleosis &
 compendij erunt eorum ferè omnium, quæ de iudicijs
 uulnerū hæcenus dicta sunt. Verba autem illius sunt
 hæc: Seruari, inquit, non potest, cui basis cerebri, cui
 cor, cui stomachus, cui iecinoris portæ, cui in spina me-
 dulla percussa est: cuiq; aut pulmo medius, aut ieiunū,
 aut tenuius intestinum, aut uentriculus, aut renes uul-
 nerati sunt: cui ue circa fauces grandes uenæ, uel arte-
 riæ præcisæ sunt. Vix autem ad sanitatem perueniūt,
 quibus ulla parte pulmo, aut iecinoris crassum, quod
 Græci πᾶσι γχῦρα uocant, aut membrana, quæ con-

Lib. 5.

Quæ uulnera in
 sanabilia sint
 Celso.

Quæ uulnera
 difficilem cura-
 tionē habeant.

tinet

» tinet cerebrum, aut lienis, aut uulua, aut uestica, aut ul-
 » lum intestinum, aut septum transversum uulneratum
 » est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad
 » grandes, intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus
 » mucro defedit. Periculosa etiam uulnera sunt, ubicun-
 » que uenæ maiores sunt: quoniam exhaurire hominem
 » profusione sanguinis possunt. Idq; euenit, non in alis tã-
 » tum, atque poplitibus, sed etiam in his uenis, quæ ad
 » anum testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum uul-
 » nus est, quodcūque in alis, uel feminibus, uel inanibus
 » locis, uel in articulis, uel inter digitos est: item quod-
 » cunque musculum, aut neruum, aut arteriam, aut mem-
 » branam, aut os, aut cartilaginem læsit. Tutissimum
 » omnium quod in carne est: & hæc quidem loco uel peio-
 » ra, uel meliora sunt. Modò uerò periculum facit, quod
 » cunque magnum est. Hactenus de iudicijs uulnerum.

*Periculosa uul-
nera.*

Malum uulnus.

*Que uulnera tu-
tiora habeant cu-
rationem.*

De curatione uulnerum in uniuersum.
 Cap. IIII.

20



QVONIAM solutionum continuitatis, nedū
 uulneris, communis quidem curandi indica-
 tio, seu (ut dicunt) intentio, est unitio, ut
 Gal. ait lib. artis medicin. cap. 90. Et ea quidem est
 prima indicatio omnibus nota, ab essentia ipsius affe-
 ctus desumpta, quæ præcipit atque insinuat, contra-
 rium per suum contrarium propellendum esse. Hæc au-
 tē prima ac generalis indicatio, perficitur à duobus,
 nempe à natura, tanquam à præcipuo agente, & cau-
 sa effectrice, adiuta suis uirtutibus, & alimento conue-
 nienti:

*Communis so-
luta unitatis cu-
randi indicatio*

P

Intentiones in
curatio uulne-
ribus obseruan-
da.

rienti: & à medico tanquàm ipſius naturæ miniſtro,
quatuor intentiones ſubijnuicem (quod aiunt) ſubalter-
natas in animo habente, dum opus ſuum exercet, ut
curationis finem propoſitum tandem aſſequatur. Pri-
ma iubet extrinſecus incidentia (ſi qua forſan labris
ulceris intercitant) amouenda eſſe. Secūda præcipit
applicanda eſſe extrema diſtantium partium. Tertia
docet ea in unum iam commiſſa & coacta, ita conſer-
uare. Quarta ſuadet ipſam partis læſæ ſubſtantiã
tueri ac ſalubrem ſeruare. His & quinta non abſurdè
superaddi poteſt, quæ docet accidentia, uulneribus ſuc-
cedere conſuecta, corrigere ac propulſare. Primam in-
tentionem aſſequemur dilatādo uulnus, ſi non ſatis de-
hiſcat, aut ſi eius labris aliquid intercitat extraneum,
utputa uel oſis particula aliqua pungens & aſpera,
aut telum aliquod infixū, ut ſagitta: uel mucro, uel ali-
quod aliud extrinſecus incidēs: cuiuſmodi ſit ſpina, uel
harundo. Atque ubi ſatis diducta fuerint labra uulne-
ris, digitis, aut uoſſella, uel forcipe, aut alio id genus in-
ſtrumento à te, ut res expoſtulat, excogitato, quod inſi-
xum eſt, aut labris ulceris intercidit, apprehendi debe-
bit, & leuiter ac (ſi fieri poſſit) citra dolorem euelli, ut
in ſequentibus docebitur.

Prima intentio.

Intentiones in
curatio uulne-
ribus obseruan-
da.

Intentiones in
curatio uulne-
ribus obseruan-
da.

De Plagis, seu cruentis uulneribus. 227

*De sagittis, plumbeis glandibus, et globis ferreis,
ac quibuscunq; alijs telis, è corpore extrahendis.*

Corpus multifariam uulneratum.



Quomodo plumbea glans, aut globus,
à ferentarijs, & levis armaturæ mi-
litibus emissus, extrahatur.



De sagittis,

De sagittis, & quibuscunque alijs telis è
cor pore extrahendis.

VT sagittas, aut quæuis alia tela in corpus defixa, secundum rationem, & ex arte possis eximere, inueniendum tibi primum est, quo instrumento

Instrumentorum
inuentio.

id queas efficere. Modus autem inueniendi instrumenta, habetur ex contemplatione naturæ, ac diuersitatis

Modus inueniendi
instrumenta.

tum lascarum particularū, tum rerum defixarum. Itaque ex horum duorum, partis scilicet lesæ, & rerum

Modus extrahendi.

10 infixarum, accurata consideratione & cognitione, tertium statim se offert: nempe modus euellendi tela in corpus infixa, qui certè uariis & multiplex est, ut ex sequentibus patebit. Cæterum tametsi discrimina, seu differentię telorū ac rerum infixarum, propemodum sint infinitæ, & nec scriptis faciliè mandari possint, (proinde & formæ proiectorum ab hostibus, diligenter à chirurgo perquirendæ sunt) Auicennas tamen conatur eas omnes differentias ad octo reducere. Has autē senario numero placuit nunc complecti. Itaque differ-

Sex telorū
differentiæ.

20 runt tela, quæ nostris corporibus infiguntur, materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uiribus. Materia quidem, quatenus ea quæ imponuntur, & hastilia uocantur, aut lignea sunt, aut arundinea. Ipsa uerò tela, aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, uel cornea, uitrea quandoq; aut ossea: quinetiam arundinea, aut lignea cōspiciuntur. Figura autem euariāt, quatenus alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe tri-

A materia sumpta
differentiæ.

Differentiæ sumptæ
à figura.

30 gula: alia sulcata, alia trifulca, hoc est, tribus ex partibus acie prædita. Nonnulla item sunt spiculata, seu

Spiculatorum
discrimina.

spectatibus, seu retrò uergētibus spiculis munita sunt,
 ut dum extrahentur, contrà defigantur. Illa in anterio-
 ra uergentia habent spicula, ut propulsata idē faciāt,
 hoc est, infigantur, & lanient. Sunt etiam quædam, qui-
 bus utroque uersum, fulminis instar, spicula extant, ut
 & dum extrahuntur, & dum intruduntur, propellun-
 tur uel corpus dilanient, & in obiecta infigantur. Sunt
 item quibus ferrum quibusdam cardinibus seu uerticu-
 lis ita mouetur, ut spicula in impulsione contracta, in
 extractione explicentur, atque ita telum extrahi pro-
 hibent. Magnitudine quoque uariāt tela, quatenus alia
 magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleāt:
 alia parua, ut unum digitum æquent: alia uerò mediū
 inter hæc locum occupent. Numerus etiam in his diuer-
 sitatem adfert, quatenus nonnulla simplicia sunt, non-
 nulla composita: tenuia siquidem quædam ferramen-
 ta, siue ferrea frustula imponuntur, ac si innexa sint,
 ut in teli euulsione faciliè lateant, & in imo relinquan-
 tur. Habitu differunt tela, quatenus alia ferrum acu-
 tum ligno seu hastilibus habent infixum, alia concauū,
 ita ut hastile in ferri tubulum insertum habeāt: atque
 hoc alia firmiter, alia negligentius, ut dum euellūtur,
 relictum intus remaneat. Viribus demum & facultate
 differunt, quatenus ueneno quædam sunt oblita, hoc
 est, uenenata: alia uerò minimè. Atque hæc quidē sunt
 telorum differentiæ. Nunc de instrumentis, quibus tela,
 & res extraneæ nostris corporibus infixæ extrahun-
 tur, dicendum est. Nam de sedibus, in quas tela ipsa pe-
 netrarunt, postea agemus, dum scilicet de modo euellen-
 di tela alia infixæ, sumpta à sede affecta iudicatione,
 commentabimur. Itaque instrumenta quæ à telorum
 aliorumq;

Telorū discrimi-
 na sumpta à ma-
 gnitudine.

Numerus.

Habitus.

Vires.

Instrumenta te-

aliorumq; infixorum differentijs, & à particularum
in quas penetrarunt uarietate excogitantur, inueniū-
turq; licet ualde multa sint, oclotamen apud Guido-
nem, & recentiores chirurgos sunt magis communia.

lis atque infixis
alijs rebus ex-
trahendis ac-
commode.

Primum, sunt forcipes, seu (ut uulgò loquuntur) te-
naculæ Auicennæ, quæ denticulatæ sunt, & capita ha-
bent ad instar limæ. 4. fen. lib. 4. Secundum, sunt
forcipes Albucasis, in modum rostri aut, etiam denti-
culatæ. Tertium, sunt forcipes in modum cannae si-

10 ue arundinis, aut scriptorij calami concavae, quas uul-
gò tenaculas cannulatas uocitant, ad sagittas spiculis
cinctas (quas barbulatas nominant) extrahendis accõ-
modæ. Quartum, est terebellum inuersum, quod in
ferri infixi tubulum (quam doliam appellant) imponi-
tur: ubi autem sic tubulo immisum, ferrum apprehen-
derit, leuiter ferro sequaci educitur. Quintum instru-
mentum, est terebra in longum porrecta, dilatandis ossi-
bus (quibus tela firmiter inhaerent) apprimè idonea.

Sextum, est excisforius culter, ad amplificanda caro-
20 nis uulnera, quò faciliùs infixa eximantur. Septimū,
est propulsorium instrumentum, quod geminum est, nè-
pe cauum, & solidum siue surdum: illud foeminam,
hoc marcm appellant. His tela protrudimus, donec ab
altera parte apprehendi, & extrahi possint. Ocla-
uum, est in modum arcus illius, quem uulgò balistam
uocant. Hoc autem, istū telum excutitur, aut ut in se-
quentibus dicemus, extrahitur. Horū autem aliquorū
formulas in sequentibus depictas inuenies. Cæterum
extrahendorum telorum, quæ illata corporibus intus

Modus extrahē-
di tela infixa
duplex.

30 hæserunt, modus est duplex, per attractionem unus,
alter per protrusionem, seu impulsione. Attractio fit

attractio,

*Propulsio.**Comunia quædam in extrahendis telis sedulo obseruanda.*

ab ea parte maximè, qua uenit telum, sed interdum etiam & ab ea in quam tetendit. Protrusio autem, seu propulsatio fit in partem oppositam ei, ex qua uenit, infixumq; est. Horum autem modorum indicationes desumenda sunt, tum ab ipsis telorum generibus, quæ suprà commemorauimus, tum ex illis sedibus, in quos illa penetrarunt. De quibus mox dicam, si communia quedam præmiserò in extrahendis telis sedulo obseruanda. Si itaque telum in conspectu sit, sic ut se habet, protinus extrahendum est: sin occultatum est, ita faciè-¹⁰
 dum Hippocrates præcipit: Corpus uulnerati, (si ta-
 men ipse poterit) in ea figura constitui debet, in qua
 erat eo tempore, quo uulnus accepit, atque ita quò te-
 tenderit telum, specillo explorandum est. Si æger id
 non potest, iacens saltem ita debet collocari, ut quàm
 proximè fieri potest, ad eam figuram accedat. Si telū
 aliquod defixum primis conatibus commodè ac salu-
 briter euelli non possit, sic eousque dimittere debes, do-
 nec circūposita caro emarcescat, putrescatq; . Deinde
 intermissum opus aggredere, telum ipsum quod infix-²⁰
 xum est, modò huc modò illuc agitando, ac manibus uel
 forcipibus leuiter ipsum contorquendo: ita enim le-
 niùs multò ac faciliùs telū extrahes, ut rectè præcepe-
 runt Auicennas, Brunus, & Albucasis. Quanquàm ali-
 ter uisum sit Henrico: hic enim uoluit statim ac sine
 mora, tela quocunque modo fixa extrahi. Si armatus
 homo telo ictus fuerit, nec possit leniter ac faciliè telū
 manibus euelli, uulneratum protinus suis armis exui
 iubeto, & ritè apparatus omnibus, quæ ad opus eius-
 modi conducere uidebuntur, emissioq; ac præfatio (ut su-³⁰
 præ dictum est) præfatio, forcipe communi apprehen-
 sum

- sum telum (praesertim si sagitta est) ipsum leniter con-
torquendo extrahito. Quod si communi hac forcipe
infixum retrò, hoc est, ea parte qua uenit, recipiendum
sit, nec aliter educi possit, amplificanda scalpello aut
nouacula plaga est, quò facilius id sequatur, quoq; mi-
nor oriatur inflammatio: quæ maior quidem sit, si ab
illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Itè si ex alia
parte uulnus aperitur, laxius esse debet, quàm ut telo
1 o postea transeunte amplificetur. Summa autem utraque
parte ita habenda cura est, ne neruus, ne uena maior,
ne arteria incidatur. Quod si horum aliquid detectum
fuerit, excipiendum hamo retuso est, abducendumq;
est scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum exi-
mendum est: tum quoque eodem modo, et eadem cura
habita, ne sub eo, quod eximetur, aliquid praedictorum
lædatur. Si autè telū ita firmiter ossi inhæsit, ut nulla
ui extrahi possit, terebello (ut uocant) directo diuissio-
nem amplificabimus, ac modo infra scripto telum li-
2 o berabimus. Telo à corpore euulso, non alia est uulne-
ris medicina, quàm quæ esset, si corpore iclo nihil in-
hæssisset. Ergo uulnus ipsum, ut et cætera alia uulne-
ra, tractari ac curari debet, hoc uno addito, quòd qui
ab infixo telo alteratus est sanguis, exprimi, ac educi
debet, ut uulnus ipsum à putrilagine uindictetur. Ac
perfundi quidem debet oleo calète, maxime si doloris
adeest suspitio. Si inflammationem experiatur, ad eam
tollendam insuccatis lanis, fomentis, cataplasmatibus, et
consimilibus utemur. Si uerò inflammatione uacauerit,
3 o futuris (si opus fuerit) adhibitis, impositoq; medicamen-
to, quod cruentis statim uulneribus iniecti solet, curan-
dum est.

Methodus exi-
mendi tela, sum-
pta indicatione
ab ipsorum dif-
ferentijs.

Sagitta sapius
antrorsum edu-
cenda.

dum est. Ceterum his communibus prælibatis, tempe-
stuum est propria quedam de telorum extractione
subijciamus, & quando ac quomodo attractione uel
propulsione, sit utendum, sumpta primum (ut proposi-
tum est) indicatione ab ipsorum telorum generibus seu dif-
ferentijs, dein ab ipsis sedibus affectis. Itaque tela, quæ
iaci ac uibrari solent, magna ex parte sunt uel oblon-
ga & angusta, cuiusmodi sunt sagittæ: uel lata, uel ro-
tunda, aut angulosa, ut plumbea glans: uel ferrea, aut
lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrum
intus insedit. Telum si oblongum est & angustum, cu-
iusmodi sagitta est, & facile in corpus cõditur, & al-
tissimè insidit. Sæpius itaque alia parte, quàm qua ue-
nit, sagitta educenda est, præcipueq; quia ferè spiculis
cingitur, quæ magis laniant si retrò, quàm si contrà
trahuntur. Sed inde aperta uia, caro diduci debet, ferra-
mento ad similitudinem sacro Græcæ literæ λ . Deinde
ubi appueris, si mucroni arundo inhaeret, propellen-
da est sagitta, donec ex altera parte apprehendi, &
extrahi possit: Si iam illa, arundo inquam, seu hastile
decidit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digitis ap-
prehendi, uel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia
ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli
magis placuit. Nam ampliato uulnere, aut arundo, si in-
est, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Por-
rò eximetur ferrum, uel terebra inuersa in tubulū (quam
doliā uocant) immisso, uel forcipe, qua dentes atque
eorum radices euelluntur: uel ferramento, quod à telo
extrahendo belulcū Græci uocant: aut alio quopiā in-
strumento ad id accommodo. Nōnunquā etiam carnem
prius incidētes, si uulnus instrumentū nō recipit. Quòd
si spicula

- si spicula apparuerunt, eaq; breuia & tenuia sunt, for-
cipe ibi communi debent, uacuumq; ab his telum educi.
At si ea maiora ualentioraq; sunt, fixis scriptorijs ca-
lamis, ut consulit Celsus, contegenda sunt, ac ne quid
lacerent, sic euellenda. Alij spicula ipsa forcipibus seu
tenaculis (ut uocant) canulatis apprehendunt, atq; ita
telum eximunt. Quod si telū spiculis utroque uersum
spectantibus cinctū in neutram partē sequatur, iuxta
ipsum alia incisione patefaciendus locus est, nisi uena
10 aut tale aliquid impediat: atq; inde ferrum undiquaq;
explicatum modeste, ac sine ulla uulstone tollendū est.
Quidam etiam spicula eiusmodi fixis calamis, seu exi-
guis arundinibus, prius contegunt, ne quid lacerent,
deinde ita euellunt, ea scilicet parte, quæ eductioni ma-
gis congruere uidebitur. Latum uerò telū si conditum
est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti uul-
neri, ipsi quoque ingens uulnus adijciamus. Euellendum
ergo est, genere quodā ferramenti, quod Diocleum era-
phiscum Græci uocant, quoniam autorem Dioclē ha-
20 bet: quem inter priscos, maximosq; medicos fuisse me-
morie proditū est, ut Cornelius Celsus annotauit libro
septimo, capite quinto. Tertiū quoddam genus telo-
rum est rotundū, ut diximus, aut angulosum, ut lapis,
plumbea glans, aut simile aliquid, quod ex funda aut
tormentis bellicis mittitur, & perrupta cute integrū
in corpus defigitur, ac latet. Tela autem eiusmodi in-
tus condita esse his notis deprehendes. Moles aspera
atque inæqualis, (si contrectetur) subesse sentitur. Pla-
ga seu diuisio non omnino in rectū tendit, sed & ma-
30 ior etiam ac amplior apparet: caro item contusa liui-
daq; cernitur. Dolor præterea cum gravitate quadam
infestat

Si sagitta spicu-
lis cincta est.

Latum telum ab
ea parte qua ue-
nit, extrahendū.

Rotundum telū
aut angulosum.

Tertium genus telorum ea parte qua uenit, extrahendum.

Tela interdum diu in corpore delitescunt, per sanato uulnere.

Methodus extrahendi tela infixæ, sumpta a sede affectæ indicatione.

Sit telum in summa carne infixum est.

infestat. In omnibus his, latius uulnus aperiendū, idq; quod inest ea qua uenit, aut uncis, aduersū ue scalpelli parte, aut uulnerario specillo recipiendum est, aut denticulata forcipe, si fieri potest; et eam uulnus admiserit, extrahendum. Quod si telum infixum sic intus lateat, ut nullo modo reperiri possit, aut non satis comòdè extrahi, tantisper dimittendum est, donec natura ipsum protrudat, aut manifestet. Interdum uerò tela infixæ integra, intus cicatrice obducto uulnere citra noxam aliquam diu delituerunt: deinde longiore tēporis spatio, partem eam abscessu occupante ac dirupto, exilière: quo facto, uulnera mox ad sanitatē perducta sunt, ea illis curatione adhibita, quæ alijs debetur uulneribus. Quod multis cōtigisse uidit Albucasis, ut refert parte secunda suæ chirurgiæ. Hactenus de telorū extractione, sumpta ab ipsorum differētij indicatione: nunc de re eadem dicemus, sumpta ab ipsis affectis sedibus indicatione. Itaque sedes in quas tela penetrarunt, uel caro sunt, uel ossa, uel articulus. Atq; in ijs quidē partibus, uel altè telū infedit, uel in summo duntaxat, aut saltē nō admodū altè, et citra mediū infixū est. Adhæc uel membrū unū duntaxat telo iclū est, uel particula plures simul cōfixæ sunt, ita ut particula unatelo traiecta, alteri affigatur. Igitur si in summa carne telū impactū est, aut certè magnas uenas, et loca neruosa nō transiit, nihil melius est, quàm quā uenit, id euellere: similiter etiā quod altè inhaesit. Obiectæ uerò partes, id est, quæ ex diuerso respondent, si conuulnerentur, uel ex sanguinis profusione, uel ex aliorū membrorū consensu, et consortij lege periculum inuehant, euulsione qua parte infixum est, eximi debet. illud autem

huc autem digitis, uel ipsius teli arundine, seu hastilli (quod plerumque ligneum est) in ferri tubulū immisso, extrahemus. In quibus uerò altè telum in carne infixum est, & plus est, hoc est, longius spaciū, per quod telo reuertendum, quàm quod perumpēdum est, iamq; uenas nervosq; id pertransiuit: breuiter cū parū admodū integræ carnis ex aduersa parte superest, neque aliquid obstat, quominus contra mucronem incisio cōmodè fieri possit, melius est aperire quod superest,

Si telum altè in carne infidit.

10 eaq; propulsatu telum educere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro, si medium mucro transiit, facilius sanescit quod peruium est, quia utrinque medicamento fouetur. Protrudi autem debet, uel hastilli ipso, si inhaereat: uel si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidem, uel solido (quod & surdum quidam uocant) prout res exigit. Porro si telū acumen (quod ῥαχὸν uocant) habeat, (hoc autem specillo deprehendimus) propulsorij instrumenti foeminam: si uerò tubulum seu concauitatem

20 habuerit, marem demittemus, atque ita ferrum inserto instrumento protrudemus, quoad educi facillimè possit. At si etiam in opposita, seu ulterius telum processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infixum est, diuisis ijs quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, uel euellentes, ut dictum est, uel per eam partem in quā tetendit, ut modò diximus, propellētes, summa cura (uti monuimus) semper habita, ne uel neruum, uel tendonē, uel maiorem uenam, aut arteriā incidamus. Turpe siquidem est, dum telū extrahimus, maiore no-

Si telū in opposita processerit.

30 xam inferre, quàm telum ipsum effecerit. Si telū ossi inhaesi, non nisi attrahendo ipsum eximere tutum est.

Si telum ossi inhaesi.

Eò autem

Eò autem usque mouendum est, donec is locus laxetur,
 qui mucronem momordit, & tum uel manu uel forci-
 pe telum extrahendū est. Quæ ratio in dentibus quo-
 que eijciendis est: & uix, unquam ita telum nõ sequi-
 tur: sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferra-
 mento poterit. Quidam tenaculis (ut uocant) seu forci-
 pibus alligant arcum, quem uulgo balistam nominant,
 & laborante bene stabilito, intensum ipsius instrumen-
 ti neruium, seu chordam remittunt, et ita telum extra-
 hunt. Quòd si telum altiùs in osse defederit, (quod co-
 gnoscimus, si firmiter id infixum, nulla ui moueatur,
 aut labet) excisorio cultro, osse quòd iuxta est exem-
 pto, aut etiam terebra (si crassum sit) priùs perforato,
 telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine te-
 rebra facto ad speciem literæ J, contra telum os exci-
 dunt, sic ut lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent:
 quo facto, id necesse est, labet, & facillè auferatur.
 Quod remedium ultimū est. Alij terebra in rectum ac
 longum porrecta, quæ illis directæ uocatur, ossis per-
 cussi rimas coniuuentes, & telum infixum mordicus
 prehendentes, diducunt, atque ita facillè quod infixum
 est extrahunt. Inter duo uerò ossa, si per ipsum arti-
 culum telum perruperit, circa uulnus duo membra fa-
 scijs habentibus ue deliganda, & per has in diuersas par-
 tes diducenda sunt, ut tendones, ligamenta, & nervos
 distendant. Quibus extentis, laxius inter ossa spaciū
 est, ut sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quo
 que uidendum est, sicut in alijs locis seu particulis su-
 præ monui, ne quis neruus, aut uena, aut arteria à telo
 ledatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quæ
 supra posita est. At si particule plures confixæ fue-
 rint,

Si telū altiùs in
 osse demersum
 sit.

Si telum in arti-
 culo se inter duo
 ossa demersū.

Si particule plu-


rint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur; uerbi causa, brachium thoraci, aut cubitus alicui alteri corporis particule, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum utrumque membrum penetret sagitta aut hasta, eam ab exteriori parte, perinde atque in uno fieri consuevit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambæ partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte ferræ rescata, eas ligni partes quamfacillimo fieri poterit modo, sigillatim euellimus. Porro si uenenato quoque telo plaga facta est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adijcienda curatio est, quæ uel epoto ueneno, uel à serpente, aut quouis alio uenenato animante ictis adhiberi solet. Cæterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quæ ueneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam, quod à sana carne multum diuersa sit: pallida enim supra modum, subliuida, & ueluti mortua apparet. Sin carnem totam à ueneno immutatam circuncidere non possis, non alium erit circa uulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare, quod plus uitiati iam sanguinis extrahatur: dein uenenum admota uulneri cucurbitula, extrahendum est. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile uas, quod idem possit. Si ne id quidem est, (quod tamē uix incidere potest) homo uilis aliquis adhibendus est, qui uulnus exugat. Sed illud ne intereat: antè debet attendere, qui uulnus exuxerit, ne quod in gingiuis, palato ne, alia uel parte oris ulcus habeat: hoc pacto enim & ipse tutus erit, & tutum hominem uulneratū præstabit. Siquidem uenena (ut Celsus ait) non gustu, sed in uulnere nocent. Verum priusquam hæc aggrediamur,

res confixe fuerint.


Si uenenato telo quis ictus est.

Venena non gustu, sed in uulnere nocent.

*Forcipes denticulatæ, ad euellendum spinas,
ossicula aspera et pungentia, aculeos
quoq; & mucrones infixos,
aliaq; id genus acuta.*



Hoc genus forcipis,
rostrū coruinū qui-
busdam appellatur,
alijs serpentiniū in-
strumentū: quod ad
2. Guid. instrumētū
pertinere uidetur.



Forcipes Al-
bucastis, sub
hac duplici
formula de-
picte, repe-
riuntur in
uarijs exem-
plaribus: hæ
autem sunt
secundū Gui-
donis instru-
mentum.



Alia

Q.

Alia forma forcipis den-
ticularæ, ad eosdem usus
utilis, et apprimæ idoneæ:
ad quos & duæ aliæ præ-
cedentes forcipum disse-
rentiæ.

Aliud forcipis genus ad
globos educendos, & tela
spiculis cincta, obuersasq;
cuspides habentia. Vul-
gares chirurgi barbata
la uocant.



Instrumentum,

Instrumentum, ad extrahendum ferrum infixum, tubulum habens arundine seu hastili uacuum. Hoc uti possumus loco quarti instrumenti Guid. quod terebram inuersam appellat.

Terebra directa, quod quintum est Guidonis instrumentum, ad amplianda ossa, quibus tela inhaerent.



Formula forficis excisorie, ad amplianda uulnera in carne accepta, quò faciliùs infixæ eximantur. Hoc sextum est Guidonis instrumentum.

Formula impel-
lētis caui, quod
et propulsoriū
fœmina dici-
tur. Hoc septi-
mum est Guid.
instrumentum.



Formula impel-
lētis surdi, quod
et propulsoriū
mas appellat-
tur. Hoc etiam
ad septimum
Guid. instrumen-
tum refertur.



10

20

30

De secunda intentione curationis uulnerum.

Secundam intentionem in curandis uulneribus (quæ
 est commissio dissidentium, seu distantium partium
 coniunctio) assequimur per orarum adductionem, seu la-
 biorum uulneris inuicem distantium attractionem, &
 applicationem, membrum ipsum læsum quam fieri po-
 terit lenissimè tractando. Dissidentium namque con-
 iunctionem seu agglutinationem, (ut Galenus ait) præ-
 cedit necessariò orarum adductio. Quæ autem diducta
 10 sunt, in idem adducuntur, aut uinculo ex duobus uitijs
 circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas Græci αγκυ-
 ρας uocant) impositis, aut horum quibusdam, aut om-
 nibus. Quòd si uulnus (ut proposuimus) simplex sit,
 hoc est, solùm continui in carne diuortium, cum quo
 neque affectus ullus, neque symptoma ullum adsit,
 nec ualde magnum sit, sola fascia orbiculatim circun-
 data, diductæ partes committendæ sunt. Ita enim uul-
 nus proculdubio coibit, et citra aliquam aliam extrin-
 secus adhibitam curam coalescet. Huius autem condi-
 20 tionis & coalescentiæ effectrix causa, sola certè est
 natura. At si magnum uulnus sit, adeò ut diductæ
 partes in totum atque exactè prædicta deligatura cõ-
 mitti nequeant, suturis ipsæ adducentur: deindè ubi
 sic deligatæ, aut suturis adductæ fuerint, glutinatorijs
 præsidijs utemur, quæ collectam humorum subluuiem
 desiccare & consumere queant: aliam uerò ne influat,
 prohibere. Plaga autem ea sui potissimum debet, quæ
 in molli parte accepta est, maximeq; si discissa auri-
 30 ima est, ut Celsus ait, uel imus nasus, uel frons, uel buc-
 ca, uel palpebra, uel labrum, uel circa guttur cutis, uel
 uenter: uix enim ijs partibus deligaturam uulnus ad-

Dissidentium
coniunctio.

Lib 3. Ther.

Trifariam di-
stinctæ oræ uul-
neris in idē ad-
ducuntur.Vulnus simplex
ex sola partium
commissione ad
glutinari potestDeligatura.
Sutura.

Q uij mittit.

Fibula.

mittit. Si uerò in carne uulnus est, hiatq; neque in unū oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est, imponendæ uerò fibulæ sunt, (ἀγκυρῶς Græci nōnant) quæ oras paulum tamen contrahunt, quò minus lata postea cicatrix sit: ferè autem fibulæ latius uulnus esse patiuntur.

De tertia intentione.

Commissorum
conseruatio.Dupliciter con-
iuncta manere
quæ commutun-
tur.

Tertius scopus, qui in curando simplici uulnere chirurgus proponitur, est, ut diductorum oræ, ita ut in unum per adductionem coniunctæ sunt, conseruentur, & maneat. Conseruabuntur autem optimè huiusmodi extrema, quæ in unum coacta sunt, iisdem ferè auxilijs, quibus & in idem adducta sunt: nempe, decenti ligatione, appposito mēbri situ, & futuris, si necessaria uidebuntur. Porro bifariam simul manent, & adglutinantur, quæ commissa sunt: alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt ac manent. Per se quidem, quæcunque secum concrescunt ac coalescunt: aliorum ope, ut ea quæ colligantur, & quæ glutino aliquo tenentur: ac quæ concrescant, coalescant uel, omnino mollia naturaliter sint oportet. Talis sanè est (inquit Galenus) tum caro ipsa, tum quæcunque carnea, ex ipsa cōsitutione sunt. Quæcunq; uerò dura siccaq; sunt, eorū diuisæ partes coire simul nequeunt, (alienū enim terminum nequaquam admittunt) sed glutinum aliquod, uinculum uel, quo commissa maneat, requirunt. Et talium quidem sanatio in sequentibus præcipietur. Nunc de ijs quæ per se uniri possunt, inceptum sermonem peragamus, & quomodo uulnus ligari conueniat, prius dicamus.

Quomodo

Quomodo uultus ligari conueniat.

Deligaturæ modi seu differentie tres sunt apud Auicenn. fen. quarta lib. quarti. Nempe incarna-

Triplex genus deligaturæ.

tua, expulsiua, & retentiua: ita enim eius interpres; & recentiores chirurgi eas nominant. Incarnatiua, quæ magis propriè adglutinatoria diceretur, recentibus tum uulneribus, tum fracturis accommodatur. De-

Incarnatiua seu adglutinatoria deligaturæ.

bet autem fascia in hoc genere deligaturæ, à duobus ini-

10 tijs uersus medium eiusdem circumuolui, & principiū deligaturæ fieri ex parte aduersa loci uulnerati, ducendo, atque iniiciendo alterum fasciæ principium uersus partem superiorem membri, alterum uersus inferiorem. Ea uerò latitudine esse debet fascia ipsa, ut semel iniecta, non uulnus tantum, sed usque ad aliquid utrinque etiam oras eius comprehendat, quantum uidelicet uidebitur necessarium. Si ab altera parte caro magis recessit, ea melius attrahitur. Si æquè ab utraque, transuersa comprehendere oras debet: aut si id uulneris ratio non patitur, media primum iniicienda

20 est, & tum in utranque partem ducatur. Ceterum arctior esse debet ligatura super locum læsum, quàm in partibus adiacentibus. Cauendum tamen semper est, ne uel nimis arcta, uel nimis laxa sit. Quandoquidem quæ laxior est, non continet, quod autem non continetur, elabitur. At uerò quod uehementius est adstrictū, dolorem premendo excitat, & proinde fluxionem pro-
30 ritat, & phlegmonem accersit, quandoque etiam gangrenam. Danda igitur opera est, ut uitato ambarum incommodo, utriusque fruamur commodo. Id fiet (ut

Lib. 6. metbo.

30 Galenus ait) si quod nimium est, declinabimus. Ergo nec adeò arctare deligaturam debebis, ut iam compri-

Q iiiij mat:

*Sic deliganda
est fascia, ut
contineat, ne-
que adstringat.*

mat: nec adeò remittere, ut laxa sit. Et, ut summam
dicam, deligatur terminus, sit bona laborantis toleran-
tia. Ceterum extrema fasciæ acu assuenda sunt. Nam
nodus (inquit Celsus) ulcus lædit, nisi tamen longè est.
Et si necessitas desideret, plures fasciæ iniiciantur, &
modo qui suprâ dictus est, reuoluantur. Itaque hoc deli-
gandi modo uulneris labra ad amussim committuntur,
et quò minus circa uulnus excitetur phlegmone, (cuius
rei curam imprimis habere oportet) prohibetur: ut lib.

*Expulsoria de-
ligatura.*

6. methodi Galen. annotauit. Sunt qui pannum lineum
duplicatum adaptant uulneri, & stringendo acu desu-
per assuunt. Hæc de prima ligaturæ differentia. Secū-
da deligaturæ differentia, quæ expulsoria dicitur, an-
tiquis ulceribus & sinibus (quos cauernosa ulcera uo-
cant) propriè dicata est. Hoc enim cōmodi præstat in
illis, quòd à fundo ad os collectam humorum colluuiẽ
extrudit, & ne quid amplius in locum affectum con-
fluat, ualidè prohibet. Hæc autem sit fascia ab altero
tantum principio reuoluta, incipitq; ab inferiore par-
te membri laborantis, ubi arctior esse debet. Ab hinc

*Deligatura ex-
pulsoria fit in-
fernè sursum.*

ad superiorem partem facta circumuolutione, eam pau-
latim soluendo, dispensatur: si saltem os per quod sa-
nies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. In-
terdum enim inferiùs spectat. Voco autem hîc par-
tem superiorem cum Galeno, quæ uersus cor aut he-
par, uasorum radices spectat. Rursus radicem uas-
is appellamus, priorem eius partem, quæ iecinori pro-
pior est, uel etiam cordi. Porro huiusmodi ligatura
adaptari solet membris inæqualibus, id est, quæ non
sunt æqualis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibiæ, scindẽ
dendo fasciam ipsam, singulo quoque palmi interuallo,

*Lib. 5. meth.
meden.*

& eam

- Et eam ualide acu assuendo, ab ea parte maximè, quæ gibba est, seu, ut dicunt, arcuata: laxè uerò à parte altera dorsali. Hoc autem genus ligaturæ utilissimum est in antiquis ulceribus, uaricibus, Et tibiæ inflatibus. Deligatura quæ retinet medicamenta, accom=
modatur membris, in quibus non potest fieri arctatio, Deligatura retinens.
seu strictura, neque alia deligatura, ut in collo, Et uentre, atque omnibus abscessibus, Et dispositionibus dolorificis. Hæc autem perficitur, linteolo, seu fascia unicum finem, seu (ut dicunt) caput habente: uel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigit. Atque eius deligaturæ principium, super locum affectum iniicietur, Et in parte opposita, uel nodus, uel potius sutura fiet. Talis autem deligatura leniter, et citra dolorem, cum appetet tempus, solui debet. Quod si linteola nimis adhereant, ea tantisper uino madefacito, donec facile separari possint. Fascia uerò ad uulnus deligandum, lintea aptissima est Galeno lib. 6. Therap. quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod
20 enim molle nimium est, Et algæ ritu fragile, non tutò continet. Quod uerò durum nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex panno ueteri, non tamen nimis detrito, suauis, lenis, Et mundus: eaq; latitudine, Et longitudine, quam natura partis desiderat. Vt si humerus tibi deligandus sit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat, assumes: at si femur, quinque: si tibia, quatuor: si brachium, trium digitorum. Si uerò diguus ligari debeat, unius digiti latitudine fascia assumenda erit. Eius uerò longitudo sit, pro ratione numeri iniectionum, hoc
30 est, pro necessitate reuolutionum. Hoc igitur, ut et multa alia, quæ scriptis mandari non possunt, medici ac chirurgi

Quæ fascia uulneri deliganda aptissima.

chirurgi ingenio, quod (ut Damascenus ait) tum artē, tum naturam operantem magnoperē adiuuat, committitur. Sed & ad hoc non parū confert, cognitio conformationis ipsius particulae laborantis: ut. 4. Ther. Gal. his uerbis expreſſit: Deligare (inquit) commodē agram particulam non poſſis, niſi prius uel ex figura, uel positura, uel utriusque indicationem ſumpſeris. Haec de modo deligandi. Nunc de qualitate, & modo ſuendi.

De ſutura in uulneribus ſacienda.

10

Sutura triplex.

Uſus ſuturæ agglutinatorie.

Modi quinque ſuturæ agglutinatorie.

Triplex ſutura communiter fieri ſolet in uulneribus, agglutinatoria, quam incarnatiuam uocant: ſuppreſſoria ſanguinis, & labiorum in unum adductorum ad tempus conſeruatricis. Sutura incarnatiua omnibus his plagis, ſeu uulneribus, in molli parte acceptis competit, quorum labra ſi inuicem diſident, ut ſola ligatura in unum adduci non poſſint, & quibus nihil iam extraneum inter ipſas oras intercipitur. Sed & recentia eſſe debent uulnera, quibus hoc genus ſuturæ accommodatur: uel ſaltem ſi uetera fuerint ac dura, calloſaq; labra habuerint, per ſcarificationem, aut cutis ablationem, ſanguine emiſſo renouata. Hæc autem fit quinque modis. Primò filo forti, æquali, & læui, cuiuſmodi eſt ſericum in communibus ſaltem uulneribus, primum punctum faciēdo in medio diuiſionis uulneris, deinde alterum in medio ſpacio utriusque lateris, & ita deinceps procedendo, ut inter duo quæcunque puncta, punctum intercedat, donec uulneris labra ritè commiſſa fuerint. Itaque neq; nimis rara, neque nimis crebra ſutura eſſe debet. Si enim nimis rara eſt, non continet: ſi

- uet: si nimis crebra est, uehementer afficit. Quia quò
 sapius acus corpus transiuit, quoq; plura loca inieclū
 uinculum mordet, eo maiores inflammationes (inquit
 Celsus) oriuntur. Sic igitur futura oras iungat, ut ne Lib. 5.
 ipsæ quidem inter se ex toto contingant. Quòd scili-
 cet, si quid intus humoris concreuerit, sit quā emana-
 re ac effluere possit. Solent autem communiter unius
 digiti transversalis spaciū inter iniecla uincula re-
 linquere. Porro acus longa ac leuis esto, cuspide trian-
 10 gulari, cauda uerò excauata, ut in ea filum recòdatur,
 & transitum acus non remoretur. Ita enim mitiùs cor-
 pori insidit. Ceterum cannula habeatur fenestrata,
 cui incumbat ac innitatur altera pars labij uulneris,
 ne scilicet huc atque illuc euagetur, dum acus intromit-
 titur: & ut per fenestellam uideri possit, quando acus
 pertanserit. Atque ubi iam acus traicla fuerit, unā
 cum filo trahatur: sed interim uulneris labrum, quod
 prope filum est, specillo huic parti applicato, ueluti
 fulcimento & adminiculo innitatur, ne dum filum ex-
 20 trahitur, labrum etiam consequatur. Ligetur autem
 primò duabus inolutionibus, secundò una duntaxat, de
 indè filum scindatur, aliquantulum remotè à nodo.
 Secundo modo fit futura incarnatiua, seu agglutina-
 toria, acubus, aut pēna cum acu introducta: hac autem
 utimur in magnis uulneribus & profundis, in quibus
 labra plurimū inter se distant. Atque tot numero
 acus imponendæ sunt, cum filo in eas intronisso, quot
 necessariae uidebuntur. Filum autem circa eas reuol-
 uendum est eo modo, quo muliereulæ facere solent, dū
 30 suas acus super manicas aut capita affseruant: atque
 hoc modo relinquuntur usque ad uulneris cōsolidatio-
 nem.

Acus qualis
 esse debeat.

Secundus mo-
 dus future ag-
 glutinætorie.

*Tertius modus
suturæ incar-
natione.*

Ansa.

*Quartus modus
suturæ agglu-
natoria.*

*Quantus modus
suturæ incarna-
tiue.*

nem. Tertio modo fit sutura hæc agglutinatoria di-
cta, ueruculis æqualibus ex stupis uehementer contor-
tis, & gracilibus, ad modum scriptorij calami, uel fe-
suce, longitudine ferè mediij digiti. Quòd si uelimus su-
turam longo tempore perdurare, pinna, seu scripto-
rius calamus, loco stuparum, assumi debet. Fit autè ad
hunc modum: utraque uulneris ora traijci debent, acu
filum ducente. Deindè facto per idem foramè reculsu,
ex ea parte qua uenerat, recipienda est: sic quidem, ut
ansa una remaneat ea parte, qua remeauit. In qua al- 10
terum ueruculi extremum imponendum erit. Postea fi-
nes amborum filorum, euntis inquam & redeuntis, cõ-
stringito, & super alterũ ueruculi caput ligaturã faci-
to, ibiq; fila rescindito, et ueruculũ hoc pacto usq; ad
perfectã uulneris coitionẽ relinquito. Quarto mō,
eiusmodi sutura fit, fibulis (quas Græci ἀγντῆρας
nominant) disiunctas atque hiantes uulneris oras com-
mittendo. Sunt autem fibulæ ipsæ uel maiores, uel mi-
nores, pro ratione partis uulneratæ: ab utraque ue- 20
rò parte recuruæ: figaturq; hamus unus in altero uul-
neris labro, & uersus alterum ducatur, in quo & alter
hamus infigatur, ut facere solent qui pannos tundendo
apparant. Hæ autem (fibulæ inquam) quibus hiantis
plagæ oras sic contrahimus, nullam uim desiderant,
sed eatenus utiles sunt, quatenus cutis ducentem quasi
sua sponte subsequitur. Quinto modo diductæ uulne-
ris oræ committuntur, pānis utrinque admotis, qui figu-
ram triangularem referant, & ea sint magnitudine,
quæ membro leso congruere uideatur. Qui suturæ mo-
dus, in ijs maxime locis conuenit, in quibus uolumus 30
cicatrices, facta uulneris agglutinatione, non appare-
re, ut

- re, ut in facie. Panni autem eiusmodi, uiscoso linimēto ac pertinaciter adhærente oblini debent, quòd recipiat puidem sanguinis draconis, thuris, & mastiches, sarcocollam, picem, & pollinem, id est, farinam uolatilem molendinariam. Quæ omnia cum oui candido liquore subigi debent, & in unitatem redigi, atque ubi linimenti formam ea iam induerint, supra dictos pannos extendi debent, qui utrinque postea ad latera uulneris, ad pollicis unius distantiam supra uulneratam partem agglutinandi sunt. Vbi autem hæc panni frustula sic linimento oblita, desiccata fuerint, ingeniosè, & ut oportet, consui debent. Quo facto, uulneris labra coibunt, & agglutinabuntur. Sutura sanguinem suppressens, fit acu filum trahente, traiectionis oris uulneris utrisque, per modum reuolutionis, uti pelles consui solent. Ea autem utimur, quando alia non datur uti, propter magnum ruentis sanguinis impetum, accepto in uenis uulnere. Sed & hæc utilis est ad transuenda intestina, cum sauciata sunt: ad panniculos quoque uulneratos, & loca carne destituta. Verum non admodum tutus est hic consuendi modus: quandoquidē disrupto puncto uno, cetera relaxantur. Sutura quæ labiorum in unum attractorum est conseruatricis, fit ut reliquæ aliæ: uerum non æquè arcta esse debet. Eo enim duntaxat nomine fit, ut simul maneant, quæ commissa sunt, tantisper dum uulnus coaluerit. Competit autem huiusmodi sutura uulneribus in carne aut molli parte acceptis, in quibus magna facta est dilaceratio, & carnis deperditio. Hac enim facto unionis diuortio,
- 3^o seiunctæ partes in unum adducuntur, quò citius coalescant. His etiam uulneribus rectè accommodatur, è quibus

Sutura sanguinem suppressens.

Modus suturæ tertius.

quibus in posterum aliquid extrahendum est. Illud autem de futuris ac fibulis in uniuersum diligenter obseruandum est, ut illis nunquam utamur, antequam uulnus intus purgatum sit, (nisi cum magna sanguinis profusio supprimenda est) ne quid ibi concreti sanguinis reliquatur: id enim & in pus uertitur, & inflammationem mouet, & glutinari uulnus prohibet. Sed ne linimentum quidem, quod supprimendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est: nam id quoque inflamat. Comprehendi uero sutura uel fibula, non cunctum tantum, sed aliquid etiam ex carne (ubi suberit hæc) oportebit, quod ualentius inhaereat, neque cutem abrumpat. Vtraque optima est (ut uoluit Celsus) ex acia molli, non nimis torta, quod mitius corpori insidat. Sed neque rara nimis, neque nimis crebra (ob superius adductas rationes) sutura aut fibula iniicienda est. Neutra etiam uim ullam desiderat, sed eatenus utilis est, quatenus cutis ducere quasi sua sponte subsequitur. Caterum tunc appetit tempus remouende suturae, cum ea, quem desideramus effectum praestiterit. Modus autem remouendi talis est: Specilli caudam, id est, angustum mucronem, filo supposito, filumque ipsum mox abscindito. Postea latum ipsius specilli mucronem, labro uulneris per quod filum educitur, superposito. Ita enim pulchre uitabis, ne quid filum euellendo laceretur.

De modo conficiendi puluillos, & eorum usu.

Vsus puluillorum.

TEmpestiuum autem est, de puluillis (qui uulgaribus chirurgis plumaceoli nuncupantur) aliquid obiter dicamus: hi enim ad multa utiles sunt. Quando quidem dissolutas ac diductas partes fulciant, & comprimunt:

- primunt: membri, quod suæ unionis diuortium patitur, genuinum calorem fouent, & conseruant. Denique à graui molestoq; uinculorum ac fasciarum pondere, uulneratam particulam tuentur. Fieri autem quondam solebant ex pluma inter duos pannos candidos, & mundos consuta, unde & nomen illi à ueteribus inditum est. Verum quoniam eos subindè mutare, & innouare (quod ualde tædiosum erat) cogebat necessitas, magis postea placuit eiusmodi puluillos ex stupis canabinis conficere, præsertim diligenter ac studiosè pexis, emundatisq;. Fiunt etiam interdum ex lana uel xylo, quod cottonem appellant. Plerique autem hodie loco puluillorum, panniculos admovent læues, id est, non asperos, duplicatos, aut triplicatos: alij uerò spongiã adaptant. Porro duo, uel tres, plures uel, prout res ex-
 1 o postulat, apponuntur. Quandoque quidem sicci ac nullo madentes liquore: nonnunquam uerò imbuti oui candido, uel uino, uel posca, id est, oxycrato: aliquoties etiã oleo, iuxta ipsius dispositionis exigetiam. Inueniuntur
 2 o autem huiusmodi puluilli ex triplici differentia, quòd ad figuram attinet. Alij enim triangularem, alij rotundam, alij uerò quadratam, habent. Qui figura constât, triangulari, glutinandis uulneribus (ut placuit Auicennæ) sunt dicati. Ita autem disponi debent: unus ex utroque latere orarum, seu laborum uulneris, cõstituatur ita, ut super plagam inter se iungatur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci alijs superponuntur, natiui caloris particule læsæ conseruandi gratia, & ut saniosam proluuiem, ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideò apponuntur, ut partem læsam à fasciarũ & uinculorum iniurijs uindicerent.

Ratio nominis.

Materia puluillorum.

Numerus.

Figura.

Triangulares.

Rotundi.

Quadrati.

De Peni-

De penicillis siue turundis (quas tentas uulgo appellant) & linamentis formandis, de quæ eorum usu multiplici.

In quibus uulneribus utendū turundis, & linamentis.

Turundas seu penicilla, & linamenta (quæ & linachinia uocant) maximò esse usui in curandis uulneribus, & præcedentia luce clariùs ostendunt, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis sit utendum, chirurgus haudquaquàm est ignorandum. Ad hæc, ex qua materia, & qua figura formari debeant. Atque illis utimur, in octo præsertim casibus. Primò, cum uulnera uel amplianda sunt, uel detergenda, uel cum aliquid ab eorum fundo uacuum est: ut in profundis uulneribus, in quibus necessum est alibi uulnus aperite, ut ex fundo, & sinu ipsius, ichores, id est, saniosa colluues, inibi collecti uacuentur. Secundò, illis cogimur uti, in cauis uulneribus, in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio. Tertiò, in uulneribus alteratis ab aere, & sordidis, quæ deterfione egent. Quartò, in uulneribus contusis. Quintò, prædictorum usus utilis est, in uulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore prætor naturam fatigant. Sextò, in uulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia nanque uulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tempore aperta & hiantia manere debent. Quandoquidem morsus ferè omnis (ut Celsus ait) quoddam uirus habet, quod foras semper euocandum est, non intrò repellendum, nec occluso uulnere intus relinquendum. Sed de his fufius in sequentibus dicetur. Septimò, turundis & linamentis utimur, in uulneribus, in quibus persanandis circa ossa manus admo-

Lib. 5.
Omnis ferè morsus habet quoddam uirus.

- ad mouenda est. Octauò, in uulneribus, quæ iam uetustate in ulcera defluxionibus scaturientia degenerauerunt. Porro in omnibus alijs reliquis uulneribus, inducendæ cicatrici studemus, absque eiusmodi turundis & linamentis. *Vfus & materia turundarum & linamentorum.* Aduertendum autem est, in ijs diuersitatem non paruam esse, pro ratione finis, cuius gratia fiunt & admouentur. Fiunt autem interdum, ut diximus, ad detergendas sordes uulnerum, atque tum ex panni non asperi, & præsertim ueteris, lacinijs
 10 uel floccis euulsis formantur. Nonnunquam uerò ideo fiunt, & in uulnus immittuntur, ut ipsum hians, & apertum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene pexis, & à sordibus ritè emundatis, uel ex prædicti panni frustulis, efformantur: uel etiam ex xylo, (quem cottonem uocant) ut Razes facere solebat. Sed & ex *Tôtè cannuleg* canna aenea, uel argentea perforata fiunt penicilli ad eundem finem: ut, uerbi gratia, in naribus, ad aëris inspirationem, & in altis uulneribus, ut sanies, & purulenta colluuiò, per hanc uelut emissarium feratur, & foràs egrediatur, non autem intus retineatur. Quandoque etiam hæc, linamenta inquam & penicilla, plagæ inferuntur, ut ipsius os magis debile fiat, & ampliatur, fiuntq; tunc aut ex spongiolis uehementer compressis & intortis, aut ex radice gentianæ: hæc enim dum multum humorem, quo scatet uulnus, combiberint, turgescunt, & ita magis hiantem plagam reddunt. Cæterum forma linamentorum æqualis esse debet, turundarum uerò inæqualis, in modum clauiculi lignei, quem Latini impagem uocant, *Impages, cbenille.* ne scilicet
 30 intrò latantur. Hæ autem aliquoties quidem sicca, quandoque uerò quopiam delibuta unguento ad-

mouentur, prout res ipsa exigit. Reliqua quæ ad eiusmodi operationes spectant, medentis consilio & solertia committuntur.

De quarta intentione curandorum uulnorum.

Substantie par
in obseruatio.

Quarta intentio in curandis recenter acceptis uulneribus, est particula læsæ substantiam conseruare, ac prohibere ne ipsa dolore, uel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate (quod uulneribus ipsis accidere solet) infestetur. Hunc autem scopum assequimur, admotis emplastris & linimentis ex oui candido, & alijs huiusmodi refrigerantibus, ut rectè docuit Razes, primis saltè diebus. Postea uerò uino styptico particula perfundenda, & figura aptissima collocanda est. Apertio quoque, eaq; interdum ex aduerso, in uulnerata parte molienda est, necessaria etiam est nonnunquam sanguinis missio, item & purgatio: ut mox docebitur. Sed & proba uetus ratio (quam statim præscribenus) imprimis est obseruanda, si quartum hunc scopum cupis assequi. Porò nihil aduersus quæ commentamur pugnat, quod plerique obijciunt, uulnera scilicet in quantum uulnera, ijs tam uarijs, tanq; multiplicibus auxilijs nõ indigere. Hoc enim dictum solum locum habet in paruis occasionebus, & eucratis, id est, bono habitu præditis corporibus. In magnis uerò occasionebus, & in plethoricis corporibus, uel uitioso succo refertis, necessum est ad prauorum symptomatum (quæ recentibus uulneribus superuenire consueuerunt) præcautionem, prædictis uti auxilijs. Quod Galenus innuere uidetur libro sexto methodi medendi, his ferè uerbis: Fingamus, quempiam

Gal. lib. 6. met.

- „ quempiam ad nos uenire, cui tantum cutis acui sit puri
 „ sta, hunc hominem, si is sit cui facile ob bonam corpo-
 „ ris habitudinem ulcera sanescant, etiam si citra medi-
 „ camentum, nudoq; membro, ad opera consueti dimit-
 „ tas, nihil sentiet mali: sin ex eorū numero sit, qui dis-
 „ ficulter sanentur, (quia scilicet uel plethoricus sit, uel
 „ uitiosis succis prematur, uel acris sit sensus, uel ho-
 „ rum quibusdam, omnibus ue prematur) primum qui-
 „ dem dolebit, post etiam tum pulsu particula infestabi-
 „ 10 tur, tum phlegmone. Porro in omni membro carnosio,
 quod sue unionis solutionem patitur, nerui, uenæ, &
 arteriæ reperiuntur, quæ praua quædam accidentia
 inducere possunt: nempe dolorem, phlegmonem, san-
 guinis profusionem, conuulsionem, & id genus alia:
 quibus summa diligentia medentem occurrere oportet.
 Occurret autem facile, si ea præsentierit, & præ-
 cognouerit, ut primo libro præsagiorum testatus est
 „ Hippocrates, ad hunc modum scribens: Nihil perinde
 „ medico conducibile est, quam ut futura præsentiat.
 „ 20 Ita enim (ut Galenus locum hunc interpretans ait) de
 longinquo obuiam it malis.

De sanguinis detractione in uulneribus.

- „ 20 **O**Mni recens factio uulneri (nisi in uentre sit) ex-
 „ 20 pedir (inquit Galenus) ex seipso statim sangui-
 „ 20 nem plus, minus ue effluere. Quippe hoc modo phleg-
 mone minus tentabitur, tum ulcus ipsum, tum quæ cir-
 cumposita loca sunt. Itaque si medicū imitatore esse
 oporteat, non naturæ tantum (ut subinde nos monet
 „ 30 Hippocrates) sed etiam eorum, quæ cum sua sponte ue-
 niant, conferunt. In recenter autem acceptis uulneri-

Lib. 4. morb. ex
Hippoc.

In uulneribus
præualidis san-
guinem mitten-
dum esse.

Vulnera trifaria magna redduntur.

Quæ sanguinẽ mittendum indicet in vulneribus.

Sanguis cur in recenter acceptis vulneribus mittatur.

L. 4. met. med.

Si fluxio ualenter irruat, ad contraria reuellendum.

bus, præsertim magnis & præualidis, expedit (ut diximus) sanguinem effluere: hic certè si minimè, uel minus quàm par sit, effluxit, quod deest, ipsi adijcias oportet, sanguinem scilicet ex uena detrahendo. Porro trifariam uulnera, ut & reliqua omnia alia uitia, magna grauiaq; redduntur, ut Galenus ait libro quarto methodi medendi: nempe uel propter afflictæ partis præstantiam, uel propter affectus uim seu magnitudinem, uel propterea quòd sunt cacoëthe, id est, maligna: cuiusmodi sunt quæcunque in articulis accepta uulnera sunt. Hæc enim doloris, uigiliarum, conuulsionis, et delirij periculum adferunt: quòd scilicet ibi tendones, & nerui, & carne uacua atque ossea loca sunt. Vulneris igitur magnitudo, unà cum uirium robore, mittendum sanguinem indicat: quanquàm qui uulneratus est, prorsus redundantia sanguinis sit expertus. Quo fit, ut in artis operibus errent, qui in sola sanguinis abundantia, ipsius detractionem consulunt. Porro nos sanguinem detrahimus, in recentibus & nuper acceptis uulneribus, non solùm ne pars læsa, aut circumposita loca (ut superius dictum est) phlegmone tententur, sed ut impetum quoque ruentis sanguinis cohibeamus, et nimium profluium impediamus. Hi enim sunt præcipui scopi mittendi sanguinis in recenter illatis uulneribus. Cæterum si perpetuum est, quod ab Hippocrate (ut Galenus ait) didicimus, incipientem (inquam) fluxionem ad contraria trahendam & reuellendam esse, fixam uerò iam in laborante particula, uacuandam esse, uel ab ipsa particula quæ affligitur, uel à maxime uicina. In promptu nobis, & de sanguinis detractione colligere nunc est, quòd in principio hæc è longinquo,

- , , quo, postea ab ipsis exulceratis partibus sit emollienda. Modum uero, seu quantitatem uacuationis: tum ex redundantia modo, tum ex copia sanguinis, qui è uulnere effluxit inuenies. Adhuc ex etate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine: & ante hæc, ex ipsa laborantis uirtute. Venæ autem secundæ electio ex laborante particula indicatur. Vt si uulnus in capite, collo, aut facie acceptum sit, humeralis in cubito, uel manu, secunda est. Si ea non cernitur, media,
- 10 quæ ex ea deriuata est. Interiorem uero (quam basilicam uocant) incidere utile est, in ijs quibus inferiores collo partes usque ad renes & umbilicum uulneratæ sunt. Hac non comparente, certè media, quæ ab ipsa diducta in iuncturæ apparet flexura, diuidenda est.
- , , Vbi enim uena (ut Galenus ait libro de phlebotomia)
- , , quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad
- , , mediarum aliquam aperiendam accedis: omnino tibi
- , , conandum est, ut eam quæ à propria diducitur, potius
- , , incidas. Est uero, & quæ inferiores sunt cubiti iunctura
- 20 ra, eas scilicet quæ in ulna existunt, nihil secare probeat, ubi nimirum quæ in cubito sunt, non appareant. Sed eas certè, quæ in rectum sunt, id est, è directo stant, & à uenis quæ in cubito si apparuissent, alioqui secassemus, diductæ. Porro quemadmodum prædictæ omnes partes, ubi sic uulneratæ fuerint, ut sanguinis, ob causas superius adductas, egeant detractione, in cubito secta uena iuuantur, uti dictum est: sic quæ renibus inferiores sunt, illis quæ per poplites & malleolos decurrunt. Ac perpetuò quidem in omnibus, dum sic re-
- 30 uellere studes, aut uacuare, & phlegmonem prohibere, uena quæ è directo est, secunda uenit. Manu tamen

Modus uacuationis ex quibus indicatur.

Venæ secundæ electio, ex parte uulnerata indicatur.

Venæ poplitæ et malleoli, quod secunda.

Semper è directo secunda uena.

Auersio à manu, et ab altero crure,

uulnerata, uti & eadem, incipiente phlegmone, laborante sanguine ualenter, ac nimis copiosè in eam irruente, crus quod è directo est, reuulsioni gratia, tibi scarificandum erit. Altero uerò crurum sic ex uulnere malè habente, reliquum crus scarificabis, aut in eo poplitis, aut malleoli uenam secabis, uel certè potius (ut consulit Aëtius) ex brachio quod è directo est,

Si renes, aut partes circumpositæ uulnus acceperint.

sanguinem detrahes. Si autem renes, uel partes illis adiacentes, recens uulnus acceperint, quod sanguinis emissionem desideret, uel propter ipsius affectus magnitudinem, uel ne phlegmone tententur, uena in cubito interior incidi debet, tametsi renes ipsi ambigant, quibus partibus, superioribus ne, an inferioribus adscribi debeant, ut Galenus annotauit, libro de curandi ratione per sanguinis missionem. Verisimile enim est, plus sanguinis ad ipsos ex superioribus partibus, quam ex inferioribus confluere. Non negauerim tamen, quin & ex cruribus sanguis commodè detrahi possit. Cæterum in hac re tam ardua, tamq; magni in arte, medendi momenti, nihil unquam moliri debet chirurgus, citra perit alicuius medici consilium, ut iam alibi semel, atque iterum monuimus.

De purgatione in uulneribus moliendi.

Alius quādo duenda in uulneribus.

SI uulneratus aluo fuerit adstricta, ea indita glan-
de, aut clystere iniecto subducenda est: uel cassia, aut manna, aut aliquo eiusmodi leniente medicamento per os accepto, citanda. Porro si uitiosi succi in uulnerato corpore subsit abundantia, uel uulnus præualidū sit, puro etiamnum existente corpore, & citra
cacochymiam, ijs lenibus modò dictis auxilijs nequa-
quā

Purgatio quādo in uulneribus necessaria.

quàm contentus eris, si saltem Hippocratem ducem
 secutus fueris, & eius interpretem Galenū: sed for-
 tioribus pharmacis purgationem per aluum molieris.
 Scribit nanq; Hippocrates, & post eum Galenus, (qui
 nec cassiam, nec mannam nouerant) purgationem per
 aluum his uulneribus ualde utilem esse, quæ in capite
 sunt accepta: item quæ in uentre & articulis. Præ-
 terea in ijs quæ suuntur, aut deligantur, id est, quæ
 adeò magna sunt, ut suturis indigeant, aut si non his,
 1. o certè deligatura. Sic autem ad uerbum scribit Hippo-
 crates: Purgatio per aluum plerisque ulcerum pro-
 dest: præterea uulneribus quæ in capite sunt accepta:
 item quæ in uentre, tum inferiore, tum superiore (qui
 sub thorace est) & articulis. Adhæc ijs in quibus osfi
 caries impendet. Præterea quæ suuntur, & exedun-
 tur, & quæ serpunt, & reliquis quæ ulcera diuturna
 reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt, per aluum
 purganda sunt. His itaque uerbis (ut Galenus ait, lo-
 cum hunc Hippocratis exponens) clarè docuit Hippo-
 crates, ulceribus omnibus, & uulneribus, quoties præ-
 ualida sunt, purgationem esse utilem. At qui purgantia
 medicamēta, quæ Galeno & Hippocrati in usu erant,
 multò sunt uehementiora (ut ex eorum scriptis con-
 stat) quàm uel cassia, aut manna, uel etiam rhabarba-
 rum, quæ prisorum seculo ignota fuerunt. Si ergo
 illos imitari uoluerimus, fortioribus medicamētis cor-
 pora non modò in diuturnis ulceribus, sed in recentia-
 bus quoque uulneribus repurgabimus. Quanquàm ea
 non probentur recentioribus medicis, ob eas causas,
 3. o quas mox subiungemus. Meminit autem eo loci Hip-
 pocrates seorsum, eorum omnium, propter quæ, non

Hipp lib. de
 uulneribus.

Morbi magnitu-
 dinem indicari
 cam esse purga-
 tionis adhibēde
 in uulneribus,

Due purgationis in uulneribus adhibende, indicationes.

Vii morbi.

Succorum abundantia.

Vomitum in uulneribus uilis. Lib. 4. Ther.

Scopus alius purgationis in uulneribus.

Antispas.

modò uulnera ac ulcera, sed etiam reliqua alia omnia uicia, grauiam magnâq; redduntur: nempe præstantiæ partis, cacoëthiæ, & magnitudinis affectus. Purgationis igitur in uulneribus adhibendæ, due potissimæ sunt, ueluti & missionis sanguinis, indicationes: nempe morbi magnitudo, (quam omnium primus adinuenit Hippocrates) & uitiosi succi abundantia, quod Galenus quarto methodi medendi ijs uerbis expressit: Purgatio non in sola uitiosi succi abundantia conuenienter suscipitur, sed sicut missio sanguinis, uel propter ipsius abundantiam, uel propter morbi magnitudinem, ita purgatio, & propter abundantiam alterius, cuiusquàm succi, & propter uim morbi adhibetur. Igitur cum in uulnerato corpore uincit sanguis, eius redundantiam uenæ sectione statim uacuabis. Cum uerò succorum uitium abundat, pharmacum adhibebis, quod ad flauam bilem, uel atram, uel pituitam educendam uim habet. Sed & per uomitum quandoque uacuationem molimur in ipsis uulneribus, si saltem Galeno assentimus. Si enim (inquit) fluxio ualèter irruat, reuellere ad contraria studebimus, utique si in superioribus uulnus consistat, per inferna purgantes. Sin autem in inferioribus sit, superiorem uentrem uacuant. At si iam fluxio restitit, atque in membro inhæsit, deriuare per uicina magis expedit. Quibus uerbis nos docet Galenus, purgationem interdum adhiberi in recētibus uulneribus reuulsionis ad contrarium (quam Græci antispasim uocant) gratia. Quæ etiam conuenienter suscipitur, tametsi nulla in corpore subsit uitiosi succi abundantia, quam uacuare intendamus.

De potionibus,

De potionibus, quæ uulneratis exhiberi consueverunt.

Q Vanquàm autem Galenus & Hippocrates, purgationem in uulneribus, per ualida etiam medicamenta quæ suis temporibus in usu erant, adhibendam esse præcipiant: nos tamen eiusmodi ualentibus medicamentis, in recentibus uulneribus, nec uti consueuimus, nec cuiquam utendum esse consulimus: sicuti neque alijs potionibus, quas nonnulli recens uulneratis propinant. Quandoquidem

Valentia medicamenta purgantia in uulneribus recentibus suspecta esse.

10 purgantia istiusmodi medicamenta, & pocula (ut sic dicam) uulneraria, quæ communiter offeruntur, facultate calida sunt, & aperientia. Proinde & sanguinem commouent, & hæmorrhagiam concitant, uulnusq; ad inflammationem atque abscessus disponunt. In diuturnis tamen ulceribus, fistulosis, & cancris, illis audacter utimur. Adhæc, cum sanguis in interaneis in grumos concreuit, & cum purulenta colluuius in pectore collecta est. In glandulis quoq; interioribus, strumis, ac hernijs, seu (ut dicunt) crepaturis, ut suis locis

20 dicetur, quandoque purgationem concedimus. Qui tamen Guidonem præcesserunt chirurgi, ut Rogerius, & quatuor illi famati magistri, in omnibus indiscriminatim uulneribus, itidem & in fracturis omnibus, potiones offerebant confectas ex rubia seu erythrodano, quam uulgò rubeam maiorem uocant, (ex qua plus quam ex cæteris assumunt:) tanaceto seu athanasia, cannabe, brassica rubra, myrrhida, (quæ species est geranij, uulgò herba Roberti nuncupata) geramo altero, qui nostris herbarijs pes columbinus appellatur:

Potio in uulneribus, & fracturis à quibusdam exhiberi solua.

30 symphyto, quam aperta significatione (licet non satis concinnè) posteriores Latini consolidam uocant: plantagine,

Herba Robertina.

Modus & tem-
pus potionis ex
bibenda.

Fabulosum.

Error Theod.
& Henrici.
Vide Theod. li.
2. sue chirurg.
cap. 3.

tagine, cynoglossa, hoc est, lingua canis: pimpinella,
elatine, quæ pilosella uulgò nominatur: caryophylla-
ta, & consimilibus. Ex quibus quidem succum expri-
mebant, uel ea in aqua, uino, & melle, decoquebant. Et
unoquoque die, ex succo aut decocto ipsorum, quanti-
tatem sescunciae, id est, unciae unius & semis, manè ie-
iunis offerebant. Super uulnus uerò manè etiam, &
uesperè, folium brassicae rubentis inuersum appone-
bant, & facta decenti ligatura, manè rursum, & ue-
sperè ipsum commutando, ita relinquebant. Asserunt
autem eiusmodi Empirici unum, quod ego planè ridi-
culum iudico: nempe quòd si potio assumpta, uomitio-
ne reiiciatur, sinistrum quid portendi: si uerò eam uen-
tricus continuerit, & talis per plagam egrediatur,
qualis per os assumpta est, faustum ac bonum quoddam
omen portendi. Sed hæc, si dijs placet, uera sunt. Cæ-
terum in maiore adhuc errore uersantur, Theodoricus
& Henricus, qui recenter uulneratis, præsertim in ca-
pite, & pectore, fortissima quædam & calidissima
pigmenta (ita enim uocant potiones quasdam ex mel-
le, uino, & puluere res multas uehementer calidas re-
cipiente, compositas) cum quibusdam exorcismis, seu
adiurationibus propinabant, aut ex iisdem rebus uelu-
ti pulticulam conficiebant, quam in modum emplastri
super linteolum extensam, uulneri apponebant.

De ratione uisus in uulneribus & continui solutione,
observanda, & à medico præscribenda.

Visus tenuis.

Vulneratis primis septem diebus (intra quos ut
plurimum securi esse solent à febre & inflamma-
tione) iustum tenuem, & parcam, frigidum quoque, &
humidum,

humidum, præsertim si iuuenes, & plethorici fuerint, atque ambiens calidus, insituito.

Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, Vinum. interdicito.

A carnibus duris & ualentibus, piscibus magnis Carnes. & prauum succum generantibus, pane non fermentato, (quem azymum uocant) malè subactò, & improbè cocto, eos arceto.

Caseum, præsertim salsum & ueterem, fructus ferè Caseus. Fructus, etc. omnes, allia, cepas, sinapi, salita omnia, et acria, nec nõ species omnes aromaticas, ne gustent, admoneto.

Perdices autem, pullos, atque auiculas, quæ in dume Auiculae. Ptissana bor- tis uersari solent, aqua rosarũ alteratas, ptissanam hor- deaceam, quam uulgò hordeatum, & hordeum munda- tum appellant: item lac amygdalinum, & quod aue- natum uocant: iura quoque carniũ simplicia, aut cũ ouis preparata, illis in cibum permittito.

Ex oleribus, lactucam, portulacam, boraginẽ, (quæ Olera. buglossum est hortulanum) præterea olus, quod Ara- bes aspanar, nos uerò nomine parum mutato, spi- nacium, & spinargium dicimus: & alia id genus, il- lis concedito.

Aqua cocta illis potus esto: sed in qua cibarius pa- Aqua pro potu. nis, qui Græcis syncomistos appellatur, uel plurimũ furfuris habens, sordidus dictus, maceratus fuerit. Vel eius aquæ simplicis loco, cremor ptissanæ, aqua hordei, uel (si debiles, aut senes fuerint) uinum aliquod stypticum, id est, austerum, quod crassæ sit substantiæ, plurima aqua dilutum: aut si tenuè cõcedatur, illud sit 3 oligophoron, id est, parum aquæ sustinens.

Breuem, ac frugalem illis coenam imperato.

Cana.

Leuem

Frictio.

Leuem frictionē, sed his partibus quę longius ab-
sunt à uulnere, adhibeto.

*Quies.
Motus.*

Vt quiescant, iubeto. Optimū enim illis (inquit Cel-
sus) medicamentum quies est. Moueri autem, & ambu-
lare alienum est, sed ijs præsertim, qui in inferioribus
partibus uulnerati sunt.

Verus.

Vt uenterem summopere deuitent, submoneto.

Affectus animi.

Item iram, contentionem, & omnes uehementes ani-
mi motus.

*Vitæ paulo
plenior, quando
uulneratis con-
cedendus.*

Ceterum ubi uulneratus à phlegmone; & abscessu 10
suerit assertus, pleniore uictu tutò uti potest, & ad
pristinam consuetudinē paulatim redire. Utatur igitur
tunc uino aliquo generoso, & carnibus probū san-
guinem generantibus, ac naturam, hoc est, uires reso-
cillantibus: cuiusmodi sunt carnes gallinarum, capo-
rum, & ueruecum, seu castratorum arietum, & quę
eius generis sunt. Quòd autem talis uictus ratio utilis
sit, & accommoda uulneratis, ex eo comprobatur, quo-
niam uirtutem fulcit & corroborat, neque febrem cō-
mouet. Sed nec phlegmonas, nec hæmorrhagiam con- 20
citāt, ac præter hæc, alimonium utile & conueniens
sumministrat. Proinde hanc summoperè commendant,
in recens acceptis uulneribus, tum celebres medici, ut
Galenus, Haly, Razes, Auicenna: tum etiam recentio-
res chirurgi, Brunus inquam, Gullielmus à Salliceto,
& Lanfrancus, à quorum sententiā & opinione de-
sciuerunt, Theodoricus & Henricus, qui ab initio diē
tam uinosam, & calidissimam uulneratis præter ra-
tionem imperabant. Aiebant enim uulneratorum imbe-
cillam uirtutem protinus firmandam, ac roborandam 30
esse, idq; uini potione commodè præstari. Quorum ni-
mirum,

*Uires in morbis
non esse augen-
das, sed dum-
taxat fouendas,
& seruandas.*

mirum, sententiæ in totum aduersatur Gale. lib. 1.
 „ Aphorif. cōmen. 4. sic inquiens: In ægrotantibus raro
 „ accidit, ut robur corporis maius reddere, quàm acce=
 „ perimus, fludeamus. Magna uerò ex parte propera=
 „ mus in longis quidem morbis, fouere uires: in acutis
 „ uerò parum debilitatas conseruare. Et subdit: Nam si
 „ eas tales, quales accepimus, properemus in istis ser=
 „ uare, uel etiam augere, semper addemus ad morbum.

Quibus uerbis aperte docet Galenus, non semper ui=
 10 res in ægris augendas esse, aut roborandas, sed satis
 esse interdum, si eas conseruemus, & fulciamus. Nisi
 forsan adeò imbecillæ, ac prostratæ fuerint, ut quæ ab
 illis sumitur indicatio, cæteris alijs indicationibus sit
 præferenda: quod sanè in omnibus uulneribus non Therap. 7.

contingit. Adde quòd ubi contrariæ, & ex aduerso pu=
 gnantes inter se sunt indicationes, committendum non
 est, ut dum alteri nimium sis intentus, alterius omni=
 nò obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad licebit, mi=
 scere eas oportet, ut libro septimo methodi medèdi Ga=
 20 lenus nos edocuit. Quod præceptum (inquit) ubique Gal. 2. meth.

memoriâ teneri uelim. Vnde & circa finem octauæ præ=
 „ dictæ methodi sic insit: Ergo tum exercitatum in om=
 „ nibus, tum natura prudẽtem esse medicum conueniet:
 „ quò cuiusque indicationis potestate diligenter conside=
 „ rata, omnibus inter se collatis unâ idonei uictus sum=
 „ mam, quæ laboranti sit commoda, comparet. Itaque,

ut semel dicam, uulneratis per initia; usque ad diem
 septimum (intra quod tempus ferè solet phlegmone in
 locis uulnere affectis excitari) uini usus interdici de=
 30 bet. Nisi tamen ex largo sanguinis profluuiò, uiribus
 destituti, intermoriẽtes appareant. Tunc enim ante ul=
 lam cu=

Vini usus inter
 dicendus uulne=
 ratis usque ad
 diem septimũ.

De sedando dolore in uulneribus.

- D**olor omnis, præsertim uehemens, etiam si pu-
rum ab excrementis totum corpus fuerit, fluxio-
nis causa est. Particula namque quæ dolore affligitur,
succum, atque in uulnere sanguinem maxime ad se tra-
hit, copiosorem scilicet, quam sit illi ex usu: unde &
phlegmone in ea frequenter excitatur. Proinde sum-
ma cura protinus adhibenda est, ut dolor demulceatur,
ac in totum, si fieri potest, sedetur. Dolorem autem cõ-
modè sedamus in uulneribus, aut saltem mitigamus, fa-
cto ad particulam læsam fotu, uel ex rosaceo, si præstò
adfuerit, uel si eius copia non sit, ex oleo communi,
quod modicè incaluerit. Quibus si oui candidum, uel
potius luteum (ubi magna non fuerit inflammatio, seu
uehemens caliditas) adijciatur, præstantius adhuc auxi-
lium efficies, neque ita uulnus inquinabis. Quòd si tã
uehemens dolor extiterit, ut necessitate coactus fue-
ris, aliquantulum uulneratam ac dolentem particulam
stupefacere, oleum papauerinum admovebis. Et si ma-
ior cogat necessitas, opij momentum, uel mandragoræ
(ut quidam rectè consuluerunt) adijcies. Quatuor illi
celebres magistri ad eum finem laudant radicem sola-
ni, tritam, & axungia porci exceptam. Theodoricus
plurimum commendabat emplastrum ex folijs maluæ
coctis, & in mortario contritis, cumq; fursuris cribra-
tura commixtis. Quòd si rosacei momentum prædictis
adieceris, melius adhuc medicamentum reddideris. Me-
dulla etiam panis triticei in aqua feruente macerata,
ad sedandos dolores (ut supra diximus) efficacissima
est. Porro si dolor admodum uehemens est, nec ullis,
quantumuis generosis, auxilijs mitigetur, neruum tunc
læsum

Dolor phlegmo-
nas & fluxio-
nes concitat.Dolorè sedātia
in uulneribus.Emplastrum
Theodor.

Rosaceum.

Medulla panis.

lesum esse significatur. Proinde tunc ad ea quæ postea ad uulnera neruorum scribuntur, tibi recurrendum erit. Sed de ijs, quæ dolore leniunt, iterum ac multò fusius libro sexto agemus.

Curatio aduersus uulnèrum inflammatio-
nes, & abscessus.

Inflamatio qui-
bus maximè uul-
neribus accidat.

Lib. 5.

3. meth.

Melior est læsio
quàm mors.

Inflamatio in uulneribus tum maximè timenda est cum uel os, uel neruus, uel cartilago, uel musculus, læsionem accepit, aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, diuturnum erit: adeò, ut si parum fluxisse uidebitur, mitti quoque ex brachio debeat: utique (inquit Celsus) si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id uulnus ebrietas præcessit. Quòd si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit: nam percussus punctusue, præsertim in eius capite, mortiferus est: præcisus uerò per transversum, sanitatem recipit, hoc est, ab inflammatione & conuulsione uindicatur: aliquis tamen ex particulae motibus uitabitur. Verum melior est (ut Galenus ait) læsio, quàm mors. Sic et neruum punctum sæpe cogimur transversum præcidere, quoties scilicet uel conuulsiones, uel deliria, uel ambo magna ægrèq; sanabilia superuenire uulnerationi cernimus. Porro si iam inflammatio, aut tumor aliquis præter naturam in uulneribus concitatus fuerit, curari debet iuxta methodum superiore libro à nobis traditam, in quo de tumoribus præter naturam abundè differuimus. Caterum tametsi pro locorum differentia (ut libro primo de locis affectis Galenus ait) curatio-
nem

nem quoque uariari contingat, Auicennas tamen omni-
bus indiscriminatim partibus à capite ad pedes, empla-
strum mirè ab eo commendatum admouet, quod constat
malo Punico dulci, incocto in uino styptico, & postea
in mortario subacto, atque in emplastri formam reda-
cto. Ceterum si enatus tumor nec reprimentibus, nec
per halitum digerentibus medicamentis cefferit, pus-
mouentia, seu maturantia, admouenda erunt. Cuiusmo-
di ea sunt, quæ ad maturanda apostemata supra retu-
limus. Huius rei gratia iubet Rogerius fieri fomentum ex
maluis, absinthio, arthemisia, & farina triticea, uino
incoctis, quibus & mellis momentum adijciendum est:
axungie uerò quod satis esse uidebitur. Quod si pus
per uulnus non uacuetur, aliud loco comodiore, illi mol-
liendum erit emissarium.

Emplastrum Aui-
cennæ, ex malo
Punico dulci.

De tollenda in uulneribus intemperie, quam
discrasiam uocant.

- 20 **S**i flammea quædam citra humorum affluxum di-
spositio, quam discrassam calidam uocant, uulnus
occupauerit (quod ex rubore & uesticatione facile de-
prehendes) affectum locum infrigidare oportet, non
hyoscyamo quidem, aut mandragora, quoniam plus in-
stè refrigerant: sed rosis potius, & plantagine, atque
unguento albo, quæ præter id quod desiccant, modera-
tè etiam refrigerant. Si autem frigida intemperies lo-
cum obsederit (quam mollicies, & cutis liuidus color
ostendunt) ipsum excalescere, non resina, uel pice, aut
asphalto, quod demonis sterco appellat: sed uino, et
30 unguento nigro, aut fusco, uel eo, quod basilico uocat.
Quod si eiusmodi symptomata uulnus, seu plagam

Si calida adsit
intemperies.

Si frigida intem-
peries uulnus
obsederit.

Horii ung. de-
scrip. ex lib 6.
requirèdè sunt.

degenerare faciant in ulcus, recurrendum erit ad ea, quæ de ulceribus sequente libro traduntur. Porro si humida uel sicca adfuerit intemperies, suo quoque contrario profliganda erit. Et ita de compositis intemperiebus ages, ut suo loco postea dicetur.

Si febris uuln-
erato acciderit.

Quod si febris uulneratum apprehendat, uelut re-
frigerante, qualem in calidis præter naturam tumo-
ribus descripsimus, laborans uti debet. Sed accersen-
dus erit huius rei gratia peritus aliquis medicus, qui
et congruam illi uelut rationem præscribat, et reli-
qua ad febrem auxilia ex arte instituat, habita ratio-
ne ætatis, temperaturæ, regionis, temporis, consuetudi-
nis, et id genus aliorum. Ceterum ne febris quidem
ipsa terrere debet, si in magno uulnere, dum inflamma-
tio est, permanet. Illa uerò perniciofa est Celso, quæ
uel leui uulneri superuenit, uel ultra tempus inflama-
tionis durat, uel delirium mouet, uel si neruorum ri-
gor, aut disiectio, quæ ex uulnere orta est, eam non finit.

Lib. 5.

De spasmo, id est, conuulsione uulneri accidente.

20

Spasmos Græcè, conuulsio Latine, est ubi nerui at-
que musculi præter uoluntatem conuelluntur, in
eamque dispositionem ueniunt, quam etiam in motibus
secundum arbitrium factis assumpserunt. Per hunc enim
affectum, actio nequaquam ablata est, ut est in para-
lysi sed solum immutata ac uitiata, ut abundè testatur
Gal. lib. 5. de symptomatum causis, ad hunc modum
scribens, si Græca saltem Latina feceris: Conuulsio ner-
uos, musculosque ad eundem cogit affectum, in quem ab
animali facultate cum naturalem habitum seruarent,
ducebantur

Spasmus quo
modo fiat Ga-
leno.

- > > ducebantur. Vt igitur uoluntarius motus interim intē
 > > tis uersus principium, id est, cerebrū, musculis, interim
 > > ab irruente spiritu impletis perficitur, ita conuulsio
 > > quoque accidere solet. Nam & spiritus inflare potēs,
 in ipsis generatur, & complures etiam affectus, qui
 illos intendere queant, quemadmodum phlegmone. Ita *Spasmus quid.*
 que spasmus siue conuulsio motus est deprauatus, uo=
 luntarie facultati motrici accidens, à solo morbo (ut *Conuulsio solius*
 ibidem ait Galenus) seu morbosa dispositione proue=
 niens. Proinde & nervosa est ægritudo, qua mouentur *morbi est opus.*
 lacerti, id est, musculi, ad suum principium, & exten=
 sioni sunt inobedientes: ut tertio canonum annotatur *Fen. 2. tertij.*
 ab Auicenna. Neque enim ad syndesmos, id est, copu=
 las, seu ligamenta, conuulsio, sicuti neque paralysis, pro=
 prie refertur: sed (ut Galenus ait tertio de locis affe=
 ctis) eorum neruorum qui uoluntatis imperio obediūt,
 affectio est. Auerrois spasmum definiuit, cum membra
 sic contracta & rigida facta sunt, ut neque flecti, ne=
 que extendi quouis modo possint. Porro omnes conuul=
 sionis cause, seu affectus omnes, qui conuulsionem pa=
 runt, Galenus & Hippocrates in duo capita reuoca=
 runt: nempe in plenitudinem, & inanitionem, corpo=
 rum uidelicet neruorum, à quibus secundum electio=
 nem motus perficiuntur. Itaque phlegmone, id est, in=
 flammationes, plenitudinem pariunt: ardentissime &
 aridissime febres, inanitionem. Sed nervosa corpora
 omnia (inquit Galenus) tendi posse, siue oppleta sint, si
 ue inanita, declarant musica instrumenta. Etenim rum=
 puntur chordæ, siue in humidum uaporibusq; scatens,
 siue in aridum squalensq; cubiculum, intentis etiandū
 chordis, instrumenta collocaueris. Proinde huius rei

haud ignari artifices, eas priusquam reponantur, laxas
 re solent. Sed quomodo affecto aëre tenduntur chordæ,
 ut rumpantur, si uel nimis aridus, uel admodum humi-
 dus sit? Nempe humor madefacit ipsas, ut in tamorem,
 præter naturam attollantur, qui mox eas extendit, ac
 ueluti sol tergora arefaciens ipsa contrahit, ita siccitas
 chordas, & trahit, & extendit. Sic lora quoque cum
 ad ignem exiccantur, contrahi tendiq; uidentur. Ter-
 tium caput, seu tertiam causam addit Auicennas, quæ
 tametsi materiæ haudquaquam, saltem per initium,
 proportionem respondeat, noxam tamen (inquit) contri-
 stantem cerebrum inducit. Proinde nerui, hanc ceu mo-
 lesum quidpiam refugientes, contrahuntur, & ad suam
 recurrunt originem, adnitunturq; inturbantem cau-
 sam ipsam expellere. Qui Barbaram sectantur medi-
 cinam, spasnum non proportionatum ad materiam,
 nominant: quia scilicet non accidat ob materiam, quæ
 implere aut inanire partes neruosas possit, sed praua
 potius aliqua qualitate. Tribus igitur modis fit con-
 uulsio, inanitione, repletione seu plenitudine, & com-
 patiendi societate, hoc est, cerebro lege commertij pa-
 tiente, & alteratis per continuationem partibus, ut cõ-
 tingit in conuulsione quæ fit ab ictu ferè cuiusdam ue-
 nenatæ. Primus modus, qui scilicet fit propter euacua-
 tionem seu inanitionem, accidit in superfluis purgatio-
 nibus, & in copiosis atque immoderatis sanguinis pro-
 fusionibus: quem conuulsionis modum (si quidem acce-
 pto uulnere acciderit) malum ac periculosum esse testa-
 tur Hippocrates, hoc Aphorismo: Vbi sanguis pluri-
 mus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniēs, ma-
 lum crebrò: enim mortem adferunt. In magnis quoque,
 ac uehemen-

Tertia causa
 conuulsionis, ad-
 ducta ab Auic.

Conuulsio tribus
 modis accidit.

Aphor. 3. lib. 5.

ac uehementissimis ardoribus, & adurentibus (ut dictum est) febribus, ac colliquante putrilagine, hic conuulsionis modus euenire consuevit, malum sanè maximum, & penè insanabile, ut Galenus annotauit in commentario illius aphorismi Hippocratis: Febrē conuulsioni superuenire, melius est, quàm febrī conuulsionē.

Secundus conuulsionis modus fit propter inflammationem, & alios tumores præter naturam, (quos omnes οἰδῖματ' uocat Hippocrates) ut in uulneribus dere-

Secundus conuulsionis modus ex repletionē.

10 pente disparentes seu euanescentes, ut in fine quinti Aphorisinorum hac sententia testatus est idem Hippo-

crates: Quibus tumores in uulneribus apparent, non

conuelluntur maximè, (id est, non admodum, seu non

ualde spasmus corripuntur) neque insaniunt. Verùm

his deletis atque euanescentibus derepente quibusdam

à tergo, siue retrò, conuulsiones & distensiones fiunt,

quoties scilicet (ut in commentario ait Gal.) uulnera

ponè, id est, à tergo infestāt. Immoderata quoq; frigi-

ditas neruosis partibus adueniens, hoc conuulsionis ge-

Frigus conuulsionis causa.

20 nus inuehit, neruos enim in unū cogit, stipat, cohibet,

atque implet. Quod & hoc aphorismo expressit Hip-

Apho. 17. lib. 5.

ocrates: Frigidum, conuulsiones, distensiones, liuores,

rigores febriles inducit, supple, uel adfert. Sicuti enim

nequaquàm conuenit, neruos ipsos, seu ipsorum neruo-

rum substantiam, ab immodico calore dissolui, sic neq;

plūs iusto, & ultra modum conuenientem, refrigerari,

substringi, & in unum cogi ac stipari. Tertius con-

uulsionis modus dolore excitatur, cuius communis cau-

sa est, autore Platone in Timæo, pathos præter natu-

Tertius conuulsionis modus, ex compatiendi societate

30 ram, uiolenter & affatim incidēs. Ab his enim (inquit

Hippocrates Platone uetustior) quæ naturam mutant

ac corrumpunt, dolores excitantur. Hac quidem uocula, corrumpunt, & celeritatem, & uehementiam transmutationis indicans. Porro uehementes eueniunt in tactu, (qui inter reliquos sensus dolore maximè afficitur) à naturali habitu transmutationes, ob uiolentum calidi frigidiq; occursum, atque ob eas res, quæ contundere, seccare, pun gere, extendere, aut erodere possunt: quippe res huiusmodi dolorum causæ reputantur.

Doloris causa. Nerosarum igitur partium punctura, acres quoque & mordaces humores, aut uenenosa aliqua qualitate præditi, in uulneribus modum hunc tertium conuulsio nis substantiam deuellendo excitant. Quod de punctura diximus, testatur Galenus libro artis medicinalis cap. nonagesimo secundo, sic inquires: Nerui uerò & chordæ punctura, propter sensus uehementiam, & quoniam hæc pars principio, hoc est, cerebro cōtinuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam. Ac tum præsertim, cūm nihil extrorsum expirat, ob cœcato cutis uulnere. Hastenus Galenus. Acres autem, æruginosos, & uenenosos succos per consensum, & uelut quadam partium conspiratione conuulsionem inducere, ostendit Galenus in cōmentario huius aphorismi Hippocratis: Conuulsio ex elleboro lethalis est. Verūm conuulsionem istam, quæ accidit ijs, qui ab elleboro albo (hunc enim simpliciter elleborum nominare consueuit Hippocrates) purgati sunt, non absurdè ad secundum genus conuulsionis (quod fit ex inanitione) quispiam adduxerit: quandoquidem humores ipsi acres, & mordaces, uim habent exiccandi, atque inanendi. Contingit autem & propter ipsam euacuationem, citra mordentes succos, ijs qui supra modum per purgantur,

Causa conuulsiois ex consensu cerebri salutæ.

Cōuulsio ex elleboro Apho. 1. lib 5.

purgantur, conuulsionem aduenire. Fit enim ob phar= Purgans medi-
 maci, seu purgantis medicamento functionem, uim, at= camentum in: er-
 que efficaciam, ut ex nervis humiditates attrahantur, dum conuulsio-
 nem inducit.

Et ita resiccata uiolentiùs ipsorum neruorum substan-
 tia, conuulsio enascatur. Sed & per uomitiones, quas
 ueratrum epotum concitat, accidit, morsus ratione,
 conuulsiones fieri, ex consensu uidelicet, communica=

tuq; , & uelut quadam partium conspiratione: nempe
 perpeßis, ac dissentis neruis, qui uentriculi ostiolo,
 seu orificio consentiunt. Sic quoque in uulneribus con-
 sortij lege contingit subindè conuulsionem fieri, exci-
 tato in neruosis corporibus (à quibus motus secundum
 electionē perficitur) dolore. Sunt autem neruose par=

Partes motui uo-
 luntario famu-
 lantes.

tes, motui uoluntario, ac secundum electionem & de-
 siderium facto seruietes, nerui, ligamenta, muscoli, &
 tendones. Hæ igitur, & potissimum nerui, ubi ingenti
 aliquo dolore afficiuntur, cerebrum ipsum (quod est
 neruorum omnium communis origo, ut in arbore cau-
 dex ramorum) huius noxæ confors statim efficitur,

fitq; (ut dixi) propter compatiendi societatem conuul=

sio, quam non debemus existimare fuisse ab Hippocra-
 te prætermisam. Etenim conuulsionem quæ infestet pri-
 maria ratione explicuit, dum fieri conuulsionem ua-
 cuatione seu inanitione, repletioeq; sanxit. Ceterū ex
 præfatis conuulsionibus, quædā sunt uniuersales, quæ-
 dam uerò particulares. Vniuersalis conuulsio dici-
 tur, quando noxa cerebro communicatur, & ad ipsum
 peruenit. Vbi autem noxam illam senserit, tanquam
 molestum aliquid, uehementi conatu eam nititur ex-

Conuulsio du-
 plex.

Vniuersalis.

Particularis.

pellere: in quo quidem conatu neruos ipsos, & alia
 neruosa corpora contrahit, & conuellit. Particularis

*Vniuersales cō
uulsiones.*

*Morbus comi-
tialis.*

*Quo differat
spasmus ab epi-
lepsia.*

uerò conuulsio fit, quando noxa non peruenit ad ce-
rebrum, sed in particula affecta remanet, ipsam con-
trahens, atque incuruans. Ideò autem conuulsiones
uniuersales dicuntur, quia maiorem partem membro-
rum occupant. Quod quidem dictum est ad differen-
tiam epilepsie, quam comitalem morbum uocamus.
Hæc enim partes omnes apprehendit, atque ideò con-
uulsio totius corporis, seu omnium corporis partium
meritò dicitur, nō iugis tamen ac perpetua, (ut in em-
prolhotono, & opisthotono, atque tetano, id est, ner- 10
uorum rigore uidere est) sed quæ ex temporum accidit
interuallis, hoc est, quæ interpellata est, atque inter-
missa, cum mentis ac sensuum oblesione, in quo & à
iam dictis conuulsionum generibus discriminatur. Ac-
cidit nanque, ut is qui comitali morbo conciderit, ne-
que uideat, neque audiat, neque ullo sensu quicquam
percipiat, ac ne consequi quidē possit, quid factum sit:
siquidem cum memoriæ uiribus, ratio quoque ledi-
tur, ut libro tertio de locis affectis Galenus annotauit.
Hæc autem in spasmō, de quo nunc agitur, minimè so- 20
lent accidere. Ceterum accuratius atque exquisitius
conuulsionis differētias, causas, & generationis ipsius
rationem ac modum perquirere, alterius est specula-
tionis. Proindē ad præsens ea consultē omitemus. Sa-
tis enim chirurgo nunc fuerit, si quæ de conuulsione
diximus, probè intellexerit: si & tum communia, tum
particularia differentiarum ipsius signa cognouerit,
ac periculoso huic symptōmati (ne in accepto uulnere
aliquando eueniat) prospicere atque occurrere possit,
& iam præsens remedijs topicis, accommodis, & ex 30
arte institutis profligare.

De signis

De signis spasmi.

- C**ommunes conuulsionis notæ sunt ægra seu difficilis membrorum dimotio, colli tensio, labiorum contractio, ac si uellet ridere: maxillarum, dentium, & gutturis adstrictio siue strictura: oculorum, & totius faciei (ut dicunt) tortura seu peruersio. Si conuulsio ex inanitione apprehenderit, non repente, sed paulatim, ac post morbos corpus extenuantes, omnemq; eius humiditatem absumentes, accidere solet. Vt, exempli
- 1 o gratia, post largos sudores, aut uomitiones immoderatas, aut alui detractiones copiosas, aut immodicas sanguinis profusiones. Itē post famem, uigilias, sollicitudines, motus tum multos tum uehementes, aridas, & fluantesq; febres. Cum enim hæc, & alia (si quæ sunt) id genus, conuulsio subsequitur, causam eius esse ariditatem, ex inanitione recte putaueris, ut Galenus annotauit libro tertio de locorum affectuum notitia. Si uerò ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est: & maximè quidem, si id
 - 2 o uitij euenire sic repente conspexeris, tenui uento cuiuspiam, ac omnino pleno homini, qui uidelicet in ocio degit. Item si post tumores aliquos præter naturam subito deletos, atque (ut paulò antè dictum est) euanescentes, uel post frigiditates condensantes, atque in unum nervos cogentes, sanum aliquem sic repente conuelli contigerit: equidem nerui replentur à frigidis & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nutriuntur, unde conuulsionem patiuntur. Itaque his præcognitis, ac diligenter perpensis, haud difficile inuentu fuerit,
 - 3 o utrum ab ariditate, quæ est humidæ essentiae defectus, & uacuatione, seu inanitione: an ab humoris plenitudine,

Communes notæ conuulsionis.

Signa conuulsionis ex inanitione.

Nota conuulsionis ex repletionem.

Spasmi ex consensu cerebri nota.

dine, quæ egestati, seu inopiæ, & inanitioni aduersatur, & ab Hippocrate repletio nominata est, affectus ipse prodierit. Spasmm autem, qui propter compatiendi societatem, hoc est, cerebro consortij lege, seu (ut dicitur) per consensum affecto, enascitur in uulneribus, ijs notis deprehendes. A causis externis excitatur, cum dolore, morsu, & molestia affligit, ac crudeliter laborantem excruciat.

Spasmi iudicia, seu præfagia.

10

Præfagia.

Conuulsio ex consummata siccitate.

Conuulsio ex siccitate non prorsus absoluta.

Conuulsio ex repletionem.

Aph. 26. lib. 2.

SI conuulsionis noxa, membris spiritalibus, ac respirationi subseruientibus communicetur, tum scire licet, ægri salutem esse deploratam, ac subitam mortem futuram. Spasmus absolutus, seu (ut dicunt) confirmatus, præsertim si ex inanitione est, & neruorum siccitate, prorsus incurabilis est. Absoluta enim siccitas, & prorsus consummata, insanabilis est Galeno libro methodi medendi septimo. Quod si ex siccitate non prorsus adhuc consummata, conuulsio nascatur, interdum (sed uix, ac non facile) curationem admittit. 20 Longum enim tempus (ut in commentario sequentis aphorismi Galenus ait) exigitur ad siccitatem remouendam. Atque morbi acuties ac uehementia tempus non expectat, quin citò uires dissoluit, et subitò exitium adfert. Que uerò ex repletionem fit conuulsio, sanabilis est per euacuationem. Repletionem enim contraria est euacuatio. Quod & sequenti aphorismo innuebat Hippocrates: Febrē conuulsioni superuenire melius est, quàm, febris conuulsionem. Febris enim conuulsioni ex repletionem superueniens, humores frigidos, & glutinosos, 30 ex quibus orta est ipsa conuulsio, solita est magna ex parte

parte excalfacere, attenuare, atq; dissoluere. Si uerò ex febribus adurentibus totum corpus exiccetur, & neruis deinde ex siccitate conuulsio accidat, hoc maximum (inquit Galenus) est malum, & penè insanabile.

Conuulsio ex febribus adurentibus.

Curandæ conuulsionis methodus.

- P**ostquam de differentijs, causis, signis, & iudicijs conuulsionis, abundè satis tractatum est, par est deinceps eius curationem exequamur. Esto igitur illud primum ac commune præceptum in omni conuulsione obseruandum: Partes quæ contrahuntur, conuelluntur uel ualenter continendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus. Oleo in hunc usum eas perfricare oportet ex lilij confecto, uel si eius copia non sit, oleo cõmuni, tum aquam mulsam assumere. Eos uerò qui ex inanitione citra febrem conuelluntur, hoc pacto curabis: Oleo, aut certè hydreleo calido, partes conuulsas primò foueto. Deinde, si nihil prohibet, etiam ad lauacrum deducito, temperatoq; folio utitor, cum oleo,
- 1**º & frictione lenissimâ. luuat quoque in calidum oleum totum descēdere, uel in aquam calidam dulcem, in qua humectantia quædam, & lenientia decocta sint: ut sunt capita, & extremitates agnorum, hædorum, uitulorum, & arietum pinguium: item maluarum, ac uiolarum folia, altheæ radices, semen cydoniorum, & id genus alia, adiecta olei parte tertia. Sunt qui ad eundem usum iubent laborantes sæpius in labrum lacte caprillo, aut bubulo plenum descendere, atque ubi caldarium seu lauacrum egressi fuerint, oleis humectantibus, ut oleo uiolaceo, & amygdalarum dulcium: si ea non adsint, oleo communi optimo: si ne id quidem est, adipe

Obseruanda in omni conuulsione curanda.

Curatio conuulsionis ex inanitione.

Focur.
Balneæ ex oleo, & hydreleo,

Humectantia & lenientia.

Vntiones.

Linimentum.

Si febr. adsit
spasmo.Alimenta in con-
uulsione ex sic-

adipe non uetustissima, gallinae praesertim, hœdi aut
uituli, cervicem, & scapulas, & spinam, iuncturas
quoque, & musculorum capita, perfricant. Quidam
autem infra scripto linimento totam spinam, iunctu-
rasq; omnes magna utilitate illinere consueverunt.
12. olei uiolarum uncias quatuor, olei amygd. dulcium,
pinguedinis gallinae, medullae crurium uituli, ana
drach. sex, pinguedinis uituli, & hœdi, ana drach-
mas decem. Bulliant omnia simul in decoctione mal-
uarum, radicum althææ, & seminis cydoniorum, usque
ad consumptionem ipsius decoctionis, deinde colen-
tur, & fiat linimentum. Porro frictio cum omnibus
in homine uertebis utilis sit, tum ijs præcipue, quæ
in collo sunt, cum manus, & brachia conuulso ma-
ximè inuadit. Quod si febris adsit, non humectantia
modò, sed refrigerantia quoque in hydrelæo, id est,
miscellanea ex aqua & oleo, decoquenda erunt,
cuiusmodi sunt folia salicis, bordeum confractum:
uiolæ, nymphaea, (quod nenuphar appellant) aut eius
farinae quopiam aliquo. Ergo die nocteq; (est enim
gravis, admodum importunus, acutusq; morbus
conuulsio) interpositis tamen quibusdam breuib; in-
teruallis, ijs remedijs, hoc est, fotibus, balneis, & un-
ctionibus, utendum est. Dum ea intermittuntur, im-
ponendum malagma, aut cataplasma aliquod est, ex
eiusmodi humectantibus & lenientibus, itidem (si
res exposulet) refrigerantibus, contra quam in con-
uulsione, quæ ex plenitudine ortum habet. Hæc enim
uacuantia, ac digerentia, calefacientia quoque, &
(cum ex humore procreata sit) siccantia desiderat, ut
mox dicemus. Cæterum qui ex siccitate (quæ inani-
tionis

tionis est comes) conuellantur, nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro, & alica: si hæc non adsunt, ex lacte, aut hordeato, aut à pullis mollibus, uel agniculis, uel hœdis tenerioribus, iure aliquo assumpto, itemq; ouis sorbilibus. Vinum quoque tenue, & aquosum, quod faciliè per omnia corporis membra distribuitur, illis exhibebimus, aut saltem cum suis iusculis, ut ea promptiùs permeent, remiscebimus: nisi tamen febris accesserit. Tunc enim ptisanæ cremor magis

citare facta,
idonea.

1 offerendus est, somnusq; accersendus. Hic enim præterquàm quòd uires omnes reparat, plurimùm etiam humectat: Vigiliæ uerò cum ex ijs sint, quæ maximè euacuant, & exiccant, conuulsionem ex siccitate accersunt, & augent. Indendi etiam sunt clysteres ex lacte, & ex eodem conficienda gargarismata. Itaque (ut semel siniam) in hoc conuulsionis genere, curandi methodus, unicum habet scopum, nempe humectationem. Quem certè, ob superiùs adductam rationem non faciliè est assequi. Aegriùs nanque

Somnus conciliandus.

2 curantur, quæ in humido siccoq; habentur alterationes, quàm quæ ex calido & frigido consistunt. Hæc enim maximè actiuis qualitatibus corriguntur. Illarum uerò curatio imbecillis, & (ut sic dicam) magis materialibus, & passiuis qualitatibus perficitur, potissimùmq; cum humectandum esse requiritur, ut libro septimo suæ methodi Galenus nos edocuit. Si tamen ulla spes curationis est, in suprâ memoratis remedijs consistit. Itaque tametsi malum hoc ferè sit immedicabile: cum tamen sæpe etiam præter expectationem quædam eueniant, curatio uenit aggredienda.

Ex. 7. methodi med.

Vacuatio à toto corpore.

Sanguis in quibus mitti debeat.

Qua in mittendo sanguine obseruanda.

Purgatio quando adhibenda.

Iam uerò spasmus ex humiditate, & plenitudine curabis per euacuantia. Vacuare autem oportet, & à toto corpore, & ab ea parte quæ conuellitur. Porro à toto corpore plenitudinem uacuamus, duobus potissimum auxilijs, nempe sanguinis missione, & purgatione. Sanguinem mittemus maxime, in quibus uel multus sanguis abundat, uel phlegmone conuulsionem excitauit, etiam si laborans, prorsus redundantia sanguinis sit expers, modò nihil obstitit eorum, quæ sanguinè mittendum debortantur. Venæ autem secunda electio, ex laborante phlegmone ac conuulsione particula, tibi indicabitur. Modum uerò seu quantitatem uacuationis inuenies, tum ex redundantia modo, tum ex reliquis, quæ in sectione uenæ spectanda & æstimanda sunt: nempe ex ætate, natura, tempore anni, consuetudine, regione, cæli statu, & ante hæc, ipsa laborantis uirtute. Cæterum sic, ut oportet, facta per sanguinis de tractionem totius corporis uacuatione, & humorum influentiu auersione, mox phlegmone curatione aggredieris. Cuius (ut & omnium aliorum tumoru, qui præter naturam consistunt) si iam facta est, caput seu scopus præcipuus est, infestantis humoris uacuatio. Cum enim phlegmone duplici ratione (ut Gal. ait) à natura recedat, & quòd pars ipsa multo sanguine sit referta, et quòd eadem sit calidior, utique uacuationis indicatio, refrigerationis indicationem uincit. Quòd si adhuc in generatione est, in hac prior uacuatione est confluentis ad affectum locum sanguinis inhibitio. Sed de hac alibi abundè dictum est. Vbi uerò corpus uel flaua bile, uel

le, uel atra, uel pituita, uel serosis humoribus, refertum fuerit, (quem habitum Græci cacochymiam nominant) tum purgatione, quæ cuique superanti succo sit accommodata, uacuationem moliemur. Verum enim uero, quoniam conuulsio ex humiditate seu plenitudine, qua sæni etiam repente capiuntur, magna ex parte à pituitosis humoribus, crassis, glutinosisque in ipsa neruorum partium substantia infarctis, procreari solet, eius potissimum, quæ ab hac causa ortum habet, curationem

- 10 subijciemus. Ergo quæ crudos, crassos, & uiscosos humores potenter euacuant medicamenta, (inter quæ primis obtinent, hiera picra, & agaricum) hac conuulsione laborantibus exhibeto. Clysteribus acerbis eorum aluum subducito. Pessis, & suffitibus, in mulieribus (si occasio detur) menses euocato. Gargarismatis, apophlegmatismis, & errhinis, seu sternutatorijs acrioribus, pituitam per os, & nares educito. Abundè reimpurgato corpore, ceruicem, axillas & inguina, oleo liuoriorum, costino, spicato, laurino, & ex pulegio, addito
- 10 castorei & euphorbij momento, inungito, & lanam mollem ac succidam facto litu superimponito. Rogerius ad eiusmodi spasmus, sequens unguentum instituit, quod & Theodoricus approbavit. ʒ. olei muscellini unci. unam, petrolei semunciam, olei communis, & butyri, ana unci. 4. ceræ unci. unam, styracis calamint hæ, styracis rubræ, singulorum drach. duas & semis, mastiches, olibanii, gummi hædæ, ana unci. semis: ex ijs omnia quæ liquefcere possunt, igni admoueat: tur: alia uero trita, & in puluerem redacta, illis remi-
- 30 sceantur: postremo addatur styrax, & fiat unguetum, ex quo moderatè calefacto, ceruix, & collum totum, ac uniuerfa

Curatio conuulsionis à crassis, & uiscosis humoribus.

Unguentum Rogerij.

nis non enascatur, eam ex industria quadam accersunt;
 & exuscitant: idq; per exhibitionem confectiois ana-
 cardine, & ad quantitatem nucis auellane. Alij ad eun-
 dem finem offerunt castoreum, & assam foetidam, uel
 opopnacem, addita mellis portione dupla. Metridatū
 quoque, & theriace, in hoc affectu mirè proficiunt:
 nervos enim roborant, & crudos succos concoquunt,
 absumentq; eo scilicet nomine, quod excalfaciant. Ca-
 uendum uerò præcipuè frigus est: ideoq; in eo concla-
 10 ui, quo cubabit aeger, ignis continuus esse, debet, maxi-
 meq; tempore antelucano, quo præcipuè frigus inten-
 ditur. Vinum, per initia præsertim, gustandum non est:
 siquidem huius usus tum præcipuè periculosus est, eo
 potissimum nomine, quod fluxionem proritat. Vini
 loco aqua mulsa exhibenda erit, in qua decocta sit sal-
 uia, & radix acori cum momento nucis muscate. Vi-
 ctus tenuis, primis saltem diebus, conuulsis à plenitu-
 dine instituitur, idemq; calfaciens, & exiccans. Ha-
 20 tenus de curatione conuulsionis ex plenitudine.

Metridatū
Theriace.

Frigus conuul-
sis inimicum.

Vinum quando,
& quare conuul-
sis interdici dū.

20 Curatio conuulsionis ex compatiendi societate.

C Aeterum conuulsio, quæ fit propter consensum,
 & uelut quadam partium conspiratione, seu cō-
 patiendi societate: si ex dolore excitata est, per anody-
 na, & dolorem sedantia curationem recipiet, ut in se-
 quentibus dicitur, cum de uulneratis nervis agitur. Si
 uerò ex morsu iclu' uel alicuius uenenosi animantis cō-
 uulsio oborta sit, theriaca parti affectæ superimponen-
 da erit, et cucurbitula defigenda, uel cornu quædam,
 30 quibus nonnulli cucurbitularum uicē utuntur. His enim
 (quæ citra calefactionem ex alto uehementius extra-

Curatio conuul-
sionis, ex cōpa-
tiendi societate.
Dolor.

Morsus, uel
ictus ueneno-
rum.

T hui)

Morsus oris uen-
triculari conuul-
sionem excitat.

Cerebrū in om-
ni conuulsione ro-
borandum.

Musculus aut
neruus interdū
per trāuersum
præcidendus.

Lesio q̄ mors
potius optanda.

Paralysis ex
quibus uulneri-
bus excitetur.

hunt) totam eius quod infestat, & dolorem creat, substā-
tiam uacuabis. Sunt autem & qui ore suo uirtus ex-
trahunt, ægræ uidelicet particule, ut superius dictum
est) admoti, ipsamq; labijs complexi. Si autem accidat
conuulsio, ob morsum oris uentriculi (quod proprie sto-
machus appellatur) ab acri aliquo, mordaci, & erode-
te humore excitatum, uomitus statim concitandus est,
post quem uenter roborendus erit, tum ijs quæ
extrinsecus admoventur, tum ijs quæ intrò assumuntur,
iuxta periti alicuius medici cōsiliū. Porro in omni
conuulsione à quacunque causa ortū habeat, cerebrum
imprimis roborandum est. Caput igitur abrasis crini-
bus oleo liliorum fouendum erit. Iuuat & eodem oleo
cervicem, totamq; dorsalem spinam, axillas quoque, et
inguina inungere: hoc enim spasmo, præsertim humi-
do, est dicatissimum. Hora paroxysmi bonum est, labo-
rans contineat inter dentes baculum salicis, ne os exa-
ctè claudatur, & lingua à dentibus dilaceretur. Vltimū
est, si nihil aliud fieri possit, neruum, aut musculum
ex quo conuulsio orta est, transuersum præcidere, ut
Galenus & Razes consuluerunt: præstat namq; unius
particulæ actionem amittere, quam totius corporis.
Meliorq; est (ut Galenus ait) lesio quàm mors. Itaque
hoc pacto conuulsionem quidem sanaueris, aliquem ta-
men ex particulæ motibus uitaueris. Ut autē ei quod
urget, & unde primum maximèq; homini imminet pe-
riculum, succurramus, cogimur sic nonnunquam alium
insanabilem affectum relinquere.

De paralysis ex uulnere, uel ex alio

Paralysis, id est, neruorum resolutio, latus unum
aut alterum, uel partem quampiam, non autem
corpus

corpus totum infestans: interdum etiam uulnera, & contusiones insequitur, sed capitis maxime, & totius spinæ dorsi, ut multis exemplis Galenus aperuit libro de locis affectis tertio. Porro an paralysis ipsa quæ ex uulnere accidit, partes quæ è regione uulneris sunt, uel potius oppositas infestet, ad præsens dicere omittemus. Est autem paralysis neruorum relaxatio, seu molificatio, cum priuatione sensus & motus, non quidem totius (ut dictum est) sed uel lateris unius duntaxat, uel priuatae alicuius particule. Quo fit ut affectus sit conuulsiōi contrarius: in hac enim durities adest cum motu deprauato ac permutato: durities autē molificatio: ni ac relaxationi est contraria. Vnde Galenus libro tertio interiorum affectuum locorum, sic inquit: Quæ omnes partes nerui, tum sentiendi, tum mouendi uim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio nominatur. Vbi uerò alteri laterum, aut dextro aut sinistro, id accidit, paralysis, id est, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus, interdum dextræ, interdum sinistræ. Quod si in aliquo membrorum idē euenerit, eiusdem membri resolutio esse dicitur. Nam & tota manus, & totum crus interdum resoluitur, atque solus in crure pes, & quæ sub genu sunt. Sic etiā de tota manu, similiter proportionē dicendum est. Hæc Galenus Galenus: ex cuius uerbis colligere licet, paralysis aliam esse uniuersalem, aliam uerò particularem. Uniuersalis ea est, quæ alterum latus totum, aut dextrū aut sinistrum occupat. Particularis uerò, quæ priuatim alicui duntaxat particule accidit. Sic & de spasmo per analogiā dici potest: nempe quod alius sit uniuersalis, alius uerò particularis.

Paralysis quid.

Paralysis affectus est conuulsiōi contrarius.

Paralysis uniuersalis.

Paralysis particularis.

De causis, & signis paralyfis.

Causa externa
paralyfis.

Causæ paralyfis, atque eiusmodi ablationis sensus, & motus, geminæ sunt: nempe internæ, & externæ, seu extrinsecus aduenientes. Externæ causæ resolutionis nervorum sunt, casus ab alto, percussio, incisio, sectio, compressio, uel constrictio, frigiditas uolenta, & uehementis, uicina partis phlegmone, uel scirrhus, & id genus alia, quæ extrinsecus euenientia, uel continuū soluunt separant'ue, uel spirituum uias occludunt, & facultatis animalis delationem impediunt. In 10
 internæ autem causæ sunt humores crassi, & uiscoli, nervos cerebri, aut spinalis uocatæ medullæ (quæ ipsius cerebri uicaria est) obstruentes. Nervorum enim corporibus ita obstructis, & crassioribus redditis, animalis facultatis (quæ sensum, & motum præstat) in membra delatio impeditur. Caterum anxie disquire= re, quo pacto per nervorum resolutionem, seu paraly= sin, interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnū quam ambo simul pereant, & alia multa ad rem pro= positam attinentia, nequaquam præsentis sunt specula= 20
 tionis. Satis enim fuerit chirurgus, si præter ea, quæ iam de paralyfi dicta sunt, sedem primario affectam, & à qua noxa orta est, simulq; dispositionem eius cognouerit. Nisi enim hæc (inquit Galenus) accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus uel sensus uel motus uitatus est, rectè curabimus. Porro ipsam affectà 30
 sedem ex anatome facile ipsi deprehendemus. Nam cum ex ea cognouerimus nervos, qui per faciem partes sparsi sunt, à cerebro dimitti, si earum aliqua, simul cum toto corpore, resoluta est, haudquaquam nos late 30
 re debet, resolutionis dispositionem in ipso cerebro consistere.

Nota cerebri
 primario affecti
 in paralyfi ex
 lib. 3. de loc.
 affect.

sistere. Vbi uerò partes quæ ad faciem attinent, inco-
 lumes ac illasæ permanserint: hæ autem quæ sub ea sita
 sunt, uniuersæ resolutæ fuerint, spina initium tunc
 affici, sciendum est. Ex ipsa enim anatome didicimus,
 quod omnes animantis partes sub ceruice positæ (quæ
 à consilio, & uoluntatis imperio moueri possunt) ner-
 uos habent, qui eas moueant, procedentes ex spinali
 uocata medulla. Quod & ijs uerbis Galenus testatus
 est libro quarto de symptomatum causis: Si spinæ prin-
 cipium ladata, solæ partes capitis, quoad uixerit ani-
 mans, & sentire, & moueri possunt. Quod si cerebro
 quoque noxa acciderit, qui sic afficiuntur, ij omnium
 partium & motum & sensum illicò deperdūt. Atque
 eadem quoque ratione, si toti corpori conuulsio accide-
 rit, eundem spinæ locum, nempe initium, affectum esse
 declarat: faciei partibus omnino seruatis illæsis. Quod
 si hæ quoque afficiantur, cerebro noxam iam illatam
 esse ostendunt. Adhæc nouimus ex corporum dissectio-
 ne, neruos, qui pectus mouent, ex ea spinæ parte, quæ
 in ceruice est, ortum deducere. Quocirca uox perit
 omnibus, quibus ea spinæ pars, quæ in ceruice est, fue-
 rit affecta. Ipsa uerò ex trāsuerso incisa, si tota fuerit
 dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sen-
 su motuq; priuari necesse est, utpote suscipiente spina
 à cerebro, uim tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio.
 Præterea in anatomia (inquit ille) uidimus, ubi per trā-
 suersas spinæ incisiones, ad medium usque duntaxat,
 secundum longitudinem, spina ipsa seccaretur, non om-
 nes suppositas corporis partes, sed eas duntaxat, quæ
 e regione sectionis erant, resolutas. Dextras quidem,
 dextra spinæ parte dissecta: sinistras uerò, ubi reliqua

Nota paralytis
 initio spina af-
 fectio.

Galen. lib. 4. de
 sym. cau. et lib.
 3. de loc. affect.

Lib. 3. de loc.
affect.

Ex lib. 4. de
sympt. caus.

Si quinta spina
uertebra affici-
tur.

Si sexta uerte-
bra affecta est,
uel septima.

Si septima
uertebra affecta
est.

pars esset incisa. Itaque (subiungit Galenus) manifestū
est, quod circa primum spinæ processum, facta aliqua
dispositione, per quam cerebri facultas, quominus ad
ipsam perueniat, prohibetur, omnia inferiora mem-
bra, dempta facie sensu, motuq; priuabuntur. Vbi ue-
rò media duntaxat eius processus pars fuerit affecta,
non omnes inferiores partes resoluentur, sed uel sini-
stræ duntaxat, uel dextræ. At uerò spina in inferiori lo-
co affecta, nempe sub ea neruorum propagine, quibus
thorax attollitur, idq; uel ob luxatam aliquam uerte-
bram, uel alio quouis modo, ut uulnere, si quidē ingens
fuerit affectus, partes inferiores omnes, subito & sen-
tiendi, & mouendi facultate priuantur. Si uerò nō ita
uehemens fuerit affectus, stuporem inducet. Atque ij
mortem effugiunt, quandoquidem spiratio in ipsis ser-
uatur. At quibus quinta spinæ uertebra uulnerata, aut
quouis alio modo affecta est, eorum manus omnino, &
sensum, & motum amittunt. Quibus uerò sexta, ijs nō
in totū sentiendi mouendiq; facultas in manibus perit,
quippe primæ brachij partes illæ se seruantur. Id uerò
multo magis, si septima spinæ uertebra fuerit affecta.
Octauæ uertebræ affectus perquam exigua: hac uerò
inferiorū nullam penitus noxā manibus inducere pos-
sunt. Maxima uerò noxam ex lesa hac uertebra sen-
tiunt, thorax, & reliquæ partes inferiores. Itaq; nisi
hoc pacto ex anatomia, neruorū ad singulas partes ue-
nientū principia didiceris, perquam difficile earū uel
sensum, uel motū deperditū curabis, restitues ue. Por-
rò humorē peccantē, ac paralytim cōmittentē, depre-
hendes ex proprijs cuiusq; humoris notis. Causas uerò
externas, seu euidentes facili cognoscēs ex relatu, &
iudicio laborantis.

Iudicia,

Iudicia, seu praecepta sagia paralyfis.

Praesagire, ac iudicare potes de paralyfi, à qua
cūquē occasione ortū duxerit, deq; omnibus ner-
uorum affectibus, quòd aegre admodum sanabiles sunt,
Nervi enim ipsi pauco admodum natiuo calore pa-
tisipant, qui curationis membrorum opifex est, & cau-
sa effectrix potissima. Proinde uerissimum etiam est,
quod uulgo dici solet, nempe paralyfin in senibus per-
quam difficile curari; he enim natiuo calore (qui robur
est facultatis nos gubernantis) propemodum sunt de-
stituti. Quod Hippocrates his uerbis expressit: Seni-
bus parum calidi innati inest. Quam senectiam ueram
esse testatur Galenus, siue quis ad qualitatem sermo-
nem referat, siue ad substantiam. Tremor & febris
si paralyfi superuenerint, bonum: namque febres ner-
uorum resolutionibus, uti & conuulsionibus ex reple-
tione, aduenientes, partim quidē superfluum dissolunt
humiditatem, partim uerò concoquant frigiditatē, quae
duae sunt medicis, in curanda paralyfi (uti & spasma
ex plenitudine) remediorum intentiones. Adhuc, pa-
ralyfis quae ab ictu uel casu non uehementer neruos
atterente, contudentē ue, excitata est, curationem in-
terdum recipit, ut contigit illi Pausaniae Syro sophi-
stae, cuius meminit Galenus in fine lib. 3. de affecto.
loco: notitia. Quum enim Romanus aliquando uenisset,
dum per uiam duceretur, uehiculo excidit, atque in
dorsi initio laesus est: unde secundum duos minores so-
nistae manus digitos, atque medij partē mediam, sen-
sum imprimis quidem difficilem habuit, postea male cu-
rantibus medicis, sensum omnino amisit. Huic autem
remedia, quae illi imperiti medici digitis frustra ada-
ptauerant,

Paralyfis affe-
ctus est aegre sa-
nabilis.Senes uix un-
quam a paraly-
fi liberantur.Tremor & fe-
bris si paralyfi
superuenerint;
bonum.Paralyfis ab
ictu, uel casu.Paus. sophista
uehiculo exci-
dit, unde para-
lysim in digitis
contraxit.

ptauerant, lesæ parti, hoc est, in uio spinæ, Galenus ipse (ubi mali occasionem intellexit) statim adhibere insit, atque sic uir ille celeriter sanitati est restitutus.

Paralysis ex uementis neruorum contusione, uel diuisione.

Quæ uerò ab insigni, atque effatu digna neruorum contusione uel diuisione, oritur particulari resolutio, prorsus insaniabilis est: soluta enim in illis continuitas nunquam (ut dictum est) perfecte curatur. Recte quidem, & conformiter ad Galeni sententiam, Auenzoar adstruxisse uisus est, subitæ mortis periculum imminere, si nerui anhelitus, hoc est, respirationi seruientes, aliquibus uulnerati, aut quouis alio modo insigniter affecti fuerint: in ipsis enim statim perit respiratio. Quod fit, ut præfocati repente moriantur. Quomodo enim ablata respiratione (quæ actio est uitæ necessaria) diutius uiuere possent? Si membrum resolutum non immineatur, nec emarcescat, colorq; eius non immutetur, spes aliqua curationis subest. Si uerò contabescat, & gracilescat insigniter, colorq; natiuus pereat, atque à seipso plurimum euariet, malum portendit.

Paralysis neruorum respirationi seruientium.

Nota paral. curabilis, aut incurabilis.

Paralysis ex uulnere curatio.

IN curanda neruorum resolutione (quæ paralysis dicitur) ex accepto uulnere, uel causa alia extrinsecus incidente oborta, præmissa totius corporis uacuatione, uel per purgantia medicamenta, uel per sanguinis detractionem, uel per utrumque, uti res exigit: facilius item ut decet, humorum in partem resolutam influentium auersionibus, præscriptaq; uictus ratione congrua, (quæ omnia periti alicuius medici consilio fieri debent) topicis remedijs aduersus illam sedulo pugnare debet chirurgus. Itaque cum duabus in hoc affectu profligando

In curanda pa

profligando Therapeutices, id est, curandi facultatis partibus, opus sit: nempe ea quæ uictu, & quæ medica mentis, tum intrò assumendis, tum foris ad mouendis medetur: eam hîc solam curationem exequemur, quæ medicamentis forinsecus ad mouendis, perficitur: ne qui chirurgiam profitentur, dietetica, & pharmaceutica (quæ peritissimū, & rationalem medicum desiderant) turpiter, & in magnam laborantis perniciem (ut plerique hodie assolent) abutantur. Caterùm cum multa

ral. dietetica, et
pharmaceutica
opus esse.

10 uariaq; præsidia forinsecus, in curanda paralyti ex uulnere, aut alia quauis externa causa suscitata, ad moueri soleant, ut emplastra, cataplasmata, unguenta, illutus, fofus, cucurbitule, & alia id genus: Guido tamen uno liquore longè optimo, & ad affectum eiusmodi siue symptoma profligandum, efficacissimò contentus erat: quod quidem ex Ioanne illo Mesue, uiro in familia Arabum doctissimo, ac in re medica Euangelista à quibusdam nuncupato, desumpsit, eo loci, ubi de cordis passionibus agit. Eo autem liquore illinere solebat

De localibus re
medijs in para
lysi ex uulnere
adhibendis.

20 medicus ille Arabs ceruicem, totamq; spinam dorsî, atque etiam affectam ipsam particulam. Consert namque hoc pacto mirificè roborandis membranæ spinalem medullam obuoluentibus, substantiæ spiritali, quæ uiuimus, neruis quoque, & ossibus. Proinde paralyti, omnibusq; neruorum ægritudinibus, cordis palpitacioni, & tremori, atque etiam manifestæ lassitudini, mirè, ac supra humanam opinionem, proficit. Adde, quòd nullum medicamentum eo præstantius inueniri potest, ubi cor celeri, festinaue eget refectione, ac refocillatione, si saltè ipsi Mesue credimus. Caterùm est quod cum ipso Mesue uehementer admiremur, præcos illos

Liquoris balsa
miti Mesue
dotes.

no. 2. alla 7

tum

tum medicos, tum philosophos insignes, & rerum natu-
 turae peritissimos, nullam in suis scriptis, eiusmodi in-
 unctionis spinæ, mentionem fecisse, cū uix aliud tam
 præstans auxilium inueniri, aut excogitari, pos-
 sit, ad uitæ substantiam conseruandam. Nouisti nanque
 satis (opinor) ex anatomicis, spinam dorsi in homine esse
 ueluti carinam nauis, & fundamentum reliquorum os-
 sium, imò uerò & principium. Nosti præterea, sub hac,
 ueluti solido quodam propugnaculo, & miro tutissi-
 mo, dorsalem ipsam medullam conditam esse, quæ ce-
 rebri quidem germæn. est, & explanatio, durorumq;
 corporis neruorum principium: per quos uelut intera-
 nuncios, corpus uniuersum transsumit, primū quidem
 & maxime motū, cum hoc autem etiā & sensum. Ad-
 de quòd in spondylis dorsi, (qui spinam ipsam consti-
 tuunt) mira naturæ prouidentia efformata sunt quæ-
 dam subtilia foramina, per quæ uasa spiritum & san-
 guinem deferentia. (uenæ, inquam, & arteriæ) intrò
 quidem: foras uerò, nerui ipsi, sensum; & motum, in
 corpus uniuersum comportantes, feruntur. Quo fit, ut
 spina ipsa sit ueluti platea; seu uia quædam publica,
 non modò neruorum, sed & uenarum, & arteriarum.
 Proinde & spiritum, ac uirtutem. Adhuc, non ignoras
 magnam ipsam uenam concuam dictā, itidem & ar-
 teriam aortam uidgò nuncupatā, iuxta spinam ipsam
 totam reptare, sed & partium spiritalium est ueluti
 subserniculum, & (ut quispiam dixerit) ueluti lectus
 aliquis. Atque (ut Mesues inquit) medullam continet ue-
 re * humiditatis. Multas ergo easdemq; bonas, atque
 effatu dignas intentiones cumulabis, ex inunctione ip-
 sius dorsalis spinæ, quam ueteres ipsi tunc medici, tunc
 philosophi,

Spina dorsi ue-
 lui carina
 nauis
 fundamentum
 reliquorum os-
 sium
 imò uerò & principium

* Alias, hu-
 manitatis.

philosophi, uel prorsus ignorantes, neglexerunt, uel
 eam nobis inuiderunt, cum ne uerbum quidem in eorū
 monumentis de ea scriptum inueniatur, ut Mesues testa-
 tus est. Porro liquoris illius tam eximij, atque ad tam
 multa utilis, compositio, & cōficiendi ratio apud præ-
 fatum autorem talis est: *℞. myrrhæ electæ, aloës be-
 paticæ, spicæ nardi, sanguinis draconis, thuris, mumie,
 * opobalsami, bdellij, carpobalsami, ammoniaci, sarco-
 collæ, croci, mastiches, gūmi Arabici, syracis liquidæ,
 † ana drach. duas, ladani electi, succi castorei, ana
 drachmas duas semis, muschi drach. semis, terebinthi-
 næ optimæ ad pondus omnium. Puluerisanda pulueri
 sentur, & omnia misceantur cum terebinthina, repo-
 nanturq; in furnibulo, seu distillatorio, quod alambicū
 uocant, & illa ingeniosè ac lento igne ut decet, distil-
 lentur: liquorem autem per distillationem sublatū,
 in ase nitreo forti excipe. Hic liquor proximè accedit
 ad uerum succum balsami. Guido à Cauliaco quan-
 doque huic precioso liquori addebat herbas dicatas
 † paralysi, & tum generosius, atque efficacius multò
 (ut ipse testatur) experiebatur auxilium.*

De Syncope ex uulnere.

Syncope (definitore Galeno lib. 12. Therapeuti-
 ces) est præceps uirium lapsus, qui immoderatas
 euacuationes, ingentes dolores, uigilias, principiorum
 intemperiem, atque animi uehementes affectus, sequi
 consuevit. Ea autem syncope, quæ in uulneribus acci-
 dit, magna ex parte creatur, uel ex immodica sangui-
 nis profusione, uel ex uehementi dolore. Hanc proxi-
 mam esse cognoscēs, tum ex arteriarū pulsū elangue-
 scente,

Liquor balsa-
 mites, Io. Mes.
 longe optimus.
 & ad multa uti-
 lis imus.

* Alia exem-
 plaria habēt
 opopanacis.
 † Aliās. 3.
 duas semis.

Syncope quid.

Syncope in uul-
 neribus unde.

Syncope proxi-
 mē instans
 notā.

scente ac deficiente, tum ex pallido vultus colore, tum
 ex motu totius corporis ignauo, ac difficili, sed præser-
 tim palpebrarum, & partium extremarum, tanquam
 illis erigendis, aut attollendis non possit uirtus motrix
 sufficere: sed & frigidi, circa collum maximè & fa-
 ciem, sudores, syncopen iam pulsare fores testantur,
 symptoma sanè minimè negligendum. Quandoquidem
 celeriter interdū hominē rapit, estq; quasi uia ad mor-
 tem, imò (ut vulgò dici solet) est ueluti quedam parua
 mors. Proinde summa cura adnūcandum est, ne in hoc tā
 periculosum symptoma uulneratus incidat. Ergo la-
 boratē quibus poteris modis cōsolator, Hominū turbā
 ne suo anhelitu cōclauē nimis excalfaciāt, & laboran-
 tē sua præsentia deterreant, procūl arceat. Sed et ante
 quā ea prematur qui uulneratus est, panis frustulū,
 uino optimo, aque rosaceæ momēto, deluto, illi sugendū
 exhibeto: atque etiam ut ex uino ipso modicum quid
 bibat, ipse iubeto. Vinum nanque omnibus syncope
 uexatis utile est, ut lib. 12. Therapeu. his uerbis Ga-
 lenus annotauit: Vinum tamen, quod & calidum natu-
 ra sit, & deductionem in corpus promoueat, omnibus,
 quos syncope malè habet, offerre conueniet. Constat,
 autem, ex uinis ea deligenda esse, quæ & flauo sint co-
 lore, & substantia tenui, & ætate uetera. Talia nimi-
 rum & boni odoris continuò fuerint. Cæterum anīra
 præ uetustate, uina ne sunt. Porro si iam syncope,
 qui uulnus accepit, uexetur, eius faciem aqua rosacea,
 uel frigida, uel utriusque mixtura, adiecto etiamnum
 aceti (si placet) momento irrorabis, ac etiā ipsa ualidè
 in illam, laborantis faciem dico, projicies: aut saltē na-
 ribus aquam rosaceam, & acetū admouebis, ut scilicet
 suauī

Vinum omnibus
 syncope uexa-
 tis succurrit.

Vini in syncope
 electio.

Si iam syncope
 præsens sit.

suauit eorū odore, animam illorū recrees. Pilos, nasum,
 & aures uellito, extrema fricato, alapis illorū genas ce-
 dito, et proprio nomine alta uoce illos uocato, ac cæte-
 ra facito, quæ in hoc sympt. medici fieri præcipiunt.

De desipientia, seu delirio accidente in uulneribus

- O**Mne delirium (ut Gal. ait lib. 3. de symptōma-
 tum causis) deprauatus est principis faculta-
 tis motus, à prauis succis aut cerebri intemperie ortum
 1. habens. Interpreti Auicennæ alienatio dicitur. Porro
 tæst eiufmodi desipientiæ, seu mētis alienationes, sym-
 ptōmata sint modò primogenia .i. primaria ac pro-
 prio cerebri affectu euenientia, modò secundaria, hoc
 est, cerebro compatiendi societate, seu (ut dici solet)
 per consensum laborante: hic tamen nunc de solo eo
 delirio, quod consortij lege, seu per consensum accidit
 in uulneribus & percussionibus articulorum, sermo-
 nem faciemus. Talia nanque uulnera (ut superius dixi-
 mus) doloris, uigiliarum, conuulsionis, & delirij pericu-
 2. lum adferunt. Cæterum eiufmodi symptōmatis (deli-
 rij inquam in cacoëthis uulneribus euenientis) genera-
 tio persimilis est ei, quæ per suffusionis oculorum acci-
 dit, à uentriculi dispositionibus ortum trahentes, ut
 Galeno uisum est libro tertio de locis affectis. Quæ ad-
 modum enim uentriculus, cerebro suas affectiones com-
 patiendi quadam societate transmittit, idq; propter
 neruorum à cerebro, ad os uentriculi descendentium
 magnitudinem: per quos etiam sensus huic particula,
 quam ulli reliquarum corporis partium acutior est. Ita
 3. quoque neruosis partibus inflammatis, cerebro noxa
 promptissimè cōmunicatur, atque ex illis promptius,
 quàm

Delirium quid,
 & unde nasca-
 tur.

Cano. 3.

Lib. 4. Ther.

Causa delirij in
 uulneribus.

Neruesis parti-
 bus inflammatis
 delirium accidit.

Delirium ex sic-
citate fit.

quàm ex alijs quibusvis partibus delirium superueni-
re solet, idq; ascendente ad caput interdum per con-
tinuas partes, solo calore: interdum uerò spiritu uapo-
roso, uel fumoso, aut fuliginoso. Hæc autem omnia, quæ
sic delirium, aut phrenitidem inducunt, siccandi pollēt
facultate Auicennæ: quippe quæ multo, eodemq; acri
calore participant. Quo fit, ut delirantes irrequieto fe-
rè motu agitentur. Vnde Gal. lib. 13. Therap. ad hunc
modum ait: Ergo cum humor qui in capite redundat, ,
frigidus est, insensibilitas, immobilitasq; hominem op- 10
primunt. Cum calidus est, perpetuus potius motus, ,
una cum rationis noxa. Accidit enim (ueluti demon- ,
stratū in libris de his est) ex frigore, segnicia: ex calo- ,
re, immodicus motus: ex humoris uerò uitio, dementia.

Delirij ex uulnere curatio.

Vapores à cere-
bro auerendi.

SI delirium, seu mentis perturbatio, post uulnus ac-
ceptum, hominem apprehendat, huius rei gratiā
statim accersendus & consulendus erit peritus aliquis
medicus, qui potu, frictionibus, & deligaturis partium 20
extremarum, & maxime pedum ac tibiæ, clysteri-
bus quoque huic rei accommodis, fumos ac uapores ui-
tiosos, à capite deorsum protinus reuellere studeat, ut
rectè præcepit Auicennas, itidem & ceteri, qui hac de
re scripserunt. Quod autem ad chirurgum attinet, le-
sæ particulæ dolor ex toto (si fieri potest) sedandus est.
Vtile est etiā alapis genas laborantis percutere, ut ipse
ad mentē, seu ratiocinandi facultatem redeat. Galen-
libro decimo tertio Therapeutices caput delirantium
in principio perfundendum esse oxyrhodino, pulchrè 30
nos admonuit: uapores enim, & humores à capite
tunc

Caput deliran-
tium oxyrho-
dino perfun-
dendum.

tunc repellendi sunt. Cum uero in summo incremento sunt deliria, perussiones ex papauerū capitibus (consilio eiusdem) applicabimus. Odorem quoque ex rebus frigidis naribus obijciemus: ac nares ipsas intus, uel frontem ex similibus medicamentis illinemus. Quippe sopire, (inquit) ac stupefacere principem facultatem oportet: cerebrum scilicet, quod supramodum incaluit, refrigerando. Sanitati magna ex parte reslituntur Auicennæ, qui per dies aliquot, radicem bryoniae, id est, uitis albae, uel bibunt ex liquore aliquo refrigerante & humectante, uel cum cibo quopiam eius saporem obtundente comedunt. Ceterum de pruritu, duritie, atque impotētia lesæ particulae, quæ interdum uulneratis accidunt: suo loco alibi dicitur.

Radix bryoniae.

De uulnere in carne accepto, & eius diffinitionis. Cap. V.

Uulnere in carne accepto
& eius diffinitionis
Hi



VULNUS proprie Galeno lib. 3. meth. med. unitatis est solutio, ex uulnerando in carnosa parte relicta, eademque, cui recentiores addiderunt) cruenta, & citra putrefactionem. Hic autem uulnus latius accipimus: nempe pro recenti plaga non modo in carne, sed etiam in nervis, uenis, arterijs, tendonibus, membranis, cartilagine, & ossibus facta. Itaque primum de eo uulnere, quod in carnosa substantia acceptum est, edifferemus. Ceterum eiusmodi uulnus aut simplex est, & citra substantiae deperditionem: aut cum aliqua substantiae amissione. Uulnus simplex, & quod siue deperditione sit substantiae, aliud profundum, aliud summò tenus factum, seu in summo

Vulnus quod Galeno.

Vulnus quod apud recentiores ubi ringer.

Diffusio uulneris.

in summo residens est: aliud uerò utriusque particeps, ut cum pars una diuisionis per longitudinem facta al-
 tē descendit, altera in summo corpore hæret, quod in æ-
 quale Galeno dicitur: aliud item magnum, aliud par-
 uum tum dicitur, tum uerò est. Quæ omnes differen-
 tiæ à quantitate, seu spacio diuisionis sumptæ sunt.
 Vulnus quod cum deperditione est substantiæ, aut sit
 cum amissione cutis solius, aut cum ablatione cutis &
 carnis subiectæ simul. Porro eiusmodi uulnera, uel sim-
 plicia sunt, & sine ullo affectu, aut symptomate: uel ac-
 cidentia habent, quæ rationem causæ non obtinent
 (tūc enim ulcera dicerentur difficile sanabilia, de qui-
 bus in seq. dicitur) sed solum rationem habent sine
 quo non, ut superius annotauimus ex Gal. lib. 4. The-
 rapeu. Cuiusmodi sunt intemperies, dolor, phlegmone,
 pruritus, & alia paulò antè commemorata. Non ma-
 gnoperè autem curo, si prædictæ huiusmodi differen-
 tiæ, dispositiones aut affectus dicantur potius, quàm
 differentiæ, uel contrà. Quanquàm Gal. lib. 3. meth.
 med. anxie satis disquisuerit, quænam sint propriæ
 ulcerum, seu uulnerum differentiæ, & quæ aliorum af-
 fectuum complexionēs. Hoc enim parum nunc mihi
 conferre uidetur ad uulnerum curationem. Commoda
 nanque morborum curatio, non ex nominum, sed re-
 rum recta opinione contingit: ut scribitur primo me-
 thodi medendi. Cæterum de causis, signis, & iudicijs
 uulnerum, quatenus uulnera sunt, abundè satis in præ-
 cedentibus dictum est, in capite scilicet uniuersali. Pro-
 inde ijs prætermisissis, uulnerum in carne acceptorū cu-
 rationem iam aggrediemur.

Curatio uulnerum simplicium, in carne summò-
tenuis acceptorum.

- V**ulnerū eiusmodi curatio, præter iā dictas qua-
tuor, aut quinque intēctiones cōmunes, unā specia-
lē præcipuāq; habet, nēpe sanguinis profussonē cohibe-
re. Quod sanē intelligēdū est: nēpe si nimis, immodera-
tē, atq; affatim effundatur, ut rectē interpretatus est
1. *Auicēnas*: Satiū enim est (inquit) ipsum fluentē ex uul-
2. *nere sanguinem*, non omnino ac statim suppressere, sed
3. *si nimis abundē prorumpat*, eius duntaxat impetum
4. *moderatē infrenare oportet*. Moderata nanque sangui-
5. *nis ex recenter accepto uulnere uacuatio*, non parum
6. *sæpe multis profuit*: quandoquidem & phlegmonas,
7. *& obstructions*, & febrem subinde fieri prohibuit.
8. *Quæ quidem symptōmata*, atque id genus alia, uulne-
9. *ribus (nisi diligenter prouideris) superuenire*, ipsiusq;
10. *solutæ unionis consolidationem, & curationem magno*
11. *perē impedire, consueuerunt*. Atque illud fuit Hippo-
12. *cratis præceptum*, quod & à Galeno refertur, & ap-
13. *probatur lib. 4. meth. med.* Fit enim (inquit Hippoc.) Hippoc.
14. *effluente sanguine uulnus siccus: proindē & sanius.*
15. *Nam siccum (ut idem ait) sano uicinius est*, humidum
16. *uero non sano*. Porro si tantus fuerit ruentis sangui-
17. *nis impetus*, ut cum ijs, quæ sistendo sanguini in uulne-
18. *ribus communiter adiuuari solent*, cohiberi nō possit,
19. *ijs remedijs suppressendus erit*, quæ in capite de uul-
20. *neribus uenarum postea dicentur*. Ceterū tametsi
21. *in genere dictum sit*, quomodo curandorum uulnerum
22. *intēctiones perfici debeant: modus tamen specialis*, quo
23. *in carne perfici debeant*, in sequentibus dicitur. Hu-
24. *ius autem inuentio habetur ex differentijs uulnerum*

Specialis præci-
puaq; intentio
curāli uulneris
in carne acce-
pti, una est.

Quid uulnus sim-
plex, & quæ sit
eius curandi
ratio.

Uulnus non sim-
plex.

Uuln. simpl. po-
tiuslat tantū ag-
glutinationem.

Gal.

Oui candidum,
quare uulnerib.
admonetur.

suprà commemoratis, ad hunc modum. Vulnus illud
simplex dicitur Galeno, Hippoc. & alijs medicis,
quod solum consistit, hoc est, quod sine deperditione est
substantiæ, nec ullum alium affectum, aut symptoma
adiunctum habet. Vulnus igitur simplex non erit, si
quæ uulnerata est particula fluxione uexetur, si malo
succo uitiosa sit, si omnino extra naturalem temperiẽ
fuerit, si ulla cavititas adsit, si aliqua cutis amissio facta
fuerit. Itaque ubi simplex uulnus, quodq; solum consi-
stit in carnosa particula, non adeo saltem magnum in-
cidit, dissidentium labiorum commissionem, seu coniun-
ctionem, quæ sola decenti fit ligatura, uinculo scilicet
ex duobus inijs circumdato, exoptulat Gal. lib. 3.
Therap. Quæ enim (inquit de simplici ulcere loquẽs),
dissident, atque inuicem distant, si in idem ad amussim,
componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitio-
nem coalescunt. Nempe sicuti in cauis ulceribus, ut ca-
ro producat, ita in simplici ulcere, ut ora ipse se-
cum coalescant atque agglutinentur, sola certe natu-
ra causa est. Diductorum igitur labiorum coitionem,
seu agglutinationem præcedit necessario, ipsorum con-
iunctio, atque in idem adductio. Idem omnino de hac
re sentit Razes, quod et Galenus: usus tamen commu-
nis obtinuit, ut recentibus huiusmodi uulneribus oui
candidum (quod album uocant) aliquandiu agitatam,
& leui stupa exceptum admoueat. Nec abs re pro-
fecto, cum & sanguinis profluium supprimat, dolorẽ
sedet, refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat, non
solum in oculis, sed & in omnibus locis exulceratis,
ut Galenus est autor libro undecimo de simplicium me-
dicamentorum facultatibus. Ante omnia uerò, cauendum

dum est, ne dolor incidat: quandoquidem dolor (ut iā
sepe dictum est) & fluxionem prorit, & phlegmonē
excitat. Quomodo autem dolorem sedare oporteat, in
præcedētibz satis est explicatū. Porrò eiusmodi oui
candidus liquor, ante tertium diem amoueri non de-
bet. Nam, ut Galenus ait, parua uulnera eiusmodi natū
ræ sunt, ut post orarum adductionem, et commissionem
seu coniunctionem, unius diei, aut duorum dierum spa-
ciū adhuc requirant, quò proba fiat unitio, & aggluti-
10 natio. Quòd si uulnus hoc pacto non adglutinetur,
curandum erit, ut in sequentibus paulò post dicetur.

Lib. 3. Therap.

*De uulnere magno, percussim diuiso, in summo residente,
hoc est, superficiali, & minime profundo, in quo
non sola sufficit deligatura ad oras ipsius
applicandas, & coniungendas.*

SI uulnus in superficie corporis acceptum, ad tan-
tam magnitudinem percussim, cassim'ue diuisum
est, ut sola deligatura oræ ipsius nec adduci, nec com-
20 mitti possint: sutura aut fibulis (quas Græcè αὐτῶν
οὐλὰς uocant) eas ipsas distinctas oras, adducendas, &
cōiungendas esse, præcepit Gal. lib. 3. meth. med. At-
que hac sola partium dissidentium coniunctione uulnus
glutinatur. Apud recentiores tamen chirurgos serè
omnes inualuit consuetudo, ut his uulneribus apponatur
pulis ruber, quem incarnatiuum, & conseruati-
uum uocant. Recipit autem partes duas thuris, &
sanguinis draconis partem unam. Albucasis addit tres
partes calcis uiuæ. Cuius sententiæ suffragatur, &
30 Lanfrancus. Guido autem loco calcis uiuæ, bolum Ar-
meniam adiicit. Halyabbas uerò santalos apposuit. Sūt

Medicamentum
cruentis aptum
ulceribus.

qui puluerem hunc rubrum appellatum, labiorum uul-
neris agglutinatum, & suturæ conseruatium, hoc
modo componunt: ʒ. boli Armenij, terræ sigillatæ,
singulorum drach. sex, thuris, mastiches, sarcocollæ, sin-
gulorum drach. duas semis, myrrhæ, aloës, singulorum
drachmā unam semis, tragacanthi pisti, sanguinis dra-
conis, singulorum drachmā unam, farine hordei, fa-
rine fabarum, singulorum drachmā semis. Sed inte-
rim summopere cauendum est, ne uel pilus uel oleum,
uel quidpiam aliud in mediū adductorū labrorum uul-
neris interuenerit. Nam tunc eiusmodi uulnus sola dis-
sidentium partium coniunctione glutinari non potest.
Hæc enim quæ sic interiacent, iam unionem dispescit,
& earum quæ copulandæ sunt partium, coalitum im-
pediunt. Ex prædictis autem singula, cum oui candido
liquore agitari possunt, donec in corpus unum coëant,
quod glutinis instar lentescat. Postea uero stupis læui-
bus excipiendum erit medicamentum, & ita uulneri
admouendum: supra quod & aliæ stupæ solo oui albo
imbutæ, & intra pannum lineum eodem madefactum
liquore inuolutæ, apponendæ sunt. Sed & supra uul-
nus nulla alia intercedente materia, pannus aliquis te-
nuis, prædicto imbutus liquore, admoueri debet, ne sci-
licet, dum remouentur stupæ, suturæ iam factæ puncta
abrum pant, aut dilacerent. Quod si loca circum uul-
nus adiacetia, rosacea inungerentur, factum bene exi-
stimauerim. Hoc pacto enim læsam particulam à dolo-
re & inflammatione uindicabis. Qualis autem suturæ
aut deligatura, quales item puluilli ex eiusmodi stu-
pis facti, hisce uulneribus percussim, casimue in super-
ficie acceptis, atque in conspectu apparentibus, con-
ueniant,

Cauēdū ne quid
lebris uulneris
intercidat.

Quæ cruento uul-
neri primū ap-
posita sunt, an-
te diem tertium
remoueri non
debent.

ueniant, & quo pacto fieri debeant, in præcedentibus abundè satis dictum est. Ceterum primus eiusmodi apparatus, usque in diem quartum mutari non debet, nisi fortè dolor aliquis uehemens superueniret, aut symptoma aliquod molestum incideret. Porro si post quartum diem transactum uulnus non coaluerit, uino aliquo styptico calente, abluendum erit. Deinde supæ prædicto uino imbutæ, et expressæ, supra uulnus ipsum apponendæ, & alligandæ erunt: quas & quotidie mutare oportebit. Intra enim dies paucos hoc modo uulnus agglutinabimus, & persanabimus, Galeno etiamnum attestante, lib. 4. Therap. ubi Thessalum arguit, qui uulnera in multos menses, & interdum in annu, aut etiam longius tempus protrahebat, & incurrere sinebat: quæ alioqui paucissimis diebus, ut sex, aut plurimum septem, curari potuerant. Itaque primus apparatus rectè decenterq; fit, cum ouorum candido liquore, & puluere illo rubro, cuius paulò antè meminimus. Hic enim & sanguinis profluium infrenat atque inhibet, dolorem sedat, & phlegmonem creari uetat. Secundus uerò apparatus, optimè fit cum uino, ut suprâ dictum est. Vinum nanque (ut Galenus ait lib. 3. meth. med.) omnis ulceris, quâ ulcus est, id est, quod citra aliam cum ea implexam dispositionem reluctantem consistit, optimum est medicamentu. Quod hac sequenti ratione conuincitur. Uulnus omne, quâ uulnus est, siccarî atque adstringi desiderat, præsertim si magnum extiterit. Atqui uinum, quale suprâ est memoratum, nempe subausterum, hæc duo commoda præstat uulneri. Vinum igitur omnis uulneris, quâ uulnus est, optimum est medicamentum, Maior est Galeni, lib.

Quæ post quartum diem fieri debeant.

Primus apparatus.

Secundus apparatus.

Vinum optimu ulceri medicamentum.

Gale. libro. 3. meth. med.

bro nuper citato, ubi ait, quod eo tempore, quo diuise
 ulceris seu uulneris partes ritè sunt coniuncte, medi-
 camento opus est, quod particulam siccet, & modicè
 adstringat, ut & si quâ sanies iâ subsit, hanc cõsumat:
 & si quâ in uacuum locû fluxiora est, hanc prohibeat.
 Proinde medicamentum glutinatorium plus siccet
 oportet, quàm quod carnem producit, nempe ordine
 secundo. Minor uerò ita deducitur. Vinum, ut Gal. est,
 autor lib. 8. simpli. medic. ex secũdo ordine est excal-
 facientium: sed quod admodum uetus est, ex tertio, sicut
 mustum quod uocant, ex primo: caliditati autem
 eius, proportionè respondet siccitas. Proinde uinum
 ipsum pro naturarum seu facultatum, quibus ratione
 ætatis pollet, diuersitate desiccatur, & agglutinat. Non
 aut humectat, & refrigerat, (extrinsecus saltem admo-
 tum) ut Theodoricus falsò existimabat. Atq; id ipsum
 est, quod Galenus refert libro quarto Therapeutices,
 ex senioris Hippocratis sententia inquiens: Ulcera ma-
 defacere, id est, abluere, quæcunque ea fuerint nisi ui-
 no, non oportet. Tum causam subiiciens, ait: Nam sic-
 cum sano uicinius est, humidum uerò, non sano. Hinc,
 Arnaldus dicere solebat, quod cruenta & recentia
 uulnera, aqua ardente (quâ & aquâ uitæ nuncupant)
 abluta, celerrimè ad sanitatem perducuntur: quippe
 quæ insigniter desiccet. Post hanc autem ablutionem,
 quidam infra scriptum puluerem (qui in hoc casu ma-
 gnæ est efficaciæ) uulneri inspergunt. R. myrrhæ
 drachmas tres, aloës hepaticæ drach. quatuor, thuris
 drachmas duas, misce, et fiat puluis. Sunt qui post amo-
 tionem primi apparatus, emplastra & unguenta ad-
 mouent, quæ in promptu ad hanc rem parata habent,
 ac statim

Vinum pro æta-
 tis ratione, diuer-
 sa pollet facul-
 tate.

Hippoc.

Aqua uitæ,

Puluis opti-
 mus.

ac statim supas superponunt. Galenus autē in re pro-
posita, plurimi facit emplastrum, quod nigrum appel-
lant: Auicennas uerō unguentum de lino: quod tamen
magis dicatum est carni regnende, quā agglutina-
tioni laborum uulneris. Guido à Cauliaco in hac re
uti consueuerat unguento, quod constat prædicto pul-
uere rubro, remixto eū terebinthina lota. Quidam ue-
rō terebinthinam ipsam, cum prædicto puluere com-
mixtam, & (ut dicunt) incorporatam, statim per initia
10 cruentoriam uulnerum admovent, atque in diem quar-
tum relinquunt. Hec enim oras uulneris coire facit, &
futuram eo nomine conseruat. Sed horū omnium, atq;
aliorum multorum ad hanc rem pertinentiū, formulæ
& compositiones, in antidotario describentur.

De uulnere profundo, & seculto, sine amissione
substantiæ, in carne accepto.

VVLNUS in profundum penetrans, & reconditum,
subinde sutura, & decenti ligatura curationem
20 recipit. Si autem hoc modo curari non possit, uel scili-
cet quia partes quæ disunctæ sunt, exacte ad inuicem
usque (ob nimiam diuisionis profunditatem) sibi coniun-
gi non possint, uel potius quia in fundo collecta sit sa-
nies, aut pus, cui nullus patet effluxus, ipsum per efflu-
xionem, Galeni consilium secuti, curabimus. Ipsam
uerō effluxionem, tum ex eiusdē, tum ex contrarij loci
diuisione, & situ, seu figura partis accommodata amol-
mur. Porro situm partis uulneratæ accommodum, seu
congruam positionis figuram intelligimus, quando pla-
30 ge biatus, quem orificium uocant, semper deorsum spe-

Emplastrum
nigrum.

omni si uuln-
re, uulneris
trahe, & mola
remouet, & q

Vulnus quan-
do per effluxio-
nes curandū,

*Scellio in parte
opposita quan-
do facienda.*

Etat, fundum uerò sursum, ita ut sanies ex ipso uulne-
re prona, & liberè effluat. Itaque si uulneris figura
non ad superiora extenditur, sed ad ima uergit, nec su-
tura, nec fibulis, nec deligatura, partes disjunctæ, omni
ex parte, ad amussim cōmitti, ac sibi applicari possint,
atque in profundo sistatur sanies: nisi prius ad efflu-
xum ipsius uitiatum humoris feceris sectionem, nihil un-
quàm proficies, siue carnem generare, siue agglutina-
re uolueris. Vbi uerò conueniētem positionis figuram
uulnus in parte laborante seruauerit, siue id ex natu- 10
ra uulneris, siue ex industria contingat, sectione noua
opus non est, ut libro secundo ad Glauconem Galenus
nos edocuit. Itaque refert eo loci, se sinū in coxa ena-
tum, figura ad ima uergente, sine ulla ex aduerso diui-
sione, curasse. Cū enim sinus ipse uersus genu qui-
dem terminaretur, os uerò altius, circa mediam scili-
cet femoris regionem consisteret: iussit molle cervical
popliti laborantis subijci, ut inferiorem situm haberet
inguen, quàm genu. Hac igitur conueniente positionis
figura in læsa parte seruata, faciliè per os, ichores, & 20
purulenta colluies, elabebantur, & effluebant. Idem
quoque & in brachio fieri potest. Quandoquidem si
os uulneris ad partem superiorē uergat, ita brachium
collocandum erit, ut ipsum orificium deorsum spectet.
Atque tum sine alia facta ex aduerso sectione, uulnus
poterit ad sanitatem perducī. Non secūs quidem ac si
os prope cubitum esset, uulnere in superiora tenden-
te. Quòd si hac conuenienti situs figura, particula læ-
sa collocari non possit, nec ex uulnere ipso sanies ela-
bi: ex aduerso sectio molienda erit. Quod & hac sen- 30
tentia

*Sinus in femo-
re curatus, citra
ullam ex aduer-
so sectionem.*

tentia iterum Galenus confirmauit circa finem libri
 20 tertij meth. med. Si uulnus (inquit) cavitatem altè re=
 20 conditam, sub cute habet, considerare oportet, utrùm
 20 ea in superiore parte sit, ita ut sanies ex ea prona es=
 20 fluat: an in inferiore, sic ut illic fistatur. Eius igitur cui
 20 effluxus patet, eadem quæ aliorum curatio est. Cui ue=
 20 rò non est, huic ipsi moliatur effluxum oportet. Eius
 20 autem effluxus moliendi duplex ratio est, ubi expri=
 20 mente deligatura nihil promouemus, aliàs tota cavi=
 20 te defecta, aliàs in fundo tantum aperta. Quando ue=
 20 rò harum alterutra sit incunda, docebit tum locorum
 20 ipsorum natura, tum uerò ulceris magnitudo. Si nanq;
 20 ea loca ipsa dubiam seu fallacè, ac periculosam sectio=
 20 nem faciant, & ulcus magnum fuerit, in fundo aperi=
 20 re magis expedit. Sin contrà se habeant, præscindere,
 20 seu diuidere præstat. Deligatio uerò eius incipiat qui=
 20 dem (ut dictum est) superne, finiatur infrà, ubi scilicet
 20 patet effluxus. Hactenus Galenus. Ceterum in tali diui=
 sione quæ ex aduerso fit, Brunus syphunculos, hoc est,
 20 tubos, siue turundas concauas (quas cānulas uocant)
 ex utraque parte imponit. Guido uerò dum hanc mo=
 liebatur sectionem, solebat uti setone, (ut uocant) quia
 melius (inquit) sordes deterget, & totum pertransit spa=
 cium, minoremq; infert dolorem. Ipsi autem intro=
 missorio ad formam acus facto immittebat, uel hastu=
 lam ligneam in cauum uulneris imponebat, & super
 eam tutius sectionem faciebat. Deinde sectione fa=
 cta, mundificatiuum aliquod medicamentum leui stu=
 pa, aut panno exceptum, superponebat, quod bis in
 30 die mutabat.

Brunus.

Guido.

De cauo uulnere, cum amissione substantiæ
cutis utriusque, & carnis subiectæ tan-
tùm, non etiã ossis. Cap. VI.

*Vera Hippocra-
tica metho-
dus sanandi caui
ulceris.*



*Due indicatio-
nes uniuersales
proponuntur, in
curando cauo
uulnere.*

Lib. 3. Tber.

*Quatuor indica-
tiones particula-
res in curando
cauo uulnere
proponuntur.*

NCAVO uulnere non ipsa modò perijt
cuticula, (quam Græci epidermida uocât)
uerùm etiã reliquæ cutis supposita na-
tura uniuersa, & subiectæ carnis portio aliquando nõ
exigua. Quo fit, ut geminus in eo curandi finis sit pro-
positus, unitio scilicet & repletio: quoniam & affe-
ctus geminus est, nempe ulcus siue uulnus, quod est uni-
tatis solutio: & cavitatis, quæ ex amissa aliqua animalis
propria substantia est contracta. Itaque continui di-
uortium unitiõnem, cavitatis repletionem desiderat. Ve-
rùm enimuero quoniã in proposito uulnere iungere nõ
possimus quæ disident, nisi prius cavitatem impleue-
rimus, ordinem curationis à cavitatis impletiõne or-
diri, necesse est. Omnis nanque quæ præter naturam
est cavitatis, impleri postulat: quare & quæ in carnosâ
etiã accidit parte. Ipsa uerò impletiõ inueniendorũ
remediorum finis, quo tenditur, est, quem uel idiota,
uel prius quisque etiã nouit. At uerò ut quæ im-
pleant, inuenias, & multa ratione opus est, & multi-
plici particulatim indicatione, & methodo rationali
exacta. Longè itaque à scopo aberrant, qui unum id
sibi ad cauum ulcus sanandum satisfacere putant, si
sciant quòd carne est implendum. Non enim in hoc cu-
randi ratio consistit, imò in eo inueniendo quòd carne
sit impleturum. Cæterum particulares indicationes,
ex quibus inuenire licet, quæ cavitatem uulneris im-
pleant, sunt quatuor. Prima ex ipsius uulneris sub-
stantia

stantia sumitur. Secunda ex ipsius ægri temperamento, non corporis modò uniuersi, sed etiam afflictæ particulæ. Tertia ab ijs, quæ coniugata & annexa dicuntur, cuiusmodi sunt particulæ laborantis intemperies, & circumdantis nos aëris temperies. Quarta ex contrarietate indicationum, ut cum lesa particula contrariò est temperamento cum toto, hoc est, cum corpore uniuerso. Talis siquidem ordo indicationum statuitur à Galeno libro tertio methodi medendi, in cu-

1. curandis uulneribus omnibus, ne dum in cauo. Porro nomine indicationis substantiæ uulneris, hoc loco inaudiuntur indicationes differentiarum maximè propriarum ipsius uulneris: de quibus abundè suprâ differuimus, & in sequenti tractatu, qui de ulceribus inscribitur, locupletius adhuc differemus. Itaque prima sanandi caui uulneris indicatio nobis insinuat, carnem eadem specie cum ea quæ periit, regnendam esse. Impleri enim non poterit, quod cauum est, (ut prima curandi indicatio uniuersalis postulat) nisi substantia

Prima indicatio.

2. omninò similis ei quæ periit, regnatur. Atqui carnis gignendæ materia sanguis est, opifex uerò, seu effatrix causa, ipsa natura. Verum non satis est sanguinem dixisse, nisi etiam & bonum (inquit Galenus) addiderimus. Erat autem sanguis qui insluit, & ex quo regnenda caro primordium habet, bonus, si nec qualitate, nec quâtitate uitiosus fuerit. Sed nec satis etiam hoc loco fuerit naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & ubi. Constat autem, quod subiectorum corporum, quibus superinduci caro debet, natura

Sanguis bonus, materia est gignenda carnis.

3. ipsa gignendæ carnis opifex est. Porro ratione opifex habere non poterit natura subiectarum particularum,

Natura subiectarum particularum, opifex est

carnis regnenda.

*In omni cauo
uulnere duo spe-
cianda.*

Hypothesis.

Interdum

*In carnis gene-
ratione, duplex
provenire solet
excrementum.*

Sanies.

Sordes.

larum, quibus deficiens caro restituenda est, nisi ius-
tum, & minime vitiatum calidi, frigidi, humidi, ac sic-
ci temperamentum obtineat. Siquidem ex horum tem-
peratura, cuiusque corporis natura consistit. In omni
igitur cauo uulnere, duo illa primū consideranda sunt:
nempe quod subiectum est, iusta ne temperie sit, id est,
an secundum naturam se habeat. Et præterea sanguis
qui influit, bonus ne, an modicus sit. Fingamus igitur
& sanam esse partem subiectam, atque afflictam, &
sanguinis (qui gignendæ carnis materia est) confluxum
citra ullum uel in quantitate, uel qualitate uitium. His
sanè ita se habentibus, nihil est præterea quod obstat,
quominus prima carnis generatio prosperè contin-
gat, idque nullius externi medicamenti ope. Quippe
causis ambabus unde nascitur præsentibus, nulloque ex-
trinsecus quod impediatur obstante, non potest prohibe-
ri carnis generatio. Verum in ipsa primæ carnis ge-
neratione duplex (ut Galenus ait) provenire excremen-
tum necesse est: alterum quidem crassius, alterum uerò
tenuius. Quod & in omni qualitatis alimenti muta-
tione contingere solet. Hoc autem (tenuius inquam) in
ulceribus recentibus, quæ hic uulnera appellamus, La-
tinis sanies, Græcis ichor nominatur. Illud uerò (quod
crassum est scilicet) nobis sordes dicitur. Ac ex tenui
quidem excremento uulnus humidū redditur, ex crasso
sordidum. Eoque duplicibus medicamentis eget: utique
ut humidum est, siccantibus: ut sordidum, expurganti-
bus. Ergo cum nullo unquam tempore natura cesset,
certè nec tempus ullum erit, in quo non ambo hæc in
cauo ulcere colligantur. Quare nec tempus ullum erit,
in quo non utriusque medicamenti genus desideretur:
utique

utique & quod siccet, & quod expurget. Verum non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse medicamentum debeat, inuenisse (ut iam Hippocratica uerâq; methode inuētum est) sed & species aliqua inuenienda est, quæ eiusmodi uulneri sit accommodata, & statuto ordine gradu uē circumscripta, ut carnem producere possit. Non omne nanque medicamentum, quod

*Medicamentum
carni producen-
dum idoneum.*

1 o ne tum siccare, tum detergere possit. Quippe quod super hunc fuerit, ita ut non modò humoris qui influit redundantiam consumat, sed etiam affluentem sanguinem populetur: id refici carnem (ut Gal. inquit) cetera materia eius absumens prohibebit. Itaque præsentis negotio aptissima sunt, thuris lachryma, et hordeacea, & fabacea, & erui farina, & iris, & aristolochia, & cadmia, & panax, & pompholyx, quæ uulgò tutia dicitur. Omnia uerò hæc, tum maioris minorisq; discrimine inter se disident: tum alia eorum simplices qua-

2 o litates uincentes habent, alia compositæ. Siquidem
, aristolochia, & panax, tum ceteris plus siccant, tum
, natura magis calent: hordeacea fabarumq; farina, mul-
, tò his minus siccant, nec ullum calorem obtinent. Thus
, modicè calet, minus tamen illis siccet: adeò ut quasdam
, corporum naturas omninò non siccet. Erui farina, &
, iris, horum atque aristolochiæ, & panacis, medium lo-
, cum tenent. Secunda indicatio curandi uulneris caui,

Ex 3. meth.

*Secunda indica-
tio curandi caui
uulneris.*

3 o nuat nobis medicamenta, uel calidiora, uel frigidiora, uel humidiora, uel sicciora ipsi uulneri esse admodenda:

nempe

Duas esse pri-
marū indicatio-
nū differentias.

nempe pro natura ac temperamento, & totius, & affli-
ctæ particulæ. Scire namque licet (ut Gal. ait) duas
esse primarum indicationum differentias, quarum una
ab eo, quod secundum naturam se habet: altera uerò
ab eo, quod præter naturam est, sumitur. Porro quod
secundum naturam se habet, sui custodiam indicat, &
propterea quæ similia sui sint, postulat. Quod uerò præ-
ter naturam est, sui ablationem desiderat: proinde &
contraria requirit. Perit enim quidque in contrariū,
& à contrario. Igitur uulnus quidem (quia præter na-
turam est) quo est humidius, eo sanè medicamēto, quod
magis siccet, indiget. Corporis uerò natura (propterea
quod secundum naturam est) quantò est humidior, tan-
tò, quod minus siccet medicamentum postulat. Proin-
de, si qua sunt in diuersis corporibus uulnera ulcera ue,
quibus par adsit humiditas: quod in siccioris corporis
temperamento consistit, utique magis siccari possu-
lat: quod in humidioris, hoc sanè minus, quo natura (in-
quit Galenus) naturæ interest. Siquidem productam
carnem, ei quæ præfuit similem esse oportet. Vbi igitur
tur pristina siccior fuit, nouellam quoque sicciorē
fieri conueniet. Quare uberius hæc siccari postulat:
quantoq; magis sicca fuerit, tantò quod admouetur me-
dicamentum, magis siccam facultatem habere debet.
At in humidioris natura, tantò rursus ijs quæ minus
siccet, medicamenti est opus, quantò caro ipsa minus
est sicca. Quò fit, ut thus (quod cum temperatis, & me-
dijs naturis consentit) in quibusdam, tum ulceribus, tū
naturis, rursus quidem mouet, carnem non producit: in
quibusdam etiam carnem producit. In humidioris nan-
que natura siccare, & producere carnē potest, in sic-
cioris,

Lib. 3. metho.
med.

Thus in quibus-
dam naturis, tū
uulneribus car-
nem producat.

cioꝛe, non poteſt, imò humectat ac ſuperatur à natu-
 ra, proinde & putrefacit. Præterea in modicè humi-
 dis ulceribus, tum recentibus (quæ hîc uulnera & pla-
 gas appellamus) tum diuturnis, & iam inueteratis, car-
 nem efficere poteſt: quippe quòd moderatè deſiccet.
 In ijs uerò, quæ præhumida ſunt (quòd non ſatis deſic-
 cet) prorsus non poteſt. Tertia indicatio nobis inſi-
 nuat inueniendum eſſe remedium, quod proportionè,
 & ſtatuto quodam ordine graduè, ipsis affectibus,
 1. qui ſimul cum ipſo uulnere incidunt, reſpondeat, illoſq;
 ipſos affectus priùs ſummonendos eſſe, quàm ipſum
 uulnus carne implere tentemus. Itaque ſi intemperies
 uulneri acceſſerit, atque exulcerata uulnerata ue ca-
 ro, uel priùs etiam ex quauis occaſione, uel ipſo uulne-
 rationis tẽpore, iuſto calidior, frigidior ue ſit effecta:
 utique medelam exigit, quæ non modò moderatè ſic-
 cet, ſed etiam in tantum calfaciat, refrigeret ue, inquã-
 tum ſubiecta caro à naturali ſuo habitu receſſit. Fieri
 2. enim non poteſt, (inquit Galenus) ut in ulcere, uel car-
 2. nis productio, uel ſinus impletio, uel agglutinatio, uel
 cicatricis inductio, (quæ omnia naturæ ſunt opera) re-
 3. cte unquam cedat, niſi ſubiecta caro pro naturali mo-
 3. dò ſe habeat. Quocirca legitimi ulceratarum ſeu uul-
 neratarum partium temperamenti, maior tibi ſolicitudo
 erit, quoties eas uel carne implere, uel glutinare,
 uel cicatrice inducere ſtudes. Itaque congruis atque
 opportunis auxilijs, aduerſus illos, qui cum uulnere in-
 cidunt affectus, pugnare oportet, priuſquam uulneris,
 ipſius curationē aggrediamur. Veluti igitur ſi phleg-
 3. mone unà cum uulnere eſſet, nemo uulnus ipſum, uel
 carne implere, uel glutinare, uel cicatrice inducere,
 attẽtare

Tertia indica-
 tio curandi uul-
 neris caui.

Lib. 3. methodo.

Circūdātis nos
aëris temperiē
in curandis nul.
maximē stellan
dam esse.

attētare debet, priusquā illa discussa sit. Ad eundem
arbitror modum etiam, si sine phlegmone sola sublit
intemperies, nullū horum fore prius sperabimus, quā
illa sit sanata. Quōd si hæc ita, ut dictum est, se habet,
inspici etiam conueniet circūdantis nos aëris tempe
riem. Siquidem (ut. 3. methodi Gal. ait) ueluti medica,
mentum quoddam, is quoque corporibus nostris forin,
secus incidens, ubi immodicus calore uel frigore est, sa,
nationem remoratur. Danda igitur opera est, ut me=,
dicamenta excessui ipsius ambientis occurrant. Ideoq; 10
Hippocrates: In calidioribus anni temporibus, ijs, qui=,
bus frigidior facultas sit, medicamentis utitor, calidio,
ribus per frigidiōra. Ad eō (inquit) perpetuō uerum est,
illud theorema: Quæ secundum naturam sunt, similiū,
sibi indicatiua sunt: quæ præter naturam, contrariō=,
rum, si modō saltem illa seruari, hæc summoneri dest=,
derant. Porro ambientis nomine hoc loco, & præsen=,
tes status, seu anni tempora, & etiam regiones, cum
Gal. intelligimus. Quarta indicatio particularis in sa
nando cauo uulnere obseruanda, sumitur (ut superius 20
dictum est) à contrarietate indicationum: non quidem
earum, quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed ea
rum, quæ in uno, eodemq; tempore ipsius curationis su
binde offeruntur. Vt, exempli gratia, si ægri tempera
mentum iusto sit humidius, particula uerò ipsa quæ la
borat, siccior: aut contrā, quōd hæc sit humidior, &
totius temperamentum siccius. Pari modo in calore
& frigore, quōd contrario temperamento sit pars cū
toto. Diuersa sanē in his est ea, quæ à patiente parti
cula accipitur indicatio, ab eā quæ ex ægri sumitur 30
natura. Itaque hæc particularis indicatio, quā quare
tam

Quæ nomine
ambientis intel
ligantur.

Quarta indica
tio curandi uul
neris caui.

- tam in ordine posuimus, insinuat nobis medicamenta, uel humidiora, uel sicciora, uel calidiora, uel frigidiora, aut prout res postulat, media ac temperata, deligenda esse, quæ ipsi uulneri admoueantur. Statuamus igitur, clarioris doctrinæ gratia, totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoque medicamenta desiderare, quæ minus siccant: ipsam uero ægram particulam ex earum numero esse, quæ sicciores sint, qualia sunt ea, quæ minus carnosæ conspiciuntur. Cuius
- 10 generis sunt, quæ circa digitos, et articulos habentur: præterea, quæ circa aures, et nasum, et oculos, et dentes sunt: ac ut semel dicam, ubi crebræ cartilagines, et membranulæ, et ligamenta, et nervi sunt: adeps uero, et caro, uel omnino nulla est, uel perquam exigua. In hac siquidem hypothesi, si quantò ægri temperamentum iusto est humidius, tantò particula iusto sit siccior, nec adijciendum, nec detrahendum pharmaco quicquàm est, sed tale adhibendum, quale si ulcus, uulnus uel, in medijs temperamenti particula consisteret. Sin sic-
 - 20 cior debito particula fuerit, quàm corporis temperamentum iusto est humidius, utique in tantum intendi siccitatem medicamento conueniet, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris sit pars exulcerata medio temperamento siccior, ægri uero natura gradibus tribus humidior: manifestum est particulam, quæ nunc uulnerata exulcerata uel est, siccius uno gradu desiderare medicamentum, quàm pars quæ sit temperata cæteris paribus. Sed ut hæc omnia coniectura sola cognosc-
 - 30 sci possunt, ita longam in hominum naturis, et medicamentorum facultatibus contemplandis, exercitationem

Epilogus præ-
cedentium.

Præxi commu-
ni.

postulant. Nec est præterea, quod de indicationibus,
quæ à calido & frigido sumuntur, dicatur: quando=
quidem ad portionem dictorum intelligi possunt. Vi=
des ne igitur clarissimè, quot huic theorematibus sit opus,
qui probè ac certa methòdo curare uulnus cauum uo=
luerit? Nam postquam inuentum est, humorem omninò
huic uitio inesse, utique siccatum medicamentum paran=
dam indicauit. At quoniam ipsorum siccantium quæ=
dam magis siccant, quædam minus, partim ex uulne=
rum diuersitate, partim ex ægri natura, quod expe=
dit, est desumptum. Itaque non modò de corporis natu=
ra meditatùs sit oportet, quisquis commodè, & ex
arte sanare uulnus eiusmodi studet: uerùm etiam dili=
genter speculationem omnem de medicamentis didi=
cisse, tum siccis humidisq; corporum temperamenti no=
tas callere. Adhæc, tum ambientis temperies, (quæ uti=
que tum ad præsentes status, seu anni tempora, tum ue=
rò regiones extenditur) tum partium naturæ, tum indi=
cationum inter se pugnantium contrarietas, eidem con=
sideranda sunt. Verùm enim uerò Thessalus, & pleri 20
que alij medici, qui etiam illum hodiè imitantur, ista
quidè nec inquirunt, nec norunt: sed iuxta prouerbiũ,
mali sutoris modo, uno calopodio omnes calceant, nul=
lo naturarũ, aut partium, aut id genus aliorum facto
discrimine. Cæterùm apud recètiores chirurgos in cu=
rando hoc uulnere, cõmunis hic modus obseruari solet.
Stata iam sanguinis profusione, & parte affecta ab
inflammatione & dolore uindicata, uino calente uul=
nus abluitur: mox ipso perluto ac destecato, puluis ali=
quis carnem regenerans, aut unguentum aliquod sar= 30
coticum, admouetur. Itaque linamenta ijs sarcoticis
(quorum

(quorum lib. 6. abundè meminimus) imbuta, aut con-
 spersa, in sinum uulneris demittuntur. Post hæc stupæ
 aridæ, uel quæ uino maduerint, superponuntur. Ac de-
 mium, quæ medicamenta approbè continere possit, de-
 ligatura adhibetur: atque æstate bis, hyeme semel dun-
 taxat, auxilia eiusmodi permutantur. Porro eiusmodi
 medicamina, quæ uulnere atque ulcerum cavitates
 implent, mediocriter, citraq; morsum abstergētia sunt;
 ut lib. 5. simp. medic. Gal. annotauit.

10

De uulnere impleto, siue æquali. Cap. VII.



ASTERVM ubi uulnus purgatum, imple-
 tumq; carne fuerit, æquale tunc, siue æqua-
 bile, latum, planum, atque impletum nomi-
 natur. Hoc autem cicatrice tantum induci postulat.

Porro ut ad cicatricem perducatur, amissam cuticulā,
 quam epidermida Græcè uocauimus, desiderat. Hanc
 igitur tum regnere, tum sibi unire oportet. Ve-

20 **rum** cum ex semine ortum habeat cutis, talis omni-
 nò, qualis erat quæ periit, prorsus regigni non potest:
 simile quiddam tamen cuti, & quod eius officium sup-
 pleat, restitui potest: non tamen planè cutis. Quando
 igitur ut cutis regeneretur, fieri omninò nequit, quod
 superest, efficere est tentandum: nempe inlaurare ali-
 quit, quod cuti deperditæ simile sit, & carni sit ueluti
 naturale aliquod tegumentum. Id enim est uulnus iam
 repletum, planumq; redditum, ad cicatricem ducere.

Qui finis est, quem nunc hic prætendimus. Huius ita-
 30 que efficiendi ratio hæc est. Portio quæpiam subiectæ
 carnis nuper genitæ, & restitutæ (ea scilicet, quæ sum-

Metodus indu-
 cēda cicatricis.

Cutis eadē spe-
 cie cum ea quæ
 periit, regigni
 non potest.

Lib. 3. metho.
meden.

mótenus euidenter apparet) sic alteranda est, ut non amplius caſo permaneat, ſed ucluti cutis euadat. At quo pacto inquires ita alterabitur? proſectò alicuius alterantiũ qualitatiũ ope. Ergo (ut Gal. ait) quoniã cutis carne ipſa tum ſiccior eſt, tum etiam denſior, ſi carnem ſiccabimus & adſtringemus, cuti etiam perſimilem reddemus. Et hæc quidem eſt medicamenti, quod cicatricem inducit, ſumma. Verùm ea non ſatisfacit: nam & glutinatoria, tam ſiccabant, tum etiam adſtringebant, ſicuti & epulotica, id eſt, cicatricem inducẽtia. 10
Aſſiſciendũ ergo eſt, quo ordine, gratiũe ſiccare debeant medicamenta, quæ cicatricem inducunt, quemadmodũ & de ſarcoticis, & glutinatorijs fecimus. Id autem ex ipſa rerum ſubſtantia facile inuenies.
Epuloticorum facultas. Epuloticum nanque, id eſt, cicatricem inducens medicamentum, non modò qui inſluit humorem, (ut glutinatorium) ſed cum quoque, qui in ipſa carne ſubiecta continetur, conſumere debet. Quò fit, ut multò proſectò ſiccius, quod cicatricem inducat, quàm quod agglutinet, medicamentum eſſe conueniat. Itaque tres gra- 20
Tres gradus deſiccantiũ medicamentorum, in curatione uulnerum neceſſario ſtatuendi ſunt. Nempe ſarcoticorũ, id eſt, carnem regnẽntium, quorum facultas ex primo ordine eſt deſiccantiũ. Agglutinatoriorum, quæ ſecundo gradu, uel etiam tertio reſſecant. Et epuloticorum, hoc eſt, cicatricem inducentium, quæ ſiccandi facultate, prædicta adhuc ſuperant. Hæc enim non accidentalem modò, & conſluentem (quæ præter naturã eſt) humorum redundantiam deſiccare ac conſumere debet: ſed cum quoque humorem, qui ſecundum natu- 30
ram eſt, & in ipſa (ut dictũ eſt) ſubiecta carne continetur.

Tres gradus deſiccantiũ medicamentorum, in curatione uulnerum ſtatuendos eſſe.

Sarcotica.
Agglutinatoria
Epulotica.

tinetur. Quod & sequentibus uerbis Gal. testatus est:

1^o Glutinatur (inquit) unum id propositum est, ut eius,

2^o quod præter naturam est, redundantiam consumat.

Qui cicatricem inducet, non hoc modo, uerum etiam ut ei, quod secundum naturam se habet, aliquid detra-

dat. Priusquam igitur uulnus cicatrice possimus obdu-

tere, eo usque resiccanda caro est, donec calli similitu-

dinem induerit, & cuti similis euaserit. Quod sane

per se, primario, ac proprio, hoc est, peculiari faculta-

te, medicamenta effecerint, quæ adstringendi modicè

facultatem habent: & eiusmodi quidem, ut plurimum

frigida sunt, & sicca. Cuius generis reputantur, gallu-

immatura, malicorium, id est, mali Punici, seu Grana-

ti cortex: balaustium, qui flos est syluestris Punice:

fructus spinæ Aegyptiæ, uel eius loco. acacia, rhus, seu

sumach, & eius generis uniuersa, quæ modicè adstrin-

gunt, atque desiccant. Per accidens uerò, & secunda-

rio, carnem alterando, & calli instar indurando, cicat-

ricem etiam inducunt calida medicamina, quæ car-

2^o nem detrabere, ac colliquare sunt nata, Gale. lib. 5.

simplicia cathartica, id est, detractoria dicuntur, uulgo

autem conscriptina. Cuius generis sunt chalcitis, &

æs ustum non lotum, (quod enim lotum est uerè est epu-

loticum) & aeris squamma, & misy, & fissum alumen,

& quod uulgo utricolum appellatur. Quæ prædictis

uere epuloticis, id est, primario, & ex sua facultate

cicatricem inducentibus, multò sunt ualentiora. Misy

quidem, & chalcitis præcipue. Mitior autem aeris

3^o squamæ: atque etiā hoc mitius æs ustum, quod etiam

si lauabis, utique (inquit Galenus) minus mordens me-

dicamentum habebis. Itaque si quando ijs. uti ad ci-

Epulotica pro-
priè dicta quæ
facultatem ha-
beant.

Cicatricem per
accidens indu-
centia.

Cathartica.

catricem inducendam in aliorum penuria cogimur, par-
cissime ipsis utemur: largius enim admota, mordicant,
colliquantq; carnem, & ulcus cauum efficiunt. Sum-
mum igitur tantum specillū, hoc est, specilli cuspidem,
in ea ad exactissimum leuorē tusa dimittemus, ac post
uelut tenuissimum quendam pollinem, partibus, quæ ci-
catrice induci possulant, leuiter eas contingentes im-
ponemus. Quod si illa etiam aduras, ut minus acxia,
sic ad cicatricem inducendam, reddes magis apta: si
uerò etiam laues, adhuc fient mitiora. Sed de his
locupletius, atque accuratius dicemus in antidota-
rio, & in tractatu de ulceribus.

De cicatricibus reparandis in uulneribus.

DEformes, atque indecoræ cicatrices, tenere qui-
dem adhuc, & recentes instaurantur Razi, ad-
moto diachylo, aut lithargyro (ut uocant) nutrita. Cica-
trices nigrae tollunt, oleum in quo radix bryoniae tum
candida, tum nigra, incocta sit, dum succū reddat im-
positum: calamintha ex uino cocta, argenti quoque spu-
ma cum rosaceo albo lota. Crassiores uerò, & iam in-
ueteratæ reparantur, oleo balsamite appposito, uel ra-
dice cucumeris syluestris (quem asininum uocant) tri-
ta, & apposita. Quod si his, aut similibus non tollan-
tur, id totum quod supereminet, atque excrescit, cul-
tro, rasorio rescindendum est, uel cauterio amouen-
dum. Crustam uerò resolues admoto gallinae, aut ana-
tis adipe, uel etiam mastiche. Hæc quidem in ijs agen-
da censent recetiores chirurgi. Verum Cornelius Cel-
sus stultum esse existimat, si uel excreuit cicatrix, uel
concaua est, decoris causa rursus & dolorem, & me-
dicinam

dicinam sustinere. Alioqui (ait) res utrique succurri potest. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, supereminentem carnem exedentia medicamenta coijcienda sunt: super concavâ, implentia, donec utrumque ulcus sanæ cuti æquetur, tum cicatrix inducatur.

De uulnere supercrescentem carnem habente, quam Græci hyperfarcosin uocant. Cap. VIII.



VULNUS quod hyperfarcosin, id est, supercrescentem carnem habet, morbus est ex eo genere, quod in quantitate magnitudinæ uel partium spectatur, quemadmodum et cauitas erat, de qua paulò antè egimus. Ergo ueluti uulnus cauum, non unum est uitium: sed pariter cauitas, et uulnus. Ita uulnus aut ulcus, quod supercrescentem carnem habet, non unus est morbus, sed simul caro supercrescens, et uulnus, ulcus uel. Prior morbus, qui instrumentarius est, (nempe magnitudo, quæ præter naturam est) primam indicationem (quæ ueluti meta est inueniendorum remediorum) nobis insinuat, ipsius scilicet exuberantis, et præter naturæ modum excrescentis, ablationem. Alter uerò morbus qui communis est (nempe soluta unitio) coniunctionem indicat. Porro ipsa agglutinatio, seu dissidentium coniunctio, uti et carnis generatio, naturæ quidem opera (ut prius diximus) perficitur. At supercrescentis carnis detractio, nullum quidem (inquit Galenus) naturæ opus est, sed

Vulnus supercrescentem carnem habens, non unus est morbus.

Carnis detractio medicata.

mentis perfici,
non opera natu-
ra. lib. 3. metho.

Septica, id est,
carnem minu-
entia.

solis medicamentis, seu medicamentorum ope perfici-
tur, quæ uehementer exiccent, & natura acria sint:
cuiusmodi sunt, attramentum sutorium, quod Græcis
chalcantum dicitur: chalcitis seu uitreolum, sponsia,
radix asphodelorum, hermodactyli, stupæ minutim in-
cise, linamenta è panniculo carpta, muria acriori im-
buta, & resiccata, unguentum uiride, & id genus alia
tum simplicia, tum composita, quæ ex libro sexto sunt
requirenda. Ceterum id unum semper fidei memoria
obseruandum moneo: nempe pro diuersis corporum & 10
partium temperamētis, uarianda esse remedia. Eadem
enim medicamenta quibusdam naturis carnem excre-
scentem insumunt, alijs uerò cicatricem inducūt, alijs
solum glutinatorio minus præstant. Eiusmodi nanque
medicamenta quæ carnem minuunt (Septica Græcis im-
propria quidem appellatione, dicuntur) proxima sunt,
tum ijs quæ ualenter detergent, tum ijs quæ cicatri-
cem inducunt. Sic ut non pauci interim (inquit Gale.
lib. 3. meth. med.) per errorem medicamentum, quod
carnem minuit, uel pro eo quod sordem deterget, uel 20
pro eo, quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli
gratia, misy, & chalcitis (quæ inter cicatricem indu-
centia annumerauimus) si naturæ humidæ applicabis,
potius carnem demere, quàm cicatricem inducere de-
prehendes. Adde, quòd inter eiusmodi septica, quæ
carnem tenellam uulneribus, atque ulceribus supercre-
scentem colliquant, & absument: quædam ualentiora
sunt, quædam imbecilliora, & mediocria. Quocirca
nonnulla mediocres carni supercrescentias exedunt.
Alia uerò maximas hyperfarcositas, id est, carnis im- 30
modicas excrecentias minuunt, & ad usque penitiora
crustis

crustis obducunt: Cuius generis est, quod recipit calcis
uiuæ, squamæ æris, & melle thuris, pares modos. Sed
de ijs quidē adhuc locupletius libro sexto dicitur: qua
re ad reliquis uulnerum differentias properandū est.

De uulnere contuso, & ab aëre alterato, dura,
callosa, & labra habente, cruciante, &
phlegmone, aut alio præter naturā
tumore, implicito. Cap. IX.



VULNERIS (ut in præcedentibus demon-
strauimus) quā uulnus est; sanatio, medio-
cris siccatio est. At uulneris, quod cū alio
affectu coniunctum est, (cuius uidelicet præcedere cu-
rationem oportet) eius curatio, ut uulneris solius non
est, sed prior illius affectus, qui cum uulnere consistit,
secunda uerò ipsius uulneris: nam siue phlegmone quæ
piam, siue nigritia, siue ecchymosis, siue erysipelas,
siue tumor is qui cedema dicitur, ulceratam, uulnera-
tam uē carnem obsederit, primū eius molienda cura-
tio est. At uerò quod uulnus interim non solum non
commodè curatur, sed multò etiam maius redditur, id
neminem (inquit Galenus) latere puto. Atque siue cō-
tusa fuerint circumposita uulneri loca, seu phlegmo-
ne, aliū uē tumor præter naturam in his consisterit,
propria eius affectus sanatio inuenienda nobis est: il-
lud pro certo habentibus, fieri non posse, ut uulnus sa-
netur, nisi locus, in quo consistit, prius sit sanatus. In
eiusmodi igitur uulneribus, supposito communi regia-
mine phlebotomiæ, purgationis, & diætæ (quandoqui-
dem hi affectus præterquā quod uulnera ipsa ad ca-
coëthiam

Vidn. contusio
Et curandi ra-
tio.

coëthiam præparant, fluxionem etiam in unum locum dolentem excitant, auocantq; tametsi etiam corpus nec sanguine, nec ullo succorum uitio redundet) topica, seu localis curatio comminuit est, agglutinationem prohibere, & fluxionem arcere. Quocirca rectè mihi fecisse uideberis, si in contuso, cruciante, & phlegmonoso uulnere, statim per initia, loca circumiacentia illiueris, uel rosaceo, uel myrtino oleo, uel unguento, quod constat bolo armenia, oleo, & aceto. Supra uerò dolentē partē oleū aliquod admoueris, quod uel leniēdi, uel molliēdi, uel maturandi (ut res exigit) uim habeat.

Hypothesis.

Ponamus igitur carnosam aliquam particulam telotum casam, tum contusam esse: huic sanè ita ex Hippocratis sententia medendum est, ut quàm celerrimè suppuret. Necesse enim est, carnes sic contusas, putrescere, & in pus uerti. Postquàm uerò sic per quandam putrescētiam in pus uersæ fuerint, liquari, & tandem nouam carnem nasci. Adde, quòd hæc curandi uia, & ratioe obseruata, minus (eodem Hipp. autore) phlegmone urgebitur caro ipsa sic cæsa, contusaq;. Duæ igitur intentiones in curando uulnere contuso, nobis proponuntur: nempe suppuratio, & nouæ carnis generatio. Porro cū suppuratio cum quadam fiat putrescentia, & omnia quæ putrescunt (Gal. autore) ex calido, & humido sic afficiantur, nimirum quæ calfaciant, humescentq;, hisce contusis uulneribus, atque adeò omnibus ijs affectibus, quibus moueri pus expedit, admouebimus. Cuiusmodi sunt, maluæ coctæ, radix alibæ, tetrapharmacum, panis triticeus, hordei farina ex aqua & oleo: itemq; panis ex aqua & oleo. Præterea fomentum multæ calidæ aquæ: hæc enim, & similia

Gemina intentio, in curando uulnere contuso proponitur.

Lib. 4. Ther.

similia omnia quæ sic calfaciunt & humectant, celerimè pus mouent. Horum autem materiam copiosam habes libro præced. de tumorib. præter natu. & in antidotario: item lib. 5. de simpl. Verùm enim uerò non fuerit alienum, hic unum, atque alterum compositum medicamentum subijcere, quod ad suppurationem in proposito uulnere benefaciat. *Ex Auic. sen. 3. quartii.*
 Re. radicis althææ, cummeris agrestis, singulorum unciam semis, origani agrestis, hyssopi, ana manipulum semis, florum chamæmeli, seminis lini, ana pugillum unum, ficus pingues sex, uuas passas pari numero: unà bulliant, ac tandem ijs pressis, ac diligenter tustis, adde galbani, myrrhæ, styracis liquidæ, cæsypii, ana drachmam unam semis, sanguinis draconis, adipis porci, ana unciam semis, componatur malagma. Conducit plurimùm ad eandem intentionem assequendam, & infra scripti medicamentum, in formam emplastri redactum. *Emplastrum.*
 Accipe foliorum maluarum, et uiolarum, ana manipulum unum, radicis althææ libram semis: decoquantur in iure carnium absque sale, postea subigantur in mortario, & cribro incernantur, ex cribratura cum prædicta decoctione, & farina hordei, ac tritici, ana quantum satis esse uidebitur: fiat emplastrum solidum, siue malagma, addendo butyri & olei communis singulorum uncias tres, uitellos duorum ouorum, & croci momentũ. Hoc autem, & præcedens malagma, super uulnus & contusam carnem, dandum est. In ipso uerò uulnere imponi debet digestiuum (ut uocant) ex terebinthina resina, & ouorum luteis. Cæterum perducto ad suppurationem uulnere, his, quæ pus mouent, relictis, ad purgantia, et detergentia transcundum erit, ut sunt, tincta in melle

Digestiuũ uuln
 ri imponẽdum.

Detergẽtia quã
 do admouenda.

in melle linamenta, mundificatiuum ex apio, & id ge-
 nus alia, quæ in antidotario descripta inuenies. In om-
 nibus autem eiusmodi uulneribus, rectè inditur turun-
 da melle rosaceo, aut unguento Apostolorum nunicu-
 pato, imbuta. *Supra uerò id purgans, detergēs ue me-*
dicamentum, stupæ aridæ dandæ sunt: adaptandæq; est
deligatura, quæ admotâ medicamenta probè retineat,
donec perfectè expurgatum uulnus fuerit. Tum de-
num autem purum ulcus est, (inquit Celsus) cùm ru-
bet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. Ac
quodcunque sensu caret, quod non naturaliter sentit,
quod nimium aut aridum, aut humidum est, quod aut
pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est, id
purum nō est. Purgato, ut decet, uulnere, carne ipsum
implere oportet, quæ secunda erat in curando hoc con-
tuso uulnere, intentio. Carnem igitur modo quo supra
diximus, generare oportet, & iam impletum ulcus ad
cicatricem perducere. Quem scopum facilè assequer-
is, si turundam in dies paulatim imminueris. Ita enim
solius naturæ opera, ac citra ullum medicamentum,
ulcus carne implebitur, & cicatrice obducetur. Quod
si caro multum esset dilacerata, & sutura utilis uide-
retur, consuatur laxa quadam sutura, labia retinente.
At si labra uulneris ab ambiente alterata fuerint, ac
dura, callosaq; appareant, scalpello illa (modò nulla
alia obstiterit dispositio) corium amouendo, renouare
oportebit, deinde consuere. Porro si cæsa contusaq;
caro enumeratis modò auxilijs, ad suppurationē per-
duci non possit, uideaturq; in gangrenam, ac partis
corruptelam degenerare, (quod ex tarda, difficiliq;
maturatione, & fusco, liuido, aut nigro loci affectu co-
lore,

lore,deprehendes)unguentum Aegyptiacum nomina-
tum, capite de curatione gangraene descriptum; aut
aliquod aliud simile medicamentum,quod ad eiusmodi
corruptionem & mortificationem sit idoneum, protie-
nus erit admoüendum. Quòd si alia quædam sympto-
mata, uel affectus, huic contuso uulnere superuene-
rint, ut dolor, phlegmone, aut quinis alius tumor
præter naturam; aduersus illa congruis (quæ suo lo-
co dicta sunt)remedijs erit pugnandum.

Si contusa caro
in gangranam
degeneret.

De ecchymosi, seu ecchymomate,id est, san-
guinis subtercutem effusione,& coitu:
quod unà cum contusione, ruptio-
neq; , cute integra manente,
hoc est, non uulnerata, in-
cidit. Cap. X.



ECCHYMOA, id est, sanguinis subtercu-
tem effusio & coitus, solutæ continuitatis
genus quoddam est, quod plurimum (ut lib.
4. meth. ait Gal.) unà cum cōtusione, ruptioneq; inci-
dit. Quocirca non fuerit à proposito alienum, si pro-
pter affinitatem, quam habet cum prædicto uulnere,
pauca nunc obiter de eo dicamus. Itaque incidit inter
dum hoc uitium, cum sola contusione, citra carnis mu-
sculosæ in profundo hærentis corpore, ruptionē, quod
Græci rhegma appellant: ut ex uiolento ictu, uel graui
casu. Aliquando uerò cum sola ruptione, absque etiam
cōtusione carnis (quod Græcis sarcothlasma & tblas-
ma dicitur) consililit: ut cum motu quopiam ualente, &
confertum facto, citra graue aliquod extrinsecus inci-
dens,

Ecchymosis
quid.

Ecchymoma à
quibus occasio-
nibus excitetur.

dens, caro disrumpitur. Nonnunquam etiam cum utroque, ut cum graui ac duro quopiam corpore, quod extrinsecus superinciderit, uel casu ab alto, non modò carnosæ musculorum partes, sine cutis diuortio contunduntur, sed etiam ex distentione uiolenta, et confer tim facta, abrumpuntur. Tunc enim uenis exiguis, in ea sic contusa ac rupta carne, diuortiū expertis, sanguis exilit, unde ipsum ecchymoma sub cute collectum nascitur. Cuius apparentes notæ sunt, tumor mollis, et tactui cedens, liuidus, et magna ex parte indolēs. Fit autem etiam aliquando ecchymosis, et ex oris uasorū apertione, quam anastomosis uocant: et ex ea, quæ à nonnullis diapedesis dicitur, id est, transcolatio, exilitio, uel transmissio, aut subsultus. Porro accidit anastomosis propter tum uasls imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius impetu ruat, copiam. Adhæc, ob acrem quāpiam, quæ illi extrinsecus incidat qualitatem. Diapedesis ex tūnica quidem ipsa ræfacta, sanguine uerò tenuato oritur. Accidere præterea interim potest, et ex gracilium uasorum ore adaperto. Verum de ea tantum ecchymosis nunc agitur, quæ contusionem, uel ruptionem consequitur. Hanc igitur ecchymosis propter solutam unitatem affatim factā, dolores, et ob sanguinis in profundo concursus, abscessus nonnunquam insequuntur, qui magna ex parte per halitum digeruntur. Species autem ecchymomatis sunt hypopia, quæ Romani suggillata uocant, et liuores ex iclu prouenientes, Græcis hyposphagmata nūcupata, quæ et interpeti Auicennæ uestigia percussionis, Latinis uerò propriè uibices, dicuntur. Ecchymoma quod cum magna ac uiolenta contusione incidit, periculo

Ecchymosis nota.

Anastomosis unde excutitur.

Lib. 5. Tber.

Diapedesis unde oritur.

Species ecchymomatis.

Iudicia de ecchymomate.

periculo non uacat. Solet enim frequenter (si negligatur) non modò afflictæ particulæ, sed & corporis totius corruptionem adferre. At si forsan in contusione, quæ cum ecchymosi consisist, cutis à carne seiuncta, maneat pendula, rarò uel nunquàm agglutinatur. Proinde satius est, eam præscindere, & exiccantia medicamenta admouere, uel absque deligatura, locum sic excoriatum relinquere. Aer nanque ambiens cutis ipsius instaurationem non mediocriter adiuuat.

10

Curatio ecchymomatis, quod uel contusio, uel ruptio excitauit.

Cæterum, quoniam ecchymosis seu ecchymoma, plurimum (ut Galenus ait) unà cum contusione, ruptioneq; incidit, idcirco in ipso curando, plures erunt indicationes obseruandæ. Semper enim pro affectuum numero, etiam medendi indicationes respondēt. Prima indicatio est, fluentem ad locum affectum materiam uacuare, & auertere. Quod optimè quidē

Lib. 4. meth.

- 20 fit, autore Auicenna, uenæ sectione, quam omnes etiā artis periti, in hoc affectu imperant, quamuis corpus mundum, hoc est, purum ab excrementis, fuerit. Secunda intentio est, dolorem sedare, & parti læsæ, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis & stypticis eam persundendo, atque illinendo. Vnde Razes, & Lanfrancus partem eo uitio laborantem, inungebant rosaceo, & post unclionem, puluere myrtillorū respergebant, ac mediocri deligatura stringebant. Verum enimuero in communi usu obseruatum est, ut per
30 initia oui candidum rosaceo permixtum, loco dolenti ac sic affecto, admoueat. Tertia, curationis cōsiliū eò dirigere

Prima indicatio in curāda ecchymosi, obseruanda.

Secūda intentio.

Tertia intentio.

eò dirigere debemus, ut sanguinem ipsum totum, qui
 subter cutem effusus est, dissipemus ac resoluamus, idq;
 confestim, priusquam nigruerit, & in grumos iam co=
 ierit. Quod factu quidem haud difficile erit, si & san=
 guis effusus tenuis, & prope summam cutem: non au=
 tem in profundo situs fuerit. Quòd si discuti nò pos=
 sit, tum infrà scriptis digerentibus medicamentis, tum
 scarificationibus educendus erit, & si nihil hæc promo=
 uerint, affectus eiusmodi more abscessuum curandus
 erit. Itaque sanguinis sic per contusionem, ruptioneq;, 10
 subter cutē dispersi, dissipatio, & uacuatio, ecchymoma=
 matis, quā ecchymoma est, propria est curatio, ut li=
 bro quarto methodi medendi ijs uerbis Galenus testa=
 tus est: Sanè (inquit) ecchymosis omnis uacuationem
 pro remedio curationis indicat. Quare calfacientibus
 huic, & modicè siccantibus medicamentis est opus, qua
 le est ex nigris populis acopon. Quippe quæ uehemen
 ter siccant, digerunt illa quidem in principio euiden
 tius, quàm quæ sunt imbecillia: ceterum nonnihil ip=
 sus utij scirrhum, difficileq; curatu relinquunt. Cu=
 randum uerò est, ut ruptis, quæ in profundo hærent
 corpore, hæc tunc uires habeant magis intentæ, tum
 ipsa magis acris, magisq; dissipantia sint: tum (ut se=
 mel dicam) tantò efficaciora, quantò magis à cute ad
 profunda ecchymosis recessit. In talibus sanè nec cu
 curbitæ usus sit inutilis: id enim instrumentum, ad uio
 lentum attractum, à medicis est excogitatum. Verum
 enim uerò, quoniam tunica uenulari, ex quibus san
 guis exiliit, contuse sunt, per initia sanè (ut Galeno, &
 Paulo uisum est) nonnihil ex adstringentibus, ijs quæ 30
 digerunt, admiscere oportet. Cōtuse enim illæ uenula=
 rum

Propria ecchy
 moma cur. ti.

Oem ecchyma
 sin, uacuationē
 indicare.

Cucurbitula
 usus, in quibus
 ecchymomatis
 utilia.

Ecchymomatis
 per initia, non
 nihil adstringen
 tium discutien
 tium admiscenda.

- rum tunicae aliquam densationem requirunt, ut ad naturalem suum statum reducantur, & ne noua materia ob dolorem attracta, ad locum contusum delabatur. Quandoquidem si solam digerentem uim haberet medicamentum in principio applicatum, non modò id quod effusum est digereret. sed & per contusionem aliquid sanguinis, qui contusis uenulis continetur, extraheret, ut testis est Gal. lib. 5. de compositis medic. secundum locos. Quando autem in naturalem statum uenulae redierint, citra adstrictionem ad sola digerentia, medicamenta uenire tempestiuum est. Porro in quibus sic modicè adstringentium quiddam, nec non per halitum digerentium miscere conuenit, perspicuum est, imbecilliora primum debere assumi: ualidiora autem inueteratis & ijs quae nigrescunt, amoueri. Ad inueterata igitur ecchymomata, Paulo etiam autore, radicula illitu prodest: quippe discutit ea, ubi erodere inciperit: uel ipsius radiculae succus, cum micis panis indutus. Ceterum ex moderatè digerentibus, quae uulgò resolutiua domestica uocant, haec sequentia sex auxilia in communem usum ueniunt. Primum constat uiuo, melle, & sale. Secundum ex farina hordei, calaminthe, & uiuo conficitur. Tertium recipit ceram, & cuminum. Quartum fit ex floribus chamemeli, meliloto, stoechade, & cumino, omnibus in uiuo decoctis. Quintum, ex maluis, surfure, absinthio, cumino, aut anetho, aqua, uel uiuo incoctis. Sextum fit ex farina hordei, & foenigræci, croco, & momento auripigmenti, omnibus quidem aqua calaminthæ incoctis. Solent & potiones quaedam institui, quae si assumantur, sanguinem coëcretum, & extra uasa effusum (uulgò mortuum

Alini et erata
ecchymomata.

Lib. 4.

Potiones quae
in ecchymosi à
recentioribus
propinantur.

Si totum ecchy-
moma per hali-
tum digestū sit.

Cuius que rupta
fuerit, subinde
dolorē renouet.

tuum uocant) dissipare ac resolvere creduntur: cuius generis est ea, quæ constat bdellio, costlo, centauro, et syropo acetoso: atque huic aliæ quædam consimiles, quæ in casu ab alto, offensione, & uiolento membrorum tractu ac distensione, offerri consueuerunt. Cum autem totum ecchymoma digestum per halitum est, siccare iam uehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, omniâq; in summa facere, quæ ut ulcus coalescat, efficiant. Ergo si euocatum ce- leriter totum ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spacio, sordes multa subna- scens, medium inter ulceris labra spacium occupabit, ita ut iam coire ruptio nō possit. Atque inde adeo fit, ut qualibet leui de causa, nos hæc sui admoneant: nam siue quis obrigit, siue parum concoxit, siue febris labo- rauit, siue se uehementius fatigauit, eiusmodi illico par- ticulis dolet. Non enim (ut modò dictum est) in idem coire ruptionis labra, sed tantum propè sunt admo- ta. Quo fit, ut leui momento ea facile separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore replea- tur. Et quid quæso aliud, quàm assidue nouum ecchy- moma creatur, & primo illi (cum uidelicet primum ca- ro est rupta) persimile: nisi quòd ex tenui magis sanie nunc constat, cum in principio è sanguine ecchymoma esset. Ideoq; facilius etiam nunc, quàm prius, seu per initia, digeritur. Cæterum quomodo curari debeant sugillata, liuores aliâq; id genus accidentia, quæ contu- siones, graues casus, et offensiones consequuntur, aliquâ do forsan alibi dicitur. Hactenus de uulneribus, quæ in carne maximè per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicamus, quæ morsu fiunt.

De uulnere ex morfu uel ictu animalium,
tum uenenatorum, tum aliorum non
ita noxiorum, illato, & præsertim
de morfu canis rabiosi.

Cap. XI.



DE VVLNERIBVS, quæ ex morfu
punctu'ue animalis inferuntur, & præser-
tim canis rabiosi, aut alicuius uenenatæ fe-
1 ora, uel bestię, quidam memoriæ pauca tradiderunt.
Quippe quæ non adeò frequenter accidunt, & si ali-
quando inciderint, soleant rustici ac plebei homines,
neglectis chirurgis ac medicis, medicamentum præsens
adhuc ipsa conficere, ex allijs, cepis, & oleo, quod ca-
taplasmatis modo uulneri imponunt. Adde, quod ex-
quisitè de ijs tractare, magis ad medicum (quem phy-
sicum appellant) quàm chirurgicum, nisi quod ad uul-
nus spectat, pertinet. Itaque qui absolutam eorum co-
gnitionem habere desiderat, ex Arabicæ familiæ scri-
2 ptoribus, Auicennam, Razem, & Rabi Moysen: & ex
recentioribus Barbaris, Henricum legat, oportet, qui
de omnibus ferè uenenis suscipiè tractauerunt. Sed
multò his doctius atque accuratius, de eiusmodi morfi-
bus & ictibus uenenatorum animalium, scripserunt,
Aëtius Antiochenus, Paulus Aegineta, Cornelius Celsus,
Actuarius, Oribasius, & ante hos omnes adhuc
Dioscorides. Quos omnes, si uelis, hac in re poteris cõ-
sulere, aut unum saltem ex illis, quem placebit, delige-
re. Tantùm enim hoc loco uniuersalem, uulnerum ex
3 morfu punctu'ue illatorum, curationem referemus, at-
que eam duntaxat adhuc, quam maximè chirurgia mo-

Qui præsertim
autores, tum re-
centes, tum uete-
res, de uenena-
tis uulneribus
scripserunt.

Morsus, ac pun-
ctus animalium
duplices.
1. uirulenti.

Morsus nō ue-
nenati.

Morsus omnis
quoddam uirus
habet.

In quibus cōspi-
rent, & inuicem
disideant uiru-
lenti morsus, et
nō uenenati.

litur. Itaque morsus animalium punctus ue, duplici cō-
stant differentia: alij enim sunt uenenati, alij uerò mi-
nimæ. Venenati dicuntur, qui à uirulentis bestiis infe-
runtur: cuiusmodi sunt, rabiosus canis, serpentes, pere-
grinæ ægues, scorpio, basiliscus, draco, uipera, coluber,
mus araneus, phalangium, aspidis, & id genus aliæ ui-
rus etaculantes feræ. Contrà uerò non uenenati mor-
sus dicuntur, qui ab animantibus non ita uirulentis im-
primuntur, infiguntur ue: cuiusmodi sunt, canes dome-
stici, simia, homo, equus, sues tam domesticæ quàm syl-
uestres, felis in domibus oberrans (quem nominant elu-
rum) & similia. Actum quoque hominum corpora lædūt,
uespæ, apes, muscæ, culices, pulices, & cimices. Sed qui
à uespis, & apibus punctus infiguntur, plus noxæ ac
doloris inferunt, interdumq; chirurgi operam deside-
rant. Omnis autem ferè morsus (si Cornelio Celso cre-
dimus) habet quoddam uirus. Paulus non addubitat ip-
sius etiam hominis morsus, cum uirulentis bestiis con-
scribere. Siquidem (inquit) maligniores multò, cæteris
alijs ulceribus apparent, præsertim si qui morsum in-
tulit, ieiunus fuerit, anteaq; legumina pro cibo sumpse-
rit, atque imprumis lenticulam. Ea propter, quæcūque
communiter in alijs uirulentis morsibus, uel ictibus,
commemorantur ac prosunt, eadem quoque in his mor-
sibus extrinsecus per initia adhibere conueniet, exce-
ptis nimium acerbis & causticis, id est, adurentibus.
Cæterum morsus ipsi ac punctus, tam uenenatorum
& letbaliū, quàm non uirulentorum, in quibusdam,
quod ad rationem curandi attinet, conspirant, & in
quibusdam euariant. Conueniunt quidem in eo, quod
neque desiccantia, neque repellentia, neque cicatricem
inducuntia

- inducientia (quorum natura adstrictoria est, & desiccatoria) desiderant: quin potius attrahentia, dilatantia, relaxantia, atque emollientia statim ab initio expostulant. Tam hi etiam, quàm illi, sedulò repurgari appetunt: ac demùm postquàm ulcera probè fuerint repurgata, cicatrice obduci. In hoc autem differunt, quòd morsui non uenenato abundè satisfaciunt, domestica (ut uocant) attrahentia, & maturantia: cuius generis sunt, cepæ, & allia, tam aggressiua quàm satiuua, cocta, 1 o trita, & cum fermento, oleo, & sale mixta. Si uerò uulnus morsu aut ictu uirulentum aliquod animans homini intulit, quæ uehementer etiàm trahunt, ne uirus interna subeat, & ad cor serpat, (cuius destructionem ex suapte natura semper appetit) statim erunt admodum uenda, ut cucurbitula, loco priùs scalpello inciso, et emplastra quedam ualidè uirus extrahentia, quæ statim subiungemus. Deindè candenti ferro (si patitur locus) uulnus adurendum est, aut caustico saltem à aliquo medicamento, ac uehementer exedente utendum. Eiusmodi enim uulnera omnia lethalia sunt, & præsentem sæpe perniciem (si protinus non succurritur) adferunt. Proinde & extrema illis (iuxta Hippocratis consiliū) adhibenda sunt remedia. Adeoq; ut membrum, quod sic à lethali ac uirulenta fera, uel morsum, uel ictum est, interdum præcidere, seu amputare cōueniat. Quæ admodum Galenus memoriæ pròdidit, uinitorem quendam à uipera morsum, ubi feram agnosceret, cōfestum lesam digitum falce abscidisse, atque in totum sic periculo liberatum. Porro uenenatos morsus, aut ictus, 3 o punctus uel, ijs sequentibus notis deprehendes: Vulnus infixum ualidè dolet, punctiōis & mordicationis sensus

Venenum semper cor petit.

Vinitor morsus à uipera sibi digitū amputauit.

Morsus, ac punctum uenenatorum notæ.

sus uehemens, in afflicta parte per sentitur. Vulneris,
 atque affecti loci color perit ac mutatur: aut enim ru-
 bet, atque inflammatur: aut liuet, uel nigricat. Labo-
 rans grauibus angitur molestijs, ac totus ardet: cor-
 pus totum eius ipsius qui uel demorsus, uel ictus est,
 ita nonnunquam obstupefcit, ac talem (ut sic dicam)
 obdormitionem sentit, ut tangentem non sentiat. Ve-
 rum nihil fere in ijs perpetuum est. Neque enim dolor
 semper adest uehemens, aut atrociter molestant in om-
 nibus eiusmodi ferarum, ac bestiarum uenenosarum icti-
 bus, aut morfibus: sed in quibusdam satis remissus est,
 ut in morsu canis rabiosi. Nec enim protinus infestum
 quicquam, ubi momorderit (ut inquit Dioscorides) in-
 fligit, nisi ut uulnus dolorem; hoc est, statim quidem,
 ubi morfu excandescens rabie canis, in partem ali-
 quam uulnus intulit, nibilo plus doloris aut mole-
 stie ab initio adferre uidetur, quam non rabiosus. Sed
 & qui a scorpionis ictu dolor accidit, modò decrefcit,
 modò intèditur: ac nunc feruor, nunc frigus, tum per-
 cussum locum; tum corpus totum uicissim inuadit, ut
 Paulus annotauit. Et ut breuiter dicam, sua cuiusque
 animantis morfibus & ictibus propria, ac peculiaria
 signa sunt, ut uidere est apud Dioscoridem, Paulum,
 Aëtium, Cornel. Celsum, & alios, qui de uenenatis bi-
 sce bestiis fusius, atque accuratius scripserunt. Cete-
 rum alijs uenenatis bestiis (quòd apud nos rarissime
 sint) prætermisfis, operæ precium non abs re duximus,
 si unius rabiosi canis particulatim meminerimus. Si-
 quidem hoc animal & fecundum prouentu, id est, fre-
 quens, et contuberniale homini, ac domesticum esse con-
 suevit. Adde, quòd & rabie sæpius corripitur, ac pe-
 rit, ab

Morsus canis ra-
 biosi y initia ni-
 bil molestia ad-
 fert, præterquàm
 ex uulnere do-
 lorem.

Scorpions ictus,
 quæ symptoma-
 ta inuebat.

Canis sæpius ra-
 bie corripitur.

rit, ab eoq; difficile cauēri possit: Inde periculum in-
 euitabile hominem manet, nisi multis, & conuenientia-
 bus usus fuerit praesidijs. Plerumque autem flagrantis-
 simis aestibus canis in rabiem efferatur. Interdum etiā
 per frigora maxima, ut Lycus memoriae mandauit.

Iam uerò rabiosus, potum, & escam auersatur, siti pre-
 mitur, neque tamen bibit: anhelat praeterea non parū,
 idq; exerta lingua: aures inclinat, largā, spumantemq;
 pituitam naribus, & ore proijcit: mutus in totum est,

Canes quibus no-
 tis, suam rabiem
 testentur, et pro-
 dant.

10 & ueluti insanus, ut ne domesticos quidem agnoscat:
 toruē, & solito tristius intuetur, in omnes, passim sine
 latratu irruit, & nullo discrimine beluas, & homines,
 notos iuxta ignotosq; morsu adoritur. Vbi autem mo-
 morderit, statim quidem nihil molestiae, (ut prius dixi-
 mus) adfert, praeterquam ex uulnere dolorem. Exinde
 autem (nempe temporis progressu) morbus ille, qui ab
 aquae metu, hydrophobia Graeca est uoce appellatus,
 exoritur. Discriminum sane (inquit Celsus) genus mor-
 bi, in quo simul aeger, & siti, & aquae metu cruciatur:

Hydrophobia.

20 quo oppressis in angusto spes est. Porro magna ex
 parte circa quadragesimum ferē à morsu diem, solet
 hic morbus hydrophobicus ingruere: quibusdam &
 post sex menses: alijs proditum etiam est, post septem
 obuuisse. Sunt & qui post annum unū, uel etiam duos
 interdum, à morsu impresso, morbum hunc contrahi te-
 stentur. Narrant & aliquos post septennium hoc aquae
 metu fuisse tētatos. Quò fit, ut qui à cane rabido mor-
 si sunt, non ualde tuti mihi esse uideantur. Non enim
 statò, definitoq; tēpore post morsum, aquae pavor ex-
 oritur. Itaque quoniam non confestim à morsu huius-
 modi aquae metus, homines inuadit, quidam decepti,

Horrorē aut me-
 tum aquae, nullū
 praescriptū con-
 stitutumq; tem-
 pus habere.

*Rabiosi canis
morsus pbatio,
ex Oribasio.*

canem qui momorderat, non fuisse rabie percitū, arbitriati sunt, & proinde uulneri cicatricē inducere properarunt. Atque hoc pacto ipsimet huius mali auctores, sibi perniciem attulerunt, dum scilicet huic affectioni causam dederunt. Hac autem usus probatione atque experientia, facili deprehendes, rabiosus sit canis, nec ne, qui momordit: luglandibus nucibus concisis, & accuratè tritis, uulnus diligenter obstruitur, & postea circumligatur, sequenti die ablatae, gallinaceo, aut gallinae in cibo apponentur, ac primum sanè non attingent: fame autem urgente, si eas uorauerint, rem, attentius considerato. Nam canis qui momordit, si non fuerit rabiosus, sospites ac supersites aues, quae nucas, illas comederint, permanebunt: sin contra rabie correptus fuerit, postera die peribunt: atque tunc ad uulneris dilatationem properandum erit. Iterumq; post paucos dies eadem experientia utendum: et si non perierint gallinacei, tunc uulnus ad cicatricem perduces, nullum iam ueritus periculum. Huiusmodi indicationis seu experimenti, auctor quondā fuisse putatur Oribasius, ut refert Paulus. Caterum hydrophobiam, id est, aquae metum, Graecorum aliqui ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi in contrarium habitum, mutata penitus humida eorum substantia: ueruntamen Ruffus antiquae medicinae grauis auctor, insaniae ex atra bile speciem, eam esse testatus est, magna scilicet ueneni eius cum humore illo similitudine. Itaque non secus quàm reliquos melancholicos, & atra bile insanientes, scimus alios alia timere: idq; etiam sentire uidentur, qui dicunt, canis ipsius qui momorderit imaginem, in aquis opinari eos se uidere, eoq; metu terri-

*Hydrophobia
unde.*

- tos aquam fugere, & auersari. At ex ijs qui hoc uitio sunt occupati, nullū (inquit Paulus) praterquā unū, aut alterum seruatum fuisse ex historia didicimus. Eosq; non à rabioso cane morsos, sed ab homine quodam morso rabienteq;, & aquam iam timente, uitium adeptos. Siquidem Eudemus (ut refert Dioscorides) superasse, ac superuixisse quendam affirmat. Et Themisonem (inquit) aliqui demorsum in idem uitium incidisse, & euasisse fatentur. Molestissimū itaque, & dum iam occupauit, insanabile est hoc morbi genus. Ante tamen huius occupationē, multi etiam quos canis mordit, seruati sunt. Euenit autem hic morbus hydrophobicus, cum neruorum distentione, uel conuulsione, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam, suiq; fastidio, & domesticorū ignorantia. Aliqui auræ splendorē, & aquam fugiunt, & dum uident, & dum admouentur. Nonnulli etiam omnem humorem auersantur, & horrent: alij sine ulla doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam, qui canum more latratus edant, & obuuium quemque dentibus impetunt, morsuq; suo alios simili uitio labefaciunt. Miserimum sanē (ut iam diximus) & molestissimū morbi genus. Ceterū unicum eo oppressis remedium esse, scribit Corne. Celsus lib. 5. suæ medicinæ: nempe non opinantem in piscinam non antè ei prouisam proijcere. Et si natandi scientiam non habet, modò mersum bibere pati, modò attollere. Si habet, interdum depri- mere, ut inuitus quoque aqua satiatur. Sic enim (inquit) simul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida uexatum, neruorum distentio absumat. Id ne incidat,

Pauci ex ijs qui
aque metu labo-
rant, seruantur.

Dioscorides.

Themison ab hy-
drophobia libe-
ratus,

Hydrophobie
nota.

Corn. Cel. reme-
diū contra aque
metum.

incidat, à piscina protinus in oleum calidum dimittendus est. Sed iam tempestiuum est, communem uirulentorum omnium uulnerum (ut sumus polliciti) curationem aggrediamur.

Communis, aduersus omnes morsus, & ictus
uirulentos, curatio.

Virulentorum omnium animantium morsus, aut ictus, non nimium distantem curationem desiderant, quamuis in ea multum antiqui uariarunt, ut in singula genera bestiarum, siue animantium; singula medendi genera præciperent, atque alij alia. Sed in omnibus eadem ualde multa, maxime proficiunt. Itaque quæ ad hanc communem medendi rationem attinent, primùm exponemus: deinde cursim perstringemus; quæ ad peculiarem, priuatamq; eorum curationem pertinent, quos rabiosi canes (quòd frequentiores apud nos sint, quàm aliæ uirulente bestię) momorderint. Igitur, in omni morso, uel ictu animalis, quod uenenũ uibrat, gemina est Gal. lib. 13. meth. med. curandi indicatio: nempe uirulenti ipsius liquoris uacuatio, & eius quod dolorem creat, alteratio. Sanè (inquit) uirus eiaculatũ, uacuant, tum excelsatoria medicamenta omnia, tum, quæ citra calefactionem uebementer trahunt: ueluti & cucurbitule, & cornua quædam, quibus nonnulli cucurbitularum uice utuntur. Sunt autem & qui ore suo, uirus extrahunt, agrè uidelicet particule admoti, ipsumq; uulnus labijs complexi. Huc sanè pertinet & cauterium, & medicamenta, quæ cauterijs similiter, escharam efficiunt. Atque hæc omnia totam eius quod infestat, substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorũ genus

Geminã esse curandi rationem, in omni morso, aut ictu ueneno-

Virus in corpus morso, uel ictu eiaculatũ, quibus auxilij, uacuet.

- 1^o genus est eorum, quæ qualitatem per cōtrariam qua-
 2^o litatem alterant. Scilicet exhibentibus nobis, si uebe-
 3^o mentem calorem æger, uel in ipso demorso loco, uel in
 4^o toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia: sin frigus
 5^o sentiat, calfacientia. Hæc lenus Galenus. Eius autem
 compendiosam dictionem, & uniuersalem methodum
 sic interpretamur: Inter ea, quæ uirus è profundo euo-
 cant, primò medicamenta enumerat, quæ calfaciendi
 facultate prædita sunt: deindè cucurbitulas, et cornua:
 1^o postea uerò oris suctionem: & postremò uisionem, quæ
 uel ferro, uel medicamentis fiat. Itaque de his singu-
 latim nobis dicendum est, quò res per uia magis cuiq;
 euadat, ac modus usus eorum neminem lateat. Id unū
 autem imprimis omnes scire uolo, ea quæ modò ex
 Gal. retulimus auxilia, & id genus alia, quæ mox sub-
 iungemus, si primis diebus prætermissa fuerint, fru-
 strà postmodum adhiberi. Non enim uirulentam illam
 materiã, quæ iam ad intima, neglecta curatione, per-
 transiit, satis euocare possent. Quare nulla utiq; adie-
 2^o ctionis eorum foret utilitas, sed incassum corpora do-
 loribus sternerentur. Inter ergo principia morsus, aut
 ictus illati, hæc, & similia adferenda erunt. Sed &
 priusquàm hæc, quæ sic uenenum extrahunt atque eli-
 ciunt, admoueantur, supra uulnus membrum id, quòd
 uel demorsum, uel ictum est, deligandum erit, nò tamē
 nimium uehementer, ne torpeat. Hac enim deligatura
 impediēs, ne tam subitò uirus interna subeat. Itaque si
 leuior morsus aut ictus est, oris suffio apprimè conue-
 nit. Homo igitur aliquis statim adhibendus est, qui uul-
 3^o nus exugat. Sugentem uerò oportet ieiunum non esse,
 sed & cibum sumpsisse, & uino os colluisse, postea
 exiguum

Alteratio eius,
quod dolorem
creat.

Aduertere.

Membrū demor-
sum supra uul-
nus deligandū.

Oris suffio.

Venena non gustu, sed in uulnere nocent.

exiguum olei in ore cōtinens, ictum exugat, & expuat uenenum. Cauere etiam oportet, ne qui uulnus sic exulceratus est, internam aliquam oris partem exulceratam habeat. Siquidem uenena (ut suprā ex Celso retulimus) non gustu, sed in uulnere nocent. Sed & locus ipse priusquā exugatur, spongia in poscam calidam immersa, fouendus, ac proluendus erit. Alij uulnus abluendum aqua censent, in qua decoctum sit chamæmelum, & syluestris lapathi radix. Sunt qui gallinarum, aut aliarum quarundam auium podicem uulnere 10
ri admouent, ad uirus exugendum. Quod si quæ applicatæ fuerint uolucres, moriantur, uenenum extractum esse suspicantur: post hæc uerò cinis aceto subactus, pro cataplasmate imponatur. Maximè autem ad hanc rem conducit, cinis sarmētaceus, id est, ex lignis uitis: uel ficulneus, aut laurinus. Qui si non adsit, eo qui haberi potest, utendum est, diligentia (inquit Aëtius) ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Sal quoq; 20
his uulneribus, præcipueq; ei (si Celso credimus) quod canis fecit, medicamentū est, si manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur: exsaniat enim: ac salsamētum quoque rectè super id uulnus deligatur. Porro in omni morsu tam uenenato, quā nō

Sal morsus canis rabidi optimum medicamentum,

Unguentū Dini.

uenenato, Dini hoc unguento utebatur. R. ceræ, picis nigre, axungie ueruecinæ, olei antiqui, ana quart. unum, galbani unciam unam: fiat unguentum. Morsibus uerò, aut ictibus uenenatis magnis, ac uehemētioribus commodè illinuntur cepæ cum sale, & ruta, sinapi quoque, & stercora. Item iuglandes nuces cum 30
allio, sale, & melle. Emplastra quoque, et cataplasma-

Auxilia aduersus magnos, & uehemētes morsus, & ictus uenenatos.

ta ex dictamno, & alijs medicamentis calfactorijs, quæ uehementem trabendi uim habent, apparatus. Plurima enim ex ijs non modò uirus ipsum potenter eliciunt; sed & uulneris oras (præsertim in rabidi canis morsu) latius, ac hiantes seruant. Neque enim permittendum
 1. ut hæ citò coëant, aut committantur. Præter opinio-
 2. nem autem facit Aëtio, ex uiperis theriace Androma-
 3. chi, emplastri modo imposita, & compositum hoc se-
 4. quens medicamentum: quod recipit spumæ argenti;
 5. cerusæ, resinæ pinus, singulorum libram unam, olei ue-
 6. teris libras tres, ceræ uncias septem, ammoniaci thy-
 7. miamatis trientē, id est, uncias quatuor, galbani etiam
 8. trientem: cerusam, argenti spumam, & oleum coquito,
 9. donec non inquinent manus, deinde liquefacta adijci-
 10. to, unito, & utitor reposito ad omnem morsum, & ad
 11. abscessus, & tubercula mammillarum, panos, sinus, fi-
 12. stulas, parotidas: ad miraculum enim (inquit) discutit
 13. ipsas. Utitor & ad carbunculos. Arcet uehementē in-
 14. flammationem, & rarò citra magnam cōmoditatem;
 15. & efficaciam adhibetur. Porro in magnis quoque ac
 16. uehementioribus, tum ictibus tum morfibz, potens est
 17. hoc subsequens emplastrū, quod acrioris est potentie:
 18. galbani, sagapeni, opopanax, assæ foetidae, myr-
 19. rhæ, piperis, sulphuris, singulorum semunciam, stercor-
 20. is columbini, & anatis, ana uncias duas, calaminthæ,
 21. mentastri, ana unciam unam: dissoluantur gummi ex
 22. uino, & in unum misceantur omnia cum melle, & oleo
 23. antiquo, & fiat emplastrum. Pleraque alia tum ex ue-
 24. teribus, tum ex recentioribus adduci possent, quæ uel
 25. cōmorsam, uel ictam partem uehementer calfacere &
 26. uellicare possunt: proinde & uenenum euocare. Ve-
 27. rùm

Aëtius.

Guid. empla.
acrioris po-
tentie.

rum quoniā iterū de hac re dicemus libro sexto, hæc abundē ad præsens sufficere putamus. Interim tamen monemus cum Erasistrato, ut incognita, peregrina, & inusitata uidentur: cuiusmodi sunt fel elephanti, oua crocodili, & consimilia, quæ difficilē, sine regia facultate peruestigari possunt. Adde, quod neque frequēti obseruatione (ut Dioscorides ait) hæc sufficiens experimentum præstiterunt, quo nostra fides ijs obstrin-
gatur. Iam uerō tempestiuum est, ut de cucurbitulis, et cauterijs dicamus: utrisque enim etiam uirus ē profun-
do euocamus. Ergo si uehementior morsus est, cucurbitulæ cum largiori flamma ad uulnus adfigito. Sed antē circumstantia loca altioribus ulcusculis (si id membrum patitur) scarificato, quo plus uitiatū tā sanguinis extrahatur, & ut sanguinis illius corrupti uacuatio obsistat, ne uenenum membratim insinuetur. Attrahetur enim pluribus quasi canalibus, & foras euocabitur, unā cum sanguine, & spiritu, ipsius uirulentæ bestię uenenum. Si cucurbitula non est, quod tamen uix incidere potest, tum quodlibet simile uas, quod idem
possit, ut caliculus, uel pultarius (ut inquit Celsus) oris compressioris. Optimē autem auxiliantur, si statim in principio post amotas cucurbitulas, super uulnus imponantur, & conuoluantur animalia parua discerpta, hoc est, per medium diuisa, intus adhuc calentia, ueluti sunt gallinaceus pullus, sed max præsertim, hædus, agnus, & porcellus. Sic uerō calida eorum caro statim percusso loco imponenda est, ut pars interior corpori iungatur: uenenum enim exugunt, & dolores leniunt. Ferē autem inter cætera animantia magis placent, gallinarum pulli, quippe qui calidiore natura præditi sint,

Cucurbitula.

Animalia parua
discerpta, et ui-
rulento morſui
admota.Gallinarum
pulli.

sint, argumento, quòd deuoratum insigne uirus eliquet,
 & aridissima quæque semina consumant. Item nonnū.
 quā harenas, lapillosq; quos faucibus insinuarint, dis-
 soluunt. Itaque animantis calore, spiritus istæ partis
 impetum capessens, uenenum exigit. Porro à maiori-
 bus canis rabiosi morsibus, abscedentes carnes, hinc
 auferre, & labia acie scalpelli circumscribere; ac pre-
 hensam hamo carnem amputare oportet: si modò tamē
 locus neque neruosus, neque musculosus est. Hæc itaque

*Abscedētes car-
nes amputāda.*

1. *o* carnis circinatio, seu circumscriptio, & sectio, scarifica-
 tione longè potentiùs opitulantur. Quòd si locus car-
 nis circumscriptionem, & sectionem non admittat, cu-
 curbitule (uti diximus) cum largiori flamma adfigen-
 de sunt. Nec uerò maiora hæc uulnera in demorsis à
 rabioso animante, ita uereri oportet, uti minora & ul-
 cusculis cutis similia: maiori nanque uulnere copiosus
 sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris ex-
 haurire: quod in minoribus non accidit. At uerò &
 ustio, contra ipsos uirulentos morsus, aut ictus, cum lo-

*Maiora uulnera
in demorsi à ra-
bioſo cane, mi-
nus uerenda, q̃
minora.*

2. *o* cus neruosus non est, & tutò inuri potest, expeditissi-
 mum censetur auxilium, utpotè cum ignis cætera uiri-
 bus præstet: simul quòd uirus domet, ipsiusq; uires he-
 betet, & penitus ferri, hoc est, ad intima illabi, non pa-
 tiatur: simul quòd pars ignem experta, deinceps non
 uilem, nec indecoram loci inflaurationem efficiat, ma-
 nente diutius exulceratione. Si uerò uri non potest,
 Cornelio Celso autore, sanguinem homini mitti, nō alie-
 nū est: tū uslo quidē uulnere superimponenda, quæ cæ-
 teris ustis sunt. Ei uerò cōmoda, quod expertum ignē

*Ustio expedi-
tissimum est au-
xilium.*

3. *o* non est, ea medicamenta, quæ uehementer exedunt, &
 si laborans patitur, quæ adurunt, & crustas ulceribus
 inducunt.

*Sanguinis
usu.*

*Ulcerationes ex
morfu uirulen-
to in longū tem-
pus prorogan-
das esse.*

inducunt. Cæterum animaduertendū, ex eo tēpore, cū
cruxta (seu igne, seu adurentibus medicamentis inductæ
fuerint) decident, ne ulceris ora coalescant, & cicatri-
ce obducantur. Sed si fieri potest, ad longum præfinitum
tempus ulcerationes, & sordidas adhuc, & inflam-
mationem minantes, prorogari conuenit, quò uirosa
materies semper effluat: non autem intus contineatur,
& ad intima se insinuet. Id autem optimè præstabit, in-
ditum ijs (ulcerationibus inquam) salsamentum, & syl-
uestre allium detritum: item cepæ, & id genus alia. Si
uerò (quod persæpe accidit) ante dies præfinitos, cica-
trices coirent, committerenturq; manum postulabūt.
Nanque eas diducere, carnemq; scalpello circinare,
aut iterum inurere expediet. Vbi uerò propositum tē-
pus præterijt, ulcus ad cicatricem perducendum erit.

*Membrum demor-
si, aut icli, ampu-
tatio.*

Quandoque etiam (ut supra diximus) haud importu-
num fuerit, partem iclam, si commodè sectionem non
respuat, ut sunt extrema, amputare, præsertim si fera
quæ momordit, aut iclu uulnus impressit, letalis sit, et
ineuitabile periculum adferat, cuiusmodi sunt serpētes
omnes, ut aspis, cerasles, uipera, & consimiles.

De uulnere cum profusione sanguinis, ex
uenis, & arterijs. Cap. XII.



*Gal. lib. 5. me-
todi med.*

POSTEA QUAM de uulneribus, quæ car-
nosæ partibus incidunt, abunde satis deter-
minatū est, nunc tempestiuum uidetur, Ga-
leni doctrinam atque institutum sequentes, de ijs uul-
neribus dicamns, quæ in arterijs & uenis fiunt. Ergo
si cui arteria uenæ ue magna uulnerata est, & copio-
sum

1. sum sanguinis profluuium continuò superuenit, & glutinari id uulnus difficile quidē etiam in uena est, in arteria uerò non solum difficile, sed etiam quod fieri (si cut nonnullis medicorum est uisum) omninò fortasse non possit. Dicendum ergo de utrisque est, uulnere inquam in arteria aut uena accepto, & hæmorrhagia, ac prius quidem de sanguinis profluuiio, quippe quod magis urgeat: secundo uerò loco de ipsius uulneris agglutinatione ac curatione. Sanè profluit ex uena uel
1. arteria sanguis, aut tunica earum diuisa, aut resecata earum ore, (Græci ἀνατόμῳσι uocant) aut (ut si quis dicat) transcolatus, siue transmissus, ut in diapedesi. Verum quoniam in duabus posterioribus causis solent magis medici, quos phisicos appellant, accersiri, hic duntaxat agemus de sanguinis effusione, quæ ex prima causa ortum habet, & uulnera consequitur: hæc namq; ad chirurgum magis uidetur pertinere. Cæterum sanguis profunditur interdum ex arteria, interdum ex uena: atque ex earum quidem aliquando una duntaxat, nonnunquā uerò ex pluribus, iisdemq; uel maioribus, uel minoribus. Sed et sanguinis eruptio accidit ex eo interdum uulnere, quod cum amissione fit substantiæ: aliquando uerò ex eo, in quo nihil substantiæ deperditum est. Interdum etiam cum erosione, interdum uerò citra erosionem, quæ Græcis διαβρωσις dicitur.
- Itē quandoq; tam profluit sanguis, & quandoq; postea fluxurus est. Interdum quoque causa huius profluuii sanguinis apparens est, quæ in uena aut arteria diuertium facit, cuiusmodi est sagitta, telum'ue aliquod, aut
2. erosio præsens, & non ex uulnere excitata. Hæ itaque sunt differentiæ præcipuæ, profusionis sanguinis in uulneribus,

Profusionis ex uena, uel arteria causæ.

Differentiæ.

Diabrosi.

Causæ.

uulneribus, à quibus curandi indicationes desumuntur. Porro causæ fluoris sanguinis, ex diuisione tunicæ uenarum aut arteriarum, sunt, uulneratio, cōtusio, ruptio, erosio. Quæ autem uulnerant, ea sunt acuta, atque ad secandum habilia: cuiusmodi sunt sagittæ, & gladij. Quæ contundendo solunt, ea grauiā, durāq; sunt, ut sunt lapides, aut quæpiā grauis moles. Quæ rūpunt, omnia id tensionis interuentu faciunt. Tensionem autem efficiunt, intentior actionis uehementia, succi abundantia, nō utique uirium respectu, sed quæ cū à uase suo non continetur, etiam casus ab alto, & graue quip

Erosionis causæ
inuenta.

piam, durumq; incidens. Erosio autem uenis & arterijs intrinsecus saltem accidit, ex succo aliquo, cui mordens natura insit, ut est bilis flaua, uel atra super affata. Ex ijs itaque manifestum euadit, quod uenæ, uel arteriæ uulnerari non possunt, quin cutis, & caro uulnerentur. Proinde suppresso iam sanguine, glutinandi, seu (ut dicunt) incarnandi indicationes, ab ipsis (carne inquam & cute) sumendæ sunt, ut in sequentibus dicetur. Signū uenæ, atque arteriæ incise, est sanguinis profusio. Quod si sanguis cum impetu ac saliendo profluat, & tenuis ac flauus feruensq; appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si uerò crassior & nigrior conspiciatur, ac quietè, sine pulsu, & citra saltum effundatur, iudicium est ipsum à uena effluere. Hemorrhagia, id est, sanguinis profluuium, omnium calculo ac iudicio periculosa est. Nisi enim constiterit ac supprimatur, mortē adfert inuitabilem. Quippe quod sanguis (ut dici solet) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hemorrhagijs malum portendunt, ut Auicenna post

Discretio, quando sanguis ab arteria, & quando do à uena reijciuntur.

Prognostica.

Apro. 3. lib. 5.

nis profusio. Quod si sanguis cum impetu ac saliendo profluat, & tenuis ac flauus feruensq; appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si uerò crassior & nigrior conspiciatur, ac quietè, sine pulsu, & citra saltum effundatur, iudicium est ipsum à uena effluere. Hemorrhagia, id est, sanguinis profluuium, omnium calculo ac iudicio periculosa est. Nisi enim constiterit ac supprimatur, mortē adfert inuitabilem. Quippe quod sanguis (ut dici solet) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hemorrhagijs malum portendunt, ut Auicenna post

nas post Hippocratē annotauit. Porro subit admirari, quod Arnaldus scriptis prodidit: nēpe quòd arteria per transuersum dissecta, promptius coalescit et agglutinatur, quàm si secundum longitudinem esset diuisa.

Curatio profusionis sanguinis ex uulnere.

Capita methodi, qua sanguinis profluvia, quæ ad manum sunt, curantur, duo traduntur à Galeno, quibus Auicennas tertium addidit. Vt igitur omnium fiat mentio, hæmorrhagia trifariam sistitur. Primò ijs, quæ fluxionem auertunt, tum deriuando tum reuellendo: secundò infrenantibus, atque intercipientibus fluxionem: & tertio, topicis, id est, localibus auxilijs.

Modi tres sistendi hæmorrhagiæ.

Porro ex ijs, quæ sanguinis profluuium auertunt, tã à uenis quàm arterijs sanguinem fundentibus, (huic enim hæmorrhagiæ propriæ debentur auertentia eiusmodi auxilia) quædam id efficiunt citra ullam extra corpus uacuationem, alia uerò cum euacuatione. Citra uacuationem, fluentem è uasis sanguinem auertunt, & aliò trahunt, cucurbitulæ siccæ, seu læues, & cum flamma admotæ, fricções, & ligaturæ primum in propinquiorebus partibus factæ, deinde in remotioribus. Auertitur autem sanguis cum euacuatione, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, uena in eâ parte incisa, quæ profusioni è directo respondet, quæq; ipsi membris sanguinem fundentibus coniuncta est. Itaque hæc (inquit Galenus) Hippocratis inuenta sunt, omnis scilicet immodicæ uacuationis communia remedia. Deriuatio ad latus, & ad uicina fit: reuulsio ad cōtraria, non tamen semper ad remotissimâ, ut falsò quidam putauerunt.

Auertentia.

Lib. 5. metho. meden.

Parocheteusis. tauerunt. Illam parocheteusin, hanc antispasim Græci
Antispasim. uocant. Antispasim igitur, id est, reuulsio, in ijs quæ
 supra sunt omnibus, deorsum semper agitur: sursum,
 in ijs quæ sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra,
 sicut ab ijs rursus ad illa: similiter ab ijs, quæ intus ha-
 bentur, ad ea quæ foris sunt: contraq; ab his, ad illa.
 Itaque si resolutus adhuc æger non sit, uena (uti dixi-
 mus) in eo loco secanda erit, quæ profusioni sanguinis
 è directo respondet, & uulneratæ parti coniuncta est,
 siue deriuare, siue reuellere studueris. Vbi autem pau- 10
 lulum detraxeris, mox unam horam intermittens, rur-
 sus modicum quid detrahes: post iterum, atque iterum
 pro laborantis uiribus, ut Galenus consulit lib. 3. The-
 rapeutices methodi. Sed de hac sanguinis in uulneri-
 bus detractiōe, latius alibi superius diximus. Causæ
 sanguinem infrenantes, atque eius fluxum intercipien-
 tes, quædam sunt incrassantes ac inspissantes, ut len-
 tes, oriza, iuiubæ, cotonea mala, quæ Græci νύκτιον
 uocant, & in uniuersum fructus omnes styptici, hoc
 est, austeri, in hunc usum offerri solent in omnibus san- 20
 guinis profusionibus. Aliæ uerò sunt stupefacientes,
 ueluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum, ex
 quo profluit sanguis proiecta. Nō autem supra uulnus
 ipsum: ulceribus enim frigidum mordax. Item res om-
 nes, quæ insigniter refrigerant, sicuti & syncope, seu
 animi deliquium, in quo propter sanguinis ad interio-
 ra reuocationē, totus corporis habitus refrigeratur,
 & sanguis sistitur, ut loco nuper citato Galenus anno-
 tauit, ad hunc modū scribens: Perro confluere probi- 30
 betur sanguis, & propter animi deliquium, & cum ad
 contraria reuclitur, & cum ad uicina deriuatur: &
 per re-

per refrigerationem, tum corporis totius, tum uerò præcipuè ipsius partis afflicte. Hac enim ratione etiã frigida pota, sæpe hæmorrhagias suppressit: idem facit & frigida foris infusa. Sed & quinto Aphorismo, rum in ijs frigidus utendum esse præcipit Hippocrates, unde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa (inquit) sed circa ipsa, unde influit. Topica, hoc est, loca

Topica auxilia

10 reduximus. Primum genus auxilij fit per suturam: secundum per linamenta, quos *μोटὸς* Græcè uocant, uel per penicillum siue turundam, quod aiunt: tertium remedium est, totius uasis sanguinem fundentis præcisio: quartum deligatura, & uinculum: quintum est adu-
 20 sio per candentia ferra, uel per caustica medica-
 30 menta. Primus modus coarctandi sanguinem, qui per suturam fit, his maxime uulneribus competit, in quibus nulla facta est substantiæ deperditio. Tunc autem commodè fit sutura, cum uulnus ipsum à sanguine con-
 40 creto, qui *θρόμβος* Græcè dicitur, integrè est repurga-
 50 tum. Itaque hoc peracto, ipsius uulneris labra in idem adducenda sunt, nostrarum manuum opera: ubi sic ad manum uulnus se exibat: postea cõsuantur, sutura qui-
 60 dem cõmuni, uel ea quam pelliones facere solent, præsertim si magno impetu sanguinis prorumpat. Dum autem ita suitur uulnus, satis altè acus in carnem de-
 70 mittenda est. Post hæc, puluis adstrictorius superponen-
 80 dus erit. Deindè stupæ oui candido liquore, & puluere illo astringente, cuius in sequentibus fiet mentio,
 90 imbutæ, superimponendæ erunt. His ritè peractis, mē-
 100 brum affectum deligandum erit, & situ apposito col-

Quinque auxiliorum genera loca-
 lia, quibus hæ-
 morrhagiæ sup-
 primuntur in
 uulneribus.

Sutura sangui-
 nem coarctans.

Z iij locandum.

Situm partis ad
hæmorrhagiam
plurimum con-
ducere.

locandum. Appositus enim uulneratæ partis situs, inter hæmorrhagias remedia Galeno censetur. Quod autem modus is supprimendi sanguinem, utilis sit, ex eo manifestum euadit, quod labra uulneris prius hiantia, & ad inuicem distantia, in unum adducuntur, & inter se committuntur, locus affectus refrigeratur, et adstringitur. Quæ omnia in hoc affectu Galenus desiderat, lib. 5. suæ metho. med. Sed & multoties adserit Auicennas in quarto, necessarium esse, ut carnis uulnera consuantur. In quo etiam Theodoricus, & Henricus consentiunt. Dicunt tamen plurimi Galenum non præcipere uenarum, arteriarum, & intestinorum uulnera, suenda esse, quippe quod dura nimis, & exanguia sint, atque ideo agglutinari, & in pristinam unionem toire non possint. Verum pace illorum (inquit Guido) dixerim, non inhibuit Galenus, suenda esse uenarum, & arteriarum uulnera: quod si id tacuit, certè adfirmasse uidetur. Quinimò & litera ipsius Galeni, quod dicimus planè innuere uidetur, quæ sic habet: Ne, que enim suere fas est, arteriæ, uenæ uel uulnus: ueluti dixerint, qui nullam à uulneratæ partis substantia, naturaq; sumi indicationem aiunt. Sed tu (subaudi) per regulam oppositorum, nos qui sumimus indicationem à substantia, & natura partis uulneratæ, suemus eas. Quod si non seorsum, ac separatim, coniunctim saltem cum carne, ad modum peritonæi, id est, ut peritonæum, suere consueuimus. Atque ita si non iuxta primam intentionem coeant, atque adglutinentur, saltem iuxta secundam (uti superius in sermone communi diximus) coibunt. Secundus modus supprimendi sanguinem, qui fit per linamenta, & uulneribus, in quibus aliqua est substantiæ

An uenarum &
arteriarum uul-
nera suenda.

Lib. 5. meth.
meden.

Secundus modus
supprimendi san-
guinem.

- substantiæ deperditio, potissimum accommodatur, ita perficitur. Imprimis uulnus ipsum puluere aliquo, qui adstringendi facultatem habeat, respergito: deinde linamentis, uel stupis. hiantem plagam oppleto: siccis quidem primum: deinde si hæc parum proficiunt, aceto, uel ijs medicamentis, quæ sanguinis supprimendi facultatem habent, madefactis: supraque spongiam ex aqua frigida expressam imponito, ac manu superposita, eam comprimito, uel alligato: Et post hæc membrum appo-
- 1º sit (ut superius dictum est) collocato. Qui sanè modus sistendi sanguinem apprimere utilis est, ut loco paulò antè citato testatur Galenus, sic inquit: Obstruetur uas sanguinem fundentis osculū, Et sanguine ipso concreto, qui thrombos Græcè dicitur, et ijs quæ foris illi imponuntur: cuiusmodi sunt linamenta, quos $\mu\omicron\tau\omicron\varsigma$ Græcè uocant, Et medicamenta ea, quæ idcirco quòd ex læta, crassaque substantia consistant, meatus obstruunt, Græci emplastica uocant. Horum autem optima sunt eidem, quæ ex frixa resina, Et farina triticea tenuiss-
- 2º sumo polline, Et gypso, alijsque id genus, sunt confecta, qui candido macerata, Et cum leporinis pilis imposita. Tertius modus sistendi sanguinem, qui fit, totum uas sanguinem fundens, per transuersum præcidendo, competit maximè uenis Et arterijs, quæ in profundo sitæ sunt, ut idem Gal. est autor. Cogimur (inquit) non modo arterias, sed etiam interdum uenas totas præcidere, utique transuersas. Incidet autem huius necessitas in ijs, quæ ex profundo loco rectè assurgunt, præsertimque per angustias, uel principes particulas. Quippe
- 3º pe ita retrahitur ex utraque parte, pars utraque celaturque, ac integitur, superiacetibus corporibus uulnus.

Quomodo obstruat or nasis.

Tertius modus sistendi sanguinem.

Lib. 5. Ther.

Quartus modus
supprimēde hæ-
morrhagie.

Radix uasis,
quæ.

Quintus modus
sistendi sangui-
nem.
Lib. 5. Tbe.

Post hæc, pulvis aliquis sanguinē cohibens, super uul-
nus imponendus, & stupæ, uel spongia medicamentis
facultatem supprimendi sanguinem habentibus, imbu-
ta, superalliganda erit, & figura particule uulneratæ
accommoda, adhibenda. Quartus modus supprime-
ndæ profusionis sanguinis, qui fit funiculo uasi sangui-
nem fundenti circumposito, competit præsertim arte-
rijs, quæ in penitioribus delitescent. Itaque si alia au-
xilia profluvio uincuntur, arteriæ nudandæ sunt, ut
Avicennas præcepit, & hamo apprehense, mox uincu- 10
lo aliquo gracili, ut filo serico, excipiendæ, ac fortiter
stringendæ sunt. Post hæc medicamentum adglutinans,
siue incarnatiuum, uulneri apponendum erit, & mem-
brum fascijs, ut oportet, deligandū, situq; appposito col-
locandum. Porro uinculū ipsum radici uasis erit inij-
ciendum, ut libro quinto methodi Galenus nos admo-
nuit. Tutius autem est, iuxta eiusdem Galeni senten-
tiam, utrunque facere, funem quidem radici uasis cir-
cundare, & quod deinceps habetur, id est, inde proce-
dit, præcidere. Radicem uasis uocat hic Galenus, prio- 20
rem eius partem, quæ uel iecinori propior est, uel etiã
cordi. Hæc (inquit) in collo, ab inferiore est parte: in
brachijs & cruribus, à superiore. In singulisq; reliqua-
rum partium, prout ex dissectione intelligere licet. His
sic peractis, implendū carne uulnus quàm primū est,
priusquàm funiculus à uase decidat. Nisi enim produ-
cta caro prius locū, qui circa præcisam arteriam est,
impleuerit, si locus aliquis uacuus superfuerit, utique
quod Græci ancyrusma dicunt, sequitur. Quintus mo-
dus, excretionis sanguinis sistendæ, qui per aduersionem 30
fit, quæ crusta (quæ Græci escharam uocant) inducitur,
maximè

maximè competit uenis, suæ unionis diuortium ab erosione perpeſſis, Galeno ipſo autore ſic ad uerbum inquiringe: Maximam autem neceſſitatem, uel cruſtifiſcis, id eſt, cruſtam inducentibus medicamentis, uel ignitis, ferramentis utendi animaduerti, ubi ex eroſione putreſcentis alicuius profluuium ſanguinis concitatur. Hic itaque modus ſiſtendi ſanguinem perficitur, tum candentibus ferramentis, tum medicaminibus cruſtam inducentibus, quibus cum calore adſtringēdi facultas ſit

10 coniuncta: cuius generis ſunt, chalcantōs, id eſt, atramentum ſutoriū, miſy, & chalcitis, ſeu quod uitreolum uulgo appellatur, iſq; tam uſtis, quàm non uſtis. Quæ autem ex calce uiua, id eſt, non extincta conficiuntur, ualentiora quidem his ſunt: cæterum quia adſtringendi uim non habent, cruſtæ, quæ ab ipſis fiunt, citius excidunt. Herent autem diutius, quæ ab adſtringentibus: quod utique longè eſt utiliſ. Quippe ita prius in baſi, ſeu in imo earum, caro ſupernāſcitur, efficiturq; uas profluentibus ueluti operculum, donec uenæ agglutinatō facta ſit. Vnde nec noſmet (inquit Galenus) præcipites eſſe, ueluti nonnulli ſunt, ad cruſtas detrahendas oportet, ubi hæmorrhagias periculū imminet. Si enim properes illas reſoluere ac deſicere, tantū inde accidit interdum ſanguinis profluuium, ut uix cohiberi poſſit. Quocirca præcipiebat Auicennas, aduſtionem faciendam eſſe, ferramentis uehementer ignitis, & ualenter in profundum adactis, quò craſſæ ac profundæ eſcharæ fiant, quæ nec facile ſeparentur, atque excidant. Hinc Theodoricus cruſtifiſcis, ſeu cauſticis

30 omnibus medicamentis præferebat arſenicum, quod uocant ſublimatum, nec ſanè immeritò. Nam & protinus omnem

Arſenicum ſublimatum optimū ad hæmorrhagias præſidium.

Modus alius sup-
primendi sangui-
nem, qui statim
fluxurus est.

omnem sanguinis profusionem sistit, & altam, ac diu-
tius hærentem crustam inducit. Horum autem medica-
mentorum crustam inducentium materia, suo loco (nem-
pe libro sexto) explicabitur. Porro ipsa ferramenta
igne flagrantia, ex aceto, aut uino (ut rectè quidā con-
solunt) restinguere oportet. Cæterum alius quidam ab
ijs modus est peculiaris reprimendi sanguinem, qui
tametsi nondum adhuc profluat, mox tamen fluxurus
est: ut cum sagitta, telum'ue aliquod corpori infixum,
extrahendum est. Itaque cū hæc occasio nobis occur- 10
rit, puluilli tres, aut quatuor apparandi sunt: rotundi
quidem, & circa mediū (ut sic dicatur) fenestrati per-
forati'ue, medicamine aliquo sanguinem cōercente de-
libuti. His ergo ritè sic apparatis, ipsius teli infixi si-
pitè, seu bastile, per foramen immittito, ipsosq; puluil-
los circa bastile stringendo, minister aliquis, suprā uul-
nus comprimat. Medicus uerò ipse uulnerarius sagit-
tam, uel aliud quoduis telum infixum extrahat. Exem-
pto telo puluilli sunt adæquandi, ita ut nullū amplius
foramen in illis pateat, & supra uulnus comprimen- 20
di: dein alij non pertusi supra illos sunt apponendi.

Præcepta que-
dam, de suppri-
mendo sanguine
observanda.
Digitus com-
primens.

Hi igitur sunt modi, quibus sanguis à uenis & arte-
rijs uulneratis profluens cohibetur, qui ut arte & ra-
tione fiant, sequentia præcepta observanda sunt. Pri-
mum est Galeni libro quinto Therapeutices methodi,
qui in omni fluore sanguinis ex uulnere, iubet ut is,
qui uulnerato adstiterit, illicò digitū super os uuln-
eris imponat, blādè innitēs, ac sine dolore cōprimens.
Quippe simul (inquit) tum sanguinem sistet, tum eum
concreescere in uulnere faciet. Thrombos enim, id est, 30
sanguis concretus, ex ijs est auxilijs, quæ hæmorrhagi-

giam

giam sistunt, sicuti & linamenta, quos $\mu\omicron\tau\alpha\varsigma$ Græci appellant, & medicamenta ea, quæ iisdem emplastica dicuntur. Ideo autem thrombus sanguinem supprimit, quia uasis sanguinem fundentis osculū obstruit, ut paulo antè diximus. Secundum documentum est, quod in omni sanguinis ex uulnere profusione, post admotionē pulueris adstrictorij, tres aut plures, ut uidebitur, pan-

Puluis.

10 primente imbuantur, uulneri agglutinentur, & supra ipsum adalligentur. Tertius canon est eiusdem Gale. qui per deligaturam docet suppressere sanguinem, sic
 ,, inquit: Alligandam autem id forinsecus fascia est,
 ,, ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor, quinque ue
 ,, amplexus ipsi profluenti uasi iniiciuntur. Ab hinc ua-
 ,, sis radicem uersus, ducentur, in quibus uidelicet par-
 ,, tibus radicem uersus ducere licet. Licet autem ferè in omnibus, præterquàm cerebri mēbranis. Hac quidem deligatura (ut inquit Auicennas) quod confluit, repri-

Deligatura.

20 mitur, & uena sanguinē fundens, constringitur. Quar-
 tus canon in supprimendo sanguine obseruandus est, ut membrum à quo sanguis profluit, situ appposito collocetur. Vnde Galenus libro quinto methodi medendi ad
 ,, hunc modum ait: Præter omnia iam dicta, inter hæ-
 ,, morrhagias, id est, profusionis sanguinis, remedia, cen-
 ,, seatur & appositus uulneratæ partis situs. Porro ap-
 positus fuerit eidem Galeno, uulneratæ particulæ sta-
 tus, si ad geminum hunc finem sit directus: nempe ut & dolore pars careat, & sursum spectet, custodito ta-
 30 men in hac situs figura modo, ne dolor incidat. Si uerò uel prona spectet, uel doleat, non solum profluuium nō sistetur,

Appositus uulneratæ partis situs.

*Deligatura ante
diem tertium mi-
nimè soluenda.*

sistetur, sed etiam si non sit, prouocabitur, & inflam-
matio augebitur, præsertim si pars dolore infestetur:
cùm nihil quidem æquè sanguinis profluuium excitet,
inflammationesq; augeat, ac dolor. Quintum docu-
mentum ab eodem Galeno præscriptum est, quo caue-
tur, ne ante diem tertium deligatura soluatur: ubi au-
tem illam tertio solueris die, si tutò adhuc medicamen-
tum emplasticum, & sistens sanguinem, ulceri adhæ-
reat, aliud rursus super ipsum accommodabis, ac uelu-
ti linamentum id quod ex pilis factum in hæsit madesa-
ciens, deligabis ita, ut initio deligasti. Sin prius sua
sponte reiecerit linamentum, radicem uasis digito blan-
dè comprimens, ne uidelicet quippiam consuat, hoc
quidem suspensa manu, ac sensim adimes, atque alteri-
impones. Quod etiam eodem, quo & primum (si ne-
cessitas exigat) imbues medicamento, uel oui candido
liquore cum rosaceo subactio, uel uino crassiore, & sty-
ptico. Ad hunc modum, quoad carne obducetur, ac mu-
nietur uas, curare debebis: utique à principio ad finem
usque (ut suprà dictū est) particulam supinam seruans.

*Laborans oculos
claudat, aut loco
obscuriore con-
tineatur.*

Sextum præceptum in larga sanguinis profusione ob-
seruandum, est, ut laborans oculos clausos contineat,
aut loco obscuriore reponatur, ne uel proprium san-
guinem, uel rubrum quidpiam uidere possit. Atque illi
asseruatione affirmetur, quod sanguinis profluuium
confluit: & si adhuc sanguis fluat, magno ipsius com-
modo id fieri: atque ita cōtraria imaginatione, uirtus
naturalis ipsius roboratur. Hinc dicebat Auicennas,
quòd grauissimum accidētium animalium, mouentium
imaginationē, est motus sanguinis, & consecutio eius,
qui paratus est ad eum, cùm multum intentus fuerit,
ad consi-

Auicennas.

ad considerandū res rubras. Ceterū tēpestiūm est
subijctamus medicamēta, quæ sistēdi sanguinē uim ha-
bent: statutum enim erat nobis postremo loco de ijs di-
cere. Itaque primum, atque omnium optimū est, quod
à Galeno describitur libro quinto methodi medendi:
quo etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias
uti, securissimum est. Item ad colli uulnera, ipsarumq;
uenarum iugularium, quas sphagittidas uocāt: etenim
et harum sanguinem citra uinculum prohibet. Verba

Medicamenta
sanguinem sup-
primētia.

1. autem Galeni hæc sunt: Thuris pars una, aloēs partis
unius semissi miscetur. Mox cū utēdi tempus instat,
tantum huius pulueris cū oui candido subigitur, quan-
tum mellis reddat crassitudinem. Hoc dehinc leporis
mollissimo pilo excipitur, deinde tum uasi ipsi, tum ul-
ceri toti liberaliter imponitur. Alligandum autem id
forinsecus fascia, ex tenui linteo, modo quo in tertio
canone suprā dictū est. Hoc autem medicamento (ina-
quit paulō post Galenus) multifariā utor, aliās (ut
dictum est) duplum thuris aloæ admiscens: aliās pari-
modo ambobus utens, aliās paulō superante aloēn thu-
re, aut etiam plusculo, sed nondum duplo: etiam man-
nam pro thure aliquando iniiciens. Porro constat in-
duris corporibus, plus aloēs esse immiscendū, in mol-
libus plus thuris. Secundum medicamentum sumitur
ex dictis Auicēne, quod et ab omnibus chirurgis ap-
probatur: habet autem ad hunc modum: ꝛ. boli Arme-
niæ, sanguinis draconis, thuris, aloēs succotrinæ, pares
portiones: terantur in puluerem, qui apponatur, ut di-
ctum est. Tertium medicamenti genus est Bruni, qui
ipsum desumpsit ex lib. diuisionum Raxis, et ex Albu-
case. Recipit autem calcis uiuæ, quæ sola, ut suprā di-
ximus,

Gal. medicamen-
tum sanguinem
supprimens.

Auicēne puluis.

Bruni medica-
mentum.

Galla cōbusta.

Symphyton.

ximus, sanguinem cohibet, et sistit) sanguinis draconis, gypsi, aloës, thuris, uitreoli, singulorum æquis portiones: rediguntur in pulverem, & cum oui candido liquore, & tela araneorum miscentur, donec in corpus unum coëant, & superponuntur. Est qui plurimum commendat gallam combustam, maceratam in uino & aceto, tritamq; & super arteriam admotam. Alij in huiusmodi pulueribus symphyton addunt, quod posteriores consolidam uocant.

Curatio uulneris in uena.

Lib. 5. meth.

Curatio ulceris
in uena.

Suppresso sanguine, qui ex uulnere profluebat, ad propriam ipsius uulneris curationem mox accedendum est, ut superius est annotatum. Porro tametsi (ut Galenus ait) sanatu difficilior sit arteria quam uena, non tamen est medicamentorum admodum diuersus in utraque usus: imò specie planè idem, maioris minorisq; ratione euarians. Quippe tantò stecioribus medicamentis eget arteria quam uena, quantò ipsa est suapte natura stecioris tēperamenti quam uena. Er-
go quod uenæ infedit uulnus, ubi ad manum est, & citra substantiæ deperditionem, eandem desyderat curationem ijs, quæ in carne accidunt. Nam siue ex recenti iclu factum est, id agendum est ut medicamentis ijs, quæ enema uocant, coëat: siue ex erosione, quæcunque dicta de rebellium ulcerum curatione sunt, ea prius ratione discernenda, mox opere perficiantur, tentanda: Quinetiam ubi uinculo uas sis complexus, aut medicamentis sanguinē supprimentibus, aut ferramentis ignitis usus, ita ut facta fuerit substantiæ deperditio: illudq; tibi curationis propositū restet, ut quæ circa uulneris ulceris ue

ulceris'ue labra sunt, carne impleas: iisdem omnino medicamentis utendum erit, quæ in methodo sinuorum ac cauorum ulcerum sunt descripta.

De uulneribus neruorum, tendonum, & syndesmorum, id est, ligamentorum. Cap. XIII.



VLNERA neruorum partium Auicennæ lib. 4. suæ medicinae, & Gal. lib. 6. methodi. med. quandoque punctim, quandoque

Differētia uulnerum, partium neruorum.

- cassim fiunt. Eadem interdum sine contusione, interdum uerò cum contusione accepta sunt. Ex puncturis autē quædam hiant, atque apertæ sunt, quædam cæcæ atq; occlusæ manent, adeò ut earum ora sic conuiueant ac inter se coeant, ut conspectum effugiant. Porro ex dissectionibus, hoc est, ijs, quæ in neruosis partibus cassim fiunt uulneribus, aliæ per transuersum, aliæ per longitudinem inflicte sunt. Atque ex harum utrisque, quædam fiunt sine amissione substantiæ carnosæ, quædam uerò cum deperditione ipsius substantiæ carnea, cute etiam, quæ interueniebat, diuisa, adeò ut neruus nudus appareat. Ad hæc nerui transuersim uulnerati, quoadmodum non ex toto, sed duntaxat ex parte dissecti, quandoque uerò toti præcisi sunt. Atque in omnibus ijs uulnerationibus, quandoque dolor ingens, & inflammatio, & conuulsio accidunt, quandoque uerò non. Itaque ab ijs nuper commemoratis uulnerum differentijs, curationis indicationes sumuntur. Omnium eiusmodi uulnera
- 3 **O**tionum causæ sunt ea, quæ incidunt, pungunt ac pertrant, & contundunt, ut in superioribus (ubi scilicet de causis

Causa.

Signa & iudicia.

Quæ symptomata, quæque affectus, ex nervo tum ulnere oboriantur.

Tumor in nervo tum ulnere.

causis ulnerum in uniuersum differuimus) ostensum est. Cæterum ex præcedentibus conspicuum euadit, quòd nervus ulnerari non potest, quin cutis, & caro solutionem continui, & ulnerationem etiam patiantur. Nervum conuulneratum esse testantur, dolor ingens, læsio sensus, & motus, & si in loco nervoso ulnus acceptum est. Sed ab hoc postremo, coniecturalis solum nota desumitur. Nervis ulneratis aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, acumine, inflammatio, & dolor immodicus accidit. Quare & febres & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob nervorum cum cerebro commercium. Interim uerò in alijs quoque particule affectæ locis, inflammationes, et abscessus super ipsum nervum conuulneratum, quòd cohæreat, solent accidere. Ita quidem iudicatur Gal. lib. 3. artis medic. ut in superioribus annotauimus. Si in ulneribus nervorum tumor apparuerit, & postea disparuerit, cõuulsionis ac delirij periculum imminet. Hinc de tumoribus, qui ulneribus superueniunt, loquens Hippocrates lib. 5. Aphorism. in uniuersum omnes illos tumores damnat, qui de repente detumescunt. Sed et ingens malum portendi ibidem adserit, cùm ulneribus prauis (qualia sunt, quæ in capitibus, aut finibus musculorum, & maxime nervosorum sunt) tumores omninò non adueniunt. Si in ulneribus (inquit) fortibus, & prauis tumor non appareat, ingens malum. Sequenti quoque aphorismo, qui pars est antecedentis, docet Hippocrates, tumores omnes, prauis maxime ulneribus, cuiusmodi sunt ea, quæ nervosis partibus illata sunt, superuenientes, quicumque molles sunt, optimos esse, contrarios uerò prauos. Molles (inquit) boni, & crudi

9, crudi uerò mali. Vbi crudum tumorem uocat, durum atque renitentem, qui opponitur molli. Adhæc, neruo per transuersum uulnerato, sed non omninò dissecto, maior conuulsionis metus impendet, quàm si totus præcisus esset: phlegmone scilicet à desectis fibris, ad non sectas, communicata: ceterum conuulsione, ab ipsis nō sectis excitata. At si totus quidem neruus præcisus sit, metus præterea nullus inflat, nec periculum ullum inde sequetur: debilis tamen particula manebit, ut prius

Crudus tumor,
qui dicatur Hip-
pocr.
Gal. lib. 6. Tbe.

10 dictū est, cum de spasio ageremus. Meminisse præterea oportet, quòd frigidum, partium neruorum uulneribus, magis est mordax, quàm ijs, quæ carnes occupant. Neruea ligamenta, siue copulæ, quos syndesmos uocant, cum simillimā habeant tendonibus speciem, ualentissimorum remedium Gal. lib. 6. Therapeutices uim tollant: quippe quòd nec ad cerebrum pertingant, & sensu careant. Nam nerui omnes, alij quidem ex ipso planè cerebro ortum habent, alij spinali interueniente medulla. Tendones quoque, quoniam compositi

Ligamenta uid.
nerata, ualētis-
sima tollant
remedia.

20 tam ex neruo ligamentoq; substantiā habent, quatenus nerui participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur. Ceterum minus saltem, quàm ipsi nerui conuulsionem accersunt. Syndesmus uerò uulneratus, si is est, qui ab osse ad os permeat, ac duorum ossium coniunctio est, & maxime sine periculo est, & ipsum quibuslibet sic cans medicamentis, nihil hominem offendet. Sin is qui in musculum se inserit, quantò est neruo & tendone minus periculo opportunus, tātò utique, nisi ritè, hoc est, cautè & diligenter curetur, reliquis syndesmis magis

30 gis terrere debet.

Curatio uulnerum partium neruorum.

Ingenti dolori
primò succur-
rendum.

Puncti nerui
curatio.

In nerui punctu-
ra uulnus diu
apertum seruan-
dum est.

Symptomata
nerui puncturam
comitantia.

Curatio uulnerum eiusmodi partium neruorum,
communis est cum ea, quæ & uulneribus par-
tium carnosarum accommodatur: hoc uno tamen exce-
pto, quòd symptoma illis superueniens, nempe dolor,
primò medici sollicitudinem (cùm nimis contristat) ad
se conuertit. Ita tamen, ut uniuersales ac communes
illæ intentiones suprâ memoratæ, haud prorsus inte-
rim negligantur. Hæ autem numero erant, quatuor.
Prima quidem, extranea, quæ uulneris labris interci-
dunt, remouere. Secunda, uulneris labra dissidentia
committere. Tertia, commissæ atque in unum coniun-
cta seruare. Quarta, particulæ læsæ substantiam con-
seruare. Ceterum quomodo has intentiones assequa-
mur, ex differentijs iam suprâ enumeratis planè co-
gnoscemus. Ergo à simpliciori exordium sumentes, de
nerui punctura primùm dicemus. In nerui puncti cu-
ratione, neque unionem moliri statim oportet, neque
coacta, seu in unum coniuncta conseruare: quin po-
tius cutis quidem uulnus apertum, inglutinatumq; cu-
stodire. Itaque infixæ duntaxat (si quæ neruis inhæse-
rint) extrahenda, & particulæ oblæsæ substantia ser-
uanda. Porro, quæ ratione defixa euellenda sint, abun-
dè in præcedentibus ostendimus. Reliquum est igitur,
ut quomodo læsæ particulæ substantia seruanda sit, &
ab ingruentibus iniurijs uindicanda, aperiāmus. Cete-
rùm partis ipsius laborantis, hoc est, puncti nerui sub-
stantiam optimè seruabis, si & dolori (qui ob exa-
ctum, atque excellentem partis affectæ sensum uehe-
mentissimus excitari solet) sedulò ac mature occurre-
ris, & phlegmonem fieri prohibueris. Quæ duo ex ne-
cessitate

cessitate (nisi oblitteris) nerui puncturam consequuntur;
 Et conuulsionem subinde accersunt, ut in precedentiibus
 tam annotauimus. Vt autem geminum hunc scopum
 assequaris, hoc est, dolorem ac inflammationem prohibere
 possis, quatuor intentiones rursus tibi erunt diligenter
 obseruandæ. Prima erit recta uitæ institutio. Secunda,
 matriæ antecedentis subtractio, ne scilicet ratione
 doloris, confertim ad locum affectum confluat.

Quatuor intentiones in curan-
 di nerui punctura obseruandæ.

Tertia, corpus à conuulsionis noxa uindicare. Quarta,

10ta, dolorem sedare, Et æruginosam saniem educere.

Et hæc quidem puncturæ nerui propria est, Et maxime
 peculiaris: aliæ uerò tres, omnibus neruorum uul-
 neribus sunt communes. Quod ad primam intentionem
 attinet, præcipit Auicēnas, ut cui neruus punctus
 est, uictum in extremo tenuissimum seruet, iuxta eam
 formam, quam superius expressimus, dū in uniuersum
 de uulneribus tractaremus. Locus in quo cubabit
 æger, tepidus esse debet, ut Celsus nos admonuit. Le-
 ctulus uerò mollis, ut Galeno Et Auicennæ placuit.

Viuenti ratio.

20 Sed Et collocari quoque membrum, quod ictum est, ra-
 tione certa debet. Optimum etiam medicamentum la-
 boranti quies est: moueri enim et ambulare, nisi sanis,
 alienum est. In quiete igitur ac lectulo molli hominem
 continere oportet. Vt autem secundam intentionem
 assequi possis, sequēdū omnino tibi est Galeni consiliū,
 qui lib. 6. meth. med. iubet in nerui punctura, corpus
 totum sanguinis missione inaniendum esse, utique si uir-
 tus robusta fuerit, Et nihil aliud oblitterit: etsi nulla
 etiam adsit in corpore laborante sanguinis redundan-

Materiæ antea-
 dentis substra-
 ctio.

Sanguinis
 missio.

30 tia. Morbi enim magnitudo, ac doloris uehementia, cor-
 pore etiam plethorico non existente, hoc genus auxi-

Purgatio.
Fristio.

Conuulsioni
præcautio.

Si nervi vulne-
rati pblegmone
occupentur, aut
putrescant.

lij (ut antea diximus) plerunque desiderat. Caterum
in hac per sanguinis missionem uacuatione, seruanda
semper erit locorum affinitas, ut frequenter admonui
mus. Si uero uitiosis succis repletum corpus sit, pro-
nus congruo medicamento illud purgabis. Lenis quo-
que frictio recte adhibetur, sed his partibus, quæ lon-
gius absunt à uulnere. De tertia indicatione abunde
satis dictum est in præcedentibus, ubi de conuulsione
uulneribus superueniente tractauimus. Itaque si pun-
cto neruo, uel quouis modo uulnerato, aut etiam contu-
so, spasmus acciderit, aut eius metus ingruat, protinus
caput, collum, atque uniuersam dorsi spinam, oleo li-
liorum, uel cõmuni calente fouebis. Porro si in parti-
bus superioribus, ut manu, uel brachio, id genus uulne-
ris neruus acceperit, præter iam commemoratas par-
tes, axillas quoque ubertim oleo calenti delinies. Si ue-
rò punctus, aut quouis modo uulneratus neruus ex ijs
sit, qui in crure habentur, bubones, siue inguina, pubes,
& loca uicina, largo oleo statim erunt imbuenda. Tum
per totam spinam, ad collum & caput usque ascendē-
dum. Sed & tendones, & ligamenta, ac loca ipsa uulne-
ri ubiuis illato propinqua, eodem modo fouenda sunt,
ut. 6. lib. meth. med. Gal. facere nos edocuit. Cate-
rum, neruorum uulneribus, sed maxime punctim inflis-
tis, perperam à principio curatis, maxima omnino in-
flammatiõ, & putredo superuenit. Ergo cum nerui uul-
nerati sic iam inflammatione tentantur, & putrescunt,
farinam hordeaceam, aut fabaceam, aut potius crui-
nã, in aqua lixiua aut oxymelite, uel syropo aceto-
sodecoctam, loco pblegmone occupato & putrescenti, sta-
tim illinere oportet. Non autem triticeam farinam, aut
eius

eius generis cataplasmata, quæ particulam putrem efficiunt: immò uerò neque aquam calidam adhibebis. Hæc enim tametsi reliquis inflammationibus, quas phlegmonas appellamus, sit accommodatissima, (ut quæ eas ualde mitiget), uulneratis tamen neruis est infestissima. Ab humefactantibus namque, & calefacientibus medicinis, putredo huiusmodi affectibus comparatur. Quod si uehemens inflammatio cum maximo dolore infestauerit, eruinam farinam, aut fabaceam, cum optima sapa, addito paucissimo aceto, decoctam illinito: prius tamen parte affecta, oleo calido affatim perfusa. Tanta uerò interdum ex eiusmodi puncturis, & neruorum uulneribus oboritur putrefactio, ut ferro candenti, uel caustico aliquo medicamento (cuiusmodi est Aegyptiacum) eam adurere cogamur. Haliabbas & Auicennas ad eiusmodi phlegmonas, & gangrenas, seu putredines, emplastro ex metallicis & aceto preparato utebantur, cuius compositio lib. 3. de compositione medicamen. κατὰ γένη à Galeno sub hac uerborum serie

Aqua calens uulneratis neruis est infestissima.

Emplastr. ex metallicis ad gangrenas, & putredines.

- 2^o descripta est: Cerae pondo unc. sex, olei unc. nouem, myrios pondo unc. sex, chalcitidis denarij pondo unius, squammæ aris pondo unc. duas & semis, thuris pōdo unc. semis, galbani pondo unc. Quæ liquari possunt, hoc est, cera, & galbanum liquefacta, metallis in aceto acri prius accuratè tritis, superfunduntur. Hoc pharmacum ignorauit Galenus, quis composuerit, neque apud ullum hoc modo citatum unquam (ut ipse testatur) comperit. Eadem tamen præstare, quæ & alia quædam odorata simul, & sumptuosa, quæ paulò antè
- 3^o recenset, adfirmat. Recentiores autem eo medicamento uti non consueuerunt, sed illo potius, quod constat

Doloris sedatio,
& saniei edu-
ctio.

Infusura di-
latatio.

Oleum Sabinū.

farina hordei, fabarum, & orobi, in lixiuio stillatio-
(ut prius diximus) decoctis. Quippe quod à Galeno,
& Auicenna maximè sit celebratum, & frequenti
experientia, optimum ad hanc rem à multis comproba-
tum. Addit autem in decoctione Auicennas, mel, & ace-
tum. Quod uerò ad quartam intentionem consequen-
dam attinet, quæ à neruorum quidem puncturæ magis
propria est, Gal. lib. 6. meth. med. ualde multa pharma-
ca recenset, ab ipso excogitata, & deorum quadam
providentia (ut alibi testatur) inuenta. Quæ uulneri 10
imposita, ad utrunque mirè sunt comparata, tum ut
dolorè mitiget, tum ut exitū saniei patefaciant. Tutius
uerò fuerit in neruis acu, aut paxillo, aut quopiā tali
cōpunctis, præsertim si in altum recessum uulnus, hoc
est, punctura, descenderit, & conspectum effugiat, cu-
tim etiam in uulneris orificio aperire, hac latius incide-
re, quo meliùs sanies effluat, & commodiùs ad profun-
ditatem loci, medicamentorum uires perueniant. Por-
rò alijs cultro rasorio, alijs uerò cauterio cutē ipsam
aperiendā esse magis placet. Galenus in id genus pun- 20
cturis, orificium duabus in cutem sectionibus rectis di-
uidere iubet, libro tertio de composit. medicamentorum
secundum genera. Itaque nisi ore angustiorum eiusmodi
punctuum aperiantur, cōuulsione periculum magis
imminet. Quippe quòd obcæcato ita cutis uulnere,
nihil à profundo extrorsum expiret. Facta autē cutis
apertione, exiccandū mox uulnus est substantia aliqua
tenui, quæ usq; ad ima nerui offensi possit penetrare, ut
libro artis medic. Gal. nos admonuit. Cuius generis est
oleum Sabinum. præsertim uetus, quod tanquam utiliss- 30
simum ad præsentem curationem, libro sexto methodi
medendi

medendi, & tertio de compo. med. κατὰ γένν, idem
 autor deligit. Vitandum autem (cōsilio eiusdem) omni-
 nō est oleum crudū, quod ὠμότριβες, uel ὀμφάνιον
 duplici nomine Græcè dicitur: & quod denique uim
 habet adstringendi, cuiusmodi est oleum myrtinum, tri-
 bus saltē primis diebus. Hoc enim per halitum non
 digerit, sed obstruit & perspiratum prohibet. Præstat
 igitur nernos punctim ictos oleo tenui, adstrictione
 prorsus carente, perfundere, quale dulcissimū est, quod
 1^o longè melius erit, si duos aut tres annos transfegerit.
 Sed neq; Sabinum etiam ipsum oleum, quamuis sit te-
 nuissimū, aut aliud quoduis simile, ut est Iasminū, (quod
 uocant) frigidum admouendum est, sed calens: frigidum
 nāque præter, quā quod nervis aduersatur (ut quinto
 Aphor. expressit Hippoc.) tenues quoque meatus ob-
 struit, & ipsos angustiores efficit: calidum uerò dige-
 rit, ac dilatat, doloresq; magis demulcet. Si uehemens
 dolor laborantem discruciat, oleum ex uitellis ouorum
 commodè administratur. Ad eandem quoque intentio-
 2^o nem in nervis punctim uulneratis, Galenus saepe usus
 est terebinthina resina, medicamēto sanè apprimē ido-
 neo: per se quidem in pueris, & mulieribus, & gene-
 raliter ijs qui molli essent carne: cum euphorbio uerò
 emollita, in duris corporibus. Non secūs autem & pro-
 poli, non per se modò, uerū etiam cū euphorbio mol-
 liens, usus est: & si nonnunquā duriora contigerint,
 cum oleo quodam tenuiore. Quin (subiungit) & saga-
 3^o peno in duris corporibus sum usus, utique cum oleo
 & terebinthina id miscens. Sed & opopanace ad eun-
 dem modum, quo & sagapeno. Mihi uerò & lachry-
 ma Cyrenaica non inutilis fore uidetur, si quis empla-

Olea adstringē-
 tia uitanda.

Frigidum pun-
 ctis nervis ad-
 uersatur.

Si dolor uehe-
 mens adest.

Medicamēta q-
 bus usus est Ga-
 le. in nervis pun-
 ctim uulneratis.

Lib. 6. meth.
 meden.

strum ex ea faciat: cuiusmodi est, quod nos ex euphorbio composuimus. Verum (inquit) nondum id experientia, quemadmodum reliqua omnia, comprobauimus.

Remediorum per
me b. inuentio-
nem precedere
debere, deinde
hanc experien-
tia confirma e.

Quippe precedere oportet eam, quæ à uera methodo, proficiscitur, remediorum inuentionem: huic uero experientiam ad certiore[m] etiam fidem, subscribere. Si quidem ex tali methodo etiam sulphur, quod neque ignem expertum, neque lapidosum sit, sed omnino tenuum partium, ei cui neruus uulneratus esset, conducturum sperauimus. Tantum eius, sulphuris inquam, tenui oleo miscentes, dum quod ex utrisque mixtum erat, sordium haberet crassitudinem. In ualentioribus uero, durioribusq[ue] corporibus, etiam si ad mellis crassitudinem redigas, sic quoque iuueris: nam id quoque comprobatum experientia est. Hactenus Galenus. Cuius sententiam approbat Auenzoar, huiusq[ue] rei periculum se aliquando fecisse testatur. Quæ autem de lota calce subdit Galenus, neruis denudatis magis conuenire uidentur: quare in sequentia, ea reseruamus. Caterum paucis quibusdam interiectis refert Galenus, se composuisse emplastrum ex cera, resina terebinthina, pice, & euphorbio, ad hanc intentionem longè optimum, quo & plurimi sua ætate, felici successu uterentur. Recipiebatur autem ex cera partem unam, ex terebinthina, & pice, utriusque partis unius dimidium, (sic ut quod ex utrisque conflaretur, ceræ par esset) ex euphorbio, uero, ceræ partem duodecimam, etiam plus aliquando, ubi scilicet ualentius efficere est in animo. Licet quoque interim & plus sit, quod ex terebinthina & pice confit, quàm cera. Licet rursus & alterum eorum tantum ceræ admiscere. Quin etiam in penuria terebinthine resine

Auenzoar.

Emplastrum
Galen.

- nae resinæ (quæ uix apud nos reperitur) abietinâ, Galeno etiam autore, cōmodè admiscebis. Emplastro uerò aliquo ex prius memoratis appposito, lanam mollē oleo calente madefactam suprà decenter alligabis. Igitur ut summatim atque uniuersim dicamus, quæ in puncti nerui curatione obseruanda sunt, Galenum ita sexto Gal. lib. 6. methodi meden.
- 1º libro Therapeutices scribentem audiamus. Vulnerati
 - nerui curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum
 - calorem excitent, & ualenter, sine molestia tamē, de-
 - 2º siccant. Tum quæ ex substantiæ suæ natura, & trahen-
 - di uim habeant, & tenuium sint partiū. Et rursus ibi-
 - dem: In pharmacis autem huc omne consiliū direxi,
 - ut esset eorum facultas, tum tenuis, tum modicè excal-
 - faciens, & quæ admodum siccare citra dolorē possent.
 - Cū sola hæc trahere ex profundo saniem, neque con-
 - tracta, neque demorsa particula, possit. Porro cū Lib. 3. uera
 - permagna humanorum corporum (ut alibi Galenus 777.
 - ait) sit differentia, tum in temperamentis, tum etatē
 - tum mutationibus, insuper uitæ studijs, nulla ratione
 - 2º quodq; medicamentum, omnibus conuenire potest.
 - Quamobrem duo in promptu habeto, alterū ualen-
 - tius ex similibus genere confectum, alterum mitius:
 - quæ inuicem iuxta dum usus postulat, permulta inter
 - hæc iuxta mixturæ quantitatem constitues. Vide reliqua apud Gale.

De cernis cæsim uulneratis.

- S**I autem neruus non punctim, sed planè cæsim uul-
- neratus fuerit, diligenter considerandum est, quo
- pacto facta uulneratio sit, utrum ne per transuersum
- neruum, an secundum longitudinem eius. Tum uerò
- 3º quantum interuenientis, seu præiacentis cutis diuisum
 - sit. Adhæc spectandum etiam est, num totus neruus
 - dissectus

Hypothesis.

Tres iniectiones
particul.

Turunda.

dissectus sit, an non ex toto præcisus. Eiusmodi namque uulnerum differentia, curandi ratione non parum euariant, ut ex sequentibus euadet manifestum. Itaque si cutis quæ interueniebat sectio, nõ satis pateat, ampliori diuisione aperienda est, ut iam in præcedentibus admonuimus. Proponatur igitur primum satis esse cutis adaperitum, nõ ita tamen hiare uulnus, ut nervus ipse incisus, sensui nudus adhuc appareat. Sanè huiusmodi nerui scissura, siue per directum, siue per transuersum facta diuisio sit, ultra communes tres iam intentiones dictas in punctura obseruandas, tres adhuc alios scopos, siue intentiones habet. Prima est, ut in loco uulneris magis declini, turunda aliqua mollis & suauis blandè imponatur. Secunda, ut aliquod medicamentum anodynum, seu mitigatorium, & ut uocant incarnatiuum, neruis dicatum, uulneri superponatur. Tertia, ut lana mollis succida, uel oleo calente delibuta, desuper blandè alligetur. Ergo non ita exactè uulneris ora cõmittendæ sunt, & glutinandæ, quin emissariũ aliquod relinquatur, quo collecta sanies effluere possit. Hæc enim si in profundo retineatur, neruis putrefactionem ac corruptionem inducet, atque ita conuulsionem etiam inuehet. Eam ob rem profuerit (primis saltem diebus) turundam aliquam mollem, digestiuo ex terebinthina, oui luteo, & croci momento illit. an, loco uulneris, ut dictum est, decliuori molliter immittere, donec nullum amplius phlegmones, aut conuulsionis periculum timeatur. Medicamentum autem his neruorum, ac etiam tendonum uulneribus, cæsim, non punctim acceptis, expeditissimum, apprimèq; idoneum esse creditur, quod unguentum ex uermibus uulgò nuncupatur. Recipit autem

autem centaureæ minoris, linguæ canis, lanceolatae, Unguentum ex uermibus.
 quæ plantago est minor, pilosellæ, consolidæ maioris
 et minoris, ana manipulū unum, uermium terrestrium,

quos lumbricos appellamus, lib. semis, olei communis
 libram unam, uini libram unam & semis: subigantur
 simul, & ita septem diebus nutriantur, seu (ut loquun-
 tur) fermententur. Deinde illis addantur sepi arietis
 à pelliculis emūdati, libra una, picis nigræ, resinæ, ana
 quartum unum, gummi ammoniaci, galbani, opopana-

10 cis, in aceto dissolutorū ana drach. quinque: simul om-
 nia moderato igne decoquantur usque ad uini & aceti
 consumptionē, & colentur. Vbi uerò hæc penè refrixe-
 rint, adde terebinthinæ quart. semis, thuris, masliches,
 sarcocollæ, ana drach. tres, croci drach. duas: spatula
 agitentur in mortario, & fiat unguentū. Porro longè
 alia multa medicamenta, paratu etiam facilia, hisce
 neruorum diuisionibus, ualde accommoda referuntur
 à Gal. lib. 3. de cōpos. medic. secundum genera, & 6.
 meth. med. Cuiusmodi est, quod ex oxymelite, & faba-

Cataplasma.

20 rum farina, uel eruorum, uel lilij, uel ciceris, uel lupino-
 rum amarorum, uel hordeacea farina, cataplasma con-
 ficitur. Item pix liquida fermento temperata, atque
 uulneri imposita. Eruorum quoque, aut alia ex prædi-
 ctis farina fermento permixta. Imò & interim fermen-
 tum ipsum solum. Quin etiam oxelæum solum quod
 caleat, modò acetum abundè acre & uetussum sit. Pro-
 polis quoque recens, liquida, & pinguis, uulneri im-
 posita, sæpe præsidio fuit: interim quidem per se, interim
 fermento commixta. His itaque præsidijs ad neruorū

Pix liquida.

Oxelæum.

Propolis.

30 uulnera, tam in agris, quàm in urbibus, felici admodū
 successu, Galenus sæpe usus est, non solum in his, quos
 iam

Qualia in uni-
uersum medica-
menta esse de-
beant, neruorū
uulneribus ac-
commoda.

Lana mollis
succida.

Lib. 3. nota
317.

iam phlegmone prehēderat, sed etiam, ut refert, pro-
tinus ab initio. In summa oportet medicamēta omnia,
quæ neruorum uulneribus tam cassim, quàm punctim
influctis, ex usu futura sunt, ea pollere facultate, quæ
et modicè calfacere, id est, tepidum calorem, et uelu-
ti ex sole suauem excitare, et ualenter, citra dolorem
tamen, siccare possit. Tum ea quoque esse substantiæ
natura, quæ ex alto saniem, atque humores educere, ac
digerere ualeant. Atque ex ijs minus molesta esse con-
sueuerunt, quæ liquida sunt, ut Galenus etiam annota-
uit lib. 3. de composi. medic. secundum genera. Super
eiusmodi uerò medicamenta, lana mollis succida, uel
oleo calente respersa, apponenda est, et leniter obstrin-
genda. Ceterum quoniam frigus cum omnibus, tum
uerò maxime neruorum uulneribus infestissimum est,
plurimum conferet lanam ipsam superpositam per-
manere calidam, siue oleo tantum, siue oxelæo quoque
imbuta fuerit. Fiet hoc, si aliæ lanæ siccæ, uellera, aut
pani calidi subinde mutati, extrinsecus circumponan-
tur, et æger intra testum, si modò hyems fuerit, ad
quantum usque, uel septimum morbi diem se cōtineat.
Nam si eò usque phlegmone nō tentetur, uacetq; pro-
sus dolore, et nullam sentiat tensionem: in posterum
(inquit Galenus) tutus erit. Atque hæc de neruo cæ-
sim uulnerato in uniuersum, ac generaliter dicta sunt,
siue per transuersum, siue per directum, seu longitudi-
nem neruus diuisus sit. Quæ uerò sequuntur, peculia-
riter de neruo per transuersum uulnerato dicuntur.

De neruo per transuersum cæso.

AT si neruus per transuersum uulneratus sit, non
tamen ex toto præcisus, maior conuulsionis me-
tus im-

- tus impendet, inflammatione scilicet (ut suprà diximus) à dissectis fibris, ad integras & non sectas succedente, ceterum conuulsione ab ipsis non sectis excitata. Huic itaque memoratis prius auxilijs, quàm citissime occurrendum est. Ergo in quiete omnino, & strato molliſſimo continendus æger est, plurimoq; oleo affatim, & assidue, inguina, spina, axillæ, collum, & caput perfundendum. Ceterum in hoc uulnere largius sanguis mittendus est, & uictus tenuior adhibendus, quàm
1. in neruo per directum inciso. Quod si conuulsio iam superuenerit, & nulla conuenientium medicamentorum ui remittatur, reliquæ fibræ quæ integræ remanserāt, prædi debent. Si enim totus neruus præcisus sit, nullū
2. quidem prætereā (ut Galenus inquit) conuulsionis periculum sequetur, debilis tamen particula manebit. Verum læso quàm mors potius optanda. Hoc pacto quibusdam in priore infernaq; femoris parte, per transversum percussis, reliquum tendinis amputauit Gal. ut tu
3. ta illi esset curatio. Porro si transversa hæc diuisio, tam insigniter alta in musculo facta sit, ut deligatura nihil prodesse possit, non dubitabis musculi distantes inuicē partes (præsertim si uulnus recens fuerit) suturis altioribus cōtrahere, cura tamē semper adhibita, ne ab acuo neruus, uel tendo compungatur. Carnosa nanque ipsa musculorum pars, dum acuo suture, periculo uacat. Nervi uerò, aut tendines, non mediocri periculo consumuntur. Horum quidē omnium Galenus nobis auctor fuit, lib. 3. de compo. medic. secundum genera, ad hunc modum scribens: Contemplatus (inquit) gladiatorem quendam ex his, quos equites nominant, transversam diuisionem in priore ac inferiore femoris parte habentē,
- camq;

Sexto meth.

Ther. 11.

Lib. 3. nota
vltm.

Historia de gladiatore in femore uulnerato.

eamq; satis altam: tum uulneris labrum intuitus, sursum alterum reuulsum, infra alterum, quasi ad patellam detractum, non dubitavi distantes inuicem musculorum partes, futuris contrahere, curatione illa, quæ Græcè ἀπὸ τῆς πλάτης & dicitur, neglecta. Itaque ueritus tendines ipsis consuere, denudatis prius illis, sic altioribus futuris usus sum, haud ignarus carnosam ipsam musculorum partem periculo uacare: tendines uerò non item, quanquam hoc nullum ex præceptoribus facientem uiderim. Has autem futuras in eiusmodi uulnere, ideo non superficietenus, sed altius moliri conuenit, ne quæ in imo sunt, inconglutinata debiscant. Reliqua uerò, quæ ad uulneris curationem attinent, hinc quoque sint eadem, etiam si totus neruus præcisus sit. In solo itaque per transversum accepto uulnere, eodemq; insigniter alto, cum deligatura nihil prodesse potest, ex sola futura curatio absoluitur. Etenim in uulneribus iuxta membri longitudinem factis, deligatura uulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit Galeno. Cæterum futura decenter facta, biduo consutum uulnus fouendum erit rosaceo, in quo lumbrici terrestres prius decocti fuerint, ac supra puluis aliquis qui futuram contineat, aspergendus erit, cui parem ipsorum lumbricorum desiccatorum, & contritorum portionem, si lubet, adijcies. Quidam enim memorie prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, neruisq; diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse, ut libro simp. 1. 1. Gal. refert. Sunt qui et centaurium arefactum & contritum etiam inspergunt: medicamen enim est admodum desiccatorium, mordacitatis expers, quodq; si glutinatorijs, & desiccatorijs miscetur,

Cur futurae altæ esse debent.

Lumbrici in rosaceo decocti.

Centaurium.

miscetur, ulcera maligna, & cacoëthe sanare creditur. Quin & ipsius herbe recentis illitu, magna ulcera glutinantur: uetusta quoque, & quæ ad cicatricem ægrè perducuntur, eodem modo utentibus, cicatrice obducuntur Galeno libro septimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Refert Dioscorides, & quodam in loco Auicennas, quod carnes minutim incisæ coalescunt, si cum centaurio maiori decoquantur. Eidem quoque centaurij minoris radix recens, aut arida ante
 10 tē madefacta, uulnera conglutinat, & coniungit. Sed iam tempestiuum est, ut de nudato neruo dicamus.

Radix centaurij minoris.

Nerui cæsim uulnerati, & nudati curatio.

Nudato neruo, omnis curationis consilium huc tibi dirigendum est, ut minima cum rosione siccet. Proinde si neruus non punctim, sed planè cæsim uulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, adeò ut nudus appareat, nullum iam supra commemoratorum medicamentorum, quæ ex euphorbio, ac si
 20 muliter acribus, emplastri specie fiunt, applicabis. Nudatus namque uehementem ipsorum uim ferre nequit, ita, ut cum interposita cutis erat, tulit. Optimè igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompholygem, ac metallica omnia, resinas quoque, olea, mel, & ceram, quæ eiusmodi medicamentis, nudato neruo ac diuiso, apprimè idoneis, miscenda sunt, elueris: quò scilicet citra rosionem ullam sint siccatura. Quippe medicamētis omnibus (ut Galenus inquit) quæ laueris, acris, mordensq; humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum
 30 erit, calcem æstatis tempore in diebus canicularibus sub sole, aqua salubri & dulcissima sæpius elotam, &

Nudat⁹ neruus uehementē medicamētōrū uim ferre nō potest. Lib. 6. meth. & 9. simplic.

Calx elota cum rosaceo.

*Medicamentū ex
pompholyge.*

*Emplastrum
ex melle.*

*Neruo denuda-
to nihil acre ad
mouendum.*

Lib. 6. meth.

*Nihil frigidum
nudato neruo
ad mouendum.*

Diapalma.

Pastilli.

tam, & exiccatam, plurimo optimoq; rosaceo admix-
tam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum,
quod ē pompholyge (ut dictum est) elota sit: largiore
itidem, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte,
solutum, liquatum ue. Salubre quoque medicamentum
est, & quod ex melle optimo sub emplastri specie cō-
ponitur. Solui uerò & id rosaceo oportet, quod tum re-
liquis conditionibus sit optimum, tum salis omnino ex-
pers, ut scilicet minima cū rostone siccet. Nihil enim
acre (ut diximus) nudato neruo (quæ pars est suapte 10
natura sensu uegetissima) unquam ad mouendum est. Si
uerò robustus sit, qui uulnus accepit, & cui corpus
sit à superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est,
etiam ualentioribus remedijs nonnullis uti, ut pastillis,
seu trochiscis ex Polyida autore, sapa calida solutis, et
in linamentum illitis. Id autem uel imprimis (inquit Ga.,
lenus) semper habendum curæ est, ne quid ex ijs, quæ,
uulnus contingent, frigidum sit. Quandoquidem ipsa,
laborans particula, & sensilis maximè est, & princi.,
pium corporis partium primati nempe cerebro conti- 20
nua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium,
occasione, & ex facili à frigido offenditur, & suam,
offensam cerebro impertit. Ad iam dicti uerò pastilli,
usum propè etiam accedit & medicamenti usus, quod
διὰ χαλκίτης Galeno nominatur, uulgò autem dia-
palma. Hoc ergo medicamine, si trochiscos Polyidæ ad
manum non habemus, uti tutò poterimus. Pastilli au-
tem Polyidæ ex quinto libro de compositionum phar-
macorum miscella sunt requirendi, quorum si copia
non est, Andronis, uel Pasionis, uel etiam Galeni pa- 30
cillus erit sumendus, quorum compositiones libro supe-
riore

riore cap. de carbunculo, descripsimus. Cæterum uulnus eiusmodi oleo perfundendū nō est, præsertim cūm nunc memoratis pastillis curatio suscipitur: nam oleū illorum uiribus aduersatur, & sordidum ulcus reddit. Neque enim parum interest (inquit Galenus) nudo ne neruo oleum, an per interpositā cutē admoueas. Abluēda igitur à uulnere sanies est, molli lana specillo circumuoluta, in sapa tepida intincta, & mox expressa.

Oleum nudato neruo, & uulnerato, nō esse ad-mouendum.

Sanies quibus abluenda.

- Quòd si omnia benè atque ex animi sententia succedant, etiam uino dulci, non acri & mordaci, uulnus commodè poteris madefacere. Eo autem iam penè ad cicatricem ducto, etiam utile fuerit album, tenue, & quod Græci oligophoron uocant. Aquæ uerò usum, ob causam superiùs adductam, sicuti & relaxatis cataplasmata, semper in neruo nudato deuitabis. Blādē etiam ac suauiter uulnus (si necessitas urget) detergebis, unguento ex uermibus factō, uel aliquo alio deterfitorio medicamento, quod recipiat mel probatissimum, terebinthinam, & farinam hordei, aut fabarum: uel alio
- ex ijs, quæ in antidotorio habentur. Nonnulli pro comperto habent, quòd si dissecti nerui capita, seu extremitates, candenti ferro, carne uitata, leuiter attingantur, optimè postea conglutinari. Postquàm autem neruum denudatum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet, ex medicamento (inquit Paulus) quod angustis uulneribus faciat: nempe eo, quod ex euphorbio præparatur, aut fimo columbarum, sed ita, ut etiam sanas partes ampliter comprehendat.

Aqua nudato neruo aduersatur.

Deterfitoriū medicamentum.

Candens ferrū.

De neruorum contusione.

- 30 **N**eruorum contusionem promiscuam cum ecchy-mosi, seu carniū contusione habere generationem,

Neruorum contusio, promiscuā habet cū ecchy-

nisi, tum gene-
rationis tum cu-
rationis ratio-
nem.

Si cum nervo cu-
tis contusa sit.

Si dolor unā cū
contusione in-
fejet.

Si nervus contu-
sus est, cutis uerò
nequaquam.

Si nervus totus
sit præcisus.

tionem, facile nobis insinuat similis utriusque affectus
curatio. Itaque illic & digerentibus, & adstringenti-
bus medicamentis utebamur, hic uerò etiam siccanti-
bus, & adstringentibus nobis utendum est, præsertim
dum cutis unā cum nervo contusa exulcerataq; est. Si
uerò absque cutis simili affectu nervus quidem contusus
est, huic auxilia, quibus euocādi ac digerendi facultas
insit, adferenda sunt. Contuso igitur nervo, si cutis si-
mul contundatur & ulceretur, fabarum lomentum
oxymelite dilutum, aut si magis siccare uoles eruina- 10
farinam cū sapa, & modico aceto illines. Quod si am-
plius adhuc siccare desideras, irim quoque illyricam,
uel eam quam uulgò florentinam uocant, immites. Re-
centiores in hoc affectu per initia rosaceum cum oui
candido liquore admouent, & mitigato dolore labo-
rantē particulam fouent uino tepescāto, quod crassē
sit substantiæ, & adstrictionis particeps. At si unā
cum contusione dolor infestet, picem liquidam cata-
plasmati ē farina fabarum adijcies, & ubi simul bene
decoxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi 20
autē corporis curatio, eadē est cum ea, quā paulò antè
docuimus. Verum si nervus quidem contusus sit, cutis
uerò nihil quod sensui appareat, à natura recesserit,
oleo calente dicussorio, quale anethinum est, & ruta-
ceum, irinum quoque & amaracinum, continuè locum
irrigabis, persundes uē, & lana oleo madefacta foue-
bis, ac totius corporis curā prædictis similē adhibebis.
Porro si nervus totus sit præcisus, metus præterea nul-
lus (ut paulò antè diximus) instat, nullum enim inde pe-
riculum sequi potest: membrū tamen ea parte debile 30
efficietur, præsertim si dissecus nervus insignis magni-
tudinis

tudinis fuerit. Curatio uero eius communis est, cum ea quæ aliorum est ulcerum.

De uulneribus ossium. Cap. XI III.



I RADITA uulnerum carnosæ substantiæ, uenarum, arteriarum, & nervosarum partium curandi ratione, nunc de uulneribus ossium nobis agendum superest. Cæterum tametsi
 1 o omnis continuitatis seu unionis solutio in osse, Galeno sexto methodi medendi & passim alibi, Græcè proprio nomine catagma (quod Latins est fractura) dicatur, recentiores tamen tum medici tum chirurgi, fracturam uocare consueuerunt, solam eâ ossis diuisione, quæ sine incisione, à uolentia quadam, ut ruptura extrinsecus accidente fit, de qua in sequentibus latius dicetur. Vulnus uero ossis appellare solent præcisionem, ense, aut quopiam alio simili incidente, uel in profundum penetrante factam, de qua in præsentiarum di
 2 o cere statuimus. Huiusmodi autem præcisio quandoque (ut nunc loquuntur) est totalis, quandoque partialis. Cæterum cum os ipsum uulnerari non possit, quin caro, & uenæ, & aliæ superiacentes particule etiam uulnerentur, sæpenumero ex ossium uulnere, pessima quædam symptomata exitantur: nempe profusio sanguinis, dolor uehemens, conuulsio & syncope: à quibus & agendorum etiam indicationes sumendæ sunt. Porro cum notæ uulnerum ossium sensu sint satis conspicuæ, his prætermisissis iudiciis seu præsagia subijciemus, quæ
 3 o tam ab ipsis ueteribus, quàm recentioribus, scriptis mandata sunt. Itaque iudicat Galenus libro artis me-

Vulnus ossis.

Ex ossium uulneru praua oboriuntur symptomata.

Iudicia.

*Puerorum ossa
clauia per se
coalescunt.*

*Erysipelas in
ossis nudatio-
ne malum.*

*Nudata ossa à
frigido magno-
pere offendunt.*

*Magnorum ossium
præcisio, cui exi-
tum medullæ peri-
culosa admo-
dum est.*

dicinalis, & rursum tertio & sexto methodi medēdi,
quod ossis soluta semel partium continuitas, nunquam
postea ad amussim et per se instaurari potest: præser-
tim uerò in iuuenibus, & adolescentibus, & uiris, mul-
toq; minus adhuc in senibus. Potest nanq; os illud tan-
tum uitionem per se & sine alterius ope recipere,
atq; in idem ad amussim coalescere, quod abunde mol-
le est, cuiusmodi conspicitur in puerulis. Alterius tamē
ope, ut substantiæ cuiusdam interuentu, ceu glutino
quodam, ossa ipsa quantumuis etiam dura siccaq; sint, 10
concresecunt glutinantur'ue. Vocant autem glutinum
hoc, seu substantiam illam interuententem, cuius bene-
ficio separatæ ossis partiæ secum agglutinantur
colliganturq;, Græco uocabulo *poron* sarcoidem, id
est, callum carnosum. Huius prognostici ratio superius
adducta est, ubi de iudicijs uulnerum in uniuersum age-
batur. Hippocratis oraculum est libro septimo Apho-
rismorum, casum prauum esse, osse nudato, carnem cir-
cunstentem uideri ab Erysipelate apprehensam. In
ossis (inquit) exutione, hoc est, nudatione, erysipelas, 20
malum. Sed hic casus (ut Galenus ait in commentario)
ossibus ita patientibus rarò superuenit. Adhæc, frigi-
dum nudatis ossibus, eiusdem Hippocratis testimonio,
est infestissimū: partes enim sunt exangues ac natura
sua frigidiores. Quæcunque autem tales in animali-
bus partes sunt, citius ac magis à frigido offenduntur,
ut libro quinto Aphorismorum Galenus annotauit, cō-
mentario decimo octauo. Si magna ossa, ueluti est os,
quod propriè brachium, & humerus dicitur, uulgò au-
tem os adiutorij: & utrunque focile, siue os tibiæ, 30
maius inquam & minus (illud eneme, hoc perone Græ-
cis dici-

cis dicitur) tota præcisa sint, adeò ut medulla egredia-
tur, uulnus tale periculosum admodum est, & magna
ex parte membrum, quod ita præcisum est, emoritur.
In tam insigni nanque incisione, nerui, uenæ, & arte-
riæ maiores, quæ uitam, sensum, atque alimentum par-
ticulæ tam sic affectæ prius ministrabant, omnino præ-
scinduntur. Quanquàm non defuerint aliqui, qui Au-
cennam perperam intelligentes, ausi sint oppositū pla-
nè asserere. Inquit autem ad hunc modum Auicennas: lib. 4.

1^o Et quod dicitur de incisione medullæ, quòd interficit,
2^o est intentio, in qua nulla est utilitas: habet enim me-
3^o dulla lenitatē, & uiscositatem, & non inciditur. Quod
dictum sic accipiendum est: quòd nullus unquàm inte-
riit ob præcisionem medullæ osium, quanquàm mem-
brum sic percussum tandem contabescat, & emoria-
tur: ob eam scilicet, quàm nuper adduximus causam.
Cum uerò dicit, medullam non incidi, hoc intelligen-
dum, cum os frangitur, non autem cum totum excin-
ditur. Quis enim addubitat, cum os totum præscindi-

2^o tur, & medullam quoque simul excindi posse? Cete-
rùm summoperè cauendum est, ne aliquid ossis uulne-
rati subito, ac magna ui extrahatur. Nam si ita fit,
uix à fistula, conuulsione, delirio, & febre, laborans tu-
tus erit, ut Auicennas nos commonuit lib. 4. sue medi-
cinæ. Proinde satius est, extrahenda ad tempus relin-
quere, & medicamento aliquo attractoriam faculta-
tem habente, naturam adiuuare, quàm sic ea subito, &
magna uiolentia eximere, ut suprà etiam monuimus,
cum de telis è corpore extrahendis ageremus.

Ossis vulnerati
fistula, nec su-
bito, nec magna
ui euellenda.

Curatio uulneratorum ossium.

Quatuor scopi
in curatione uul-
neris ossium ob-
seruandi.

IN curandis ossium uulneribus, sicuti & in fracturis, atque aliarum partium soluta continuitate, finis, seu scopus saltem primus, ac generalis, unus est, nempe unitio. Quod si is per affectarum partium siccitatem (ut paulò antè diximus) perfici nō possit, restat alter, ut alterius scilicet cuiusdam interuentu dissidentes ossis uulnerati partes glutinentur. Vt autem finem hunc secundum possis assequi, quatuor alij scopi tibi proponuntur obseruandi, suo ordine exequēdi. Primus est, 10 ut ijs quæ infixæ sunt, & ossium frustulis (si quæ sint) exemptis, partes inuicem distantes, in unum adducantur, & ut commissæ iam seu coniunctæ maneant, uulnus in carne acceptum, futuris altioribus, ac ualidioribus contrahendum est. Secundus est, ut præsidia, quibus huic affectui ritè mederi possis, prudenter deligas. Tertius, ut deligaturæ modus decens adhibeatur: nempe talis, ut commodè uulnus tractari ac curari possit, citra omnimodam eius ipsius deligaturæ remissionem, & ademptionem. Quartus, ut postquàm 20 à phlegmone iam tutæ esse uidebitur laborans particula, uictus p̄oro gignendo aptissimus instituat. Cæterum quomodò primus scopus attingi possit, iam in sermone uniuersali de uulneribus superius dictum est. Quod autem eiusmodi suture in carnosissimis partibus factæ, in proposito affectu sint ex usu, hinc manifestum euadit, quoniam dissociatas uulneris partes, in unum adducunt, adductas uerò, coniunctasq; haud amplius dissidere patiuntur, ac præter hæc, partis substantiam tuentur. Vices enim deligaturæ, & ferularum 30 tenent, prohibentq; ne circumfluus aër plagam temere sub-

re subintret, et os ipsum alteret, ipsiq; noxam inferat, quod magnoperè uitandum est. Atque hæc omnia in proposito casu sunt utilissima. Permittendum igitur, ut uulnus mox carne impleatur, atque caro ipsa medicamentis exiccatoria facultate præditis, ita obduranda est, ut tandem callosa fiat, & porus gignatur. Itaque si aliquid ex ipsius ossis substantia deperierit, eiusmodi cavitās ad unguem impleri non potest, sed insana-

- bilis remanebit, ut libro tertio methodi medendi Gale-
 1. nus nobis est autor. Secundum autem scopū hoc mo- Secundus scopus.
 do assequeris. Sutura decenter facta, turundam in lo-
 cum uulneris decliuorem imposito, ut per hoc emissaria
 ossis frustula (si adsint) uel sanies, aut purulenta
 colluuiēs, educi et expurgari possint. Sed & puluerem
 futurarū (ut uocant) cōseruatiuum, superponito, quem
 primis diebus cū oui candido liquore remiscebis. Postea
 eā uerò agglutinatorium cōmune ex puluere illo, quo
 omnes passim utuntur, terebinthinæ permixtum, ita
 ut in unum corpus cōeant, superaccommodato, uel ali-
 2. quod aliud simile, ex ijs quæ incarnatiua uocāt, prout
 res expostulabit. Ergo turundulā melle rosaceo, quod
 puluerē glutinatoriū ex myrrha exceperit, illitā in-
 dito. Myrrha enim Auicēnæ, carne nudata ossa uestit, Myrrha.
 & operit. Itaque si os exutum nudatum ue appareat,
 prædicto puluere, & linamentis ex optimis pannorum
 lacijs confectis, ipsum operito, munitū ue. Deinde
 emplastrum, uel stupas, aut pannos lineos uino calente
 delibutos, superapplicato. Cæterum tertius scopus Tertius scopus.
 in curando ossium uulnere propositus, ita absoluetur. pus.
 3. Cum os totum præcisum est, facta imprimis (ut dictum
 est) sutura, totum membrum, ut Razes præcepit, exce-

Religatur mo-
dus in uulnera-
to offe.

pro uulnere, duplici panno obuoluito. Pannos autem
eiusmodi, primis quidem diebus oui albore, sequētibz
uero, uino calido, tum austero, tum nigro, imbuito. Et
fascia longa ac lata iuxta membri magnitudinem &
figuram deligato. Ea enim longitudine & latitudine
fascia ipsa esse debet, quam uulneratę partis confor-
matio desiderat. Vt autem conueniens sit eiusmodi de-
ligatura, eius principium iuxta finem laborantis par-
ticulę incipiat. Ab hinc facta ad superiorem partem
circunuolutione, ubi prope uulnus uentū erit, fasciam 10
ex aduerso plagę circunducito, atque eam uersus cor-
pus non comprehenso uulnere, quousque satis erit, di-
spensato. Mox fasciam uertendo, eam supernę deor-
sum ducito. Atque ubi iam ad locum uulneris eam de-
duxeris, in partem uulneri oppositam, supra priorem
aliā circunuolutionem, circunducluz inijcito, eosq;
ita dispensato, ut ibi unde initium accepit deligatura
terminetur, & uulnus minimę coopertum remaneat.
Porro, fascię sic reuolutę extrema acui ibidem erunt
assuenda. Deindę ferulę duę uel tres (si uulnus in ar- 20
tubus acceptum est) laues ac politę, membri læsi figu-
rę, ac magnitudini accommodę inijcientur, quę læsam
partem ita fulcient, ut uulnus minimę contegant. Has
autem fasciā deligabis, nec prius solues, quā uulnus
percuratum fuerit: nisi tamen dolor, uel eo loci excita-
tus pruritus, aut inflammatio nos ad id compellat.
Quibus quidem symptomatis modo, quo in sermone
uniuersali diximus, succurrendum erit. Vulnus uerō
extrinsecus stupis contegendum est, & fasciā deligan-
dum, quę singulis curationibus solui debebunt, cū 30
alię supradictę fascię maneant: deindę uulnus deter-
geri,

> geri, exicari, & more aliorum ulcerum curari debe-
 > bit. Quod autem (inquit Galenus) neotericis inuentum
 > est glossocomion, quo maxime tempore gignendi calli
 > utimur, laudandum id quidem, quantum aliud quiduis
 > eiusmodi machinarum, ducimus. Porro quod ad quartam ^{Quartus sco-}
 intentionem attinet, quo tempore callus gignitur, nu- ^{pus.}
 triendum corpus est, cibus boni succi, & qui multum nu-
 triant, ex quibus prouenire succus soleat, non solum bo-
 nus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maxime ex-
 10 pedit: de quo plura in sermone de fracturis. De duritie ^{Lib. 6.}
 autem, quæ diuortium continui sequitur in fractura, quæ
 Græci catagma uocant, fusus etiam alibi dicitur.

FINIS SECVNDI LIBRI.

GENERALIS DIVISIO

VLCERVM, IN LIBRVM

TERTIVM CHIRVRGICARVM

20

Institutionum Ioan. Ta-

gaultij Medici.

Vlcus.

1 Simplex,

{ Id est, cui nec ullus affe-
 ctus alius, nec symptoma
 ullum coniungitur.

2 Compositum,

{ Seu cum alio effectu,
 aut symptomate com-
 plexum.

30 1 Vlcus simplicis, ac solum consistentis
 differentia.

Veræ,

Hoc est, à natura
 Veræ, ac propriæ, } ulceris acceptæ.
 Extrinsecus accedentes, } Et nō à substantia
 rei desumptæ.

Ulcus differentię ueræ ac maximè propriæ, atque à substantia rei acceptæ, sumuntur.

A figura ipsius ulceris.
 Ab ipsis dimensionibus, } Hoc est, à diuisionis
 magnitudine, spacio
 seu quantitate, &c.

Ulcus differentię à figura.

Ulcus rectum.

Ulcus obliquum.

Ulcus pampini modo retortum.

Ulcus hami ritu uncum.

Ulcus differentię à magnitudine, & spacio ipsius diuisionis.

Ulcus magnum. } Longitudo, & latitudo. 20
 Ulcus paruum. }

Ulcus in summo residens. } Altitudo. 17
 Ulcus profundum. }

Ulcus æquale. } Differentię sunt etiam in
 Ulcus inæquale. } alto.

Ulcus magnum, & profundum. — Longitudo, & altitudo.

Sub magno comprehenditur longum, & latum : sub paruo, & breue & angustum. Quæ differentię sunt

sunt à dimensionibus sumptæ.

Vlceris simplicis differentię extrinsecūs accedentes, & non à substantia rei, hoc est, à natura ipsius ulceris, acceptæ, sumuntur.

A tempore.

A parte affecta.

A situ, seu loco in parte affecta.

Vlceris differentię à tempore.

Vlcus recens.

10 Vlcus inueteratum.

Vlceris differentię à parte affecta.

Similari.

Organica.

Vlceris differentię à parte similari affecta.

Vlcus in cute.

Vlcus in carne.

Vlcus in arteria.

Vlcus in uena, &c.

Vlceris differentię à parte organica affecta.

20 Vlcus auris.

Vlcus narium.

Vlcus oculorum.

Vlcus oris.

Vlcus faucium.

Vlcus pulmonum, &c.

Vlceris differentię à situ in parte affecta.

Vlcus in conspectu.

Vlcus sub cute conditum, & non apparens.

Vlcus in principio, in fine, uel medio musculi.

30 Vlcus in supernis partibus.

Vlcus in infernis partibus.

Que à generationis modo, & ratione sumuntur differentię, magis ad uulnus pertinent, quàm ad ulcus.

Vlcus

Vlcus secundum longitudinem.

Vlcus secundum latitudinem.

Vlcus secundum transuerfum.

Non sunt propria differētia, sed uerius cōplicati affectus.

2 Vlcus compositi differētiæ sumuntur, à complexu ipsius.

Cum symptōmate.

Cum morbo.

Cum sua causa.

Cum sua causa, & morbo.

Cum sua causa, morbo, & parte affecta.

10

Vlcus differētiæ à cōplexu cum symptō-

Vlcus crucians.

mate.

Vlcus dolore uacans.

Vlcus purum.

Vlcus sordidum.

Vlcus saniosum.

Vlcus cruentum.

Vlcus differētiæ à complexu cū morbo.

Vlcus dyscratum, id est, cum intemperie.

Vlcus phlegmonosum.

Vlcus erysipelatosum.

Vlcus gangrænosum.

Vlcus cancerosum.

Vlcus putridum.

Vlcus cauum.

Vlcus supercrescens.

Vlcus phagedænicum.

Vlcus complexus cum sua causa.

Vlcus spontaneum.

Vlcus ab animali uenenofo.

Vlcus à simiæ morfu.

20

30

Vlcus ab

Vlcus ab hominis morfu, &c.

Vlceris complexus cū ſua cauſa, & morbo.

Vlcus cacochymū, id eſt, uitioſo ſucco obſeſſum.

Vlcus cacoëthes, id eſt, malignum.

Vlcus rheumaticum, id eſt, fluxione uexatum.

Vlcus arroſum.

Vlcus ſinuofum.

Vlcus ab atra bile.

10 *Vlceris differentię à complexu cū ſua cauſa, morbo, & parte affecta.*

Eroſio. Caries.

Eſthiomenus.

Sphacelus.

Dyſenteria.

INSTITUTIONVM

CHIRVrgICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER TERTIVS,

20

De Vlceribus in uniuerſum.

Quid ſit ulcus uulgò apud Chirurgoſ, & eiꝯ
diffinitionis interpretatio. Cap. I.



30

DIXIMVS LIBRO SUPERIO
re, de cruentis uulneribus, ſeu de ea
continui ſolutione, quæ in carnoſa
parte ex uulnerando recens facta eſt
ac relictæ. Nunc tranſeundum ad id
unionis etiamnum in carnoſa ac molli ſubſtantia fa-
ctum diuortium, quod nec recens eſt, nec cruentum,
ſed iam

sed iam inueteratum, & in quo una, uel plures consistunt dispositiones, quæ unionem uel consolidationem remorantur, atque impediunt, ex quibus saniosa, & purulenta quædam colluies, putredôq; excitatur. Vocant autem uulgares medici, & chirurgi, tale unionis diuortium, seu continui solutionem, communiter ulcus. Quinquàm uulnus, et ulcus, ferè passim apud probatos autores pro re eadem sumantur: nempe pro dissolutione unionis in parte carnosâ: Quæ siue recens sit, siue antiqua (quatenus saltem solutio tantum unitatis est) eandem sanationem (ut Galenus ait) semper desiderat. Cuius utique propositus finis unus est, nempe unitio, uel agglutinatio, uel coitio, uel continuatio, quæ eadem sunt. Itaque discrimen quod à tempore sumitur, nihil planè proprium indicat Galeno: nam recens (inquit) uetus uel ulcus nihil indicat. Quinquàm indicare uidetur nonnullis, sed hi seipsos fallunt. Non abs re tamen factum putauimus, si recentium ac uulgarium medicæ ac chirurgicæ familiæ, scriptorum morem iam ab omnibus receptum secuti, discrimen inter uulnus, (quam & plagam uocant) & ulcus posuerimus. Vlcus quidem cum ipsis appellantes continui solutionem in substantia carnosâ & molli, in qua una uel plures consistunt dispositiones, unionem, seu agglutinationem fieri impediens, ex quibus sanies, & purulenta quædam colluies ac putrilago excitatur. Apud interpretem autem Auicennæ, ulcus ita breuiter definitur: Solutio continuitatis in carne, quando iam continet saniem & pus, nominatur ulcus. Cæterum in hac ulceris definitione, solutio continuitatis, locum generis obtinet, cuius species libro superiore de uulneribus abundè

Vlcus quid uocetur chirurgi uulgaribus.

Vulneris, seu ulceris finis.

Vlceris definitio.

Vlcus quid Auicenna.

Definitionis ulceris examinatio.

- bus abundè recensuimus. Reliquæ uerò definitionis particulæ pro differentia appositæ sunt. In substantia quidem carnosa, siue in carnosiss, & mollibus particulis, ad discrimen corruptionis ossium, quæ propriè ulcus non est, sed caries, & corruptela, quæ teredon Græcè dicitur. Quæ autem subnectuntur, ad differentiâ uulnorum addita sunt. V ulnus enim recēs, & cruentum, quatenus saltem uulnus est, & quantum nominis ratio indicat, solutio est continui, simplex ac per se
- 1° consistens, hoc est, nulli alteri affectui, aut præcedenti, aut sequenti coniuncta, qui eius curationem, nempe agglutinationem (quam solam desiderat) remoretur, & impediat. Vlceris uerò nomine, communiter in chirurgia, eam unionis, seu continui dissolutionem statim inaudimus, quæ nō simplex sit, ut uulnus, sed quæ alijs dispositionibus, eius curationem impedirentibus, seorsumq; ac per se nonnunquam consistere ualentibus, cōplexa semper atque annexa reperiatur, ut in differentiarum enumeratione clariùs innotescet. Quò fit, ut
 - 2° uulnus generaliter, si ad ulcus conferatur, simplicis ac minime compositi affectus rationem obtineat: ulcus uerò (quo de hic agimus) compositus semper affectus intelligatur. Non imus tamen inficias, quin & uulnera poprijs quibusdam dispositionibus, quæ necessariò illis accidunt, complicari possint: ut uerbi gratia, magnitudini & paruitati, rectitudini et obliquitati, æqualitati & inæqualitati, profunditati & residentie in summo, & ita de alijs, quæ uulnorum discrimina, siue differentias constituunt: generalem tamen uulnorum,
 - 3° quatenus uulnera sunt, curationem parùm aut nihil euariant, ut suprà in tractatu de uulneribus diximus.

*Vlceris nomine
quid intelligat
in chirurgia.*

Vlcus quo à uulnere differat.

Itaque

*Vulneris atque
ulceris propriæ
differentiæ.*

Itaque uulnus magnum & paruum, rectum & obli-
quum, æquale & inæquale, in summo residens & in
profundo penetrans, longum item & breue, recens &
inueteratum, ueræ ac propriæ sunt simplicis soliusq;
uulneris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, dif-
ferentiæ: sicuti etiam & ulceris, quod solum consti-
tuit, ut in sequenti capite dicemus. Porro in diffini-
tione ulceris ex Auicenna superius adducta, per sa-
niem & putredinem, sordities, squammæ, & crustæ
(quas Græci escharas uocant) etiam inaudiuntur, quæ 10
in ipsis ulceribus contingere possunt. Itaque Auicen-
nas, & qui cum secuti sunt, uulnus & plagam uo-
cant, ubi nōdum est pus: ulcus uerò, ubi iam pus adest.
In qua sententia fuisse quoq; uidetur Cor. Celsus, Lati-
nus ferè Hippocrates, libro quinto suæ medicinæ, ubi
recentem & cruētam adhuc plagam, uulnus appellat:
ulcus uerò, cum iam uetustas occupauit, siue extrinse-
cūs quidem per uulnera inciderit, siue intrinsecūs cor-
rupta aliqua corporum parte nascatur. Quid autem
sit sanies, quid pus, quid sordes, postea dicetur. 20

De differentijs ulcerum, & à quibus su-
mantur. Cap. II.

*Ulcus differe-
ntiæ inde su-
mantur*



ULCERVM differentiæ sumuntur quibus-
dam à tribus potissimùm, nempe à causis
ea excitantibus, membris, & accidentibus,
seu dispositionibus cum eis complicatis. Alij uerò bre-
uitati studentes, eas à duobus duntaxat desumunt, ut-
pote à causis, & symptomatis, atque etiam affectibus 30
ipsis, quibus complicantur: ea quidem, quæ à membris
siue

siue laborantibus particulis sumuntur discrimina, omnino prætereuntes: quippe quæ ad particularem, non autem ad uniuersalem de ulceribus tractationem pertineant. Adde, quod & in tractatu de fistula, id est, sinu, qui occalluit, de ijs obiter agetur. Dicemus tamen hic & de ijs nonnihil. Differentiæ, quæ à causis sumuntur, saltem cōmuniore, & magis propriæ hæc, cōmuniter solent à chirurgis assignari: ulcus uirulentum, & corrosiuum, siue comedens: ulcus sordidum, rhypha-

Ulcus differe-
rentia à causis.

10 rōn Græci uocant: & putridum, siue putrefactū, quod Græci serpedōna appellant: ulcus cauernosum, ulcus profundum, ulcus fistulosum, ulcus cancerosum. Differentiæ autem, quæ ab accidentibus, siue symptomatis, & affectibus, quibus ipsa ulcera complicantur, ferè communes, atque æquiuocæ sunt, & ipsis uulneribus: primò tamen, & magis propriè (ut recentibus placet chirurgis) de ulceribus, quàm de uulneribus dicuntur. Hæ autem sunt, ulcus cum intemperie, quod Græcè discratum uocant: ulcus crucians, siue dolorosum: ul-

20 cus cum tumore aliquo præter naturam, quod apostematosum nominant: ulcus contusum, ulcus supercreascent, cū carne molli, & superflua, ὑπερσάρκην Græci appellant, Auicennæ interpres carnem additam siue per uulnera: ulcus durum simul & tenebrosum, ulcus cancerosum & gangrænosum, ulcus cauium, ulcus cariolum, id est, cum ossē corrupto: ulcus cū uaricibus, ulcus cacoëthes, id est, malignū, & agrè sanabile, atque id genus alia. Cæterum multæ ex suprâ commemoratis differentiis, ueræ ulcerum differentiæ non cō-

Differentiæ ulcerum ab affectibus quibus complicantur.

Affectus cū ulcere complicati.

30 sentur Galeno, sed aliorum affectuum cum ulcere complexiones, cuiusmodi sunt ulcus cancerosum, gangrænosum,

nosum, supererescens, putrefactum, cauum: & cum tu-
more aliquo, ut ulcus pblegmonodes, erysipelatodes.
Putredo nanque, gangræna, pblegmone, erysipelas, can-
cer, & reliqua id genus, ex morborum sunt genere:
nempe affectus præter naturam, actionem vitiantes,
qui seorsum ac per se consistere possunt. Quod enim
consistere seorsum & per se potest, id nullius unquam
(inquit Galenus) alterius fuerit differentia. Est igitur
hoc tibi ueluti præceptio ac regula, qua discerne-
re liceat, differentia ne alicuius affectus aliquid sit,
an alterius affectus complexum. Sed & alio rursus
modo ulcus crucians siue dolorosum, & ulcus sordi-
dum, seu quædam ulceris differentia dicuntur, cum ta-
men ueræ aut propriæ differentia non sint, sed comple-
xus potius symptomatis cum ulcere: dolor nanque
& sordes ex symptomatum sunt genere. Pari mo-
do & cum dicitur cacochymon ulcus, id est, uitioso suc-
co obsecsum, aut fluxione uexatum, quod rheumaticum
Græcè Galeno dicitur, aut arrosum, id est, quod ex-
ditur, causa cum affectu copulatur. Talia igitur multa
pro differentiis ulcerum chirurgis & medicis uulga-
rijs usurpantur, quæ re uera differentia non sunt, sal-
tem apud Galenum, sed alterius dispositionis compli-
cationes seu affectus compositi. Simplicis igitur soliusque
ulceris differentia ueræ ac propriæ, ab ipsa ulceris
natura sumuntur. Ulcus autem simplex hic cum Ga-
leno appellamus, quod solum consistit, id est, cui nec ul-
lus affectus alius, nec symptoma ullum coniungitur.
Simplex igitur non erit, si quæ exulcerata est parti-
cula, uel fluxione uexetur, uel malo succo uitiosa sit,
uel omnino extra naturalem temperiem fuerit, uel ulla
cauitas

Vlceris comple-
xus cum sympto-
mate.

Vlceris comple-
xus cum sua cau-
sa, ex morbo.

Verg ac proprie
ulceris differen-
tia, unde suman-
tur.

cauitas adfit, uel si aliqua cutis amissio contigerit. Itaque differentia, quae ab ipsa ulceris natura sumuntur, uel maxime propriae sunt, & à substantia rei acceptae, uel extrinsecus accedentes. A substantia rei capiuntur, quae à figura, & à diuisionis magnitudine seu quantitate ac dimensione, siue spacio ducuntur. A figura, ut ulcus rectum, ulcus obliquum, ulcus circulare siue rotundum, ulcus retortum, ulcus uncum. A diuisionis magnitudine, siue quantitate, ut ulcus magnum, ulcus paruum. Ex dimensionibus siue spacijs, ut ulcus longum, ulcus breue, ulcus latum, ulcus angustum, ulcus sublime, siue superficiale, id est, in summo residens, ulcus profundum, ulcus aequale, ulcus inaequale. Extrinsecus uero accedentes ulcerum differentiae sumuntur à tempore, & à generationis ratione: item ex eo quod totum ulcus, pars uel ulceris conspectum fugit, uel conspiciendum se praebet, hoc est, à situ in parte affecta. A tempore quidem, ut ulcus recens, ulcus inueteratum. Ex generationis ratione, ut ulcus incisum, ulcus disruptum, ulcus partim incisum partim disruptum. A situ in parte affecta, ut ulcus in conspectu siue euidenter apparens, ulcus intus conditum siue non apparens, idque in toto, uel in parte: item ulcus in principio musculi, ulcus in fine musculi, ulcus in medio musculi. Ceterum quae ex loco affecto sumuntur ulcerum differentiae, (si tamen differentiae censendae sunt) non utique, ut Galenus inquit, à propria ipsorum natura, ut praecedentes, desumuntur. Loci autem in quibus consistunt ulcera, sunt partes similes, & organicae. Igitur si à locis, in quibus est ulcus, differentias censeas, hoc modo fiet diuisio ulceris à loco affecto: ulcus in parte simili, ulcus

Vlcerum differentia maxime propria.

Figura.

Quantitas.

Dimensio.

Vlcerum differentiae extrinsecus accedentes.

Tempus.

Modus & ratio generationis.

Situs.

Locus affectus.

in parte organica, siue instrumentaria. Rursus ulceris differētiās à parte similiari affecta, hoc pacto diuides: ulcus in uena, ulcus in arteria, ulcus in cute, ulcus in musculo. Censetur enim musculus, & pars similis, saltem ad sensum. Differentiæ uerò à parte organica affecta eiusmodi sunt, ulcus auris, ulcus in faucibus, ulcus in aspera arteria, ulcus pulmonis, ulcus pectoris, ulcus in pene, ulcus in sede, & sic discurrendo per singulas corporis partes, quas instrumentarias uocamus. Atque hæc completa, & absoluta est simplicis soliusq; 10 ulceris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, in suas differētiās diuisio, quæ à propria ipsius natura sumitur. Quod si affectus aliquis, seu dispositio, quæ seorsum (ut diximus) & per se consistere possit, ut phlegmone, gangræna, putredo, ulceri adiungatur, ab eo (ut suprà diximus) sumi non possunt ulceris differētiæ, saltē ueræ & propriæ dictæ. Verū enim uerò quoniam ab ipso etiam Galeno locis sexcentis dictum est, non oportere de nominibus contendere, si quis putrescens ulcus, & quod exeditur, & quod gangræna, & 20 quod erysipellate affligitur, & cancerosum, & sinuosum, & cariosum, & cacoëthes, & dolens & indolēs, atque id genus alia, ulcerum differētiās nominauerit, non erit cum eo contendendum, modò rectam illis curationem adhibeat. Vocabunturq; ulcerum differētiæ, sumptæ ab eo cum quo complicantur: nēpè differētiæ à complexu cum morbo, differētiæ à complexu cum symptōmate, differētiæ à complexu cum sua causa, & si quæ sint aliæ.

Non esse de nominibus contendendum.

De causis ulcerum. Cap. III.



VLCERV M causas in uniuersum geminas
 tantum chirurgorum posteritas statuit, nē
 pē antecedentes seu pæcedentes, quæ Græ
 cis πρὸν γὰρ μέναι dicuntur: & continētes siue coniun
 ctas, quæ συνεκτικὰ Græcè appellantur. Procatar=
 ticas nanque, hoc est, pægressas & euidentes seu pri
 mitiuas illis minimè tribuunt: quippe quæ dum car=
 10 nem incidunt, disrumpunt, aut laniant, aut quouis alio
 modo continui solutionem in ea efficiunt, nequaquam
 primo statim occurso saniem aut pus, aut sorditiem
 (quæ necessariò ulcera comitari arbitrantur) creare,
 aut excitare possunt. Quanguàm consequio quodam
 id præstare ualeant, nempe corporeas, atque antecede
 tes causas commouendo. Itaque ulcerum antecedentes
 causæ sunt, cacochymia, id est, succorum uitium, cū
 scilicet sola qualitate peccant humores, non etiam
 quantitate, atque eorundem prauorum succorum, siue
 20 humorum in corpore existentium nimis exuperant co
 pia, qui corporis ipsius particulas arrodere, & tandē
 corrūpere possint. Porro eiusmodi succorū prauitas,
 aut ex deprauata uictus ratione generatur, aut totius
 corporis, uel alicuius notæ mēbri, ut hepatis, aut lienis,
 uitio contingit, uti plerisque locis Galenus nobis te
 statum reliquit. Causæ uerò continentes, siue coniun
 ctæ, ulcerum dicuntur intemperies illæ, quæ malitias
 complexionū uocant, in uulneratas particulas ex cau
 sis πρὸν γὰρ μέναι siue antecedentibus modò dictis, uel
 30 etiam ex ipsis uulneribus, aut abscessibus, alijs'ue præ
 ter naturā tumoribus, (sed malignis præsertim) ruptis
 CC iij & apertis,

Vlcenum cause
 antecedentes.

Cause ulcerum
 continentes.

Tres modi ægrè
sanabiliū ulcerū

et apertis, excitatæ. Quemadmodum enim ex herpete, tum miliari, qui Græcis cenchrias dicitur: tum etiā esthiomeno, id est, exedente, qui ex bile fit crassiore et acriore, ulcus corrosiuum siue exrodens generatur: ita ex anthrace seu carbunculo præsertim uenenoso (quod ulcus est escharosum) rhyparum, id est, sordidū, et ex abscessibus profundum, et concauum, siue cauernosum procreatur. Itaque tres hi ægrè sanabiliū, rebelliumq; ulcerum modi uidentur. Primus, qui ex intemperie subiectæ carnis prouenit. Secundus, qui ex uitio con- 10 fluentis fit sanguinis. Et tertius, qui ex mensura, seu copia, uel quantitate confluētis nascitur, ut libro quarto methodi medendi Galen. annotauit. Qui et aliter ibidem diuisionem posse fieri tradit: nempe ægrè sanabilem rebelliumq; ulcerum, alia propter ulceratæ carnis intemperiem, alia ob confluentem humorem talia fieri. Tum intemperiem rursus ipsam bifariam diduci, cum aliās in qualitate sola naturæ modum egressa, subdita caro sit, aliās etiam cum accessorio quopiam tumore. Iam ipsum confluxum bipartitò etiam scindi: 20 nempe in confluentis succi, tum qualitatem, tum quantitatem. Quatuor igitur erunt in uniuersum, contumacium, et ægrè sanabilem ulcerum modi: nempe sola subiectæ carnis intemperies, quam et dyscrasiam uocant: intemperies cum accessorio tumore, humor influens, aut uitiosus, aut multus. Humor nanque qui copiosior in partem ulcere laborātem influit, (tametsi uitiosus nō sit) sanationem ulcers (quod in eo excrementa creet) moratur, atq; in longū tēpus protrahit. Cæterum quintum modum adiecisse uidetur Gal. in com- 30 mentario huius aphorismi Hippocratis: Vlcera quæcunque

Hippocrates.

1. cunque annua sunt, &c. nempe passionem ossis corrupti in loco ulcerato. Vbi enim caro, quæ ossi superiacet, patienti, adhibitis (ut oportebat) idoneis medicamentis, exiccata contraxerit cicatricem, statim quidem integra sanitas restituta uidetur. Rursus uerò paulatim aliqua influente sanie ex osse corrupto, in parte penitior iterum aduenit inflammatio, & puris generatio consequitur, à quo cicatrix eroditur, caro uerò exulceratur. Subdit autem Gal. loco nuper ex 4. lib. Therap.
2. methodi citato, interim dictorum affectuum siue dispositionum, aut aliquos, aut etiam pariter omnes misceri, atque ita multas, ac diuersas ulcerum differentias iam supra commemoratas enasci. Porro tradenda est medendi methodus, non omnium simul, sed cuiusque seorsum, quod in sequentibus faciemus, à simplicioribus quidem exordium sumentes, ut eorum curatione tradita, compositorum sanationis methodus facilius ac melius intelligatur. Cæterum quoniam passim, cum de ulceribus tractamus, uoces hæc, sanies, pus, uirus, sordes, &c.
3. id genus alia, nobis occurrunt, non abs re factum putabimus, si hoc loco quid apud chirurgos & medicos significent, quoque inter se conueniant & dissideant, paucis aperiamus. Sanies proprie Latinis is tenuis humor est, qui Græcis ἰχὼρ dicitur, qualis exit ex ulnere nec recenti, nec iam sanescente, sed inter utrumque tempus. Quibusdam ichor sanguinis sanies interpretatur. Saniei due sunt species apud Celsum, Græcis distinctæ nominibus, quarum una ἰχὼρ, altera μελίκηρ ἢ ἰχὼρ nominatur. Ichor tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi neruo læso inflammatio secuta est. Meliceria crassior & glutinosior, subalbida, mel-

Sanies quid.

Saniei species
due Cel.

In aliquibus
exemplaribus nō
ἰχὼρ legitur, sed
ὑδρῶν.
Meliceria.

Sanies vulgò,
pro pure male
usurpatur.

Virus.

Sordes.

Sanies.

ἰχμῶρ.

Puris gene-
ratio.

liq; albo subsimilis fertur. Hæc quoque ex malis ulceribus, ubi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca maximè ex genibus profluunt. Apud recentiores autem, & plebeios istos medicos ac chirurgos, (quibus nusquam ferè ullius uocis proprietas, & quæ rei naturæ conueniens sit, seruat) sanies communiter pro eo quod Latini appositè pus uocant, usurpatur. Genus tamen interdum sanem etiam faciunt, ad sordem, uirus, seu uirulentiam, & purulentam colluuiem, quam Græci πύον, Romani pus uocant. Nomine enim saniei, latius sumpto uocabulo, omnem humiditatem præter naturam alteratam intelligunt. Itaque si tenuis sit humor, qui exit ab ulcere, uirus seu uirulencia, si crassior, sordes: si uerò mediocris, generis appellatione, illis sanies nuncupatur. Et hæc quidè in ulceribus (ut aiunt) copiosa, in cauis uulneribus pauca, reperitur. Est igitur sanies propriè uulgaribus medicis, et chirurgis, idem quod pus Latinis, & πύον Græcis: Celsus uerò genus est, duas sub se (ut modò diximus) species continens, Græcis distinctas nominibus, quarum una ἰχμῶρ, altera πυλινγία dicitur. At Latinis Galeni interpretibus, ubi passim Græcè ἰχμῶρ scribitur, sanies uertitur. Cæterum, quod πύον Græcis, & Latinis pus propriè nominatur, ex sanguine uel carne contusa ortum habet. In eius autem generatione, semimala quædam, ut quisquam dixerit, sit transmutatio, siue alteratio. Et enim cum tres in animalium corpore fiant alterationes, ut libro quinto simplicium Galenus docuit, unà planè secundum naturam est, cum uidelicet cibus in uentre coquitur, aut in uisceribus, uasis, et qui inibi generatur succus, unde rursus pars unaquæque nutriatur.

Alterat

Altera contrā planē prāter naturam, nempe in putrescentibus omnibus. Atq; hæc quodāmodō inuicem sibi cōtrariæ sunt. Tertia ex utraq; mixta, & media est, partim secundum naturā existens, partim prāter naturā. Itaque transmutatio seu alteratio, quæ pus generat, mediū inter optimam (quæ nutritio est partiū animalis) & simpliciter malam (quæ cū putrefactione fit olida) locum obtinet. Neq; enim à solo calore prāter naturam, neque à solo calore ingenito & secundum

1^o naturam planē uincente, fit suppuratio seu puris generatio, sed mixtus quodāmodō ex utrisque est calor inflammationis: quæ dum ad suppurationē connectitur, dolores extēta simul ac calefacta, & prāter naturam inflammata particula, & febres principio, id est, corde concalefacto, excitantur. Atque hæc duo quidem contingunt ex quadam ueluti ebullitione, atque exustione sanguinis, qui ubi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, quemadmodū ex lignorum exustione cinis, ut Galenus testatum reliquit in commen-

2^o tario huius aphorismi Hippo. Dum pus cōficitur, &c. Ex ijs igitur manifestum euadit, quid sit pus, quomodo generetur, quæ sit eius causa efficiens, & materia. Nunc quid sit uirus, seu uirulentia, & sordes, apud chirurgos, paucis aperiamus. Virus ergo illis, seu ui-

Virus.

3^o quæ quidem est triplex: quædā enim (inquit) est spissa, inequalis, coagulata, & alba: quædam uerō nigra, & alia

Sordes.

Sanies siue uirus, quid.

Lib. 3. meth.

Pus medium est inter sanie[m], & fœdem.

Boni, ac mali puris notæ.

Pus λεαιῶδες.

Male saniei notæ.

alia uelut fœx, cinericea. Porro quod illi uirus appellant, Galeno Græcè ἰχὼρ, Latinis sanies, dicitur. Est autem sanies, siue uirus, (ut uerbo uno dicatur) tenuius illud excrementum in ulceribus, quod ea humida reddidit: sicuti sordes crassū, quod ulcus rhyparon, id est, sordidum efficit. Quemadmodum enim (ut Galenus inquit) omnem qualitatis alimēti mutationem, alterum crassius, alterum tenuius excrementum sequitur: ita & in ulceribus, præsertim cauis, duplex excrementum provenire solet: nempe tenuius, quod Latine sanies, 10 Græcè ἰχὼρ appellatur: & crassius, quod sordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento ulcus humidum redditur, ex crasso sordidum. Quò fit, ut ulcus ipsum duplicibus egeat medicamētis, utique ut humidum est, siccantibus: ut sordidum, ijs quæ expurgant: sed hæc alterius sunt contemplationis. Ceterum mediam quodammodò substantiam sortitur pus, inter tenuem & crassam, si saltem laudabile atque optimum est. Optimum autem est (ut scribit Hippocrates) si album, læue, æquale, ac quàm minimè fœtidum sit. At illud malū 20 est Celsò, quod multum tenue, dilutumq; apparet, magisq; si ab initio tale est: itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si fœculentum est. Præter hæc, si male olet. Porro genus quoddam puris est, apud eundem Cornelium Celsum, Græca dictione λεαιῶδες appellatum, quod in magnis (inquit) ulceribus sanescentibus apparet, tenue, subalbidum, quasi unctum, colore, atque pinguitudine oleo albo non dissimile. Sanies autem mala est, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ 30 & ipsum ulcus, & iunctam ei cutem erodit. Melior, non

non multa, modicè crassa, subrubicunda, aut subalbida. Itaq; spes sanationis in his ulceribus maior est, ex quibus melioris generis quæque prædictorū proueniunt: sicuti & eius uulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Eam ob rem, bonitatis atque maliciæ notæ, in horum singulis diligenter à chirurgo perpendendæ sunt, ut & deprehendere & pronūciare possit, quæ ulcera insanabilia sint, quæ uel facilem aut difficilem curationem habeant. Quæ res non par-
 10 uui sanè est momēti, ut chirurgus ipse, & se alijs admirabile præstet, & calumniā deuitet. Atq; hæc de pure, sanie, ac sorde, dicta sufficiāt. Nūc autē dicendorū ordo postulat, ut ulcerū signa, ac etiā iudicia subijciamus.

Notæ siue signa, quibus ulcerum differentię dignoscuntur, ex eorū definitionibus petitæ. Cap. III.

20 **V**LCERIS cuiusque suæ sunt propriæ notæ, quibus unum ab altero distinguitur. Hæ autem ex singulorum diffinitionibus petendæ sunt. Quocirca præcipuarum suprā memoratarum differentiarum, breuißimas definitiones hic obiter recensere operæ precium esse duximus. Quod dum facimus, non tam uerba, quam rem ipsam lectorem spectare uolumus. Maluimus enim cōmunibus, & ab omnibus chirurgiæ professoribus iam dudum receptis uti de finitionibus, licet aliquando rudibus, plebeis, & nō ita elegantibus, quàm rei per se satis obscuræ, uerborum
 30 lenocinijs, et tersiore stilo tenebras offundere: crassam tamen illam, & supinam barbariem, quantum nobis licuit,

Vlcus uirulentum.

lieuit, ubique deuitauimus. Ergo ut semel dicamus, *ulcus uirulentum est*, in quo uirus, hoc est, tenue quoddam, ac liquidum excrementum, quod saniem propriè Latinis appellari diximus, citra erosionem abundat.

Vlcus corrosiuum, siue arrodens.

Alio nomine saniosum dicitur. *Vlcus*, quod sua malignitate siue malitia, parti quam iam occupauit, erodendo, atque interdum escharam (quam acris mordaxq; succus ad ipsum confluens excitat) gignendo, maius atque amplius indies efficitur, corrosiuum siue arrodens nominatur.

Vlcus depascens.

Quòd si eius malitia adeò crescat, ut non modò ulceratas atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat depopuleturq; , *ulcus* iam depascens appellabitur. Græci omnes medici $\nu\alpha\mu\pi$ hunc affectu, Galeno etiam teste, nominant, propterea quòd pergere pascendo id uitium ab ægris particulis ad eas, quæ integræ sint, soleat, atque harum semper aliquid ægris adijcere. Cuius species est phagedæna, ambulatiuum *ulcus* appellant, quod huc atque illuc serpendo, cutim, ac subiectam carnem, sed extimam tantum ac superficiale depascitur ac rodit. Nunquam enim

Phagedæna,

eiusmodi *ulcus* in penitiora penetrat: quò fit, ut *ulcus* in summo residens, minimè autem profundum, dici merito debeat. *Vlcus sordidum est* Galeno, quod crassiore illo ac uiscofo scatet recremento, quod sordè appellauimus, Græci $\rho\eta\psi\alpha\rho\omicron\nu$ uocant. Recentiores uerò aliter definiunt, nèpe quòd crustas aliquas habet crassas seu (ut loquuntur) grossas, aut carnè aliquam mollem, crassam, & superfluam. *Vlcus putre siue putridum dicitur*, ex quo uapor aliquis graueolens, seu (ut aiunt) sumus quidam foetidus, & cadauerosus expirat

Vlcus sordidum.

Ianfrancus sic diffinit.

Vlcus putridum.

atque attollitur, persimilis illis qui à putrescentibus ac corruptis

ac corruptis iam carnibus effertur, habetq; semper annexam sibi sorditiem, atque extraneam caliditatem cum humiditate superflua, & plerunque febrem. Hoc à sordido differre uolunt sola malitie, ac fraudulentie intentione. Cauernosum ulcus appellant, cuius orificium strictum est, atque angustum: profunditas uero latior, & sensum effugiens, siue occulta, multosq; anfractus habet, & cuniculos, siue uias hinc inde discurrentes, citra tamen callositatem & duritiem. Sunt qui &

Vlcus cuniculosum.

1. appposito nomine cuniculosum ipsum appellant. Fistulosum ulcus à nuper descripto cuniculo seu cauernoso ulcere non differt, nisi quòd meatus illos anfractuosos & sinuosos, callosos habet, & duros. Vlcus cancerosum, est uisu horrendum, foetidum, labra habens dura, crassa, tumida, atque inuersa: colore inter rubrum & nigrum medio, utpote fusco, aut liuido; adhuc circa locum ulceratum uenæ quædam liuide apparent, exaltatæ & turgidæ, crasso & nigriore sanguine plenæ.

Vlcus fistulosum.

Vlcus cancerosum.

2. Vlcus dyscraton, siue ut uulgò dicunt, dyscrasiatum, est in quo quædam *δυσκρασία* id est, intemperies, seu mala quædam qualitas præter naturam dominatur, ut caliditas immoderata, uel frigiditas aut humiditas, uel siccitas, aut plures ex illis simul. Nominatur autem proprie nobis ulcus cum intemperie. Vlcus crucians, siue dolorosum appellatur, quod laborantem atrociter molestat, seu (ut ait Guido à Cauliaco) in quo sensibilitas rei contrariæ reperitur, Græcè *ἐλκὸς ὀδυνηρὸν* dici potest. Vlcus rheumaticum Galeno dicitur, quod aliunde fluentes humores uetant sanescere. Verminosum

Vlcus dyscraticum.

Vlcus crucians,

Vlcus rheumaticum.

Vlcus verminosum.

3. sum ulcus appellatur, quod uermibus scatet, *σcolecόδες* à Græcis dicitur: horum autem uermium opifex est putredo.

*Vlcus cacoë-
thes.*

putredo. Vlcera cacoëthe Galeno, & Græcis omni-
bus ritè decenterq; factis, sanari tamen non possunt,
quòd scilicet in particula laborante siue ulcerata, ma-
lignitas quædam adsit cæca, & nobis occulta, ea sana-
ri prohibens. Nos eiusmodi ulcera, maligna, contuma-
cia, rebellia ue, atque ægrè sanabilia dicimus. Varico-
sum ulcus nominatur, quando in partibus eo superio-
ribus uenæ quædam eminentes, ac turgidæ, crasso san-
guine, aut uitioso aliquo succo oppletæ apparent, (ua-
rices uocant) quæ ipsi ulceri fluxionem suppeditant, 10
atq; ita sanescere ipsum uetant. Apostematofum ulcus
nuncupant, in quo tumor aliquis præter naturam est,
ab humore quopiã procreatus, ut phlegmone, aut ery-
sipelas. Cætera satis ex præcedentibus innotescunt.

*Varicosum ul-
cus.*

*Vlcus apostema-
tosum.*

Vlcerum prognostica, siue iudi- cia. Cap. V.

*Apb. 45. lib. 6.
Vlcera annua,
& diuturna.*



VL CERA (inquit Hippocrates) quæcunque
annua sunt, aut etiam diuturniora, os absc- 20
dere est necessarium, & cicatrices cauas
fieri. Quæcunque ulcera (ut Galenus ait in commenta-
rio huius aphorismi) longo tempore manent, uel cica-
trice nullo modo adueniente, uel si facta sit, rursus re-
soluta (nihil uidelicet medicis in curatione delinquen-
tibus) cacoëthiam, hoc est, malignitatē quandam ostē-
dunt, difficulterq; ad sanitatem perducuntur. Id autem
accidit, uel propter influxum uitiosorum humorum,
uel propter dispositionem in membro ex humoribus in
id confluentibus, processu temporis contractam, uel ob 30
aliquem uitiatum ac corruptum inibi ossis affectum. Vlcus
omne

- omne (ut scribit Auicennas) quod, posteaquam carne impletum est, & cicatrix illi induci debet, subito renouatur, periculū est, ne in fistulam degeneret. Eidē ma-
la ulcera iudicantur dura, & quæ ad uirorem aut nigriciem uergunt: eiusmodi enim color natiui particula ulceratæ caloris extinctionem insinuat. Vlcera (ut idem Arabs ait) frigida, albedine et mollitie dignoscuntur, & præsertim si calidis iuuentur. Calida uerò ad ruborem declinant, & frigidis gaudent, sed & tactu
 1. etiam discernuntur. Itaque horum utraque agnosces, partim colore, partim tactu, partim (ut Galenus inquit) laborantis sensu. Quippe aliàs uisionē sentire se fatentur, aliàs manifestum frigus in particula, gaudentq; uel frigidis medicamentis, uel calidis: et alijs quidem rubor leuis insidet, alijs color magis albicat. Siccis quoque atque humidis ulceribus suæ sunt propriæ notæ, quæ tactu maximè deprehenduntur. Hic nanque sensus sicca atque humida, & quæ eas qualitates consequuntur, duritiem scilicet & mollitiem, asperitatem
 2. & lenitatem experitur. Adhæc si maligna ulcera totius corporis colorē representent, ut uerbi causa, candidum, purpureum, aut fuscum, uel citrinum, uitium ali- quod effatū dignum hepatis, atque insignem sanguini, ab ipso iocinore procreato, corruptelā inesse significatur. Aliud. Vlcera, quæ alijs morbis succedunt, ægrè sanabilia sunt. Aliud. Vlcera circumglabra praua sunt; hoc est, cum uideris pilos à circumiacentibus ulceri locis defluere, uel cutem squammulas è summa parte dimittere, scito ac iudicato tale ulcus prauum esse. Præ
 3. uos nanque humores, seu malignos succos ad partem ulceratam tūc cōfluere simile ueri est, qui uehementer
 ulcus

Fen. 4. cap. 1.
Vlcus se renouans.

Vlcera dura uiridia, aut nigra.

Vlcera frigida.

Calida ulcera,

Lib. 4. Tber.

Vlcera totius corporis colorē representantia.

Apb. 4. lib. 6.

Vlcera circumglabra.

ulcus erodunt . Itaque eiusmodi maligni succi, neque
radiculas pilorum omnes abolere queunt, neque exulce-
ratum locum ad cicatricem perducere ac solidescere pa-
tiuntur . Cum autem pili qui prius deciderant , in ijs
quæ circiter ulcus sunt sedibus renascuntur, bono indi-
cio esse solent . Aliud. Vlcus (ut primo libro prædictio-
num scribit Hippocr.) siue ante extitit, siue in ipso
morbo natum est, diligenter obseruari debet : Nam si
moriturus æger est, aridum & luens, aut pallidum an-
te mortem apparet . Aliud. Vlcera, in quibus post lon-
gam saniei, seu uirulentiae emissionem pus laudabile ap-
parere incipit, bonum nobis portendunt . Siquidem &
naturæ robur, & materiæ obedientia notatur . Quæ
autem sint puris optimi ac laudabilis notæ, in præce-
dentibus dictum est . Aliud. Vlcera, quæ in extremita-
tibus musculorum dorsi, uel tibiæ, aut brachiorum
sunt, periculo non uacant Auicennæ. Valde etiam pe-
riculosa eidem censentur, quæ interna membra occu-
pant, aut ad ea usque perueniunt . Aliud. Quibus ul-
ceribus ante absolutam deterisionem, sarcotica, id est,
carnem producentia medicamenta adiuuant, mala
ac superflua caro in illis generatur. Quæcunque uero
probe & opportunè expurgata semper ad siccitatis pro-
mouentur, his caro (inquit Hippocrates) magna ex par-
te non supercrescit, nisi si contusa sunt . Aliud. Vlee-
ra in orbem circumducta, hoc est, rotunda, pessima (ut
de uulneribus dictum est) esse solent, ac tardè magnoq;
negotio ad cicatricem perducuntur . Proinde pueros
subindè in perniciem trahunt . Itaque in eis consilium
chirurgorum est, ut cauterio figura illa orbicularis
aboleatur, & lineæ modo (quantum saltem fieri pote-
rit) in

rit) in rectum diducantur. Aliud. Artuum siue extre-
 marum partium ulcera, ut pedum, aut manuum, sæpe
 numero phlegmonas, aut alios eiusmodi præter naturā
 tumores in adenss partibus, seu glandulis (quas Græ-
 ci adenas uocant) accersunt, atque excitant, præsertim
 uerò ubi corpus plethora laborat. Hæ enim partes, quo-
 niam imbecillæ sunt & raræ, facillè tentantur fluxio-
 nibus. Sic igitur fit, ut & propter ulcus, quod in ma-
 nus aut pedis digito sit, cuiusmodi glandule in inguini-
 10 bus & alis, tum intumescant, tum phlegmone occupen-
 tur, cum defluentem ad ultimos artus sanguinem, aut
 alios quosvis humores, priores acceperint, & exce-
 ptos, ob eam quam habet laxitatem & raritatem reti-
 nuerint. Quinetiā in collo, et secus aures sæpenumero
 glandule his quibus in collo, capite, uel aliqua uicina
 parte ulcus est natum, intumescunt. Nominant autem
 (inquit Galenus) ipsos adenas, cum sic intumuerint, bu-
 bones. Aliud. Cum medicamenta ulceribus adhibita
 conferunt, aut saltem nihil nocent, argumentum est ea
 20 rite ac decenter administrata esse. Cum uerò noxæ ali-
 quid adferunt, & ulcus humidius reddunt aut siccus,
 calidius aut frigidius, indicium est ea non esse præsen-
 ti morbo idonea: eruntq; magis desiccantia, aut hu-
 mestantia, calidiora aut frigidiora, prout res postula-
 bit, deinceps admouenda. Quod si ex admotis ulcus
 etiam mollius redditur, adstrictoria statim erunt adij-
 cienda. Cæterum si ulcus eroditur, & profundius effi-
 citur, sedulo aduertendum est, num id ex acrium succo-
 rum uitis, & ulceris malignitate accidat, an ex facul-
 30 tate medicamentorum (quæ admouentur) plusquam
 oportet detergentium. Hæc enim ulceratam particu-
 lam

Artuum ulcera.

Colli & capitis
ulcera.Bubones.
Si auxilia pro-
fuerint, aut no-
cuerint.Si ulcus arro-
datur.

Nota

lam arrodendo, multam saniem procreant, & ulcus bu-
midius reddunt. Quò fit, ut imperitos chirurgos atq;
improvidos sepe numero falli contingat, qui dum pu-
tant ulceris cacoëthia, id est, malignitate, eiusmodi sa-
niosam colluviem, seu (ut ipsi loquuntur) virulentiam,
atque superfluum humiditatem prouenire, quæ adhuc
efficacius detergunt, properant admoovere, atque ita
profundius, et magis cauum ulcus, immò uerò et calidius
ac etiã interdum phlegmonodes efficiunt. Hinc erosionis
ac mordicationis sensum laborantes persentiscunt. Sed
hæc nō minus ad curandi rationem pertinere uidetur,
quàm ad signa prognostica, de quibus nunc agimus.

Ventus meridio-
nalis efficiit ulce-
ribus.

Porro inter cætera quæ magis efficiunt ulceribus, uen-
tus est (ut Guido à Cauliaco annotauit) meridionalis,
atq; aëris ambiētis humiditas caliditati adiuncta. Hæc
enim ulceribus putredinē inuehunt: siquidē quæ putre
fiunt omnia, ex calido & humido sic efficiuntur. Hinc
fit (inquit) ut tibiariū ulcera Auiniōe, ægrius ac diffici-
lius multò curētur quàm Parisiis. Contrà uerò accidit
in capitis uulneribus. Cæterum quæadmodum plurima
uulnerū iudicia, ulceribus etiã cōia sunt, ita & ulce-
rū, de quibus modò differimus, iudicia permulta uulne-
ribus adaptari possunt. Quocirca quæ in iudicijs uulne-
rū dicta sunt, ulceribus cōueniētia, huc reuocanda erūt.

De curatione ulcerum in uniuersum.

Cap. VI.

Duo spectanda
in curatione ul-
cerum.



IN CURATIONE Vlcerum duo nobis
spectanda proponuntur, nempe ipsius ulce-
ris, quā ulcus est, contemplatio, & ulceris
cum

cum sua causa, aut symptōmate aliquo, aut alia quāvis dispositione complicati, aut etiam hanc uel illam partem occupantis consideratio. Omne enim ulcus, ut supra diximus, aut solum est, ipsumq; per se, hoc est, nullo alio affectu, uel cum eo simul inuadente, uel ipsum præcedente, aut sequente: aut cum alio quopiā uno, multis uel consistit. Quorum alij non modò statim ab initio ulcus excitant, sed etiam nunc maius efficiunt: alij eius sine quo non, ut ad curandi opus, ratio

1. omnem obtinent. Ceterum ulcus omne, quā ulcus est, unā communem habet curandi indicationem. Siquidem (ut Galenus ait) ulceris, quā ulcus est, sanatio, mediocris siccatio est. Hæc autem indicatio communis etiam est uulneribus curandis, quā saltem uulnera sunt, id est, plage uulnerando acceptæ. Sed hoc discrimen habent, quòd hæc minori, illa (quòd humidiora sint) maiori de siccatione indigent. Verum enim uero ulceris, quod cū alio affectu cōiunctum est, (cuius uidelicet præcedere curationem oportet) eius curatio, ut ulceris solius nō.

*Vlceris sanatio
mediocris sic-
catio est.*

2. est, sed prior illius affectus, secunda ulceris. Nam siue phlegmone quæpiam, siue erysipelas, siue tumor is qui œdema dicitur, siue nigritia, siue ecchymosis, ulceratā carnem obsederit, primū molienda eius curatio est. Quòd si ualentior aliqua intemperies (quæ imbecillitatis affectus partis causa esse solet) exulceratæ carni adsit, huic nimirum primò medendum erit. Vbi autem intemperiei affectū iam sanaueris, exulcerationis post eā affectum sanabis. ita quoque & uarices, qui sæpe supra exulceratū locum sunt, prius sanabimus, ut dein

3. de mōx ulcus sanemus. Ceterum nulla harum curatio-
num (inquit Galenus) ipsius est ulceris, sed alterius cu

In tollendis di-
spotionibus cū
ulcere complica-
tis, duplex con-
siliū esse.

Particul. in cu-
randis ulceri-
bus scopi.

De primo, & se-
cundo scopo.

iusquam affectus, qui ulcus uel gignit, uel certè fouet.
Porro duplex, in eiusmodi cum ulcere complicatis di-
spotionibus, consiliū est ipsi Galeno lib. 4. meth.
med. nempe ut uel eiusmodi affectus ē corpore pror-
sus eximas, uel incommodum quod inserunt, uincas.
Verū hoc (inquit) ubi exiguus planè affectus est, fie-
ri licet: ubi magnus est, duci ad cicatricem ulcus prius
non poterit, quā illi affectui remedium attuleris. Ta-
lium igitur ulcerum quæ sic cum alijs affectibus com-
plexa sunt, quatuor sunt particulares curandi inten- 10
tiones. Prima uitæ rationem, sanandis eiusmodi ulceri-
bus accommodam, præscribit. Secunda materiam an-
tecedentem auertit & intercipit. Tertia symptoma-
ta siue accidentia, & dispositiones, quæ cum ulceribus
complicantur, corrigit & siuamouet. Quarta corre-
ctis, & profligatis ijs dispositionibus, quibus ulcera
complicantur, ea more uulnorum concuatorum sanare
præcipit. Ceterū primam & secundam intentionē
assequimur, humores copia aut praua qualitate no-
xios, quibus laborantis corpus scatet, quicq; in partem 20
ulceratam influunt, tum corrigendo, tum uacuando, &
auertendo, fluxionemq; ipsam intercipiendo. Porro au-
xilia quibus commodè succorum abundantiam, & ui-
tium tollimus, corrigimus, atque auertimus, sunt, uenæ
sectio, purgatio, proba uictus ratio, cauterium, uomi-
tio, & id genus alia. Fluxiones uerò intercipimus liga-
turis, perfusionibus, & epithematis: item unguentis ex
bolo Armenia, atque alijs refrigerantibus & adstrin-
gentibus, de quibus in sermone de tumoribus præter
naturam, abundè dictum est. De ijs autem sic Gal. lib. 30
4. meth. med. ubi maligni succi, & exulcerantis cura-
tionem

tionem pertractat, ad uerbum scribit: Aequè uerò &
 mali succi, qui ad exulceratam partem confluit, ut ul-
 cerans quidem est, sanatio eius hinc dicitur. Vt mali-
 gnus succus est aut copia redundans, in proprijs ipso-
 rum locis tractabitur. Cum ergo qui exulceratis par-
 tibus influit succus, nec multò plus iusto, nec multò
 deterior sit, auerti hunc reueri; conueniet, adstrictis
 scilicet, refrigeratisq; ijs particulis, quæ ante exulce-
 ratam sunt. Anchoanda quoque deligatio est à laboran-
 te ipsa particula, deducendaq; uersus sanam, ueluti in-
 fracturis ossium præcepit Hippocrates. Talis enim de-
 ligatura meatu adstringit, per quos materia ad par-
 tículas ulceratas influit. Sed & quæ ulceribus ipsis ad-
 mouentur pharmaça, siccant ualentius oportet, quàm
 ea quæ simplici admoventur ulceri. Quod si fissi com-
 pesi; medicamenti influxus nequeat, causa eius in-
 uestiganda est, atque hæc prius adimenda. Ac si qui-
 dem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem id
 fiat, huic nimirum medendum est: fuerit autem ulcera
 quoque partis propria quædam curatio. Sin pro-
 pter sanguinis copiam, uitiosum uel succum, uel corpo-
 ris totius, uel alicuius suprapositarum partium, illa sci-
 licet prius sunt corrigenda. At imbecillitas quidem
 partis, propter quam plus iusto succorum illi influit,
 omninò ab intemperie provenit, non tamen ab omni.
 Eoq; fit, ut exulcerata caro nonnunquàm intempera-
 ta tantum sit, non autem imbecilla, nonnunquàm utrius-
 que, & intemperata, & imbecilla. Quippe imbecilla
 tatis affecte partis, ualentior intemperies causa est.
 Quomodo autem curari debeat illa dyscrasia, siue in-
 temperies, mox in sequentibus dicemus. Caterum qua

*Si succus qui in-
 fluit, nec copio-
 sus sit, nec ma-
 lignus.*

*Si fluxio fiat ob
 partem imbecil-
 litatem.*

*Valentior intem-
 peries causa est*

imbecillitatis
s artus.

ratione, quibusue modis fluxiones, quæ uel à toto corpore, uel à membro quopiam in particulam ulcere laborantem irruunt, intercipere atque auertere oporteat. supra in tractatu de tumoribus præter naturam abundè dictum est. Quare ne eadem identidem ubique repetamus, ex eo loco, quæ ad rem præsentè attinent, Terminus scopus. requirenda erunt. Tertia intentio, quæ symptomatica & dispositiones, quæ cum ulcere complicantur, corrigi ac summouet, perficitur prout cuiusque symptomaticis, & affectus cum ulcere complicati natura requirit ac desyderat. Porro (si Galenum sequimur) tradenda est medendi methodus, non omnium simul, sed cuiusque seorsum. Itaque Galenum ipsum imitantes, exordium sumamus ab intemperie, quæ cum ulcere compli-
catur, corrigenda, de qua ad hunc modum scribit libro de morbis methodo curandis quarto.

Lib. 4. meth.
meden.

Ulceris dyscrati, id est, cum intemperie iuncti, curatio. Cap. VII.

Squalentis ac
siccae intempe-
rici curatio.



Humidioris in-
temperiei cura-
tio.

SARNIS intemperies, si squalens siccaq; uidetur, aqua temperata fouens humectansq; corriges. Quoties autem eo remedio uteris, esto tibi perfusionis humectationisq; meta, ut cum primum rubescit, attolliturq; particulae moles, tum desinas. Quippe si ultra perfundas, quod attraxisti, id euocabis. Itaque nihil profeceris. Quinetiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quam ut in sana carne præceptum est. Si uero humidior, quam pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua uero

- , uerò nullatenus admouenda. Imò si lauandum ulcus ui-
 , detur, uinum, aut posca, aut decoctū austeræ cuiusquam
 , herbe præparandum. Eodem modo & calidiorē quàm
 , par est, carnis habitum refrigerabis; & frigidiorē
 , calefacies. Agnosces uerò (inquit) horum utrunque, Caloris & fri-
 , partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. goris nota.
 , Quippe aliàs uisionem sentire se fatentur, aliàs mani-
 , festum frigus in particula: gaudentq; uel frigidi me-
 , dicamentis, uel calidis. Et alijs quidem rubor leuis in-
 10 sidet, alijs color magis albicat. Breuiter quæcunque Curatio fit per
 partes ulceratæ per intemperiem aliquam à naturali contraria.
 habitu recesserunt, eorum sanationem per ea, quæ con-
 traria uiribus sunt, fieri omninò est necesse, calidam
 utique intemperiem (ut dictū est) refrigerando, siccam
 humectando, frigidam calfacièdo, humidam siccando.
 Quòd si frigidior humidiorq; locus sit, calfacièdo pa-
 riter ac siccando, & in alijs ad eundem modum, uin-
 centem uidelicet qualitatem, contraria semper oppu-
 gnans. Atque ubi intemperiei affectum iam sanaueris,
 20 deinde etiam exulcerationis affectum sanabis. Non ali-
 ter planè nunc curata intemperie, quàm si citra ulcus
 incidisset. Quo manifestum fit, non esse ulceris, sed in-
 temperiei propriam omnem eiusmodi curationē, quæ
 tamen ulceris ipsius sanationē omninò præcedere de-
 bet. Siquidem fieri non potest, ut in ulcere uel carnis
 productio, uel sinus impletio, uel agglutinatio, uel cic-
 tricis inductio, rectè unquàm cedat, nisi subiecta caro
 pro naturali modo se habeat. Hæc autem rectè se ha-
 buerit, si (quod reliquis etiam omnibus est commune)
 30 proprium temperamentum tueatur. Ergo si exulcera-
 ta caro iusto calidior, frigidior uel effecta fuerit, utiq;

Caro rectè se ha-
 bet, si proprium
 seruet tempera-
 mentum.

medelam exigit, quæ in tantū calfaciat, refrigeratue,
 in quantum ipsa à naturali suo habitu recessit. Subie-
 ctæ nanque carnis affectus, causæ rationem obtinet ad
 id quod efficitur. Quippe ex hac, (ut Galenus inquit)
 et per hanc, tum quæ dissident, glutinantur, tum quæ
 caua sunt, carne implentur. Itaque temperatam esse
 subiectam carnem, ad ulcera tum glutinanda, tum car-
 ne implenda prorsus oportet. Dolor quoque unum est
 ex symptomatis, quæ ulcerum curationem remoran-
 tur, et impediunt. Quocirca si uehemens aliquis do-
 lor ulceratæ parti incidat, protinus hic aut tollendus
 erit, aut saltem quoad licebit, demulcendus. Dolor enim
 præsertim uehemens, vires prostermit, et fluxionē pro-
 vritat: proinde et ulceris ipsius curationem prohibet.
 Itaque tametsi quæ ulceratis particulis ad doloris se-
 dationem admoventur, ulceri aduersentur: quoniam ta-
 men ex doloris uehementia plerunque imminet labo-
 ranti periculum, et propriam ulceris curationem mo-
 ratur, neglecto ad tempus ulcere, dolori tanquàm ur-
 gentiori primū, maximeq; intendendum est. In com-
 plicatis nanque affectibus, id ex quo primū maxi-
 meq; homini imminet periculum, quodq; magis acce-
 lerat et urget, primū curari, atque auferri debet.
 Cæterum quibus auxilijs dolor mitigari aut sedari
 possit, in duobus libris superioribus copiosè satis di-
 ctum est, diceturq; iterū in antidotario.

In cōplicitis af-
 fectibus urgen-
 tiori semper pri-
 mum succurren-
 dum est.

De ulcere cū tumore particulæ. Cap. VIII.



ABTERVM ad eundem quoque modum,
 et partium, quæ cum aliquo præter natu-
 ram tumore exulceratæ sunt, earum prius
 sanandus

sanandus tumor est: fieri enim non potest, ut ulcus, tumore manente, ad sanitatem perducatur. Quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco ulcerato excitetur: quod si id prohiberi non possit, remedijs dicatis curari debbit, ulcere tamen interim non neglecto. Quæ autem omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, in præcedentibus fusissimè dictum est. Nunc quantũ eius rei coniunctum cum ulcerum curatione est, obiter ac cõpendiosè

- 1º tractabitur. Compendiaria igitur obsessarum phlegmone partium ulceratarum curatio, per id genus præstidia obitur Galeno, quæ sanè uel affectum prorsus summovent: uel si quid exiguum, quod suppuret, reliquerint, alterum medicamentum acre, quod educere possit, requiritur: uel si tenuis circumposita cutis sit, uel isq; celerius explicatum agrum, sectio petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua et oleo, quod calfaciat humectetq;, illinantur partes ulceratæ, quæ phlegmone infestantur, lenientis (ut Galenus ait)
- 2º tractatio est, non medentis, & contra malum pugnantis. Id enim non ex prima ratione fit, hoc est, ut remedium affectus, sed ut symptomatis mitigatio. Siquidem ipsius phlegmone remedia (ut autor est Hippocrates) sicciorũ sunt uirium. Itaque si inflammatio ulcera aut etiam uulnera adhuc recentia obsideat, usus est medicamentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcent. Ex liquidis igitur (inquit Paulus) laudatissimum est uinum, deinde posca. Si uerò sordes quoque cū inflammatione occupent, mulsa diluta conuenit. Ex ijs
- 3º autem medicamentis, quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem conferent, inflammationibus dicata,

Lib. 1.
Phlegmonosi ulceris curatio.
Lib. 4. meth.

Si inflammatio ulcera exerceat.

Vinum.
Posca.

*Malum Punicū
dulce.*

dicata, quæ in tractatu de tumoribus præter naturam
descripta sunt, si oleosa, acriq; excipias: priua-
tim autem hoc proficit. Malum punicum dulce, ut
no incoctum tritumq; illinitur. Mirabile nimirum, &
(ut Paulus ait) multiplici usu commendatum est reme-
dium: facit enim tum ad capitis, tum naturalium ul-
cera, tum etiam ea, quæ toto corpore excruciant, ocu-
lorumq; inflammationes. At si erysipelis, aut eiusmodi
quippiam ulceri accesserit, ijs utendum erit præsi-
dijs, quæ aduersus illas superius scripta sunt. 10

Vlceris contusi curatio. Cap. I X.

*Vlcera cum con-
tusione facta,
ad suppuratio-
nem ducenda.*



CALONI ex Hippocratis testimonio sen-
tentia fuit, ulcera omnia, præter ea quæ cō-
tusa sunt, siccari oportere. In ijs uerò quæ
cum contusione facta sunt, quàm celerrimè pus mouen-
dum esse. Siquidem necesse est carnes sic contusas pu-
trescere, ut noua tandem caro gignatur. Pus autem
ipsum, siue carnis contusæ suppuratio, cum aliqua pu-
trescentia fit. Porro quæ putrescunt omnia, ex calido
& humido sic afficiuntur. Proinde fit, ut ea quæ cale-
faciunt & humectant, omnibus his affectibus, quibus
moueri pus expedit, semper admoueamus. Cataplasma
ta igitur ex hordei farina, aqua, & oleo: item quæ ex
pane, aqua, & oleo, componantur, conueniunt. Præter
ea fomentum multæ calidæ aquæ, & tetrapharmacum
(ceu quæ calfaciant, humectentq; & pus quàm celer-
rimè moucant) ulceribus contusis rectè adhibentur.
Sed præstat ipsius Hippocratis uerba subiungere: Quod
cunque ulcus (inquit) cæsim percussim ue acuto telo est,
diuisum,

*Cataplasmata
suppuratoria.*

*Aqua calida.
Tetraplarmacu-
m.*

Hippocratis.

» diuifum, medicamentum enemum & ficcans aliquod,
 » quod fuppurare uetet, admittit. Sin caro aliquo telo
 » tum contufa, tum cafa fit, huic ita medendum eft, ut
 » quàm celerrimè fuppuret. Nam & minus phlegmone
 » urgetur, & necesse eft carnes, quæ contufa cæfæq;
 » fint, putrefactas, & in pus uerfas liquari, poft eà nouā
 » carnē nafci. His itaque uerbis apertè nos docet Hip-
 pocrates, ulcera quæ fine contufione accepta funt,
 quàm maximè ficcare. His uerò quæ cum contufione
 10 facta funt, quàm priuim pus mouere. Porro eorum
 quæ puri mouendo aptiffima funt, materiam in sermo-
 ne de tumoribus præter naturam, & in antidotario
 copiofam reperiēs. Sed & de ijs etiam fuprà tractauim-
 mus, ubi de uulneribus contufis meminimus.

De carne in ulceribus fupercrescente,
 quam Græci hyperfarcōfin nomi-
 nant, tollenda. Cap. X.

20 **C**ARO in ulceribus fuprà quàm par eft, excre-
 fcens, medicamētis exiccātibus tollitur. E' quo-
 rum fanè numero funt diphryges (cuius tria *Diphryges.*
 funt genera apud Dioscoridem) infperfum, aut cata-
 plasmatis inflar inductum, squamma eris, omniaq; te- *Squamma eris.*
 flacea combufta. Item echini, hoc eft, erinacei utriusque *Echini.*
 tam terreftrēs quàm marini, cum toto corpore con-
 cremati. Verum hæc non admodum eximie, fed modice
 ac mediocriter duntaxat purgant, & fupercrescen-
 tia compefcunt. Afia uerò petra flos longè ualidius *Afiæ lapidis*
 30 id muneris obit, atque hoc magis adhuc fori, chryfo- *flos.*
 colla, chalcitis, mify. Quæ fi combufta fuerint, minus
 uellicant,

*Sales concre-
mati.*

*Medicamentum
ad maxims by
persarcosus.*

*Faustini pa-
stilli.*

*Unguentum
Aegyptiac.*

uellicant ac rodunt. Item aeris flos, qui chalcantios
 Grecis uocatur. Ceterum ærugo his adhuc omnibus
 ualentior est. Sales autem concremati carnes cum hu-
 more flaccidas consumunt, ac liquefaciunt. Sic etiam
 linamenta è panniculo discerpta, muria acriori imbu-
 ta, & denuò resiccata atque imposita, mediocres car-
 nium supercrescentias liquefaciunt, atque exedunt.
 At maximas carnum excrescentias ad usque penitio-
 ra crustis obducunt, Faustini pastilli, triti atque in-
 spersi. Item medicamentum quod recipit calcis uiuæ,
 id est, aqua non extinctæ, squammæ aeris, & mannæ,
 (quæ mica est thuris, concussu seu attritu elisa) pares
 modos, hoc est, partes æquales. Porro Faustini pastil-
 li, id est, trochisci, Paulo Aeginetæ libro septimo ad
 hunc modum describuntur: Auripigmenti drachmæ
 duodecim, sandarachæ (quæ rubrum est auripigmen-
 tum, & à natura magis excoctum) drachmæ sex, cal-
 cis uiuæ drachmæ octo, chartæ combustæ drachmæ:
 myrti baccarum succo uel decocto excepta in pastil-
 los redigito. Sed de eiusmodi supercrescentem car-
 nem compescentibus & absumentibus, iterum in an-
 tidotario dicemus. Ad hanc autem intentionem in com-
 muni usu est unguentum Aegyptiacum nominatum.
 Ceterum dum hæc caustica atque erodentia medica-
 menta admoventur, partes quæ in circuitu sunt, refri-
 gerantia desiderant, ne scilicet in partem ulceratam
 ex rossione, calore, & dolore, humorum fluxio aduoce-
 tur. Deindè crustæ ulceribus inductæ resoluendæ erunt,
 & ulcus ad sanitatem perducendum.

Vlceris cum duritie, & decoloratione
labrorum curatio. Cap. XI.

- C**um labra tantum ulceris decolorata duraue-
pusculum fuerint, excidenda ea sunt (Galeno
autore) ad sanam usque carnem. Auicennas au-
tem decolorata eiusmodi, duraq; ulceris labra scarifican-
da esse precipit, & ab eis sanguinem, admotis etiam
cucurbitulis, extrahendum. Sanguine autem, quod sa-
tis esse uidebitur, educto, spongiam siccam, hoc est, nul-
lo liquore madentem, ac postea etiam medicamenta
quædam resiccantia superimponere iubet. Sed & de
ijs ante Auicennam ad eundem ferè modum scripserat
Hippocrates: qui certè nihil omninò eorum, quibus ad
ulcerum curationem est opus, omisisse uidetur. Hic enim
non solum ulcerum, (ipso etiam Galeno teste) quæ ci-
tra alium affectum consistunt, sanandorum rationem
inuenit, (ut quæ in siccando, ut suprà dictum est, consti-
tat) sed etiam priuatim per species affectuum cuiusq;.
- 10 Si quidem uel luidum, uel nigrum, uel rubrum conspi-
citur, scarificando, ac sanguinem emittendo. Mox spon-
giam statim sicciorem magis, quàm humidiorē, hoc
est, siccam potius quàm humefactam, superimponen-
do. Post hæc uerò etiam resiccantia remedia applicando.
Ab his, si res postulet, rursus sanguinem auferendo.
Ac mox iterum talia peragendo, donec parita omninò
sanitas sit. Quod si labra ulceris dura callosaq; appa-
reant, etiam ea excidendo. Cum uerò amplius progressus
huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, exciden-
- 20 dum ne omne id sit, quod præter naturam uisitur, an
spatio potius curandū: proculq; dubio est, ægri animū
hoc casu

Excisio Gal.

Scarificatio
Auicennæ.

Hippocrates.

Lib. 4. Tbe.

hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiori tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quidvis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Ceterum excidere (ut postea Galenus ait) res est promptissima: maius uero quippiam atque artis egens medicamentis, sanare.

Varicum cum ulcere complicatarum
curatio. Cap. XII.



VARICVM superiacentium, hoc est, supra exulceratum locum existentium occasione, contumax ad sanandum saepe ulcus redditur: quippe quod ex his humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur (ut supra dictum est) prius sanare oportet, ut deinde mox ulcus sanemus. Igitur uarices, qui cruribus & alibi quam in testiculis prouenire solent, hoc modo ex Hippocratis, atque Aëtij Antiocheni, & Pauli Aeginetæ sententia curabis. Primo in cute, uasi elato seu uenæ in fastigium tumefactæ, hoc est, uarici, adiacente simplicem sectionem scalpello per longitudinem facito. Ita leuiter tamen, ut uenam sic in uerticem elatam non diuidas, & scalpello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in cute sectione, oras uulneris hamulis diducito, & membranulas, cultro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blandè excoriato. Mox uena detecta nudata ue, & à circumiacentibus corporibus undiquaque explicata, eam uolsella aut obtuso hamo attrahito ac suspensam teneto. Deinde acum duplex linum, seu lineum funiculum duplicem trahentem subijcito, subter ue transmittito: liniq; habenuclam amputato, sic ut duo su-

Varicū curatio.

duo funiculi efficiantur. Tum uenam dilatatam, non aliter quam in phlebotomia fieri solet, scalpello per medium diuidito, ac sanguinis quantum satis esse uidebitur, detrahito. Deinde altero funiculo superiorem uasis partem constringito, crureq; eleuato, sanguinem qui in ipso apparebit, manu expressu euacuato. Quod ubi factum fuerit, uenam ab altera parte lino altero rursus deuincito. Partem uero illam uenae, quae inter duo uincula est, uel statim excindito, uel manere sinito,

1 o usque dum putrefacta sua sponte cum funibus excidat. Peracto opere, sicca linamenta in plagam inferenda sunt, spleniumq; cœnelæo, id est, uino cui oleum adiectum sit, madens superimponendum ac deligandum est. Tum linamentis, medicamento aliquo ad pus faciendum apto, imbutis, curatio proseguenda erit, ceteraq; quae reliquis ulceribus communia sunt peragendo. Sed interrim quies aegro imperanda, seruato accliuu membri decubitu: ne si decliue iaceat, humores ad ipsum confluant. Pranso autem magis quam ieiuno, & parum

2 o pleno, potoq; item concalescto, & (ut Paulus uoluit) loto, dieq; calido potius quam frigido, uenam eiusmodi (si dictis Hippocratis auscultes) secabis, atque ex ea sanguinem mittes. Itaque si uarix crus (ut magna ex parte solet) occupauerit, loto prius (ut præcepit Paulus) homine, funiculum superiori femoris regioni circundato, ac ut inambulet iubeto. Inde uenam ita repletam, atramento scriptorio, aut collyrio notato, iuxta eius situm trium digitorum spacio, aut paulò ampliori interposito. Deinde reclinato seu decumbente aegro,

3 o crusq; ipsum extendente, alterum uinculum, paululum supra genu injcito ac mox quâ atramenti nota est, sectionem

Si uarix crus occupauerit.

*Exulsiō uaricis.
Vñlio.*

tionem facito, & reliquam curationem (ut suprà mo-
dò annotauimus) prosequitor. Quidam ex ueteribus,
funibus siue uinculis minimè utebantur, sed uenam uel
statim ubi à carne absoluta erat, & undiquaque nuda
ta, excindebant, uel ab imo etiā adhaerentem uiolenter
extrahendo abrūpebant. Alij uerò uisionem eligētes, di-
gitalibus interuallis innixa cauteria uasīs admovent.
Atq; ubi crusta exciderit, ulcusq; incarnatū, et cicatrix
inducta fuerit, locum roborant. Verū omnium tutis-
simus chirurgiæ modus est, quem suprà diximus. Por-
rò uarices in imo uentris suborientes, consimiliter tra-
ctandi sunt. Illi item, qui in temporibus existunt, ea ra-
tione, quam in angiologia, siue exēptione uenarum do-
cuit Aegineta, tolluntur. Atque hæc satis de uaricū cu-
ratione, quantum saltem præsens locus postulat.

Lib. 6. cap. 5.

De uerminoso ulcere. Cap. XII.

*Ad ulcerum ner-
uici.*



VERMES, qui ulceribus procrean-
tur, arceas, primum quidem est, ut humidi-
tatem putredinemq; eorum opificem, tol-
las. Itaque uermes in ulceribus exortos interficiunt, et
putredinem simul auferunt, succus, & decoctum absyn-
thij, & agrimonie, uel cetaurij, uel marrhubij, calame-
thi quoque officinarum (quod primum genus est cala-
minthæ Diosc.) succus, iugiter instillatur, atque id ge-
nus multa, quæ etiam aurium uermes enecant. Priua-
tim autē ad uermes, qui ulcera infestant, cōmendatur
Archigeni, & Theodoro medicamentum, quod recipit
cerussæ & polij parē mensuram, cū pice liquida illitū.
Cōducit etiā magnopere linamentū salina ieiuni homi-
nis il-

nis illitū, & applicatū. Hoc uermes etiā in auribus perimit, et cōcolores cicatrices reddit, ut testatur Aëtius.

Vlceris disrupti, & cum ossis corruptione complicati, curatio. Cap. XIII.

- V**LCERA nonnulla cicatrice obducta, postea tempore haud ita multo interiecto, de nouo inflammatione tentantur, rursūq; sua sponte & per se rumpuntur, & à continuitate sua discedunt. Osse enim quopiam substrato male affecto, hoc est, uitiato & corrupto, circumdata ac superiacens caro, ex facili quidem interdum ad cicatricem ducitur, & sana ex toto, ad unguemq; restituta esse uidetur: uerum cursu humoris ualido, paulatim ex osse in alto contabescente ac putrescente, tum inflammatio, tum pus oboritur, quod cicatricem lacerat ac dirumpit. Ceterum uitiati ac corrupti ossis signa hæc sunt: Primo ferè pingue fit: deinde uel nigrum, uel cariolum. Quæ
- 2^o supernatis (ut Celsus ait) grauib; ulceribus, aut fistulis, hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Quæ nam igitur horum ulcerum curatio erit? certè eatenus exiccare, quatenus squammæ affecti ossis exciderit. Ossium autem squammæ facile excident, si agrestis papaueris, & fici arboris folijs cum polenta læuigatis, atque ex uino illitis ipsius ossis sinus concauos repleueris: aut alterci (quem Græci hyosciamum dicunt) semen, & attramentum sutorium, pari pondere contrita imposueris. Sed & peucedaniradix contrita, subito squammas ossium remouet ac separat. Squammas etiam ossium breui detrahit, & nouam
- E E probamq;

Ossis uitiati
nota.

Quæ ossiū squa-
mas excidere fa-
ciunt.

Emplastrum
Auicenn.

Canabil.

Terra et albas

probamq; carnem desuper renasci facit, sequens medicamentum, quod admirabile uocat Auicennas. Recipit
 autem aristolochiæ, irreos, myrrhæ, aloës, corticis plā
 tæ panacis, ex qua fit succus opopanax, dictus canabil
 (quod apud Arabes genus est cuiusdam terræ rubræ
 minutæ ut harena, et Galeno ac Græcis creuthrias, ut
 puto, dicitur) adusti, scorix aris, corticis pini, singulorū
 portiones æquas: melle omnia excipiantur, & fiat em-
 plastrum. Oportet autem ante omnia uitiatum ac cor-
 ruptum os nudare, ulcere exciso, & si latius eius cor-
 rupti ossis uitium est, quàm ulcus fuit, carnem subse-
 care, donec integrum os undique pateat. Osse autem
 sic nudato, totū id quod pingue & corruptum est, can-
 dente ferramento semel iterum ue (ut res exigit) ad-
 moto adurendum est, ut ex eo statu secedat. Aut certè
 eradendum, donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ
 integrioris & minimè corrupti ossis nota est. Neque
 alia facienda sunt, ubi caries nigricies ue in summo
 osse est. Siquidem id uel paulò diutius eodem ferramen-
 to adurendum est, uel radendum est. Porro qui radit
 hæc (inquit Celsus) audaciter imprimere ferramentum
 debet, ut et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est,
 cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. Albo
 nanque finiri ex nigritie uitium, soliditate quadam
 ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris ali-
 quid integro suprâ dictum est. Ceterum si caries altè
 descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus
 est, quæ altitudine uitium æquent. Tum in ea forami-
 na demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde
 siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resolu-
 tur ab inferiori osse quodcunque uitiatum est, & is sta-
 nus carne

Si caries aliè
descendit.

- nus carne replebitur, & humor, aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Sed quod totum uitiatum est, totum eximendū est. Si inferior pars integra est, eatenus, hoc est, usque ad subiectam partem ossis integram, quod corruptum est excidi debet. Sunt qui post abrasionem cauterium admouendum esse suadent: nec immeritò sanè. Nam si corruptela ossis ex humiditate excrementosa & su-
- 10 peruacanea, ipsius ossis substantiam labefaciante ortum habet, (ut certè magna ex parte habet) nullum præsentius aut tutius remedium excogitari potest, ipsa uestione, seu cauterio (ut uocant) actuali. Hoc enim decenter admotum, & citò, & tutò, in summo quoque & in alto, nō secus quàm ignis ipse actualis, desiccet. Post uestionem uerò ferro candente factam, rosaceum calidum infundunt. Guido autem à Cauliaco post uestionem cauterio (ut dicunt) actuali (quod in hoc affectu magnoperè probat) decèter factam, rosaceum oui candi-
- 20 do liquore permixtum, tribus primis diebus admouet: triduo uerò alio sequente, loco albuminis, luteum oui (quod uitellum appellant) rhodino, id est, rosaceo commiscet: postea butyrum cum melle rosato infundit. Sed præstat eius uerba hoc loco subiungere: Ego (inquit) post cauterium pono oleum rosarum cum albumi-
- 30 ne oui per tres dies, & per alios tres dies cum uitello oui, & postea butyrum cum melle rosato. Et desuper continuo unum de mundificatiuis usque ad ossis exfoliationem, & post cum puluere emplastri dicti, hoc
- 30 est, ex Auicenna superius commemorati, incarno, & consolido.

Que post uestionem facienda.

De ulceribus dysepulotidis inueteratis, &
ijs quæ cacoethe, & chironia di-
cunt. Cap. XV.Dysepulota.
Cacoethe.LCERA quæ ad cicatricem agrè ducun-
tur, Galenus Græcè dysepulota nominat.

Quæ uerò agrè sanabilia, dolosa, malefica
siue maligna, contumacia, rebellia uè dicimus, eidem,
& Græcis alijs, qui de re medica scripserunt, autori-
bus, cacoethe nominantur. Hæc quoque, præsertim in- 10
ueterata, & quæ uix cicatricem recipiunt, alijs chi-
ronia appellarunt, ceu Chirone medicina peritissimo
indigentia: alijs telephia, quòd in tali ulcere Telephus
consenuerit. Gal. lib. 4. de compositione medic. secun-
dum genera, ulcera cacoethe diuidit penes uehementiæ
differentiam in maligniora, seu præter modum malefi-
ca, & mediocria seu moderatiora: atque hæc quidem
imbecillioribus, illa uerò ualentioribus remedijs curari
præcipit. Illa autem non mediocriter, sed maximè ma-
ligna contumaciaq; ulcera, Asclepiades atque alijs uete- 20
res (uel ipso Galeno testè) chironia propriè nomina-
bant. Cæterum Cornelio Celso autore, chironium ul-
cus appellatur, quod & magnum est, & habet oras
dus callosas, tumentes: exit sanies non multa, sed te-
nuis. Odor malus, neque in ulcere, neque in eius tumo-
re est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil ser-
pit: ideòq; nullū periculum adfert, sed non faciliè sane-
scit. Interdum tenuis cicatrix inducitur: deindè iterum
rumpitur, ulcusq; renouatur, & maximè in pedibus
& cruribus. His similia sunt, quæ Auicennas agrè sa- 30
nabilia, & occultam quandam nobis proprietatem ha-
bentia

Chironia.

Telephia.

Chironij ulceris
descriptio ex
Cornelio Celso.

Auicennas.

bentia nominat. Hæc enim (inquit ille) neque putrida sunt, neque corrosiua, neque ambulatiua, sed sunt unius dispositionis, plana, claudentia sese, & recidiuantia sæpe, hoc est, cicatricem frequenter ducentia, & rursum sæpè se aperientia & renouantia. Porro multæ ac uariæ sunt causæ, quæ eiusmodi malignorum, contumacium, atque ægrè sanabilium ulcerum coitionem & sanationem remorantur, & impediunt. Nempe fieri aliquando potest, ut labra exulceratæ partis callosa, &

Varie causæ propter quas non sanescat ulcus.

Labra callosa.

10 dura, causa sint, quominus sanescat ulcus. Potest etiam causa esse intemperies, uel quæ citra tumorem præternaturam in ulceratis partibus consistat, uel quæ cum tumore quidem aliquo coniuncta sit. Potest & uarix superiacens, uel lienis auctior & malè affectus, uel in iocinore uitium aliquod: præterq; hæc omnia, imbecillitas ægræ partis, quæ (ut Galenus ait) ipsa quoque inter quædam est intemperies, ulceris curationem in multos menses protrahere. Quinetiam uitiosus in toto corpore succus (cacochymiam uocant) maxima causa-

Intemperies.

Varix.

Lienis, aut iocinoris uitium.

Imbecillitas partis.

Cacochymia.

20 rum est, quæ incommodare ulceribus possunt, & ea diuturna contumaciaq; efficere. Vexat sanè non minus ulcera, atque ea curatu difficilia reddit, succorū æqualiter se habentium exuperantia, quam plethoram appellant. Quæ omnes causæ, & si quæ sint aliæ, in duas (ut supra docuimus) reuocari possunt: nempe in carnis subiectæ intemperiem, & humorem confluentem. Itaque si eiusmodi ulceribus dysepulotus, id est, ægrè cicatricem admittentibus, maleficis, contumacibus, atque inueteratis, aliquando mederi uelis, necesse

30 est causas, quæ illa creant, primum summoueas atque abscindas, deinde maligni ipsius ulceris curationē ag-

Plethora.

grediatis. In morbis nanque omnibus, nedum ulceribus in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Magna igitur attentione inspiciendum uenit, num corpus totum cacochymum uel plethoricum existat, uel lien, aut iecur malè afficiatur, uel labra ulceris dura & callosa sint. Item num aliqua insignis sublit partis ulceratæ intemperies, aut etiam uarix aliquis superiacens fuerit, cuius occasione contumax ad sanandum ulcus redditur. Ergo si totum corpus cacochymia aut plethora laboret, prius expurgare, uacuareq; expedit, quàm medicamentum ulceri admoveas. Si uerò lien aut iecur malè afficiatur, his prius providere, deinde ad ulcus curandū uenire oportet. Ad eundem modum & uarices, qui sæpe suprâ exulceratum locum sunt, prius (ut suprâ docuimus) tollendi sunt, deinde mox ulcus sanandum. Intemperies quoque atq; imbecillitas, quàm sæpe insignis quædam parit intemperies, antequàm ad ulceris curationem accedamus, corrigenda erit. Breuiter ei quod fluxionis in partem ulceratam decumbentis est causa, atque ægrè sanabile ulcus reddit, providendum, ac si fieri potest, medendum prius erit. Deinde maligni ipsius ulceris & contumacis curationem aggredi oportebit.

Malignorum & contumacium ulcerum summus curationis scopus.

Itaque malignorum & difficulter cicatricem recipientium ulcerum, curationis summus scopus est, ualida citra demorsum exiccatio. Hæc enim ab alijs ulceribus hoc uno dissident, quòd medicamenta citra demorsum atque erosionem uehementer exiccantia desiderant.

Mordacia medicamenta quid efficiant.

Quæ enim mordendo ulcus, & manifestam in eo exasperationem excitando, dolorem inferunt, fluores, hoc est, humores ulceratis partibus influentes irritant, & phlegmonas

phlegmonas concitant. Talis igitur pharmacorum materia, quoad eius fieri potest, ad dyssepulota, id est, ægræ cicatricem admittentia, & cacoëthe, id est, maligna ulcera, inuenienda est, unde ulcus citra mordicationem & dolorem siccescat. Hæc autem non ita inuentu facilis statim uidebitur, si attentius rem ipsam fueris contemplatus. Vt enim generalem hunc scopum, nempe

Duo alij scopi ad summum, & generalem scopum assequens necessarij.

1. *o*ras repellas, uel si saltem qui ulceratis partibus influit succus, nec multò plus infuso, nec multò deterior sit: aliter, ut quod affectæ parti inhaeret, infixumq; est, discutias. Atque hæc contrariæ uires præstant. Siquidem influxum reprimunt, quæ sunt adstringentia pharmaca: digerunt, impacta iam exceptaq; trahendi potestate prædita. Porro quæ adstringunt, ut plurimum exasperant, atque hac occasione molesta sunt. Trahentia uerò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis ne-

Repellendum quod influit.

Digerendum quod iam parti inhaeret.

2. *o* cessario sequitur, ulceratam partem erodēs: atque sic propter dolorem, quem exasperantia erodentiaq; concitant, humores (ut paulò antè dicebamus) ulceratis partibus influentes irritari, & ulcus phlegmone obsideri exediq; contingit. Ex quibus sanè dictis, colligitur ulceribus dyssepulotis, id est, cicatricem difficulter recipientibus, præsidia inueniri non posse: & multò minus adhuc malignis, quæ Græca dictione cacoëthe suprâ iam sæpius uocauimus. Quid ergo nobis agendum erit, ut talia ulcera cacoëthe, & dyssepulota disc-

3. *o* cta, ad integram sanitatem perducantur? Deligenda sanè erunt pharmaca, quæ utraq; ui & facultate (nem-

Medicamenta dyssepulotia & ma-

*lignis ulceribus
sanandis accom-
moda.*

pe adstrictoria & digerente) polleant, atque ita quod influit, repellant: quod uerò iam affecta parti inhaesit, discutiant. His itaque mixta facultate praeditis medicamentis, ulcera, de quibus nobis in praesentia sermo est, citra erosionem demorsum'ue, ut res exposulat, desiccabis. Ceterum tametsi medicamentum ex ambobus compositum, erodente puta & adstringente, necessario ualidum existat: sordes tamen & humiditatis copia id genus ulceribus incumbens, ueluti propugnacula quaedam ulceratis particulis facta, rossionem ualentibus pharmacis adimunt, soluuntq;. Porro artificio hac in re potius (ut uidetur) uti debet medicus, quam experimento inniti: nempe quod sciat rationalis medicus ulcus non alia medicamentorum uirtute curari, quam dum affecta pars eam siccitatem consequatur, quam in naturali statu sita possidebat. Quod factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat. Hanc autem dispositionem ulcera nanciscuntur, quo dicebamus modo sicescentia, hoc est, adstricta, discussaq;. Dein ubi sicca quidē fuerint, uerum sordida adhuc appareant, deterforijs pharmacis repurgantur. Ceterum cum manifestò constet omnibus in artis operibus exercitatis, rationem sine operum exploratione probabilem nō esse, medicus diligenter attendere debet, quem effectum medicamentum ulceri adhibitum, quotiescunque ipsum soluerit, in particula ulcerata praestiterit, quantum scilicet humiditatis in ulcere desiccauerit, uel si etiam sordes adsit, quantum inde absterferit. Sed & animum intendere oportet, utrum ulcus carne quae subest exesa ac collis-
quescente, sordidum euascri, an quia medicamen-
sordibus

Lib. 4. comp. secundū genera.

Diligenter inspicendum, unde sordes in ulcere enata sit.

dibus auferendis aptum requirat, impositum uerò tale non sit. Quod nimirum medicis etiam bonis (Galeno attestante) existimatis, nonnunquam imposuit, ac nostris quoque chirurgis quotidie adhuc imponit. Vbi enim ulcus post unam aut alteram medicamenti appositionem sordidius cōspexerint, statim non cogitantes, an id ex rosione pharmaci acciderit, ad abstinerforiū ualentius acriusq; se conferunt: undè iterum ulcus erosum ex æquo sordidum, uel etiam magis adhuc altera

1^o solutione uisitur. Carne enim id scēdatur, à medicamento colliquata: nam ita in prauam saniem degenerat.

Quicquid autem in his ipsis tenuioris substantiæ est, à pharmaco diffilatur, reliquum ibidem ulceribus infixum, sordes ipsis redditur. Cæterum cū ampla sit latitudo utrinque in eo, quòd alterum ulcus altero magis minusue dyssepulotum, malignumq; sit, corporaq; omnia, quibus mederi cogimur, nō eandem omninò temperaturam ac dispositionem habeant, sed alia uitioso succo, alia plethora laborent, quædam dura & robusta

2^o sint, quædam uerò tenera & mollia, atque ad sentendum insigniter habilia: fieri non potest, ut uno eodemq; medicamento omnibus indifferēter dyssepulotis & malignis ulceribus, quæ uis corpora occupantibus, medeamur: sed tantum medicantium pharmacorum (ut Gal. ait) esse numerum oportet, quantus ipsorum quoq; ulcerum extiterit. Ergo in curandis eiusmodi ulceribus ægrè sanabilibus, supposita eorum natura, & maiori cuiusque minoriue à naturali habitu recessu, laborantis cuiusque corporis habitus ac dispositio diligenti animaduersione erit consideranda. Deindè cuiusq; medicamenti tam simplicis quàm cōpositi, uis & facultas ad amussim

*imponere
apposito*

Nō unū idemq; medicamentum omnibus corporibus mederi potest.

Lib. 4. nat. v. 1.

Que in curandis malignis ulceribus præcipue consideranda.

ad amussim ediscenda. Quæ scilicet desiccant, non tamen ulceris sordes abstergunt. item quæ abstergunt qui dem, non tamen probe desiccant, ac quæ utrunque etiã possunt efficere. Sed & accuratè prospiciendum est, ex quoto quodque medicamentum ordine existat, hoc est, an imbecillum, an moderatum, an ualidum. Atque in uno quoque ordine maioris minoris uel ratio attendenda erit. Quod maximũ Galeno censetur, inter ea, quæ ad horum ulcerum curationem pertinent, neglectum tamen (inquit) plerisque medicinalis materiae scriptoribus. Nam hi solas uniuersales ipsius uires dicere studuerunt: inter quos fuit & Dioscorides, quem nulli eorum, qui in eadem quasi harena desudarunt, hoc est, de medicinali materia scripserunt, secundum esse, uel Galeni ipsius testimonio quisquam dixerit. Sed & qui composita medicamenta tradiderunt, de ijs indeterminate, et citra distinctionem scripserunt. Neque enim uirtutem ipsius medicamenti, an scilicet ualidissimum, an moderatum, uel imbecillum esset, explicuerunt: neque difficultatis, aut malignitatis latitudinem ipsorum ulcerum, aut naturam habitum uel corporum ulcere laborantium expresserunt. Quia nimirum distinctione omissa, permultos medicos & chirurgos, interdum bene, interdum male, ipsis pharmacis, quæ posteris scripto reliquerunt, uti contingit: ideoq; nonnunquam scopum mirificè adsequi, interim ab illo errare, aliò delabentes. Itaque non iniuria tam ueteres, ut Andromachus, Crito, Asclepiades, quàm recentiores scriptores accusandi ueniunt, qui sine ulla distinctione remedia scripserunt ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia: item ad cacoëthe, id est, malefica, sive maligna,

Dioscorides.

Qui de medicinalis indeterminate, & citra distinctionem scripserunt, erroris occasionem alijs dederunt.

- ligna, & contumacia ulcera: plurima enim ex ijs sunt uirtute inuicem longè diuersa. Siquidem nonnulla horum uehementiora sunt, alia moderatiora, quædã uerò imbecilliora. Adde, quòd & talia ulcera (ut diximus) magis, alia minus dyssepulota, & difficilia, malignaq; sunt. Sed nec corpora omnia eius generis ulceribus scatentia, eiusdem prorsus (ut paulò antè dicebamus) naturæ ac dispositionis reperiuntur. Quare neq; eadem omninò medicamenta desiderant. Itaque ad maligniora ulcera, & corpora duriora ac robustiora, ualentioribus utendum erit remedijs: ad mediocria uerò, & molliores ac delicatiora corporum habitus, imbecillioribus. Meritò igitur (ut initio quarti libri de compositione medica. κατὰ γένος scribit Galenus) omnes, qui unum duntaxat medicamētum ulceribus malignis cicatricem inducere promittentes habent, successu crebro frustrantur. Nam duo (minimū) quæ idem pollicentur, eademq; facultatem ostendunt, diuersa aliquin inter se non simpliciter maioris minorisq; uerū (ut
- 10 inquit ille) maximi ac minimi ratione in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus uitio curare proposuerit. Nos itaque deinceps pharmaca, primū quidem simplicia, deinde composita recensebimus, ac etiā seriatim enumerabimus, quæ ulcera (de quibus nobis hic sermo est) citra demorsum, & manifestam exasperationē exiccare possunt. Cæterū cū uariè (ut iam sæpius dictum est) inter se differant, in eo quòd magis minusue siccent, expressam eorum mentionem faciemus, quæ ualidè ac uehementer, quæ moderate, & quæ
- 30 obscurius seu imbecillius exiccent, à metallicis, Galenum secuti, incipientes: quibus etiam terræ species adnumerantur.

Ordo dicendorum.

Moderatè sic-
cātia simplicia.
Lemnium si-
gillum.
Cadmia.

numeratur. Siccant igitur modicè lenia sphragis, siue
lemnium sigillum, ita quidem cognominatū ob impres-
sam illi sphragida, hoc est, sigillum Dianæ sacrum: nos
et terram sigillatam eam uocamus. Et cadmia, quam
clumiam et cathimiam nuncupant. Hæc autem plu-
ribus deinceps diebus sub canis feruore ex aceto tri-
ta, aut uino planè giluo, et substantia pellucido, fa-
cultatem acquirit magis siccantem. Quod si ex acri
aceto teratur, siccataq; reponatur, ulceribus ualdè etiā
magnis, Galeno et Aëtio, commodè inspergitur. Va- 10
lentius cadmia et lemnio sigillo, hoc est, terra sigilla-
ta, pharmacum est chalcitis (quæ species est utreoli,
apud Arabes colcotar, chalcadis, et zegi nuncupata)
combusta, in cadmiæq; morem trita, atque in puluerem
reducta, et postea exiccata. Nam cruda, hoc est, ignem
non experta, tanta pollet efficacia, ut iam crustas in-
ducat. Lota quàm uisla minus desiccet, minusq; mor-
dax reperitur. Persimile quoque medicamentum est
ærugo cremata, quæ et æris ærugo etiam dicitur, et
uulgò hodiè ab omnibus uiride æris. Non combusta au- 20
tem nimis efficax medicamen est, sicuti et chalcitis,
quæ ignem non experta est. Verùm hæc (chalcitis in-
quam) nonnihil etiam adstringit, et ea multò magis
adhuc chalcanthum, id est, atramentum sutorium, quod
inter metalla maximè siccet. Misy autem et sori chal-
citidi genere cognata sunt, ex una, ut ita cum Galeno
dicam, radice producta. Itaque tria hæc (quæ sub ui-
treoli genere comprehenduntur) maioris tantum, et
minoris ratione differunt. Stibi siue slibium, quod Græ-
cis σίμπι, uulgò autem in officinis antimoniū dicitur, 30
magis quàm sori desiccet, et adstringit. Porro diphyr-
ges

Chalcitis.

Ærugo.

Chalcanthum.

Misy.
Sori.

Stibi uel Sibiū,
uulgò antimo-
nium.
Diphyrges.

ges appellatum pharmacum, ulceribus agrè humidita-
tis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est. Va-
lidè enim desiccatur, tametsi modicè mordax sit. Adhuc
præter acrem tum qualitatem, tum potentiam, uim ha-
bet adstrictoriam: quas tamen utrasque fortiores, &
chalcitis cruda, & chalcanthum, id est, atramentum su-
torium, repræsentat. Omne quoque aluminis genus ul-
cera exquisitè desiccatur, & generosè adstringit. Vnde
nemo (inquit Galenus) solis his ad ulcera utitur, sicuti

Alumen.

1^o nec cruda chalcitide, & æruginè: usla uerò & hæc, &
misfæ utilia sunt: ut elota morsum quidem remittunt,
uerùm minus siccant. Illud enim metallicis omnibus
commune est, quòd còbustis elotisq; erosio, quæ priùs
adsuit, edomatur, ac interit. Quamobrem his sic cre-
matis & lotis uti quidem licebit in pueris, eunuchis,
mulieribusq; præsertim candidis: imò etiam & uiris,
qui cute alba uisuntur, et molli carne natura sunt præ-
diti. Item in eis, qui ad sentiendum habiles admodum
sunt, & plethora, uitiosq; succo laborant. Taliū enim

Erosio metalli-
cis per còbustio-
nem edomatur.

2^o corpora facillè ex morsu, seu rosione phlegmonem ac-
cersunt. Itaque cum permulta corpora, quibus mederi
cogimur, unam quandam dispositionem habeant, qua
uehementem commorsum ferendo non sunt, tutius est
lotis, quàm non lotis uti. Cæterum alia, præter hæc
metallica superiùs commemorata, plurima adhuc sim-
plicia sunt pharmaca, quæ malignis ulceribus curan-
dis sunt idonea. Sarcocolla nanque, & ichthyocolla,
id est, gluten piscium, & his magis adhuc chrysocolla,
quàm aurum glutinum appellant, tali facultate prædita

Tutius est locis
metallicis, quàm
non lotis uti.Sarcocolla.
Ichthyocolla.
Chrysocolla.

3^o sunt. Huc etiam optime faciunt, plumbum combustum,
plumbiq; recrementum, quod σκαργίαν μολύβδου

Plumbum com-
bustum.

Græci

- Scoria plumbi.* Græci uocant, & uulgus cacaturam. Siccat & ferri
- Squama ferri.* squamma, præsertim stomomatis, id est, partis ipsius
- Squamma aris.* squamæ subtilioris: hæc enim probè siccat. Porro aris squamma, ex malleorum percussione decussa, quæ Græcè λεπίς χαλκῆς, uulgò autem batitura aris dicitur, præter quòd siccat, etiam abstergit purgatq; Galeno & Aëtio, unde pura quoque ulcera efficit, quod reliquæ squammæ præstare non possunt. Itaque si hæc omnia medicamenta arida ulceribus malignis ac contumacibus insperseris, mirificè (inquit Galenus) uide- 10
- Ostracordermon testæ concretæ.* bis citra erosionem ea desiccari, sicut ubi buccinorum, purpurarumq; ostreorū, sepiarum, aliorumq; id genus ostracordermorum piscium testæ concretæ, & (ut addit Aëtius) lotas adhibueris. Vitrum combustum leuiter ac sine morsu exiccat, hinc dysepulotis, id est, cicatricem difficulter admittentibus, non item malignis, ac rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quàm illa requirunt. Caterùm galla omphacitis, hoc est, im- 20
- Galla omphacitis.* matura: & malicoria, id est, mali Punici cortices seu putamina, cremata, & arida apposta, ad malefica & 20
- Malicorium.* quæ malè coalescunt ulcera, efficacissimum medicamentum deprehenditur. Hæc enim non solum siccandi, sed etiam adstringendi potestatem habent. Cortex etiam capparis tritus, & aridus, malefico & putrido ulcere utilissimè imponitur Aëtio. Malum terræ, quod Græci aristolochiam appellant, iris, acorum, arthemista, panacis radix, argemone, chamæleontis nigri radix, cyperum, dracunculus, & gladiolus, affatim exiccant Gale- 30
- Cortex cappari.* no. His euidentius adhuc centaurium, & poliū: quibus paulò imbecillior est terra nomine creuthrias, quæ 30
- Affatim exiccantia.* Auicennæ et alijs sectæ Arabicæ scriptoribus, cabil nominatur.

minatur. Talis sanè medicamentorum simplicium, ad dysepulota ulcera, maligna ac contumacia, materies existit, quibus & humorum fluxionem interciperè, & locum ulceratum ualenter, citra demorsum tamen atq; erosionem, exiccare possis. Quomodo autem simplicibus eiusmodi medicamenti siccis modò cōmemoratis, in ulceribus ad cicatricem agrè uenientibus, et malignis utendum sit, ex Galeno & Aëtio requirendū est.

Porrò ex his suprā memoratis simplicibus pharmacis, Gale. lib. 4. de compositione medicamentorum secundum genera, uarias remediorum formulas, nempe cerata, unguenta, emplastra, & pulueres conficit, quæ ad eiusmodi maligna, & agrè ad cicatricem uenientia ulcera, mirè proficiunt. Ex cuius quidem scriptis Auicennas formulam unam medicamento desumpsit, quam magnoperè Guido à Cauliaco, & illius ætatis chirurgi celebrariunt. Recipit autem cadmiæ, aluminis, chrysocolle, id est, glutini auri, singulorum partes octo, floris æris, qui spontè ex ære profilit, et corticis æris,
 10 hoc est, æruginis, quæ in officinis uiride æris nominatur, & Græcis ἰὺν ξυσὸν, ustorum, ana partem unam, gummi cupressi partes quatuor, ceræ, olei rosacei, aut myrtini, ana quantum satis esse uidebitur, fiat unguentum. Ceterum, cū unum omnibus medicamentū (ut frequenter dictum est) commodè adaptari non possit, tatiórq; sit leniorum pharmacorum usus, mordaciorū uerò periculosior, cōposita medicamenta distinctè hoc loco describam, quæ ad dysepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia, inueterata, contumacia, ma-

Vnguentū Auicenn. longè optimum.

Ærugo, uel æris ærugo, est uiride æris.

Lib. 4. de compositione medicamentorum. c. 19.

30 ligna, & chironia ulcera, ex Galeni sententia bene faciunt:

Journal

ciunt: primumq; mitiora ac moderatiora referam, deinde ualidiora, ac potentiora subijciam.

Andromachi emplastrū ad ulcera dyscupulota, id est, a grē ad cicatricem uenientia, sed nondum maligna, quod probatur Galeno.

Diphrygis denariūm pondo quatuordecim, argenti spumæ denariūm pondo quadraginta, ceræ denariūm pondo quinquaginta trium, olei myrtei pondo uncie decem.

Aliud eiusdem generis mitissimum & lenissimum.

Eloti plumbi denariūm pondo duū, spodij denariūm pondo quatuor, cadmiæ tantundem, diphrygis denarij pondo unius. Ea omnia excipiantur terebinthinae denarijs sex.

Aliud cicatricem obducens, imbecillius autem, quam ut cacoethe persanct.

Compositio hæc capit, molybdænæ, id est, plumbæ aginæ, drachmas quinque & uiginti, diphrygis drachmas quatuor, sorios aut uitreoli drachmas duas & semissem, misyos tosti drachmas duas, terebinthinae drachmas nouem, ceræ & myrtei utriusque drachmas decē. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, deinde rasa, siccis diligenter in puluerem reductis admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, sæpe fient grumi ceræ modò, maxime cū frigus fuerit. In sole feruenti si mixtura fiat, licet ea superfundere: mouendo uehementer rudicula primum, deinde cochleari. Præstat autem in hisce omnibus (inquit Galenus) rudiculam palmæ esse ramusculum.

Aliud

Aliud medicamen epuloticum, id est, cicatricem ducens, optimum, quod dicitur Ladani, id est, ex ladano inscribitur: ad Critonem relatum, callosis, ueteribus, & curatu difficilibus ulceribus apprimè idoneum.

Picis aridæ denariū pondo uiginti quinque, æruginis rase denariū pondo octo, æris combusti denariū pondo quinque, squammæ rubræ denariū pondo octo, ladani uncias tres, uini optimi sextarium semis, quod capit uncias duodecim Oribasio. (Conuenit etiam hoc medicamentum prætumidis ulceribus, & calulis. Deligatum uerò membrum in diem quartum continendum est.) Argenti spumam & oleum coquito, donec aliquam spissitudinem accipiat: deinde squammā æris, æruginē dum cōfluxerint, ut colorem bonum acquirāt, mox picem adjcito. Posteaquā refrigeratum fuerit, ladanum ex uino tritum: obseruans, ne ex hoc adiecto, effervescat. Postremò supra moderatum ignem unita confundito subigitoq;.

Mediocre medicamentum ad moderatè maligna ulcera idoneum.

Accipe æris cōbusti, et æruginis, utriusq; unc. unā, aluminis scissi, uel scissilis (quod uulgò in officinis alumen de pluma appellatur) semunciam, ceræ uncias duas semis: hoc pharmacum temperatum est, & medium facultate. Porro minus mordebit medicamentum, leneq; prorsus efficietur, si loco aluminis scissilis diphyrgem acceperis, & æruginem combustam apposueris. Quòd si expurgare sordes statueris, æris squammæ semuncia addetur. Hæc autē pingui cera & recte excipienda sunt. Quòd si siccior paulò fuerit, quam ut commemorata excipiat, temperandum est oleum

myrteum, quo mollescat, uel melinum, quod oleum de cydonijs appellant: uel ricinum, quod uulgo in officinis oleum de cherna nominatur: uel omotribes uetus. Aut si omnino nihil oleosum medicamēto adhibere placet, laricem resinam admisceto: cuius si copia nō est, terebinthinam assumito.

Aliud ualidius medicamētum ad chironia ulcera, id est, non mediocriter, sed maxime maligna contumaciāq;
ex Asclepiade.

Aris squammæ, & aruginis rasæ, utriusque pondus unciā, ceræ selibram, hoc est, uncias sex, resina laricis, uel si eius copia non est terebinthinae pondus unc. & semissem. Ea quæ liquari possunt aridis affunduntur. Quibus acceptis, ac curiose mollitis utitor. Item platysma (hoc est, linteum latum, cui emplastrum illitum sit) exiguum soli affectæ parti, ut ulcus tantum comprehendat, iniicito. Ceterum ambientes particulas, pharmaco quod phlegmonem arceat, circundare oportet, atque inter curandum tertio quoque die soluere expedit, deinde fomentis mitigare, ipsumq;
emplastrum, quod à latitudine platysma uocatur, ablūendo emollire, ac rursus (ut iam supra diximus) imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Porro mediam, ac (ut Galenus ait) symmetriam habebit temperiem, ut etiam modice maligna curet, si non tripla, ut in præcedenti descriptione, sed quadrupla ceræ portio metallicis, squammæ scilicet & arugini, commixta fuerit. Sed moderatius adhuc extiterit, si quincupla adijciatur, ut nondum cacoëthe, sed ægrè cicatricem ducta persanet. Itaque cum auxilium ad aliquid spectet, ac mollius pharmacum ad moderatiora cacoëthe, id est, ma-

Platysma.

est, malefica, magis quam uehementius conducatur, satius fuerit in ulceribus non ita malignis & contumacibus, ceram quadruplam, uel quincuplam amborum simul metallicorum esse, ut recte Gal. admonuit.

Aliud pharmacum uehemens & mitigatorium ad cacoëthe, Andromachi.

CEræ tyrrhenicæ (uel eius loco pinguis & recentis, optimæ) drach. octo, seui taurini, terebinthinæ, plumbi usti, singulorū drachmas quatuor, linamentis excepto utitor.

Ad desferata ulcera, quorum scilicet curationem plerique aggressi, non absoluerunt, sed tanquā ab insanabilibus desilire, emplastrum admirandum, cui (autore Galeno,) cum propter alia, tum quoniam longo experimento probatū est, multum confidere oporteat.

Sorios, cuius loco uitriolum sumi potest, drach. uiginti quatuor, aluminis scissilis, quod uulgò alumē de pluma nominant: calcis uiuæ, malicorij, id est, corticis mali granati: singulorum drachmas sexdecim, thuris, gallarum immaturarum, utriusque drachmas uigintidas, ceræ drachmas cētum uiginti, seui uitulini, uel si eius copia non sit, ueteris suilli, quam axungiam uocant: drachmas centum sexaginta, olei ueteris hemina, hoc est, uncias nouem. (Aëtius assumit olei anti- qui libram unam.) Arida trita, & tenuissimo cribro excussa, denuò simul terito. Quæ deinde, his quæ liquari oportet liquatis, & ab igne remotis, permisceto. Cumq; omnia probè unita fuerint, alumen, thus, sori, calcem, singula prius è uino adstringenti trita adijcito, & utitor. Dum Galenus medicamentum hoc con-

In codice Greg.
Gal. & Aëtij.
hæc pōderare-
perimur.

Hemina, Græcū
cotyle dista, con-
tinet olei unc. 9
uini 10.

ficeret, oleum & adipem quadraginta annorum adijciebat, atque ita semper diuturna ulcera, præter modum maligna ac deplorata, opinione melius sanauit. Eius autem generis sunt ea, à quibus pars affecta in tam uitiosum ac deprauatum habitum ducitur, ut sanguinem probe etiam coctum, qui ad eam nutriendi causa deferretur, mutet corruptaq; , uel id quod influit, adeò cacoehymum existit, ut etiam si pars nihil passa fuerit, ab illo certe ipso solo erodatur. Hoc itaque medicamento quod noxium est, transmutatur, atque discutitur. Satiùs autem fuerit cacoehymiam priùs conuenienti medicamēto expurgare, deinde (ut suprà monuimus) ulceris curationem aggredi.

Aliud Galeni, ad chironia ulcera in
mollibus corporibus.

CEræ libram unam, cerussæ uncias octo, rosacei libram unam, salis ammoniaci uncias quatuor, squammæ æris uncias duas, sthuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis uiuæ, singulorum unciam unam: quæ liquari debent, liquata & frigefacta, aridis è uino tritis admisceto, atque placidiori igne decoquito. Cæterum innumera propemodum aliæ formulæ compositorum medic. ex ueterum scriptis à Gal. lib. 4. de comp. medic. secundum genera, referuntur, quæ ad dyssepulota, cacoëthe, inueterata, & chironia ulcera persananda apprimè idonea sunt. Ex illo igitur libro, ueluti è syluâ quadam remediorum, rationalis quisque medicus, & qui methodum ab eo illic traditam artificiose didicerit, idoneam ulceri, quod curandum suscepit, remedij formulam sibi deligere poterit, atque hac solus uti sciet. Porro nonnullas, easdemq; ex ipsis præcipuas,

cipuis, exempli gratia hoc loco adscripsimus, quod magis lectori ad manum essent, & in particularibus, non uniuersalibus solis contentus, exerceatur. Sed iam tempus est, quartam curandorum ulcerum in uniuersum intentionem persequamur. Quarta igitur intentio curandorum ulcerum cum alijs dispositionibus complicatorum, quæ ablata, & (ut loquuntur) rectificata dispositione agglutinationi seu consolidationi reopugnante, loci ulcerati curationem nos aggredi debet.

Quarta intentio curandorum ulcerum.

1. re suadet, iisdem omnino intentionibus & modis perficitur, qui supra dicti sunt. In curatione uulnorum concutorum, in quibus substantiæ aliqua deperditio facta est. Proinde methodus ac curandi ratio, quæ illi à nobis tradita est, in mentoriā reuocanda erit. Ita quæ cum tanta sit curationis ulcerum, cum uulnorum atque etiam apostematum curatione communitas ac conuenientia, nil mirum si Galenus multis locis, eorum tractationem ac doctrinam commiscuerit. Caterum his ita ad umbilicum deductis, tempestiuū est, de proprijs
2. ac (ut dicunt) saniosis ulcerum differentijs pertractemus, inter quas primum se offert ulcus, quod uirulentū & corrosiuū appellant.

De proprijs ac (ut loquuntur) magis famosis ulcerum differentijs, & primò de ulcere uirulento, & corrosiuo, quod Graecis nomodes, id est, exedens appellatur. Cap. XV.



Quid sit ulcus uirulentum seu saniosum, & ulcus corrosiuum siue arrodens, quid item ambulatiuum & depascens siue man-

Cause.

Causa

Causa

Curatio ulcers
exedentis.Hypothesis ex
lib. 4. Ther.

ducans, quod Græci *vopuip* appellant, & quomodo hæc inuicem dissideant, in definitionibus differentiarum ulcerum, abunde est explicatum. Excitantur autem eiusmodi ulcera à prauis humoribus, sed præsertim biliosis, acris, & mordacibus, qui propter adustionem, cacoëthiam quandam, hoc est, malignitatem acquirunt. Atque hæc magna ex parte oriuntur post herpetas, & prurientes pustulas, quas acris, & biliosus humor excitauit: atque etiam post uulnera, quæ mordacibus medicamentis exacerbata atque irritata fuerunt. 10

Ceterum ut ad perfectam sanationem perducantur eiusmodi ulcera, triplici egent auxiliorum genere, sicuti & pleraque alia, nempe uiculus ratione proba, & conuenienti purgatione, quæ succo prauo, acris, & erosionem in affecta particula excitanti, sit accommoda, & localibus remedijs. Age igitur, esto aliquis qui sanus quidem sit, hoc est, omnia naturæ munia inculpate exerceat, sed ex scabenda de repente quapiam particula, ueluti brachio, pustulam statim excitauit, mox eadem ipsa particula iterum atque iterum pruritu uexetur, pustulæq; disrupta ulcus decolor & inæqualiter erosum gignatur, atque hæc in tribus quatuor uel diebus à principio inciderint. Hac itaque hypothesi posita, dicat mihi hoc loco quispiam, quoniam pacto sanare huiusmodi ulcus conueniat. Certè ut eius curationem feliciter assequaris, imprimis qualis sit totius corporis tali ulcere laborantis affectus, statim tibi erit considerandum. Inuenies namq; tū ex ulceris ipsius symptomatis, id est, accidētibus, tū ex notis quas totū corpus præ se feret, cuius maxime generis sit is qui redundat succus. 30

Atq; hunc (si Gale. consiliū sequaris) idoneo purgante medicamento

medicamentō protinus educes, nec protrahes, dum totus hominis cubitus affectū quendā contumacē rebellemq; curationi cōtrahat, quēadmodū facere solebant Theſſali ſectatores; ipſius uidelicet præcepta mordicus obseruantes. Præcipitur namq; ab omnibus ſerē (inquit Gal.) antiquis medicis, quicūque ratione quadā ac methodo de ulceris curatione ſcripſerūt, cauſas quæ illa creant abſcindendas eſſe, æquē proſectō ut cæterorum omniū morborum. Itaque hoc tibi tanquā commune præce-

A purgatione incipienda curatio.

Lib. 4. Tbe.

1 o ptum eſto, omnino in omnibus morbis nedum ulceribus, in quibus effectrix cauſa adhuc manet, ab hac inchoandum curationem eſſe. Hinc rectē monebat Gal. lib. 1. 3. meth. med. digerentia, hoc eſt, reſoluentia, ſeu diſcutientia medicamenta, nequaquā particulis quibusdam applicanda eſſe, ubi redundantia in toto corpore aut ſuperiacente particula ſubeſt. Quippe quōd hæc ſic adnota implerent potius quā educerent. Ita que tunc à totius corporis, aut ſuperabundantiæ mitentis particulæ ſuperiacentis uacuatione incipienda

Comune de digerentibus præceptum.

2 o curatio eſt. Deinde euaporante auxilio utendum. Faſta igitur totius corporis, ut decet euacuatione, (ut faſtum quondam fuit in Romana quadam illuſtri muliere, quæ herpetem eſthiomenum, id eſt, exedentem, in malleolo primum habebat, qui tandem ad bubones uſque aſcēderat) ad curationem particularis affectus, hoc eſt, ipſius ulceris arrodentis deueniendum erit. Ergo ſi particulam exulceratam atq; arroſam ſupra modum calefactam uideris, ipſam ſtatim frigidis ſtypticis deſiccantibus refrigerabis. Commodè autem feceris,

Particularis curationis ulceris arrodentis.

3 o ſi ulcus ipſum, & particulam totā ulceratam aqua aluminosa ablueris: hæc enim ablutio magno uſui tali-

Aque aluminosæ.

- Repellentia & siccantia.* bus ulceribus esse solet. Quippe quæ influentes humores potenter repellat, & siccandi facultatem obtineat, ut autor est Auicennas. Poteris etiam affectum locum irrigare, uel aqua plantaginis & rosarum, uel aqua in qua ferrum candens extinctum fuerit, aut etiam decocto cyperi, myrobalanorum, cupressi, plantaginis, mali corij, balaustij, quod flos est mali Punici syluestris: & consimilium. Vt autem ab ingruentibus defluxionibus, seu ab iniuria influentium humorum, ulcerata particula uindictetur, optimum fuerit circumiacentes partes **10**
- Bolus armenia.* unguento ex bolo Armenia illinere. In medio uerò ulceris, puluis aliquis, qui uim desiccandi habeat apponendus erit, ut ex lithargyro, plumbo usto, pompholyge, quæ uulgò tutia dicitur: antimonio, quod stimmi & sibiū Græcè dicitur: ære combusto, corallio, lapide hematite, spodio, lotis. Atque etiam sidijs, id est, corticibus mali Granati, myrobalanis, et id genus alijs. Item pannorum laciniæ in linamenta formatae, siue plagulae, quæ & splenia Græcis dicuntur, unguento albo Rhasis illitæ, aut unguento quod sextam partē lithargyri re= **20**
- Puluis exicatorius.* cipiat, in quo omnes consentiunt, uel unguento quod diapompholygos nuncupatur, supra ulcus ipsum datae sunt. Ceterum supra eiusmodi pulueres ac linamenta ulceri imposita, puluillus seu puluinus aliquis, quem plumaceolum uocant, posca aquosa imbutus, adhibendus erit: deinde conueniens deligatura, quam exprimentem nominant, cuius supra in tractatu de uulneribus meminimus. Guido à Cauliaco in talibus ulceribus solebat post lotionē absque aliquo, hoc est, nullo alio adhibito auxilio, ponere laminā plumbi tenuem **30**
- Horum unguentorum formula & compositio. nec lib. 6. describuntur.* perforatam, in qua uirtus argenti uiui, cum aqua plantaginis
- taginis

Nota de plumbea lamina.

taginis erat infixā, & ligare. ligatura exprimēte, quod non est (inquit) fas loqui propter idiotas. Itaque tria hęc, molybdos, id est, plumbum, aqua aluminosa, & deligatura decenter facta, miram ac ferē incredibilem vim habent in sanandis eiusmodi ulceribus. Porro de ligaturā talem esse conueniet, quę ad usum magis, quā ad elegantem formam cōducatur: hęc autem duobus modis fit; nēpe uel unico iunculo seu fascia una, uel duabus. Itaq; si una tantū fascia fuerit, principio eius

- 1^o uersus superiorem ulceris partē statuto nectenda erit, siue sura, siue genu, siue maleollus, siue cubitus, siue manus summa, aut alia quęuis pars laborauerit. At si duabus fasciis uti malueris, quemadmodū in fracturis fieri solet, altera a parte affecta, hoc est, ab ipso ulcere, ad superiorem regionem feretur, altera deorsum prius ducetur; mox in superiore parte desinet, eo uidelicet loco quo prior incepit. Ceterū præter reliqua commoda, quę ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quod ulcera quę ob rotunditatem
- 2^o tem coalescere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non singulis diebus, sed alternis facienda est. Neque in solutione ulcus aqua inspergendum, sed molli linteolo, puro, & sicco, sanies detergenda. Quod si partes ulceri adiacentes inflammari uideantur, et iam phlegmonodes quippiam representent, platysmati exterius plurimo spatio liquidum medicamentum illinere oportet, quale est Galeni phoenicinum, hoc est, ē palmulis confectum, uel aliquod simile non quidem quocunque contingerit dilutum, sed uino adstringen-
- 3^o te, quantum imbibiri poterit. Sitq; oleum quod adijcitur refrigerans, & adstringens, cuiusmodi sunt myrteum,

Deligatura duplex.

Deligatura alternis diebus soluenda.

Si partes adiacentes inflammantur.

Olea refrigerantia, & adstringentia.

*Si durities
adfit.*

myrteum, & melinum. Quod si hæc non adsint, omphacinum, & omotribes nominatum adhibebis. At si durities circa partes ulceri adiacentes apparuerit, ipsum phœnicinum, seu emplastrum e palmulis, oleo ueteris, aut ricinino (quod officinæ oleum de cherua nominant) diluendum est. Tutiusq; fuerit superpositæ regioni, quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere, quò si quid uel prauum, uel plusquam par est influat, regeratur. Atque id maximè, cum in crure ulcus obortum, superpositam uenam uaricosam habeat. Quæ dum magna est, ac sanguinem nec colore rubrum, nec probum, sed atrio-

*Si erosio non
cedat medica-
mentis.*

rem & melancholicum continere uidetur, excidenda, ut prius diximus, auferendaq; est. Ceterum si ulcera eiusmodi admota medicamenta contemnunt, in diesq; magis atque magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde à uitiosis succis repurgandum erit, continensq; ipsa seu (ut uocant) coniuncta materia depascens atque arrodens, iniustione seu cauterio (ut loquuntur) actuali absumenda & desiccanda ueniet, modo laborans id genus auxilij tutum, atque utile, ceterisq; alijs longè præstantius, non reformidet, ac renuat. Quod si ferrum candens ob timiditatem, aut delicatam nimis naturam pati, atque admittere noluerit, medicamenta acriora, & quæ ignis uires habeant admouebis, cuiusmodi sunt pastilli Andronis, Musæ, aut Pastonis, in tractatu de tumoribus præter naturam descripti: uel trochisci asphodelorum, aut qui calidicon nominantur, quorum formula ac descriptiones libro sexto referuntur. His etiam attramentum scriptorium, quod & incaustum uocant, magna utilitate

Ursio.

Pastilli caustici.

litate admonetur. Quod si hæc parum profecerint, *arsenicum*, quod sublimatum nominant, modica tamen (ut alibi dictum est) quantitate, tuto adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circumpositæ ulceri partes, interim refrigerantibus perpetuo munendus erit, ne tam uehementibus admotis prædijs, fluxio irritetur. Porro si ne his quidem tam potenti- bus auxilijs malum aliquando uictum fuerit, nec ero- sio ipsa depascens quouis modo sisti possit, membrum
 10 amputare necessarium est, ut uoluit Auicennas.

De sordidi & putris ulceris cu-
 ratione. Cap. XVI.



QUID sit ulcus sordidum, quod Græci rhy-
 paron uocant: quid item putrefactum ul-
 cus dicatur, supra diffiniuimus. Porro sor-
 didum, & putrefactum ulcus Guidoni dicitur, quod
 sui malicia (ut eius uerbis utar) putrefacit membrum,
 dimittendo uiscositatē, aut carnem mollem, siue (in-
 20 quit) crustosam, foetidam, à qua fumus eleuatur foe-
 tidus, & cadauerosus. Ac tale quidem ulcus fraudu-
 lentum etiam appellant. Caterum si eius malicia ulte-
 rius progrediatur, & serpat, in sphacelum (quem uul-
 gus eschiomenum uocat) degenerat, & homini uitam
 adimit. Horum autem ulcerum causæ sunt succi præ-
 ui, crassi sanguinis naturam quodammodo respiscen-
 tes, hoc est, sanguinei, qui seruore quodam uelut ebul-
 lientes, uenenositatem atque malignitatem quandam
 indipiscuntur. Et hæc quidem magna ex parte carbun-
 30 culos maleficos, siue anthracas, abscessus, & uulnera
 malè curata, consequuntur. Porro talium ulcerum cu-
 ratio

*Vlcus sordidum
 & putre.*

*Vlcus fraudu-
 lentum.*

*Causæ ulcerum
 præui & sor-
 didorum.*

Cutandi ratio.

ratio consistit in proba uictus observatione, & euacuationibus accommodis, quibus corpus uniuersum ab excrementis, atque à natura alienis humoribus expurgetur. Vbi autem iam purum ab excrementitijs, atque à natura alienis humoribus corpus uniuersum tibi apparuerit, tum particula ipsa laborans, hoc est, ulcerata, cucurbitulis, scarificationibus, hirudinibus, atque epithematis sive fotibus, à corruptis ac deprauatis succis ipsam occupantibus, uindicanda erit, ut re-
Sordis ablutio. **Et** præcepit Auicennas. Post hæc uerò propriam ipsius ulceris curationem aggredieris. Sordes igitur primò tibi abluenda erit, aut hydromelite quidem, aut marina aqua, uel si eius copia non est, salsa. Deinde mundificandum ulcus, unguento uulgo Apostolorum dicto, aut eo quod Aegyptiacum nominatur. Post hæc, quidam desuper adhuc dandum esse monent mundificationum aliud, ex absinthij succo, melle rosaceo, myrrha, & farina hordei compositum, & circumiacentes ulceri partes, unguento ex bolo Armenia illinunt, ac supra cetera prædicta puluillos, ex stupis cannabinis studio-
Ulceris mundificatione. se pexis, aut ex lineis pannis læuibus, pusca aquosa (quod oxycratum uocant) imbutos apponunt, atque alligant. Si uerò sordes in putredinem, aut corruptionem degeneret, locus abluendus erit oxycrato, aut (ut uoluit Guido) aqua cineris, uel saponis. Deinde emplastrum ex carnibus piscium salforum, farina orobi, & aristolochia longa, non autem rotunda, & scilla, omnibus ex uino coctis, & cum melle mixtis, super accom-
Emplastrum Auicennæ. modandum est. Ad eandem intentionem Auicennas subsequens medicamentum scribit, multa (ut adfirmat) experientia comprobatum. Concipit tragacanthi rubri unciam

unciā unā, calcis uiuæ, aluminis, corticis granatorum, ana drach. sex, thuris, gallarū, ana drach. quatuor, cere, olei, ana quod fuerit satis. Aliud. Vitrioli partes duodecim, chalcitis (quod & colcotar Arabes appellant) partes decem, tragacanthi partes nouem: coquantur in aceto, & ex eis fiat linimentū. Ac semper quidem unguētum ex bolo in ambitu ulceris, ut supra monuimus, apponito: desuper uerò stupeos puluillos oxycrato madefactos. Porro si ulcera eiusmodi depa-

Linimentum.

10 scentia putriq; eo usque feritatis & maliciæ deuenierint, ut partes adiacentes magis atque magis semper erodant, ac sine modo in illis corruptelam excitent, uehementissimis medicamentis (qualia supra in curatione malignorum ulcerum recensuimus) indigebunt. Imò uerò frequenter inuisiones, atque etiam excisiones illis erunt necessariae, ita ut quicquid uiliatum, ac corruptum est, prorsus extirpetur, & uiua ac sana duntaxat caro relinquatur: quam ex natiuo ipsius colore, & sanguinis bonitate, facile deprehendes. Inter cetera

20 autem medicamenta acria, quæ uiuum à corrupto separant, & in hoc affectu celebrari solent, omnium præstantissimum atque efficacissimum quotidiano experimento deprehenditur arsenicum, quod sublimatum uocant, ut aliquoties alibi annotauimus. Hoc enim confestim malū sistit, & id quidem sine dolore. Quod si medicamenti eiusmodi malum non cesserit, membrum ipsum tali depascente ac putrido ulcere affectum cogimur abscindere, ut cetera pars tuta sit. Id autem miserum atque ultimum auxiliū, nunquam tentandum est, nisi dum cetera præsidia nihil proficiunt, & malo prorsus uicta sunt, ut alibi admonuimus.

Arsenicum.
sublimatum.

De profundo

De profundo & cuniculoso ulcere, quod & sinus Latinus dicitur. Cap. XVII.

*Ulcus cauer-
nosum.*



ULCERA cuniculosa seu cauernosa supra appellauimus, quorum orificia stricta sunt, profunditas uero in latum se diffundit, & sensui occulta est, multos interdum anfractus habens, modò rectos, modò obliquos, citra duritiem tamen & callum. Atque hoc uno à fistula distinet, quamuis promiscua turba, eiusmodi ulcera omnia cuniculosa, fistulas nominent: cum tamen fistula propriè ulcus sit altum, angustum, & callosum, Galeno, Cel. Aët. & Paulo. Itaque quod profundum, & cauernosum ulcus recentiores chirurgi appellant, id Latini appositè sinum, Græci colpon nominant. Fit autem cum adiacens ulceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit, glutinaturque: cuius multæ ac uariæ sunt differentie, nimirum ex cauernarum magnitudine, situ, figura ac numero desumptæ. Aut enim breues sunt, aut altè penetrantes, iuxta carnem desinentes, aut ad ossa uel cartilagine[m] subeuntes, sursum, deorsum, uel ad latus tendentes, recti aut flexuosi, simplices ac duplices, triplices'ue. Galenus autem eorum duntaxat, qui à positionis figura sumuntur, meminit: ut qui præcipue curandi rationem immutet. Siue enim magnus, siue paruus aut breuis, uel altus, aut iuxta superficiem consistens, simplex uel duplex, triplex'ue fuerit, eadem semper est eorum curandi ratio. At si uel sursum, uel deorsum, uel ad latus, uel intrò ad ossa tendit, curatio nem uariat. Cum enim sursum tendit, facile per eius os saniosa colluuiet, atque ipsum pus effluit. Cum uero deorsum

Fistula quid.

*Sinus quid, &
eius differentie
multiplices.*

*Que sinu dif-
ferentie curan-
di rationem eua-
riet, & que no.*

deorsum uergit, intus retentum pus, aut sanies, contiguas partes erodit. Quare nisi factò ex aduerso (ut statim dicitur) emissario, nihil omninò profeceris, siue carnem generare, siue glutinare uelis. Cùm uerò ad latera declinat, aut sursum uergit, aut intrò fertur, sed ita locari pars afflicta potest, ut liberè sanies, aut pus, è sinu effluere possit, incisione ex aduerso facta opus

non est, sed de his adhuc in sequentibus. Caterùm *Causa sinuum.*

se eiusmodi sinuum seu cuniculorum ulcerum, sunt

1. abscessus, siue suppurantes affectus tardius dissecti, &

uulnera perperam curata. Pus nanque longo nimis spa-

cio in suppurato abscessu, aut in profundo uulnere,

quod non ritè expurgatur, retentū ac delitescens, mali-

gnitatē, & ueluti acrē atq; erodentē quandam naturā

acquirat, & cuniculos tandem molitur, qui difficile ad

modum carne impleri, & glutinari queunt. Ad affe-

ctam nanque particulam, quæ iam imbecillitatem con-

traxit, undique ex circumiacentibus ac uicinis parti-

bus, imò uerò & ab uniuerso corpore, superuacanei

2. humores confluunt, atque ita agrè sanabile redditur

ulcus. Differentiæ cuniculorum seu cauernularum

eiusmodi ulcerum, deprehenduntur turundis (quas ten-

tas uocant) & specillis, siue contis (quæ probè uulgò

dicuntur) argenteis, uel plumbis, aut alia cōsimili ma-

teria factis, in ipsos cuniculos leniter ac blandè immis-

sis. Item minutis quibusdam, atque exilibus radicibus,

& cereis candelis, necnon & coloratis quibusdam inie-

ctionibus. Color uerò materiæ, quæ ab ipsis cauernu-

lis & sinibus egreditur, qualitatem eius manifestè in-

3. sinuat: si enim tenuis fuerit, & loturæ carnis persimi-

lis appareat, calidam esse haud temerè eam iudicabis.

At si

Sinui differen-
tia quibus depre-
bendantur.

Iudicia.

At si cādida uisitur & serosa, indubiè frigida erit. Sed & saniei puris uel bonitas, & paucitas, doloris quoque & tumoris, qui prius aderant, priuatio, sinum carne impleri & glutinari demonstrant. Si uerò contraria his adfuerint, glutinationem nequaquam adhuc fieri nobis indicant: ut Galenus his uerbis nobis testatum reliquit, libro secundo de ratione & methodo curandi, ad Glauconem: An uerò (inquit) altæ sinus paræ, , tes coaluerint, ex manante sanie deprehendes, si ea, , multa uel pauca, cocta uel cruda sit. Præterea si 10 neque in ipso sinu dolor sentiatur, nec tumor appareat, sed totus locus æquabilis sit, siccus ac doloris, , expers. Quòd si puris probe cocti portio exigua in ore conspicitur, multò magis de glutinando sinu sperandum est. Hactenus de sinuum differentiis, causis, & iudicijs dicta sufficiant. Itaque tempestiuum est, eorum curationem aggrediamur, & qua poterimus breuitate, nunc prosequamur.

Ratio curandi sinus, seu ulceris profundi & cauernosi, 20
non tamen adhuc callosi.

In curando sinu, geminū esse scopum.

CVM sinus, quo de hic agimus, ulcus sit cauum & profundum, geminus in eo curando scopus ac finis medenti proponitur, unitio scilicet & repletio. Vlcus enim quā ulcus est, unitiōnem, cavitās uerò impletionem desiderat. At quæ dissident, uniri non possunt, nisi prius cavitatem (si cum ulcere, ut in sinu coniuncta sit) impleuerimus. Ordo igitur curationis postulat, ut à cavitatis impletionē ordiamur. Sed cavitās 30
rursus carne impleri non potest, nisi laborans particula
cula

- cula & iusto temperamento prædita sit, & sinus ipse omnino purus, & ab omni sorde immunis extiterit. Itaque si uel pblegmone, uel erysipelas, uel gangrena, uel intemperies aliqua simplex aut composita partem affectam obsederit, manifestum est quòd nisi quis illos affectus prius sanauerit, implere cauum ulcus non poterit. Fieri enim non potest (ut lib. 3. meth. med. Gal. inquit) ut in ulcere uel carnis productio, uel sinus impletio, uel agglutinatio, uel cicatricis inductio rectè unquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Adhæc cum in ipsa nouæ carnis generatione, duplex prouenire excrementum necesse sit, alterum quidem crassius, quod sordes propriè appellatur: alterum tenuius, quod Græci $\iota\chi\omega\epsilon$, nobis uerò sanies dicitur: ac ex tenui quidè hoc excremento, ulcus humidum reddatur, sicuti ex crasso sordidum: duplicibus sanè medicamentis sinuosum ulcus egebit, antequam carne repleatur: nempe ut humidum est siccantibus, ut sordidum expurgantibus seu detergentibus. Ordo igitur sanationis à sorde expurganda in curando sinu incipiet, quòd uidelicet nec glutinari quicquam, nec carne impleri possit, priusquam purum, hoc est, detersum, & à sordibus rite expurgatum fuerit. Vbi uerò iam ab omni alio affectu immunis, & purus ab excrementis sinus fuerit, tàm primum agglutinantibus medicamentis utendum erit. Hæc autem nec detergent, nec expurgant, ut sarcotica, id est, carnem generantia, sed contrà prorsus (inquit Galenus) substantiam omnem in idem conuertunt: cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, quæ austera & adstringentia uocantur. Hæc enim siccant tantisper, dum humoris redundantiam qui secundum naturam
- In noua carnis generatione duplex prouenire excrementum.*
- Vlcus sinuosum duplicibus eget medicamentis.*
- Agglutinantium facultas.*
- G G

Hypothesis.

dum naturam est, absumat. Sed de ijs alibi fustus à nobis dictum est. Pone ergo in eadem particula sinu occupata, intemperie aliquam, uel phlegmonem, aut con similem affectum, & cavitatem, & ulcus, & sordem simul consistere: ordo curationis exposulat, ut primum phlegmonem aut intemperiem, secundo loco sordem, tertio cavitatem, & quarto ulcus persanes. Si quidem iuxta subiectæ carnis temperies, causæ rationem habet, ut quæ concreescere secum quod ulceratum est, faciat, & cavitatem impleat. Puit as ulceris, rationem eius sine quo non: atque hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet uero & ipsa cavitatis, ad ulcus, rationem eius sine quo non, ut lib. 3. Therap. Galenus annotauit. Quando (inquit) nisi cavitatis prius impleta sit, induci cicatrice ulcus non possit. Atque hæc in uniuersum dicta sunt de ratione curandi sinus, quod & ulcus profundum, & cauernosum, nostri chirurgi appellant. Cui magna ex parte compli cari solent, quæ supra commemorauimus. Hac igitur uniuersali methode præmissa, particulariū ipsorum sinuum differentiarum (quas curandi rationem uariare diximus) sanationem subiungamus. Cōstituatur igitur imprimis sinus ad superiorem partem porrectus, ita ut eius orificium deorsum spectet, talis certè non adeò multum negotij in sanando faceffet. Quandoquidem per os eius facile sanies effluet, atque idèò promptè conglutinabitur, adhibitis saltem ijs, quæ statim dicentur auxilijs. Sed neque cum ad latus declinat, aut intro fert, aut etiam deorsum uergit, incisione ex aduerso facta opus erit, si pars ipsa afflicta ita locari possit, ut liberè sanies e sinu emanare queat. Atque ponatur

Si sinus orificiū
deorsum spectet.

Incisio ex aduerso,
quando in sinu fieri debeat,
& quando non.

sinus

- sinus artus aliquos, nempe cubitum, aut femur occupare, poterit utique declinuis figuratus, citra diuissio-
1. nem ex aduerso factam coalescere. Etenim in cubito cum oræ gibbero uicinæ sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxionem indicabis. Sic & in femore, si sinus deorsum uergat, Ex Paul.
Ex Gal.
2. ad Glau.
- & ad genu terminetur, os autem ipsius sublime supra femoris mediū sit, popliti mollem puluinum subijcies, quò demissius inguen quàm genu positum sit. Ceterum si sinus deorsum uergat, aut ad latus declinet, uel intrò feratur, & situm affectæ parti commodum dare non possis, quò liberè sanies effluat, nihil unquam promouebis, siue carnem generare, siue glutinare uelis, nisi prius collectioni purulentæ effluxum molitus fueris. Intus enim retenta sanies contiguas partes erodet. Porro saniose illi colluuiet effluxum bifariam moliri poteris: nempe uel facto, tantum in imo sinus uulnere, uel tota cavitata dissecta. In imo, seu radice sinus fit sectio, si ulcus magnum fuerit, & locus totus sine
2. periculo secari non possit. Præstiterit autem semper, si nihil obliterit, totam ipsius sinus cavitatem disseccare, quàm ex aduerso plagam facere. Ita enim facilius ac citius multò, ad sanitatem ulcus perducetur. Tota igitur cavitata dissecta, ellychnijs, & pannorum lacinijs in linamenta formatis, congruisq; medicamentis sic expurgandus, atque resiccandus erit sinus, ut tandem caro regignatur, cavitata impleatur, & ad perfectam sanationem, modo quo supra de altis, & cauis uulneribus docuimus, perducatur. Ceterum priusquàm
3. ex aduersa parte diuissio fiat, purulenta colluuiet sinen-
da est, magna satis copia in fundo ipsius sinus colligi,

Risariam efflu-
uium moliri pos-
se sanici, aut pu-
ri, in sinu.

Quòd multa pu-
ris copia sinen-
da est colligi in
fundo sinus.

prinsquā ex ad-
verso diuidat̃.

Specillum, quod
in sinum immit-
tatur, quale esse
debeat.

Si neque aper-
tio in imo, neque
cavitas tota dis-
secare possit.

Sinus quibus li-
quoribus ablucen-
dus.

quò sinus parietes magis attenuentur, atque ita me-
lius specillum (supra quod sectio fieri debet) in cavitatem demittatur, sinu scilicet ex puris copia distento, & ampliore facto. Specillum autem ipsum quod sic in sinum immittitur, læue, hoc est, minime asperum esse debet, ac unctuosum aliquo (ut citra dolorem immitti possit) illitum. Adhæc parte posteriore perforatum esse decet in modum acus, ut in eo imponi possit ceto aliquis (ut vocant) ex stupis canabinis, aut aliqua gracili fascia, aut certe funiculo quoptam molli, ut canabino, factus. Incisione autem facta, dolor qui per eam exci-
tatus est, sedandus erit, & impetus profluentis sanguinis, omni candido, atque alijs id genus supprimendæ sanguinis profusioni dicatis auxilijs, compescendus. Post hæc autem ceto alius, quando opus erit, detergente aliquo medicamento imbutus, indendus erit, atque ut id commodius fiat, alteri, qui sinum adhuc occupat, aut assuetur aut alligabitur. Poterunt & ellychnia, seu linamenta in mundificatiuo aliquo tincta, in sinum ipsum imponi, superq̃, atque in ambitu danda sunt, quæ mox infra dicemus. Porro si neque in imo ipsius sinuosi ulceris, plaga commodè fieri possit, neque cavitas tota diffecari, sinus totus eluendus erit collutionibus, primum quidem deterforijs, si inhaerentem saniem subesse suspicaris: deinde sarcoticis, id est, carnem generantibus: postea uerò ad glutinans medicamentum transcendendum erit. Proinde Galenus libro secundo de ratione curandi ad Glauconem, sinum ipsum nunc melicrato solo, id est, mulsæ, nunc quidem puro uino, nunc uerò mulso, eluendum esse monet. Itaque ad detergendam, expurgandamq̃; sinui inhaerentem san-
niem,

- niem, melicratum præferendum est. Sed præsertim in *Melicratum.*
 sinu cuius os deorsum spectat, per quod sanies liberè
 effluat. Huius nanque sinus profunditatem totam, ad
 glutinationem aptam (ut Galenus inquit) sola reddere
 potest injecta mulsæ. Ad purgandum uerò simul & ro-
 borandum, ubi scilicet adhuc aliqua levis cuiusdam
 sordis, derelictæ suspitio est, uel ipso etiam Aëtio autò-
 re, mulsum eligimus. At ubi carnem iam in sinu me- *Mulsum.*
 diocriter exentam, omninò puram esse cōiecerimus,
 10 & glutinationem querimus, uino puro subadstringen-
 te sinum ipsum eluimus. Vinum enim eiusmodi, quod *Vinum subadstringens.*
 medium est inter dulce & adstringens, leuiter gluti-
 nat. Si autem cruentus foetidusq; sit humor, qui è sinu
 excernitur, oxymeli (Aëtio autore) cæteris præstat. *Oxymeli.*
 Auicennas & quidam alij, sinum præsertim malignio-
 rem, & uehementer sordidum, detergent & eluunt,
 aut lixiui, aut marina aqua, aut etiam aluminosa, quæ
 in hoc affectu præstantissima est. Hæc enim præter *Aqua aluminosa.*
 quàm quòd potenter sordes abluit, à parte quoque
 20 affecta fluxionem arcet, & repellit. Albucasis chi-
 rurgus insignis, unguentum Aegyptiacum cum aqua
 & melle liquatum, in sinum eiusmodi, deterfionis &
 corrigendæ malignitatis gratia immitti iubet. Gale-
 nus quoque, ubi sinus ipse, aut situs, aut alterius cuius-
 uis occasione, sordidior aut humidior est, medicamen-
 ta quæ ualentiùs quàm mulsæ desiccant, & detergent,
 adinuenda esse suadet. Cuiusmodi est medicamentum
 ex combusta charta compositum, quod ad hunc modum *Medicamentum ex charta combusta.*
 , temperatur: Squammæ, gallæ, myrrhæ, singulorum
 30 pondo denarium octo, sandarachæ, arsenici, elaterij, id
 , est, succi cucumeris agrestis, singulorum pondo dena-
 rium

riūm quatuor, thuris pondo denariūm trium, atramen-
 ti sutorij (quod Græci chalcantum uocant) tantundē,
 chartæ quantum satis est ad inducēdum colorem. De-
 bet autem exigua eiusmodi medicamenti portio largo
 rosaceo misceri, quò & eius uehementia remittatur,
 & per angustum foramen, in sinus profundum, per fi-
 stulam aut aneam aut corneam, recto ductu foratam,
 possit iniici. Iniecto autem medicamento, ulceris os li-
 namento concepto claudendum est, ne id refluat. Nisi
 enim diutius maneat, exiccare non poterit. Caterū
 si ulcus calidum fuerit, hoc est, calidam intemperiem
 sibi adiunctam habuerit, & uirus ab ipso sinuoso ulce-
 re manans, rubrum & loturæ carnis recenter macia-
 te persimile appareat, non alienū fuerit ipsum abluere
 melicrato, hoc est, aqua mulsæ recentis, in quo lenti-
 cula, hordeū, rosæ, & balaustium incocta fuerint. Si ue-
 rò ulcus frigidum sit, & sanies tenuis & aquosa con-
 spicitur, mulsæ in qua incocta sint, marrubium, absin-
 thium, pimpinella, & myrrha, eluendum est. Porro ubi
 sic ab omni sorde pueros sinus effecerimus, carne re-
 plētibus medicamētis, (sarcotica Græci uocant) si caui
 saltem fuerint, deinde glutinantibus, & tandem cicat-
 ricem inducentibus, similiter reliquis ulceribus uten-
 dum erit. Carne autem replent, quæ humiditatem sic-
 cant, & sordem detergent. Itaque idem medicamen-
 tum primariò atque ex sese sordis detersorium Gale-
 no appellatur, altero uerò significatu sarcoticū & glu-
 tinans: quippe quòd tali imposito medicamento, ulce-
 ra carne replentur, ac coeunt. Opus enim ipsorū pro-
 prium est (ut alibi scripsit Galenus) affectam partem
 recrementis uacuare, ne uidelicet sanies carnis gene-
 rationem

*Si ulcus sinuoso-
 sum calidum
 fuerit.*

*Si ulcus sinuoso-
 sum frigidum
 fuerit.*

*Idē medicamen-
 tum detersorium,
 sarcoticum, &
 glutinans.*

rationem glutinationemq; impediatur. Sarcotica igitur detergendi etiam vim habent, sed omnis rofionis seu morfus expertem. Finis autem glutinantium est, nullam inter coitura subnascentem humiditatem permittere. Glutinatio namque (ut tertio methodi Galeni ait) unum id propositum est, ut eius quod secundum naturam est, redundantiam consumat. Epuloticorum uero, id est, cicatricem inducentium medicamentorum finis est, non hanc totam subnascentem, ac redundantem humiditatem impedire, sed etiam nunc consistentem, in ijs quae mox cicatricem ducent consumere: adhuc callo obducere, & adstringendo indurare. Sed de ijs in antidotario fusius dicemus. Ergo (ut ad propositum reuertamur) si cauius sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod charta constat, aridi, paululum cum multo rosaceo inferi conuenit. Deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum ipsis aut Macherionis, aut simile quoddam, unum cum rosaceo cerato liquidiore solutum inijcitur. Vbi uero mediocriter carne repletus est sinus, aliquid ex glutinantibus medicamentis, non uehementer siccantibus adhibendum est, quod crescentem tenellam carnem blandum, & sine morfu cogat, non aliter ac si recens ac cruentum uulnus curaretur. Curatur autem hoc mollibus, blandis, minimeque dolorem excitantibus medicamentis, qualia sunt enema, quorum opus seu facultas est coniungere, & diuisas partes conglutinare, ut in pristinam unitatem particula reducatur. Multa (inquit Galenus) eiusmodi medicamenta inueniuntur, alia quidem ex bitumine confecta, uocanturque, nescio qua ratione, ut idem ait, emplastra Barbara: alia uero, quia fului & fusci sunt

Sarcoticorum facultas.

Glutinantium finis.

Epuloticorum finis.

Si cauius sinus carnem requirat.

Enema.

Citrba. & phæa sunt coloris, citrba, & phæa nominantur, ex argenti
medicamenta. spuma & ærugine liberalius decocta. Horū autem me-
Auicennas. dicamentorum mixturas, Galenus, Paulus, & Celsus do-
 cent. Sed præstat de hac re interpretis uulgaris Auia-
 cennæ uerba subijcere: Ad incarnandum (inquit) oportet, ,
 tet quòd medicinae fiant currentes lauatius, cum ui- ,
 scositate adherente, & iniiciantur in eis cum clyste- ,
 rijs, & immittantur cum ellychnijs & tentis. Et nos, ,
 quidem iam experti sumus emplastrum Apostolicum, ,
 id est, Apostolorum, & centauream, quando cum ea 10
 implentur, & est mirabilis ualde. Succedit huic sym- ,
 phyton, deinde iridis Illyricæ radix, postremò erui fa-
 rina, & id genus alia, quæ glutinandi facultatem ha-
 bent. Porro sequens medicamentum, quod in frequen-
 ti est usu apud chirurgos, miram uim habet in gluti-
 nandis seu incarnandis eiusmodi ulceribus. R. aquæ
 decoctionis hordei libram unam, mellis rosati uncias
 tres, sarcocollæ drachmas duas, myrrhæ, thuris, singu-
 lorum drachmam unam, uini odoriferi unc. sex. Co-
 quantur omnia simul usque ad tertias, id est, usque ad 20
 consumptionem tertiæ partis. Quibus & addi potest
 aliquando aliquid aloës. Cæterum post glutinantis me-
 dicamenti impositionem, sola sponsia noua ex mulso
 iuxta Galeni consilium circumponenda est, quàm fieri
 potest mollissima. Eius autem deligatura à sinus fun-
 do incipiat, & eius ore finiat: fasciarum uerò spiræ
 siue circumflexus, sinus profundū sine dolore ardent,
 ac paulatim usque ad os eius elaxentur, eidemq; (ori
 inquam sinus) indatur medicamentum molle, circumdu-
 cto forinsecus emplastro ad os ipsius sinus forficibus 30
 discisso, ut sanies effluere possit. Effluet autem è sta-
 nu sanies,

Medicamentum
incarnans & glu-
tinans.

Modus deligendi
sinus post gluti-
natorij medica-
menti imposi-
tionem,

nu sanies, supposito aliquo alio paruo emplastro ad solutionem usque, quam tertio quoque die faciens; hoc ipsum tanquam operculū circumpositum auferes, relicto eo quod totum ambit sinum, medicamento. Ideo autem tertio quoque die, aut cerie citius aut tardius, prout res effragitabit, demenda spongia est, ac paruum emplastrum quod superpositū erat, ut si qua humoris colluuiis in ore sinus collecta sit, uacuetur, explore-
musq; an altæ sinus partes coaluerint, an minime, quod

Tertio quoque die spongia, ac paruum emplastrum demenda.

1 o ex manante sanie (ut docet Galenus) deprehendetur. Si scilicet ea multa uel pauca, cocta uel cruda sit. Itaque altas ipsius partes coaluisse demonstrat, pus coctum ac paucum, præsertim si neque in ipso sinu dolor sentiat-
tur, nec tumor appareat, sed locus totus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Cumq; spongiam rursus im-
posueris, rursusq; (ut diximus) adalligaueris, postero uel tertio die soluito, ut dictum est, semper lintecolum sinus ori admotum permutans, quod eodem emplastro
illitum, totum os ambitu cingat. Neque uerò omnino

Lib. 2. de arte curat. ad Glau.

2 o appressum (ut Galenus admonet) esse debet, sed ita, ut per id tota sanies uacuari possit. Itaque cum secundo uel tertio quoque die (ut iam semel atque iterum dictum est) spongia, uel paruum emplastrum eximit-
tur, considerandum, multa ne an pauca, cruda an co-
cta materia ad os ulcers affluxerit. Deinde expers ne sit, an particeps doloris locus affectus, & an tu-
mor remanserit, aut diminutus sit. Altas enim sinus partes coisse testatur pus coctum ac paucum, præ-
pueq; si dolor & tumor non adsint. Contrà, multum
3 o & crudum, & cum foetore, & loci humiditate, dolore
& tumore, nondum coaluisse significant. Neque uerò
(ut scribit

Inom. medicis
m. m. m. m. m.

Nota: coitionis
altarum sinus
partium.

(ut scribit Galenus) si primo uel secundo die tenuis quædam sanies ex sinu manet, de glutinatione omnino desperandum est. Sepe enim uis medicamenti affectæ, particula admoti, ex ipsa cute & subiecta carne tenuem humiditatem uehementer exprimit, quoties eius, qui curatur corpus ita affectum est, siue ex natua temperie, siue mala uictus ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocriter resiccata glutinantur. Quod si tertio, aut quarto ab initio die, sanies cruda in ore appauerit, scito (inquit idem) sinum non esse glutinatum. Quare affecto loco medicamentum, quod uehementer quidē exsiccat, sed nec mordeat, nec cutem contrahat, circumponendum est. Cuiusmodi Galeni medicamentum est, quod à fuluo colore cirrhum dicitur, ex concoctis metallicis, oleo ricinino, quod oleum de cherua appellant, & aceto sine cera confectum. Hoc enim medicamentum (ut idem Galenus testatur) sine morfu uehementer exiccat. Cuius compositio & usus ex libro secundo de compositione medicamentorum κατὰ γένη requiri debent. Guido à Cauliaco iubet post glutinantis medicamenti impositionem, desuper apponenda esse emplastra, & pannos, aliquo quod habeat (ut eius uerbis utar) rectificare illa, illitos. Cuiusmodi sunt, emplastrum διὰ χαλκίτεως nominatum, quod à palma Græcè Φοινικίον, & uulgò diapalma appellatur. Item emplastrum (inquit) nigrum uel flauum cum galis: & mel coctum cum puluere thuris, myrrhæ, et aloës: uel quædam horum, uel omnia simul: & uinum stypticum crassum, quod grossum uocat. Postea ligare præcipit, ut docet Gal. lib. 2. ad Glauconem. Paucis autem interiectis subdit, de tenta (ut loquitur) hæsitasse multos, 46

Cirrhum medicamentum.

Guido à Cauliaco.

tos, ut Henricum; & præceptorem suum Bononien-
sem, quod solida non ponatur, qua saniem (inquit) in lo-
co retinet: sed cannulata, aut duplicata, ut sanies con-
tinuè ualeat exire, & spongia super orificium pona-
tur, ut sanies trahatur exterius sugendo. Spongia nan-
que ideò circumdatur atque alligatur, ut exiccet, ma-
nantemq; è sinu saniem excipiat, alioqui partem ero-
suram, aut pruritum excitaturam. Imbuta autem (ut
suprà diximus) mulso spongia sit, ut detergeat: mollis,
10 ne asperitate, lædat: noua uerò, ut aqua marina adhuc
imbuta partem affectam desiccet. Haslenus de ratione
curandi ulceris alti, angusti, & cauernosi, non tamen
callosi. Nunc ordo postulat, ut de calloso ulcere, seu cal-
lo obducto sinu, quam fistulam nominant, dicamus.

*Spongia qualis
esse debeat.*

De fistula. Cap. XVIII.

QUAM pus in abscessibus sic excoriat parti-
culam, ut continentia à subiectis separet ac
20 diducat, dein eo quomodocunque euacuato,
distàtia inter se pristinum statum recuperare nequeant,
affectio eiusmodi sinus appellatur Galeno, libro de tu-
moribus præter naturam. Quem si quis (ait ille) non
statim curet, callo obducitur, durusq; temporis pro-
gressu fiet, nec conglutinare ipsum cum subiectis sibi
possibile est, uocaturq; tunc hic affectus propriè fistu-
la, de qua nunc dicere instituiamus. Est igitur fistula
(quam Græci syringa nominant) arctus, oblongusq; et
callosus sinus, aliquatenus indolens, qui magna parte
30 ex abscessibus parum dextrè curatis, oritur: sed & ex
alijs nonnunquam ulcerum generibus ac sinibus perpe-
ram

Sinus.

*Sinus degene-
rat in fistulam.
Fistula quid.*

Fistularū dis-
sentie multipli-
ces.

rām curatis nascitur. Hæc autem nomen accepit ab harundinearum fistularum translatione, ut Paulus annotavit. Quādoquidem in eis cavitas quedam deprehenditur, harundinum cavitatibus similis. Est autem fistula in omni ferè parte corporis, habetq; quedam (ut Celsus ait) in singulis locis propria, sed de cōmunibus hæc dicemus. Differentiæ igitur fistularum plures sunt, sicuti & sinum, quæ ex situ, figura, numero, magnitudine, & alijs id genus sumuntur. Siquidem aliæ sub cute extensæ sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ, aliæ flexæ & tortuosæ sunt: aliæ intra carnē desinunt, aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant: aut ubi neutrum horū subest, ad interiora perveniunt. Aliæ nervos attingūt, aliæ uenas aut arterias occupant. Aliæ præterea simplices sunt, aliæ duplices triplices uel ab uno ore intus orsæ, quæ tres fiunt, aut etiā in plures sinus diuiduntur. Aliæ deinde faciliæ, aliæ cū difficultate curantur. Atq; etiam (inquit Celsus) quedam insanabiles reperiuntur.

De signis & indicijs fistularum.

Fistularū nota
à quibus petan-
tur.

Fistularum dignotiones sumende sunt, ab his quæ secundum essentiæ rationē ipsis insunt, atq; etiam ijs, quæ consequuntur accidentibus, & effectibus. A substantialiter quidem inherētibz, ut ab illo (inquit Guido) corio calloso, et à forma fistulæ instrumentalis, & factitiæ. Callositas nanque cum forma fistulari, essentialis est differentiā ipsius fistulæ. Ab accidentibus uerò & effectibus, ut à uirulentia illa horribili, quæ aliquando ab ipsa fistula effluit, emanat uel à dolore, qui in ea modicus esse solet, nisi dum partes

quæ

quæ iuxta neruū sunt, occupat. Ceterum simplices ne
 fistulæ sint, aut in plures partes diducantur, cognos-
 ci potest ex modo puris. Cuius si plus fertur, quam
 quod simplici spacio conuenit, plures sinus callo-
 sos esse manifestum est. Corporis quoque inquina-
 tio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint.
 Quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterq; membrū
 collocauit, pus ferri, quod iam desierat, incipit: testa-
 turq; nō solum alium sinum esse ex quo descendat, sed
 etiam in aliam corporis partem eum tendere. Cumq;
 ferè iuxta sint caro & neruus, & aliqua nervosa: qua-
 les ferè tunicae, membranaeque sunt: genus quoque puris
 docebit, num plures sinus intus diuersa corporis gene-
 ra perroserint. Siquidem ex carne (inquit Celsus) pus
 laeue, album, copiosius fertur. At ex nervoso loco colo-
 ris quidem eiusdem, sed tenuius, & minus. Ex neruo,
 pingue, & oleo non dissimile. Cuius sententiæ refraga-
 ri uidetur Aëtius, sic de nerui fistula inquit: Humor
 inde delatus tenuior est, ei similis, qui ab ossibus defluit,
 non quidem oleaginus, aut pinguis, sed saniosus & glu-
 tinosus. Sed & ex alijs notis, quam ex pure, deprehen-
 ditur nerui fistula, nepe dolore: stuporis enim punctio-
 nisq; sensum incutit. Deinde motus, qui ab eo neruo
 perfici solet, deterior apparebit. Sed in specillo attactu
 (inquit Aëtius) molestus acutusq; sensus redditus, rem
 manifestissimè indicabit. At fistula locum erodente, si
 uena suberit, plurimus crassusq; sanguis effunditur.
 Sin arteria aperiatur, tenuis & flauus cum multo spi-
 ritu stridoreq; exibat. Ante omnia autem (ut rectè con-
 suluuit Celsus) demitti specillum in fistulam conuenit, ut
 quò tendat, et quàm altè perueniat, scire possimus. Si-

Quibus notis de-
 prebèdatur, sim-
 plex ne sit fistu-
 la, an multi-
 plex.

Lib. 5.

Aëtius.

Nerui in fistula
erosi nota.

Vena atque ar-
teris erosa si-
gna.

Fistulae specillo
maximè explo-
randa.

*Os in cariosi
nota.*

*Oblique fistule
quomodo explo-
randa.*

mul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extra-
elo specillo patet. Si uerò os in uicino est, id quod di-
sci potest sic, iam nec ne eò fistula penetrauit, quatenus
nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo con-
tingitur, intra carnem adhuc uitium est. Si uerò magis
id renititur, ad os uentum est. Ibi deinde si labitur spe-
cillum, nondum caries est: si nō labitur, sed æquali in-
nititur, caries quidē, uerū adhuc leuis est. Si in æqua-
le quoque & asperū subest, uehementius os exesum est.
At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentūq; 10
esse ad eam ex renixu patet. Cæterum si oblique fue-
rint fistulæ, flexumq; aliquem, uel plures habuerint, ut
specilli apex progredi nequeat, uirgulam plumbeam,
flanneam uel conflaginam, aut ceream potius candelam
assumemus, qua iter pertentemus. Cum enim flexilis
admodum sit, ad fistulæ figuram facili accommodabi-
tur. Hactenus de signis fistularum, nunc de iudicijs.

Fistularum iudicia, seu prognostica.

Lib. 7.

Cor. Cel. lib. 5.

Fistulæ si altius penetrant, ut ad ultimas demitti 20
collyrium non possit, si tortuosæ atque anfractu-
sæ sunt, si multiplices, maius (inquit Celsus) in manu,
quàm in medicamentis præsidium est: minusq; operæ
est, si sub cute transversæ feruntur, quàm si rectæ in-
tro tendunt. Expedita quoque curatio est in fistula sim-
plici, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus, si
iuuenile, si firmum est: inimica contraria his sunt.
Itemq; si fistula, os, uel cartilaginē, uel neruum, uel mu-
sculos læsit, si articulum occupauit, si uel ad uescicam,
uel ad pulmones, uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, 30
arterias uel ad inania, ut guttur, stomachum, ichora-
cem,

cem, penetravit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum saepe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Aegre (inquit Paulus) consanescit in ano fistula, quæ orificio caret, tum quæ delitescit, & in os terminatur, multifariamq; fissa est. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spacia, & noxa. Prætereà an simplices hæc sint, an multiplices, & in plures partes diductæ. Haftenus igitur de fistularum differentijs, signis, et iudicijs. Deinceps uerò de medicamentis ad easdem conferentibus differere oportet.

Paulus.

De fistularum curatione in uniuersum.

Imprimis genus uiclus conueniens, & quod substantia & qualitate, causis, quæ fistulæ consolidationem impediunt, aduersatur, instituito. Deinde corpus uniuersum à superuacaneis, & noxijs humoribus (illis tamen prius, si ita res exigat, expulsionis paratis) idoneo cathartico medicamento purgato. Mox potionibus roborandis ac desiccandis interioribus partibus accommodis, fistulam ad consolidationem præparato. Ceterum tametsi potiones multæ ad hanc intentionem à uarijs autoribus descriptæ sint, duæ tamen sunt quæ frequenti usu, & felici successu à recentioribus medicis probatæ sunt. Prior ad hunc modum habet: Agrimonie partes tres, plantaginis partes duas, foliorum oliuæ partem unam: scindantur minutim & contundantur, postea in uino albo coquantur, & fiat colatura, de qua quolibet die sub auroram cyathus unus administretur. Altera, ex osmunda (quæ filix mas est Dioscoridi) partes tres, gentianæ partes duas, centaury par-

Ratio curandi
uniuersalis.Potiones fistu-
lis idoneæ.

Guaiacum, lignū
sanctum.

rij partem unam, coquantur in uino albo, & fiat potio, quæ ut prior administretur. Hæc postrema etiam ualde efficax est in osium corruptorum expulsionem. Ego autem optimè factum existimauerim, si in prædictis decoctionibus nonnihil ligni Guaiaci, uel Indici (quod lignum sanctum, & palmam sanctam appellant) aliquot horas maceretur, postea moderato igne leuiter decoquatur, & ex colatura quantum assidenti medico satis esse uidebitur, manè bibendum offeratur. Atque hæc regimen (ut loquuntur) uniuersale concernunt. 10

Ratio curandi
particularis.

Quod autem ad topica pertinet auxilia, & regimen (ut uocant) particulare, quatuor sunt ordine peragenda. Primum quidem fistule orificium, si non satis hiet, hoc est, si nimis strictum fuerit, imò uerò & sinus ipse fistularis usque ad fines eius, si fieri possit, dilatari debet. Secundo loco callum eximere, fistulamq; auferre, atque omnino destruere conuenit. Tertiò post exemptum (quocunque modo id fiat) callum, sordities detergenda ueniet. Quartò ubi purus iam ab omni sorde sinus uidebitur, similiter reliquis ulceribus ad sanitatem perducetur: nempe glutinatorijs, seu (ut loquuntur) incarnantibus medicamentis, & epuloticis, id est, cicatricem inducentibus, atque etiam (si carnis aliqua fuerit amissio) sarcoticis, id est, carnem generantibus pharmacis. Ergo si nec aduri ferro, nec incidi commodè possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue unus ac simplex, siue multiplex fuerit, non latè satis pateat, immisso collyrio aliquo, seu (ut uocant) tenta, ampliari ac dilatari debebit. Materia autè ad conficienda collyria, dilatandis eiusmodi fistulis, & sinibus non callosis idonea, sunt radices gentiane, & mali

Sinus fistule
ampliatio.

terræ

- terre, quam aristolochiam Græci nominant: radix item byroniæ, hoc est, uitis albæ, & dracontij seu dracunculi, præsertim maioris, qui serpentaria officinis, & Romanis ueteribus colubrina nuncupatur. Sed imprimis huic negotio accommoda sunt; frusta spongiæ contorta & ualide compressa. Ex ijs igitur fiant collyria siue penicilla, (quas tentas uocant) altera quidem parte tenuia, altera paulò pleuiora. Atque ea parte qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed si
- 1 o semper appendicè, ut tutius, si altius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possunt. Dimittantur autem hõis duodecim; aut certe plus aut minus; donec scilicet late satis dehiscat fistula. Ceterum orificio fistulæ, atque eius sinu, sufficiënter dilatatis, ipsius destructio, prorsus molienda est. Id autem trifariam fieri consuevit: nempe uel medicamentis acrioribus & callum exterentibus, uel incisione sinus & uestione, uel incisione citra uestionem, cum calli euulsione. Ergo si recens fuerit fistula, aut non adeò multum antiquata,
- 2 o ta, nec etiam admodum profunda aut flexuosa, & chirurgiam, hoc est, sectionem & uestionem, prorsus recuset ager, medicamenta callum exterentia adhibebimus. Deinde remoto callo ad curationem reliquis ulceribus communem uertemur. Itaque callos elidunt atque exciunt quæ ex Galeno, Paulo, Aëtio, Cornelio Celso, & alijs recentioribus chirurgis subiungunt: Spondylii radicem circumrasa, & fistulis imposita, earum callos eximit. Item ueratrum nigrum duobus tribusue diebus insertum idem præstat. Ad
- 3 o hæc amurca cocta, & in collatione adhibita. At idem elaterium, id est, succum cucumeris agrestis, seu (ut uo-

Fistula destructio seu mortificatio.
Trifariam fistula destruitur.

Callos exterentia.

cant) asinini, terebinthina exceptum in collyria cogito, impositoq;: uel laserpitij radice succum infundito. Id quod sequitur etiam callos consumit Paulo. Aegineta: Aeruginis drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excepta aceto in longum inducuntur, & fiunt penicilla. Hoc medicamentum expeditissimum, atque ex primis esse ad callos eximendos, ex præcepto Megetis, nobis testatum reliquit Aurelius Cornelius Celsus. Verum exemplaria omnia eo loci corrupta sunt: pro drachmis enim duodecim, habent tantum denarios duos. Plurima eius generis collyria, hoc est, fistulis callos extirpantia, à modò nominatis autoribus describuntur, ex quibus quisque, quæ suo proposito magis conducere uidebuntur, poterit deligere, & in usum assumere. In communi autem usu apud recentiores chirurgos, sunt collyria siue penicilla ex trochiscis asphodelorum, quorum descriptionem habes in antidotario. Itē ex calce & sapone. Ad hæc, quæ auripigmento, hoc est, arsenico illinuntur penicilla, neminem unquam sefellerunt, ut præter quotidianam experientiā recentiorum ferè omnium scripta testantur. At uerò si fistule multos, & ualde anfractuosos, altosq; cuniculos habeant, ita ut in eos collyria eiusmodi, prout res exigit, indi non possint, eadem ex aceto aut liquore aliquo ad rem accommodo, per oricularium clysterem intro infundenda sunt, ut scilicet per omnes multiplicis ipsius fistulæ anfractus perferantur. Mirificè prodest in antiquis fistulis, & admodum callosis sequens iniectio: Vnguētī Aegyptiaci semuncia, sublimati drachma dimidia, lixiuij uncie quatuor, aquæ rosarum uncie duæ, arsenici scrup. 1. aquæ plantaginis uncie

leens in Corn.
Cel. emendatus.

Trochisci aspho-
delorum.

Arsenicum.

Ad antiquas &
ualde callosas
fistulas.

- uncia quatuor: bulliant usque ad consumptionem tertie partis. Iniecto medicamento fistulosi ulceris os, linamento concepto (ut de sinibus dictum est) aut quouis alio claudendum est, ne id resiliat. Nisi enim aliquādiu maneat, nullū effectum effatu dignum prestare poterit. Si autē duplices aut multiplices eiusmodi fistulæ, breuesq; intraq; carnem sint, eadem etiam medicamenta quæ callos elidunt, arida in calamus scorpionum conijci possunt. Calamus igitur ori fistulæ
- 10 aptandus est, postea in eum insufflare oportet, ut ea medicamenta intus compellantur. Si quando uerò longior (inquit Celsus) & transversa fistula est, demisso specillo, contra principium huius incidi commodissimum est, & collyrium utrinque demitti. Aqua fortis Alchymistarum saltem prima, in eiusmodi tortuosiss, atque labyrinthi modò flexuosis fistulis, mirifice prodest. Hæc enim (inquit Guido ex sententia Arnaldi à nulla noua) omnes fistulas mortificat, & dissipat. Secundus modus abolendi fistulas
- 20 cisionem totius cavitatis fit, deinde per adustionem, quæ uel caustico medicamento, uel ferro candente & ignito inducitur. Cæterum quæ in magnas arterias, uel neruos, uel tendines notatu dignos, aut membranam costas soccingentem, aut aliquam principalem partem deueniunt, uel nequaquā (ut supra diximus) uel certe cum multa artificiosaq; diligentia ac prudentia attingendæ sunt. Reliquis uerò hunc in modum manus admoiemur: Primum quidem tentabimus, an rectæ sint uel obliquæ, demisso intro (ut paulò antè monuimus) specillo, uel cerea candela. In quibus autem duplices uel tres habentur, quæ specillo aut consimili instrumento

Si fistula longior
et transversa sit.

Aqua Alchymistarum.

Secundus modus
abolendi fistulas.

strumento tentari minimè possint, ita notantur. Clyste
 re in sinum per unum os liquorem compellimus, exq;
 transitu eius in reliqua ora, faciliè deprehēdimus,
 una ne, quæ multas oras habeat, an multæ fistulæ sint.
 His ita exploratis, si in summo fuerit sinus, atque is
 angustus, specillo demisso explicandus est, supraq; id
 accommodata figura, scalpello incidendus. Si flexus re
 periuntur, hi quoque simul specillo & ferro perse
 quendi sunt. Ademq; faciendum, si plures se quasi ra
 muli ostendunt. Vbi ad fines fistula uentum est, diuiso 10
 ulceri imponenda sunt penicilla, oui candido liquore
 imbuta, quæ labra solutæ continuatatis distendant, &
 inuicem coire non sinant. Postera die locus adurendus
 erit, uel ferro candente, uel caustico, seu adurente ali
 quo medicamento, nempe uel puluere asphodelorum,
 uel arsenico, aut alio consimili, quod facultatis sit cau
 sticæ siue urentis. Auicennas hydrargyrum, id est, ar
 gentum uiuum sublimatum admouet, quo efficitur, ut
 nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique quod
 præter naturam sit, in ulcere remaneat, quod non om 20
 ninò desiccetur, elidatur, & absumatur. At si non
 summa occupauerint fistulæ, & sub cute non transuer
 se ferantur, sed rectæ intrò tendant, ubi quàm profun
 dissimè potest, & quatenus licet, incisus fuerit sinus,
 orbiculatim totum callum, modò qui nuper dictus est,
 si fieri possit, auferemus. Quòd si aliquid ex eo reli
 ctum fuerit, adurente id medicamento absumemus. Si
 autem multum sit, quod ex callo remansit, nec medica
 mento cedat, candentibus ferramentis adurendum est.
 Caterùm superponenda sunt, atque in circuitu sem 30
 per admouenda quæ refrigerent, & reprimant. Nam
 ferè

totum ch. 32
 11. 12. 13. 14.

amud. 11. 12.

Argentū uiuum
 sublimatum.

Si fistula sub cu
 te intrò tendat.

ferè quæ circa fistulam sunt, (ut Celsus ait) aliquid habent inflammationis. Signum autem, quo dignoscimus, medicamentum acre atque adurens suum effectum, quod satis est, induxisse, est ulceris elatio siue tumefactio, ac trium dierum mora, ut communis usus habet. Itaque adusta, & ut oportet resiccata fistula, mitigatio aliquo medicamento primis diebus utitur, ut oleo cum oui luteo mixto. Deinde ea, quæ crustas, ferro ignito aut adurente medicamento indutas resoluunt, ac de-

Quid post adustionem & resiccationem fistule agendum sit.

10 **ijciunt**, admovento: cuiusmodi est butyrum, aut aliud quod aliud simile, pingue ac unctuosum. A quorum usu non prius desistito, quam crustæ deciderint, & in pus conuersæ fuerint. Mortificatæ autem fistulæ cuius dens argumentum est, cum pus quod ante multum, et crudum apparuerat, nunc paucum & coctum uisitur.

Mortificatæ fistulæ signum.

Tertius modus abolendi fistulas est, qui per incisionem fit, sine cauterio, uel actuali (ut uocant) uel potenciali. itaque facta, quemadmodum antè proditum est, incisione usque ad fines, seu fundum ipsius fistulæ, cal-

Tertius modus abolendi fistulas.

20 **lus totus uel unguibus, uel acie scalpri, uel cultro rasorio, id est, nouacula, detrabi debet** ita ut locus, seu sinus ipse purus, & ab omni sorde mundus appareat, quod uiuæ ac probæ carnis præsentia deprehenditur, ut docuit Auicennas. Et hæc uera est fistulæ curatio, quam statim, si nihil obstiterit, aggredi debemus, quoties fistula nobis sananda & abolenda proponitur. Cæterum dilatata fistula, atque in totum abolita, detergentibus, si quæ sordes adhuc supersit, & sarco-

Vera fistulæ curatio.

30 **bit: qui postremi duo scopi erant in sanandis fistulis propositi. Ergo callo fistulæ eliso atque absumpto, si**

Deterfio.

fordes aliqua fubfit, mulfo, uel aqua in qua eruum co-
 elum fit, fic ut huic quoque mellis paulum adijciatur,
 locum abluito: uel fequenti medicamento, repurgandis
 fiflulis, poft remotum callum longè accommodatiffi-
 mo, utitor: Terebinthinae in aqua uitæ ablutæ uncia
 tres, fucci apij, fucci cynogloffi, (quod Romani linguâ
 canis appellant) fingulorum drach. ſex, mellis roſacei
 colati ſeſquiunciam, ariſtolochia rotundæ drachmas
 duas, farine lupinorum ſemunciam: coquantur fucci
 & terebinthina cum melle roſaceo, uſque ad conſum-

Medicamentum
 fiflulas repur-
 gans, ac deter-
 gens.

Carnis gene-
 ratio.

ptionem medietatis ſuccorum, deinde reliqua commi-
 ſceantur. Si prædicto medicamento abſterſorio, myr-
 rhæ, ſarcocollæ, radicis peucedani aridæ, & iridis, ſin-
 gulorum momentum adieceris, optimum incarnans
 medicamentum effeceris, modò ex eo turunda illina-
 tur. Aliud Aëtij Amideni experimento probatum,

Lib. 14.
 Medicamentum
 callum exterens,
 & incarnans.

callum exterens & incarnans: Radicum liliorum cre-
 matarum cincre fiflulam repleto, & callus excidet:
 quo ablato ſinilacem herbam ſumito, arundinibus ſe-
 implicantem, flore candido, folijs hortenſi phafelo ſimi

Aliud fiflulas
 incarnans.

libus: qua arefacta, uſta, & trita, fiflulam replebis, &
 incarnabitur. Aliud aridum Maſgiſtriani, ab eodem rez-
 latū, fiflulas incarnans: Chamæleontis nigri radicem,
 pini corticem, thus maſculum, ariſtolochia longam,
 pari pondere terito, fiflulæq; mulſa ablutæ aridum,
 applicato. Sequens quoque collyriū, à quodam chirur-
 go noſtri temporis uſurpatum, fiflulam agglutinat, in-
 ſigniter deſiccatur, & affectæ parti robur addit: Aquæ
 uitæ unc. duas, uini maluatici unc. unā, mellis roſacei
 drach. decem, myrrhæ, radicis peucedani tritæ, utriuſ-

Medicamentum
 ad fiflulas len-
 gè optimum.

que drach. duas, ſarcocollæ, aloës hepaticæ, utriuſque
 ſeſqui-

se/ quidrachmam, id est, drach. unam & semissem: mi-
 sceantur, deinde bulliant omnia ad ignem moderatum
 unico seruire, & per oricularium clysterem, quē syrin-
 gam uocant, iniiciantur in fistulam. Aliud ad fistulas, Aliud.
 usque ad os attingentes, ex Aëtio: Squammæ æris, æru- Aëtij.
 ginis, ammoniaci thymamatis, portiones æquas, ex
 aceto terito, & pastillum, id est, trochiscum conflato.
 Deinde collyria, hoc est, turundas, fistulæ equalia for-
 mato, & imposito: Quomodo autem, osi uitato &
 10 corrupto medendum sit, in præcedentibus diximus.
 Hæc igitur de fistulis dicta sufficiant: superest ut de
 cancro ulcerato dicamus.

De cancro exulcerato. Cap. XIX.



CANCRORYM (ut in tractatu de tumori-
 bus præter naturam diximus) alij cū exul-
 ceratione, alij citra ulcus fatigant. Ac de
 his quidem qui sine ulcere molestant, (quos Hippocra-
 tes latentes nominauit) abundè à nobis suprâ dictum
 est. Itaque præsens locus postulat, ut de ijs disseramus,
 qui exulcerati sunt, et aded laborantes affligunt, ut in-
 terdum illis manum admoliri (ægris etiam ultrò id ef-
 flagitantibus) cogamur. Ceterùm quibus locis maxi-
 me accidat cancri, tam ulcerati quàm non ulcerati, ex
 quoq; humore potissimùm gignatur, et à quibus causis
 excitentur, quibus quoq; notis deprehendantur, qui ex
 illis curationē recipiant, & qui nō, atq; in totum quid
 de illis præsagiendum sit, fusissimè à nobis explicatum
 30 est, ubi de cancerosis tumoribus, qui citra ulcus inua-
 dunt, egimus. Reliquū est igitur, ut cōpendiosam exul-

Signa cancri
ulcerati.

Ratio curandi
cancris exul-
cerati.

Vacuatio.
Excisio.

Vide Paulum
lib. 6.

V'stio.

cerati ipsius cancri curationē describamus. Sed prius-
quā id agamus, non alienum fuerit, eius notas in me-
moriā revocare. Itaque in cancro ulcerato, præter
dolorem, duritiem, tumoremq; ulcera erosa ac inæqua-
lia cōspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris præ-
tumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum col-
luvie ingrata. Quæ uerò (inquit Paulus) pura uiden-
tur, sæculenta, liuida, atque interdum etiam subrubra,
& cruenta apparent: sanies inde manat continuo te-
nuis, aquosa, nigra, aut fulua, grauiter olens. Ergo si
eiusmodi affectus chirurgiam, hoc est, manus operam
desiderat, à uacuatione humoris melancholici curatio
auspicanda est. Deinde totum carcinoma, si locus pa-
tiatur, prorsus rescindendum, sic ut nulla supersit ra-
dix, sinemusq; sanguinem effluere, nec statim eum inhi-
beamus. Imò pressis uicinis partibus crassum ac me-
lancholicum sanguinem exprimemus. Postea alijs ulce-
ribus similiter curabimus. Hæc curandi ratio tradita
& probata est lib. 14. metho. Therapeu. cuius uer-
ba hoc loco subijcere placuit: Ceterum (inquit) si quan-
do cancerum per chirurgiam curare audebis, cœpisse,
quidem ab uacuando per purgationem melancholico,
humore oportebit. Vbi uerò totum quod uitiatum est,
prorsus excideris, sic ut nulla supersit radix, fines ef-
fluere sanguinem, nec propere eum inbibebis: imò pre-
mendo potius uicinas partes, exprimes ex his crassio-
rem sanguinem. Mox alijs ulceribus similiter curabis.
Hactenus Galenus. Sunt qui exciso carcinomate, &
crassiore sanguine ex circumstantibus partibus expres-
so, ferramenti igni flagrantibus locum adurunt. Alij
cū partem aliquam corporis carcinoma eiusmodi,
quod

quod cū ulcere est occupauit, hoc (si locus non refrage-
tur) circuncidi opus esse tradunt, dein uiuōtenus adu-
ri, tritasq; cantharides ex alumine & cyprino oleo *Cantharides.*
superponi. Alij uerò à sectione, & uisione quæ fit *Corrosio.*
ignito ferramento abstinentes, corrosione ualida ex
adurentibus medicamentis facta uitium, hoc totum ex-
tirpant, & destruunt. Porro medicamenta eiusmodi si *Carcinoma mi-
tiora contemnit
remedia.*
quando adhibenda sunt, ualentis admodum facultatis
esse debent: nam, ut scribit Hippoc. extremis morbis,

1º extrema remedia adhibenda sunt. Tanta autem est
huius uitij malignitas, ut mitiora planè contemnat re-
media. Inter cetera autem præstantissimum ac tutis-
simum auxilium in hoc affectu, Guidone à Cauliaco
prædicatur, arsenicum sublimatum, cuius egregias do- *Arsenicum
sublimatum.*
tes, suprà iam multoties commemorauimus, & in se-
quentibus adhuc celebrabimus. Hoc (inquit Theodo-
ricus) càncrum, lupum, esthiomenum, hoc est, sphace-
lem, seu syderationem: noli me tangere, fistulam, &
omnes tales pessimos morbos, prima die occidit, &

2º extirpat. Caterùm magna locorum circūstantium,
interim dum admouetur, cura semper habenda est, ne
scilicet ea ipsa inflammatione, atque humorum conflu-
xu, occupentur. Quod incommodum facilè deuitabis,
si partes illas uicinas, & carcinoma cingentes, bolo
armenia, & id genus alijs, alleueris. Sed & modo legi-
timo, seu iusta quantitate (quam coniectura tantum ar-
tificiali rationalis definit medicus) adhibendum est
arrhenicum ipsum, siue arsenicum (ut uocant) sublima-
tum. Vbi autem effectum quem desideras, præstiterit, *Legitimi effe-
tus arsenici
nota.*
3º (quod ex loci inflatione siue tumore, & mora tridua-
na, deprehendes) dolor mitigandus erit, & crustæ ca-
sus, modo

Extincti carci-
nomatis notæ.

Qui nam cancri
ulcerati uulso-
nem aut sectio-
nem desideret.

Quibus cancri
duntaxat adblā-
diendū, uera cu-
ratione omissa.

sus, modo quo suprà docuimus procurandus. Cancro
uero sic penitus extincto, ac radicitus extirpato, ul-
cus ipsum quod remansit, similiter alijs canis ulceri-
bus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum
agnosces, si proba & sana caro apparuerit, si & nulla
uirulenta proluuius, se in parte affecta ostenderit, nul-
laq; amplius graueolētia, eorum qui proximē adstant,
nares offenderit. Ceterum soli illi cancri etiam cum
ulcere consistentes, curationem eiusmodi, quæ uisione
uel sectione fit, admittunt, qui in summa corporis par-
te hærent, quique adeò laborantes fatigant, ut ipsi ul-
trò (inquit Galenus) chirurgi manum efflagitent, &
simul in talibus partibus consistent, quas refecare &
exurere unā cum radicibus possis. Sed cum hæc curan-
di ratio, non sine graui egrotantis periculo (ut suprà
de cancro non ulcerato monuimus) administrari pos-
sit, temerè adhuc in talibus adhibenda non est. Itaque
si in penitioribus corporis partibus, constituti sunt
canci istiusmodi, aut in talibus quidem cōsistant, quas
nec adurere, nec excindere unā cum radicibus possit,
uel si loca principibus membris uicina occupent, uel
laborans ob uirtutis imbecillitatem tale curationis ge-
nus sustinere non possit, aut forsan (quia nimis timi-
dus sit & pusillanimis) extrema hæc remedia subire
non uelit: adhuc si ex hac curandi ratione deterius ali-
quod malum sequeretur: breuiter si periculum ex chi-
rurgia, id est, sectione aut uisione, timeamus, nec cu-
rari affectus aliter possit, sat fecerimus, si hunc auge-
ri prohibeamus, proba imprimis uictus ratione, &
commodis uacuationibus, solisq; leuibus & quasi ad-
blandientibus medicamentis utentes: à uehementibus
uero,

uerò, & acribus (quibus malum hoc ueluti crabro irri-
tatur, & excandescit) prorsus abstinentes. Ergo impe-
randa agris talis, uisus ratio est, quæ tenuis sit, bo-
numq; et minimè melancholicum succū generet. Quòd
si ob iecoris caliditatem et siccitatem excedentē pro-
hiberi nō possit, quin crassus & melancholicus in cor-
pore sanguis procreetur, cibis refrigerantibus & hu-
meclantibus erit utendum, quibus hepatis intemperies
paulatim emendetur. Conueniunt itaque in hoc affectu

*Visus ratio in
cancro ulcerato
obseruanda.*

- 1 o ptisanæ cremor, lactisq; serum, uinum paucissimū &
aquosum, pisces saxatiles, atque omnis generis aues,
præterquàm palustres. Ex oleribus malua, atriplex,
blitum, cucurbita, atque id genus alia. Acrum esus, &
repletio omnis uitanda. Sed & crassior ille succus qui
in uenis colligitur, ex interuallo uacuandus erit, inter-
dum purgante medicamento, interdum (nisi quid probi-
beat) uenæ sectione. In mulieribus quoque, si quidē li-
ceat per ætatem, menses euocandi, atque etiam in uiris
hæmorrhoides (si eas pati consueuerint) proritandæ.

*Succus melan-
cholicus ex in-
teruallis uacuan-
dus.*

- 2 o Loco autem affecto imponenda remedia sunt, quæ do-
lorem leniant, & ita ipsum firmare possint, ut nihil re-
dundantiæ humorum amplius excipiat: quæ item refri-
gerent & exiccent, minimè uerò mordeant aut irri-
tent. Cuiusmodi sunt solani succus, uel aqua destillata:
cumq; succi copia non est, plumbū ustum & elotū, un-
guentum album, unguentum ex lithargyro & plumbo
usto, item medicamentū quod ex pompholyge, uel chal-
cite cōstat, aut alijs id genus metallicis ustis & elotis.
Atq; etiam (ut uocant) camphorata, similiter & succi
- 3 o in mortario plumbeo ducti, huius uitio efficacissimè ad-
mouentur. Lamina quoque plumbea maxima & pene
incredibili

*Quæ loco affe-
cto imponenda.*

Succus solani.

*Lamina plum-
bea.*

Modus usus succi
ei solani.

incredibili usu cancris ipsis exulceratis superinducuntur. Modus autem usus succi solani (quod medicamentum eiusmodi affectibus utilissimum esse scribit Galenus) talis esto. Solani succo linteam molle duplicatū imbuito, & loco affecto imposito. Extrinsecus lanā molliusculam eodem succo madentē linteo circumdato, atq; hæc, ne siccescant, eo succo subindē irrigato. Hoc remedium loco dolenti inductum, sine dolore ac molestia (inquit Paulus) exulceratis cancris subuenit. Plurima medicamēta cōposita à Galeno, Paulo, Celso, et Aëtio, 10 ad hunc usum conscripta sunt, ex quibus duo hæc selegimus: Argenti spumam & cerusam in plumbea pila, cū oleo rosaceo in sole tantisper conterito, dum plumbi colorem, unguentū quod ex his fit, acquisiuerit. Aliud quod magnoperè probo, recipit plumbi usli & eloti, pompholygis, thuris, singulorū unc. quinque, absinthij unc. unam, olei rosacei selibram, id est, libram semis: cere fescunciam, id est, unc. unā semis, succi solani quod sufficit ad unguenti crassitudinem. Insigniter autem leuiunt, solanturq; plurimum in ipsis exacerbationibus, 20 & cruciatus tēpore, malua, aut althea (quā bis maluam appellāt) in mulso subacta liquefacta ue, & rosacei paululo læuigata, inslarq; cataplasmatibus illita. Adhæc cataplasma ex ficibus aridis, meliloto, quam Latini fertulam campanam uocant, ruta, thure, buniade herba, id est, napo, diligenter cum oleo contusa. Lenit item cataplasma quod constat palmularum dactylis in passo decoctis, quibus adiecta sint ouorum lutea, polentaq;. Adhæc quod ex papauere cum coriano factum est, aut polygono, aut feri, hoc est, cichorio: hæc quidem in do 30 loribus usui sunt. Multi (inquit Guido) mitigant eius fraudulentiam

Unguentum ad
cancros ulceras.

Aliud longè
optimū.

Malua.
Althea.

Cataplasma le-
uicū.

Aliud.

Aliud.

fraudentiam & lupacitatem, (ita enim loquitur) cū
 pecia scarlati & appositione carnum gallinarū. Hinc
 uitium hoc idco lupum appellari uulgo putat, quoniam
 carnes unius gallinæ si apponantur, quotidie ferè ab-
 sumit et deuorat. Quod si forsitan eiusmodi gallinaceæ
 carnes, uel similes illi, pro pabulo non offerrentur, car-
 nes sibi proximas, ceu lupus quidam famelicus, ad ean-
 dem quantitatem depasceret & exederet. Quidam
 huic malo ueluti ablandiuntur, admoto puluere sterco-
 ris humani, & aethi, igne concrematorum. Item appo-
 sitis quibusdam herbis, ut scabiosa, trifolio, uerbasco, id
 est, tapso barbato, et herba robertiana nuncupata, quæ
 quibusdā myrrhis Dioscorides esse putatur. Caterum
 utcumque res habeat, commemorata nuper remedia,
 (quoniam ferè temperata sunt) si magnoperè non
 prosint, nocere saltem non possunt.

Cancer ulcera-
 tus cur quibus-
 dam Lupus ap-
 pellatur.

Herba Roberti.

FINIS TERTII LIBRI.

20 GENERALIS DIVISIO

FRACTURARVM, IN LIBRVM

QVARTVM CHIRVRGICARVM

Institutionum Ioan. Ta-

gaultij Medici.

Fracturæ, quæ Græcis *κλάσματα* dicuntur,
 differentiæ.

1. Simples.

2. Composite.

30 Simples fracturæ differentiæ, plures sunt:
 aliæ enim sunt

Καυλιδόρμ

Καυλιδόρ } Caulium } fracturū ſpe
 Ραφανιδόρ } id eſt, ad } Raphani } cie ac ſimili
 Σικυιδόρ } Cucumerū } tudinem per
 traſuerſum.

Σχιδακιδόρ } Quasi aſſeris modò, per
 Εἰς ὄνυχ' } id eſt } longitudinem.
 In unguis formam.

Id eſt, ad ſimilitudinē farinæ, uel pol-
 Αλευιδόρ } linis, quando ſcilicet os in multas te-
 nues partes conſtringitur.

Id eſt, iuxta abruptionē fit, cū
 Κατὰ ἀποθεῶν } pars oſis per ſuperficiē abru-
 ptionē detrahatur, ac recedit.

Compoſitæ fracturarum differentiæ, ſeu
 potius implexus cum alijs mōrbis & ſym-
 ptōmatis.

Fractura cum uulnere.

Fractura cum inflammatione.

Fractura cum gangrænâ.

Fractura cum dolore.

Fractura cion priuitu.

Fractura cum fragmento oſis eminente.

Fractura cum contuſione.

Fractura malè ferruminata.

Fractura cum callo nimium excreſcente.

Fractura cum nimia calli ſiccitate, & duritie.

Fractura cum ſuperflua calli humiditate.

Sunt & aliæ fracturarum differentiæ Albu-
 caſi, & recentioribus chirurgis, à locis in qui-
 bus conſiſtunt deſumptæ, quæ tamen pro-
 priè differentiæ dici non debent: ut

Fractura

Fractura in caluaria.

Fractura in maxillis.

Fractura in naribus.

Fractura in clauiculis.

Fractura in fquina dorfi.

Fractura in coflis.

Fractura in fcapulis.

Fractura in humero.

Fractura in brachio, id eſt, cubito & radio.

10 Fractura in femore.

Fractura in crure ſiue tibia.

Fractura in patella ſeu rotula genu.

Fractura in digitis, tum pedum tum manuum.

INSTITUTIONVM

CHIRVRGICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER QVARTVS.

20 De fracturis.

Quid fractura, & quæ ſint eius
differentiæ. Cap. I.



QUANDO QVIDEM TRIBUS libris ſuperioribus, de vnijs chirurgiæ ſubieclis, quæ carnoſis & mollioribus corporis partibus accidunt, abundè ſatis dictum eſt, ora

do iam poſtulat, ut de alijs quæ oſibus contingūt, hoc eſt, fracturis & luxationibus, diſſeramus: hæc enim chirurgia generi etiam ſubiſciuntur. Ac premium quidam

Fractura quid.

Κάταγμα.

Paulus.

Guido à Can-
luco.Simplicis fra-
cturae differen-
tiae.Fractura schi-
dadidon facta.Aliae fracturarū
differentiae.

dem de fracturis agemus, quas etiam Hippocrates lu-
xationibus anteposuit. Est igitur fractura, ut in uniuersum
dicatur, unionis siue continuitatis solutio quaecū-
que in osse, quam Graeci proprio nomine, & omnibus
suae gentis hominibus noto, catagma uocant, ut Gale-
nus sexto methodi medendi, & alijs plerisque locis te-
statum reliquit. Paulo uerò Aeginetæ, atque alijs po-
sterioris medicinae Graijs scriptoribus, fractura ossis
est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, discissio uel, à uio-
lentia quadam extrinsecus irruente accidens. Guido à 10
Cauliaco, & alij quidam ætatis illius medici, fractu-
ram definiunt, continuitatis solutionem in osse, non à
qualibet re factam, sed ab ea tantum, quæ contundit.
Ut uera sit (inquit) prima differentia solutionis ossis,
quod quædam est incisa, quædam contusa: ossium enim
diuisionem quæ incisione fit, non fracturam, sed ossis
uulnus appellant. Cæterum plures fracturarū eiusmodi
differentiæ sunt: aliae nanque simplices sunt, aliae
compositæ. Ex simplicibus quidem aliae sunt, quæ fra-
cti ossis partes iam prorsus separarunt, easq; cau- 20
ledon, raphandon, atque etiam scyedon factas, Græci
dicunt, hoc est, ad caulium, raphani, & cucumerum
fracturæ speciem ac similitudinem. Manifestum autem
est eiusmodi ossium diuisionē transuersim per crassitu-
dinem fieri. Hæc quibusdam uirgalis & transuersalis
nominatur. Aliae uerò fiunt schidadidon, quasi asseris
modò: hæc autem per longitudinem magis fiunt, dicun-
turq; oblongæ ossis fissuræ. In ijs non omnino separan-
tur à se partes sic affecti ossis, sed ueluti per rectitu-
dinem finduntur. Præter has aliae quædam adhuc sim- 30
plices numerantur fracturæ differentiae, quarum aliae
Græcis

Græci dicuntur fieri εἰς ὄνυχον, id est, ad instar unguis: aliæ αλβιτίδον, id est, ad farinæ, uel pollinis similitudinem: aliæ κατ' ἀπόρραυσιν, id est, iuxta refractionem, seu (ut alij interpretantur) abruptionem. Fractura quæ εἰς ὄνυχον, id est, in unguis formam fit, fissura est ossis, quæ cum aliqua in parte recta sit, in extremo tamen lunata euadit. Atque hæc etiam calamidon, id est, harundinatum ab aliquibus nuncupatur.

Fractura unguis.

Albitidon ad similitudinem farinæ uel pollinis dicitur.

Fractura albitidon facta.

1. Ossa, est cum os in multas tenues partes confringitur, quæ & ipsa caryedon, id est, nucatim, à quibusdam uocatur. Apothrausis, quæ & apocope dicitur, id est, abscisio seu præcisio, est cum pars ossis per summitatis rupturam, seu superficiei abruptionem detrahitur, ita ut pars ea quæ detracta est, & recessit, supereminet, ut ferè fit cum squamula ab osse resoluitur. Cæterum hæ fracturarum differentiæ, curiosè nimis (ut Galenus inquit) atq; ambitiosè à medicis Hippocrate iunioribus, ijs proprijs nominibus interpretatæ sunt:

Fractura κατ' ἀπόρραυσιν facta.

2. non contenti enim fuerunt oratione, os quod uariè seu, multifariàm sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi autem appellationibus, omninò abstinuit Hippocrates, sed quoad fieri licuit, usitatissimis utens nominibus, oratione interpretari non est grauatus, non has modò fracturarum differentias, uerùm etiam quæ in capitis ossibus eueniunt. Breuiter duo potissimè sunt fracturarum differentiæ simplices Galeno, à quibus curandi indicationes sumuntur, nempe quæ per transversum, & quæ per longitudinem facta est. Cornelius Celsus ter-

Due sunt potissimè fracturarum differentiæ simplices.

3. etiam addit, quæ scilicet obliquè fit. Omne (inquit) os, modò rectum ut lignum in longitudinem finditur, mo-

Compositæ fra-
cturæ differen-
tiæ.

Lib. 3.

dò frangitur transuersum, interdum obliquum. Ceterum ossis fracturæ, nonnunquam carnis quoque uulnus accedit, sed potissimum cum ossa multifariam fracta sunt: sæpe etiam dolor ingens, & interdum inflammatio. Contingit etiam aliquando ut aliud os super aliud efferatur, & ex osse malè ferruminato ac cōmisso, ueluti tophaceus aliquis nodus relinquatur. Horum autem affectuum & symptomatum cum ossium continuitatis solutione complexus, compositas fracturæ differentias, iuniores medici uocauerunt, cum tamen propriè differentię non sint: quandoquidem quod seorsum, & per se consistere potest, (ut alibi ex Galeno diximus) nunquàm alterius erit differentia. Vultus autem, dolor, inflammatio, & id genus alia, seorsum & per se consistere possunt: proinde ueræ fracturarum differentię, & à propria ipsarum natura desumptę, nec re uera sunt, nec rectè dici possunt. Quòd si quę à loco quoque, seu parte in qua est fractura, differentias censeas, ueluti si nares, aures, maxillę, costę, clauicula, caluaria, spina dorsi, humeri, brachia, femora, crura, digiti, fracturam patiantur, fuerint profectò & ipsę fracturarum differentię Albucasi: non utique à propria ipsarum natura, sicuti neque præcedentes, desumptę, sed à locis, in quibus consistūt. Verum enimuero quoniam ab ijs omnibus supra commemoratis agendorum sumuntur indicationes, donemus eas cum recentioribus medicis & chirurgis differentias appellari.

De causis, signis, & iudicijs fracturæ in
uniuersum. Cap. I I.

A V S A B fracturarū internæ nullæ sunt, *Causa.*
externæ uerò ea omnia, ut breuiter dicam;
quæ contundere, uel diuidere ossa possunt.

- Quæ contundunt, ea dura grauiq; & mole non exi-
gua sint oportet, uehementiq; impetu deferri ac ira-
ruere. Ossa diuidunt quæ uulnerando incidunt: item
10 casus ab alto, præsertim si ossa sicciora sint, nec ad-
modum crassa. Fractura quoque ossibus interdum acci-
dit ex circuntortione in luctantibus, ut si tibia siue
crus Dioclis, cruri aduersarij Socratis cum eo luctan-
tis per transversum supposita sit, ita ut utraque eius
capita, & iuxta pedem, & iuxta genu deorsum uehe-
menter deprimantur, os procul dubio tibie ipsius Dio-
clis, præsertim si infirmum sit natura, hoc luctationis
genere medium disrumpetur, seu si malis frangetur. Id
quod in lignis quoque, quæ à nobis ipsis circuntor-
20 quentur, uidere licet. Si enim lignum aliquod neque
magnum neque ualidum, sed paruum & imbecillum su-
pra femur tuum impositum, ex utroque capite deor-
sum uehementer manibus urgeas, statim id in media
parte frangi aspicies. *Signa.* Signa aut ossis fracti, & præser-
tim per transversum, atque in artubus, hæc fere sunt.
Tactu ossis partes disiunctæ separatæ ue ac uariæ rea-
periuntur, membri figura inæqualis percipitur: dum
membrum dimouetur, & manu uariæ tractatur, ossa
colliduntur, & ueluti crepitus quidam ex ea collisione
30 auditur. Pars afflicta contacta dolet, corpus membro
fracto haudquaquam inniti potest: causæ quæ frangūt,

Iudicia.

aut contundunt, præcesserunt. In osse uerò quod per longitudinem fractum est, substantiæ eius crassities nō naturalis tactu percipitur, cætera signa non adsunt, præterquàm quòd dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenduntur. Prognostica. Ossâ minimè periculose mediâ franguntur, in humeris, brachijs, femoribus, & cruribus, & digitis. Quò autem propior fractura capiti, uel superiori uel inferiori ipsius ossis est, eò peior iudicatur: nam & maiores dolores adfert, & difficiliùs curatur. Ea itidem quæ in artuum uicinia est, curatu difficilis est, uel eo potissimū nomine, quòd commodè ligari non possit. Atque hæc, ut plurimum, motum relinquit difficilem. Maximè tolerabilis est simplex transversa, peior ubi fragmenta atque ubi obliqua, pèssima ubi eadem acuta: nam & carnem uulnerant, interdum neruum quoque aut muscolum. Fractura quæ cum dolore uel inflammatione, aut carnis contusione incidit, mala est. Quippe quæ instaurari non possit, donec ea priùs curationem receperint. Si ossis fracturæ, carnis quoque uulnus accessit, in malo etiam æger est, maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. Nam & inflammationes multò grauiores, & (ut inquit Celsus) promptiores cancos habent. Adde quòd in eiusmodi fractura, neque ferulis neque canalibus (inter quæ uulnus sanescere non potest) uti possumus. Sed nec primis fascijs, quas Hippocrates ὑποδερμίδες, id est, subligamina uocat, uulnus contegendum esse uolunt, tum huius ætatis chirurgi, tum qui seculo Hippocratis fracturas curabant. Itaque ulcere non deligato, hinc & inde, hoc est, utrinque ab eo fascijs circumiectis quâ ulcus est, fenestellam relinquant,

Per cancos hic
Langranam &
Hippaceliū intelle
xit, sicuti et alijs
quibusdā locis.

quant , per quàm medicamenta uulneri accommoda
imponant. Quem deligandi modum damnat ille medi-
corum princeps & antesignanus Hipp. libro quem de
fracturis inscripsit, eumq; lemmatis ac rationibus non
absurdis quidem, aut probabilibus tantum, sed scienti-
ficis quoq; & necessarijs, inutilem, erroneum, prauūq;
esse conuincit ac demonstrat. Si brachiū aut crus fra-
ctum est, bonum est alterum saltem os integrum mane-
re. Altero nanque osse integro manente, necesse est

10 neruos ac tendines minus contrahi, quippe qui ab in-
tegro ipso osse & non comminuto adhuc intenduntur.
Adde quòd curiosius omnia in continendis ossibus fieri
debent, ubi utrumque os fractum est, & neutrum alte-
ri auxilio est. Itaque si alterū os integrū manet, plus
opis in eo, quàm in fascijs ferulisq; est. *Corn. Celsus*
memoriæ tradidit ignorari minimè oportere, si femur
perfractum est fieri breuius: quia nunquàm, inquit, in
antiquum statum reuertitur, summisq; digitis postea
cruris eius insisti. Quod equidem à ratione & expe-

*Locus in Corn.
Ccl. aut falsus,
aut mancus.*

20 orientia, ab ipsiusq; Hippocratis sententia prorsus est
alienum. Non enim quoties femur frangitur, protinus
necessario ipsum breuius efficitur: sed duntaxat si sta-
tim quàm fractum est, minus quàm par sit, à chirurgo
distentum fuerit, uel tortuose distractum, & separate
ac distantes inter se ossis confracti partes, non recte
atque ad amussim, priusquàm ferrumeni impleant, coa-
ptatæ extiterint. Tunc enim & breuius femur red-
detur, & crure eius partis claudicabit homo. Sic autē
,, de hac re lib. de fracturis scripsit Hipp. At uerò si fe-
30 moris os fractum sit, extensio imprimis diligenter fa-
,, cienda est, ne minus quàm debeat efficiatur. Amplior

enim si sit, nullam lationem affert. Verum quoque est, ut in eodem opere idem testatur Hippocrates, quod quibuscunque utraque uel tibie uel cubiti effracta ossa fuerint, illa breuiora effici. Quod sane intelligendum est, nempe ut Gal. interpretatur, nisi ante conformationem extensio debita adhibeatur, & commoda deligatione ossium coaptatio seruetur, quoad callus obducatur: tunc enim non solum in maiorem tumorem, quam naturaliter conueniat, membrum illis attollitur, uerum etiam breuius propter re- 10 tractos musculos efficitur. Sed hæc præsentia particularia sunt. Porro in quadrupedibus, præsertim ueterinariis, non omnino eadem est de fractis præsentendi ratio, quæ in hominibus. Nam si quadrupes pedis posterioris radium fregerit, præsertim mulus aut asinus: ijs quod medulla careant, quamuis sanguinis compotes sunt, nunquam solidefcit. Quæ supra genua fracturam senserunt, ut deplorata non continges. Siquidem ea nunquam ferruminantur. Si femur fractum sit, in periculum uenit spesque salutis in angustio est. Fractis 20 armis, nullus medicinae locus: nam neruorum distensio sequitur, quæ caput scapulis annectat. Vix unquam sanitas contingit, si fractura uulnus aut luxatio coniuncta sit. Si uero costa perfringatur, facilis medendi ratio est. Fractura quæ calloso ferrumine coaluit, nunquam urens medicamentum ad mouebis: quandoquidem eo callus ille tophaceus resoluitur, nec ullam ferè medicinam sentit. Hæc & quædam alia de fracturis ueterinorum, Hierocles & Apsyrus ueterinarii medici, nobis scripto reliquerunt. Fractura siue in quadrupede si- 30 ue in homine sit, quod uetustior est, hoc est, quod tardius

Prognostica
quædam de fra-
ctura in ueteri-
nis.

fracta

fracta ossa ut oportet cōmittuntur, cō deterior effici-
tur. Quandoquidem & callus illic gignitur, & spatia
ipsa inania, aliena quadam substantia opplentur. Quo
fit, ut dum instauratio moliēda sit, maiore ac ualētore
multò extensione sit opus. Magna autem & ualens
eiusmodi extensio, non raro conuulsionem inuehit, ut
alicubi testatus est Auicennas. Fracturae non pari die-
rum numero in omnibus ossibus ferruminantur, sed in
alijs tardius, in alijs citius. Caluaria triginta quinque
10 diebus glutinatur. Brachium & tibia, si rite curentur,
diebus circiter quadraginta coalescunt. Firmatur cu-
bitus diebus plurimum triginta. Si in natibus os per-
fractum est, decem & octo dierum spacio consolide-
scit. Costa post unum & uigesimum diem Celsō, alijs
non nisi post uigesimum octauum, ferrumen implet. Fe-
rē etiam intra decimum quartum, & union & uigesti-
mum diem sanescunt, maxilla, iugulum, scapula, os ta-
li, calx, manus, planta. Inter uigesimum septimum, &
quadagesimum, humeri & femina. Coxa uerò diebus
20 quinquaginta coalescit. Hippocrati, pes eidem sexa-
ginta dierum spatio, si quiescat, consanescit. Et ita de
alijs pro fracti cuiusque ossis natura dicendum est.
Quinetiam confert aliquid ad celerem aut tardam sa-
nationem, & aetas, & corpus, & uitae propositum, &
anni tempus, ut & de uulneribus dictum est. Proinde
in ijs nihil certum aut perpetuum est. Factionis Arabi-
ca princeps Auicennas, affirmabat ostium agglutina-
tionem in biliosis, conualescentibus, & primis senibus,
difficillimam esse: in decrepitis uerò ac ualde senibus,
30 impossibilem. Ceterum costa aliquando tota, inter-
dum non tota frangitur: nempe cum pars eius interior

Nota mali aut
boni indicis in
fractura cranij.

Que agglutina-
tionem remoran-
tur in fractis
ossibus.

Ossis fracti ve-
lie commissi
note.

(que rara est) duntaxat leditur, summo osse manen-
te integro. Si tota costa perfracta est, casus asperior
est: nam & graves inflammationes, & febris, & sup-
puratio, & sepe uite periculum sequitur, & sanguis
spuitur. Narium fractura peior est, ubi aut osi, aut car-
tilagini fractæ, cutis quoque uulnus accessit. In cra-
nij fractura malum portendunt, membrana immobilis,
nigra uel liuida, uel aliter coloris corrupti: dementia,
acris uomitus, neruorum uel resolutio uel dissentio,
caro liuida, maxillarum rigor atque ceruicis. Spem ue-
rò certam faciunt membrana mobilis, ac sui coloris,
caro increescens rubicunda, facilis motus maxillæ, at-
que ceruicis. Cætera quæ ad somnum, cibi desiderium,
febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris
uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt. Ferru-
men seu agglutinationem in ossibus remorantur, mul-
ta ex aqua calida perfusio, crebra superpositorum mu-
tatio, festina nimis ac præpropera membri affecti di-
motio, nimia coarctatio, & quæ parti oblæse (alimen-
ti in eam distributionem prohibendo) atrophiam indu-
cit. Sanguinis quoque uiscosi penuria. Item & frag-
menta quæ remanserunt. Ossa quæ fracturam expe-
ta sunt, rectè commissæ esse testantur, æqualis membri
perfracti compositio, & figura naturalis, si alteri sibi
cōpari, nihil noxæ perpeffo, conferatur: dolor sublatus,
ac ueluti quidam uoluptatis sensus, sanguinis quoque
solerti quadam naturæ prouidentia, ad fracturæ lo-
cum expulsi apparitio. Proinde non minus uerè
quàm communiter dici solet, quòd tumor membri
perfracti post primam eorum quæ fracturæ admota
sunt mutationem, sine magno dolore apparens, atque
ubi fracti

ubi fracti ossis partes recte concurrerint, & in naturalem situm aptatæ fuerint, euanescent, certam salutis spem pollicetur. Sed iam tempestiuum est fracturæ in uniuersum curandæ ueram methodum, quamq; ipsa rei natura præscribit, tradamus.

Generalis curandæ fracturæ
methodus. Cap. III.

- 10 **Q**UONIAM fracti ossis soluta partium continuitas est, utiq; (inquit Galenus) finis quod tendet is qui fracturas curabit, saltem primus, unio est. Quod si is primus in curatione propositus finis per affectarum partium siccitatem perfici non possit, restat alter, qui est ut alterius cuiusdam interuentu disunctæ ossis partes glutinentur. Qui si nec ipse cõparabilis aduertitur, insanabile esse uitium dixeris. Quod igitur coalescere (saltem per se & nullius alterius ope) nequeat tam durum os, quàm id quod
- 20 in iuuenibus & adolescentibus, & uiris, multoq; magis in senibus cernitur, id profectò (inquit Galenus) uel cuius patere potest. Quæcunque enim concreescere ac coalescere debent, omnino mollia humidaq; sint naturaliter oportet. Quæ igitur dura siccaq; sunt, eorum diuise partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliud quod uinculum uel, quo commissæ maneant, requirunt. Itaque potest certe illud os tantum unionem per se, & nullius alterius interuentu recipere, quod abundè molle est, cuiusmodi conspicitur in puerulis: in adultis
- 30 uerò, & siccioribus corporibus, separatæ fracti ossis particule, non per se unquam, sed substantia duntaxat quapiam

Vnitio, finis primus quod tendit is qui fracturam curat.

Quorum fracta ossa coalescere non possunt, & quorum possunt.
Lib. 6. meth. meden.

*Pari, id est, cal-
li substantia un-
de nascatur.*

*Calli medio-
critas.*

*i. q. d. d. d. d. d.
i. q. d. d. d. d. d.
i. q. d. d. d. d. d.*

*Scopi quatuor,
in curanda fra-
ctura, que per
transuersum fa-
cta est, medico
proponuntur.*

*Restituta partium
fracturæ inui-
cem commissio,
et coaptatio.*

quapiam interueniente, ceu glutino quodam, ferrumi-
nari colligariq; secum possunt. Interuenit autē ea sub-
stantia, quoniam omnis particula sibi familiare trahit
alimētum, os autem crassius ac terrenum magis, quā
aliud quoduis nostri corporis membrum, alimentum ad
se allicit, exugitq;. Quod autem ex hoc ipso proprio
ac maximē idoneo ossis alimento redundat, & in la-
bris fracturæ cōcrescit, suo ipsius interuentu ossis ex-
trema, dura licet & sicca, conglutinat, ut saepe usu eue-
nire conspiciamus. Vocatur autem corpus id, quod sic 10
fracturis innascitur, Græcè πῶρ, Latinis uerò cal-
lus, qui (ut suprā de uulneribus ossium diximus) medio-
critatem in crassitie, & tenuitate, duritie etiā ac mol-
litie seruet oportet. Sed de hoc adhuc in sequentibus.
Age igitur dicamus, quomodo finem hunc primū, quō
tendit is qui fracturam curat, nempe unionem, asse-
qui ualeamus, initium quidem facientes ab ea fractu-
ræ differentia, qua per transuersum os frangitur, &
suo loco excidit: quandoquidem hoc fracturæ genus
sæpius incidit. Itaque quatuor mehercle intentioni- 20
bus, in hac fracturæ differentia curanda, est opus, quas
& scopos appellare possis. Prima intentio est, ut fra-
cti ossis partes rectē cōmittantur, & in naturalem si-
tum coaptentur. Secunda, ut ritē commissæ ossis pier-
fracti extrema, coniuncta atque immota maneant.
Tertia, ut πῶρ, seu (ut diximus) callo interueniente
diluictæ ossis partes agglutinentur, coalescant ue.
Quarta est, symptomatum, hoc est, accidentium, quæ
fracturæ sequi consueuerunt, correctio. Quod ad pri-
mam intentionem attinet, cū in hac fracturæ diffe- 30
rentia, quam καὶ ἄλλοθεν καὶ ἑξ ὁμοιοῦ, id est, per
transuersum

transuersum fieri diximus, sic à se fracti ossis partes dissideant, ut è directo non iaceant, clarum est primum id esse agendum, ut in directum agantur. Directum autem hic uocamus, quum in figuram pristinam natura

- 1^o lemque situm reducuntur. Sanè (inquit Galenus) eum si-
 2^o tum habuerint, si quis ea quæ sic disident integræ par-
 3^o tis exemplo usus, in contrarium adducat. A qua nimi-
 4^o rum certissima iudicatio transpositionis eorum erit.
 5^o Fieri enim potest, ut tum prorsum, tum retrorsum, tum
 6^o in hanc partem membri, tum in illam facta translatio
 7^o sit. Quæcunque igitur retrorsum magis sunt acta, ea
 8^o prorsum impelli conueniet. Nec minus alteram quoque
 9^o fracti ossis partem modicè ad contrarium retrudi. Con-
 10^o tra quæ prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidem
 11^o retrorsum, reliquam uerò partem sensim duci prorsum. Eodem etiam modo, & eorum quæ ad dextram
 12^o sunt detorta medicatio est, si ad sinistram ducantur: contraque eorum quæ ad sinistram, si mutantur ad dextram, semper scilicet altera parte modicè in contrarium
 13^o acta. Guido à Cauliaco (præmissis quibusdam præcep-
 14^o tis communibus, quæ hic suo loco referemus) quomodo primam hanc intentionem assequi possis, uerbis non adeo multis perstringit. Itaque iubet imprimis membrum perfractum, si ossa suis sedibus (quod sæpius contingit) exciderint, aliudque super aliud efferatur, & musculi ad capita sua retracti sint, decenter intendendum esse. Deinde os depresso attollendum, & eleuatum deprimendum, atque id quatenus fieri licet sine dolore, donec ossis fracti fines rectè concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Neque enim unquam fracta eiusmodi ossa, & suis etiam sedibus mota, in suum locum ueniunt,

Lib. 6. Meth.

Hippoc lib. de
fracturis.

Guidonis præ-
cepta de redu-
ctione fracturæ.
Cel. lib. 3.

ueniunt, nisi illa per uim aliquis intendat. Intendere autem dignum, uel aliud quoque membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra apprehendit. At uero ualentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendunt. Si firmiores nerui ac tendines sunt, (ut in uiris robustis, maximeq; eorum feminibus & cruribus euenit) habent quoque uel lineis fascijs utrinque capita articularum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. Cavendum autem semper est, ne immoderatus con fractum membrum extendatur. immoderata enim dislentio in duris praesertim & siccis corporibus, uehementes dolores, febres, conuulsiones, & resolutiones interdum inducit. Quinetiam per eam diuelli ac dirumpi musculorum, ac neruorum fibras aliquando contingit. Proinde summa in hac re prudentia opus est. Igitur aegro in sedili collocato, uel resupinato potius, ut Sorano placuit, ministris duobus iubeamus, huic supra fracturam, illi infra digitos circumponant, atque sic tensionem perficiant. Quod si ualentius sit intentio, non solum manibus, sed etiam, ut diximus, habent aut funibus intendere aggrediemur. Ergo duos funes aequales con fracto membro, uerbi gratia, brachio aut cruri circundamus: unum supra fracturam, alterum infra: atque uni ministro ad aegrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funium tradentes, iubeamus in diuersa membrum per fractum distendere. Vbi paulo longius, quam naturaliter esse debet, membrum uis fecit, dislentio remittenda est, ac tum demum ossa omnibus in suam sedem compellenda sunt. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor sublat-

174. d. 22

Aeger quomodo
collocandus, in
fractis artubus.

Dislentio quan-
do remittenda.

tus.

tus. Ceterum ossibus fracturæ iam sic probe coaptatis, iuxta Hippocraticam consuetudinem membrum deligandum erit, ut statim subiungemus. Modus alius reducendi ossa fracta in suum locum, & naturalem statum per distentionem; libro de fracturis traditur ab Hippocrate, qui & à Paulo refertur libro sexto sui operis de re medica, quo etiam si uelis, & parata habeas quæ describit instrumenta, uti poteris. Sed hic modus quem supra posuimus longè facilior, & magis ad-

1. manum est. Atque eo etiam Soranus medicus utebatur, estq; hodie apud nos in frequentiore usu. Oportet igitur (ut summam dicamus) aut manibus ipsis, utique si confractum membrum exiguum est, aut unguibus impositis, si maius est, & ualidiore tractu opus sit, aut eiusmodi instrumento quod nobis Hippocrates descripsit, antitastum ossium facere, hoc est, retrorsum ea trahere, ut è directo committantur, exactaq; eorum coniunctio fiat, sic ut pristinam unionem imitentur.

Anacephalaosis.

2. amplius supersit metus, ne se in adducendo contingant, tum in directum opponere, uinculaq; relaxare, ac musculis ipsis ductorum in idem commissionem permittere opus est. Interim uero (ut rectè Galenus admonet) te ipsum quoque qui operi præes, manibus subservire expedit, ac sicubi aliquid paulum subsultet, ac promineat, porrigere atque formare. Ceterum in adducendis sic, ut supra expressimus, contrario motu partibus, ne aliquæ frangantur ossium extantia, non leue periculum est. Non enim ueluti (inquit Galenus) in
3. serrà defectis usitur, levis est semper utriusque partis finis. Quod si ille (ossium inquam extantia) forte fortuna

Lib. 6. Tber.

Ossium extantia.

te fortuna frangantur, nō poterunt ad amussim secum coaptari fracti ossis fines, tum quia forsā fragmenta inter partes uniendas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium fortē extrā ceciderit, & comminutum perierit, unde spacia inter applicata simul ossa, mancant inania: in quā sanies collecta, atque temporis tractu putrescens, totum pariter membrum secum corrumpet. Atque hæc tractanda fracturæ ratio omnibus propemodum confractis artubus conuenit, ubi præsertim ossa fracta suo loco (ut sæpius contingit) exciderint, aliudq; super aliud effertur. Neque enim semper dum franguntur ossa suis sedibus moueri contingit, sed interdum fracta in suo loco, ac naturali situ remanēt. Quod ante omnia (ut nos admonet Celsus) considerari debet: & sunt notæ certæ, quibus id discrimen deprehendere possis. Nanq; si suis sedibus mota sunt, resima apparent, punctiōisq; sensum repræsentant, ac tactu (ut suprā annotauimus) inæqualia sunt. Vbi uerò loco suo non exciderunt, neque punctiōis sensus ullus, neque ulla quæ tactu percipi possit inæqualitas adest. Cæterum si primis diebus ossa ipsa perfracta, & suis sedibus mota, reposita non sunt, non leue inflammationis periculum subest, sub qua & difficile, & periculose uis neruis & tendonibus adhibetur. Atque hæc de prima intētiōe dicta sufficiant. Secundus scopus in curandis fracturis nobis propositus, est, ut ossibus iam sic, (ut suprā docuimus) probè coaptatis, & è directo admotis, eorum postura seruetur, & exactè coniuncta maneant, sic ut pristinam unionem imitentur. Porro nequaquam prohibere poteris, quin diuisa eiusmodi ossa, quæ sic effinxeris, & ad amussim secum coaptaueris

Notæ ossis fracti, & sua sede moti.

Secundus scopus.

coaptaueris, sua sede moueantur, & rursum dissideant, si laborans quoquo pacto uel uigilans, uel dormiens, membrum fractum dimoue at. Ergo ut secundum hunc scopum assequaris, per fractum membrum prorsus immotum consistat necesse est. Quòd si ipsi quidem ægrotanti, ut quietudini membri prospiciat, permiseris, uigilans fortassis (quemadmodum inquit Galenus) pro-

Membrū perfractū prorsus immotum seruandum.

Lib. 6. Metb.

bè id curauerit, at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur nō dormientis modò hominis, sed etiam
 1^o ad desidendum, itemq; cum cubile resternitur surgentis, eorum quæ ritè formata & exactè coniuncta sunt, positura seruetur, tuta deligatura completi fracturam oportet, quæq; fracti ossis partes secum coarctare ad amussim possit. Tuta autem non erit deligatio, si uel nimis arcta, uel laxa nimis fuerit. Quandoquidem per laxiorem ossibus moueri licet, per arctiorem uerò & uehementius adstringentem, & alimenti in locum affectum distributio prohibetur, & dolor (qui humorum in ægram partem affluxus euo-

Os fractum deligandum esse, & quare.

- 2^o cat, & phlegmonas creat) excitatur. Danda itaque opera est, ut utrumque excessum declinemus. Constrictio igitur mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. Ac si quidem equalis esset crassitudinis membrum quodque, utique latissima fascia (ut Galenus ait) commodissima esset, utpote quæ totum equaliter, continenterq; ex omni parte fractum os complecteretur. Sed quoniam id non est, quod deest nobis ex fasciarum latitudine, circuituum numero pensabimus, ut in artubus ipsis, qui omnium maxime
 3^o me fracturæ per transuersum factæ, expositi sunt. In talibus nanque utilior est angusta deligatura, quam ualde

Deligaturæ modus.

Com. in lib. Hippoc. de fracturæ, & 6. Ther.

Angusta deligatio artubus utilis.

Ratio deligandi artus perfractos, ex Hippo. Gale. & Celso.

Hac secunda fascia non bis a uter, ut in prior ligatura, sed semel tantum membro perfractio circumdatur Hippocrati.

ualde lata & remissa: quippe quæ nec rugas, ut ea quæ latiore fascia fit, contrahat, & totius membri cui circumdata est, cutem contingat. Eo igitur usque augere tibi latitudinē fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Cæterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis (in medio præsertim brachij, uel tibiæ, aut femoris existentibus) adhibetur, duabus fascijs lineis molli-
bus (iuxta Hippocratis dogma) opus est. Has autem Hipp. ipse nomine peculiari ὑποδεσµίδας, id est, subligamina, seu malis subfasciationes, appellauit. Pri-
mæ fasciæ initium super fracturam iniici debet, ac circa eam bis ter uel conuoluta, sursum uersum ferri, & quasi in cochlea serpere, atque illic desinere. Id tamen perpetuò obseruandum est, ut multum partis sanæ fasciæ hæc complectatur. Ita enim fiet, ut & firmiter reposita ac conformata ossa contineantur, & magis ab affecto loco in circumuicinas partes humores elidantur, magisque ne hi à superiori parte eo defluant, impediat. Altera etiam super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumque (ubi primos complexus super fracturam fecit) tendere, atque inde iterum red-
cta in superiore parte, ultra priorem fasciam desinere. Quocirca dimidio longior priore esse debet. Terminus autem longitudinis earum fasciarum, non unus ac certus statui potest, sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine fracturæ, & perfracti membri crassitie utraque dimensio uarianda est. Hunc Hippocrates libro τῷ κατ' ἰκτερίον, id est, de medicina seu medici officina, & libro de fracturis, trium aut quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum longitudinem; digitorum uero latitudinem cōstituit. Digni autem & cubiti intel-
ligendi

- ligendi sunt eius ipsius qui deligatur, nempe uel uiri adulti, uel puerili. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio, ex ipsa rei natura desumitur. Quandoquidem duo hæc prima lintea fracturam quidem muniunt ac stabiliunt, nec phlegmonem (quæ in hac re imprimis est arcenda) oriri sinunt. Siquidem & ab integris ad labo-
rantem particulam sanguinis confluxum arcent, & quod iam collectum in ea est, exprimunt. Prior quidē Prioris deligaturæ uis & facultas.
deligatura quod in læsa parte continetur, ad superpo-
sita expellit atque elidit: quod uerò ex ijs (superposi-
tis inquam partibus) in locum perfractum confluit, re-
pellit. Altera uerò primis quidem complexibus, quos, Quid secunda deligatura efficiat.
ut suprâ diximus, super ipsius fracturæ locum facit,
itemq; diffipatione deorsum tendente, quædam ad in-
feriora extrudit, quædam, ne quid ex ijs in locum fra-
cturæ confluat, prohibet. Reliquis uerò deinceps com-
plexibus, quibus uidelicet ab infimis partibus sursum
uersum recurrere deligaturam diximus, ut eodem scili-
cet loco cum priore fascia, secunda desinat tum ad su-
periora (uti & priore ligatura) repellimus, tum conflu-
xum ab ijs prohibemus. Ceterum priusquam fasciis
huiusmodi fractura deligetur, unus aut alter pannicu-
lus lineus, candido oui liquore & rosaceo delibutus,
nudo membro non absque ratione à recentioribus chi-
rurgis superaccommodatur, ea quidem magnitudine,
ut etiam aliquid partis sanæ comprehendat. Sunt autē Fasciarum longitudo & latitudo.
tem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe quatuor,
aut quinque, aut sex, ut diximus cubitorum, & circa
tres quatuor uel digitos latæ, aqua aut posca potius
madefactæ, & postea expressæ, præsertim si fractura
inflammatione uacet, recensq; sit. Si uerò dolor uehe-

Si inflammatio adest, cum fractura. mēs, aut inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusq;
aut stupis leuibus oleo uel oxycrato imbutis ment-
brum contegendum est, & nō ita arctē deligandū. Sa-
tis enim fuerit tunc, si deligatura adhibeatur, quæ &
membrum utcunque fulciat, & admotā medicamenta,
adhæc symptomata profliganda idonea, contineat. Ve-
rumenimvero cū hæ duæ primæ deligaturæ, ad am-
bos hos usus quos supra retulimus (nempe ad fractu-
ræ munimentum stabilimentumq; & ut phlegmone ex-
citari prohibeatur) non satis adhuc faciant, præsertim
solæ, ad earum quidē tutelam & fracturæ stabili-
men Hippocrates remedium excogitauit, ut scilicet
plagula siue splenia à splenis forma ita appellata; unā
cum exterioribus fascijs, quas ἐνδόσπας, id est, su-
perligamina uocat, desuper adhiberentur. Et hæc qui-
dem tertiæ deligaturæ rationem quibusdam obtinent.
*Splenia cur ad-
libeat.* Splenia enim eiusmodi siue plagula, quarum prima-
rium fasciarum, quæ peculiari nomine ὑποδόσπιδες,
id est, subligamina Hippocrati appellantur, firmamen-
ta sunt, ut commentarijs in librum Hippocratis de fra-
cturis Galenus annotauit. Ne autem phlegmone susci-
tetur, medicamento quoque ex ijs quæ inflammatio-
num iniurias arcent, uti censuit. Quale nimirum est ce-
ratum humidum siue liquidum, quod confici solet ex
cera in rosaceo aut oleo colliguata, aut eius loco rosa-
ceum. Huius sententiæ fuit & Cornelius Celsus libro
octauo, sic inquit: Super has (duas inquam primas
deligaturas) iniiciendum leuiore linteo ceratum est,
quod eas contineat. Quod si ossis fracturæ, carnis quo-
que uulnus accessit, neque ceratum, neque rosaceum
tuto admouetur: quandoquidem hæc ulcus tum sordidum

- dum tum putre efficerent: sed in uicem eorum puluilli prælongi uino nigro ac styptico imbuti, superinijciendi erunt. Reliqua autem curatio, quæ eiusmodi fracturis cum uulnere incidentibus conuenit, in sequentibus dicitur. Porro præter has modò à nobis commemoratas deligationes, quasdam adhuc alias quatuor commemorat Aurelius Cornelius Celsus, capite decimo, libri paulò antè citati. Sic autem eas dispensat, ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia fascia (quæ duas
- Alie quatuor Corn. Celsi deligationes.*
- 1^o primas ac splenna comprehendit) tantum in inferiore
- 2^o parte, tres reliquæ in superiore finiant. Quia satius
- 3^o est (inquit) sæpius circuire quàm adstringi. Siquidem
- 4^o id quod adstrictum est alienatur, & cancro opportunum est. Quo loco (ni fallor) cancerum pro sphacelo, quem uulgus medicorum esthiomenum uocat, usurpauit, ut & quibusdam alijs locis. Caterum cum multis complexibus atque inuolutionibus duæ illæ superius commemoratæ Hippocratis deligationes, fracturam cõtineant, (aliàs enim parum tutæ essent) tam numerosis
- Cornelii Celsi opinio resellitur.*
- 5^o fascijs opus esse minime censeo. Hæc enim in membro ipso perfractio, præter solitum cooperto, & pruritum & dolorem (quæ duo symptomata à fractis membris diligenti studio arcenda sunt) excitare, atque etiam eius quod iam infixum fracturæ est, perspirationem prohibere possunt. Porro ubi decenter sic membrum confractum deligaueris, de apposita repositionis ipsius figura, maxima tibi sollicitudo habenda est. Siquidem sub alia forma aut figura membrum perfractum deligare, in aliam uerò mutare ac reponere, non dolorem
- De apposita repositionis perfracti membri figura, ex Galeno.*
- 6^o modò (ut inquit Galenus) excitare potest, uerumetiam ossa intorquere. Neesse enim est, ubi figura mutatur,

Repositionis fi-
gura ad duo di-
reclivasse.

Rectissima figu-
ra que dicitur
Galenus.

alios musculorum tendi ac uelut cōtractos rotundari,
alios uerò solui ac remitti. Vbi autem tenduntur, tum
premi eos à deligatura est necesse, tum ex compressio-
ne ipsa dolere. At ubi tensio remittitur, quo loco deli-
gatura est laxa, ibi fracturam fulcumento desitui. Cæ-
terum aptissima fuerit in ossium fracturum repositio-
ne, sicuti etiam & in retractione, (quam antitaxin di-
ximus à Græcis appellari) & coaptatione, & deliga-
tione, partis figura quæ (ut uerbo uno dicatur) maximè
à dolore abest, & in qua æger persistere immotus
diu possit. Hæc enim & rectissima est, & maximè na-
turalis membro ac serè consueta. Rectissimam autem
hic partis figuram cum Galeno uocamus, quæ uenas,
arterias, & musculos. quàm rectissimos habet. Itaque
angulosa figura, quæ ἐγγώνι & Græcè dicitur, brac-
chio quidem maximè naturalis est: cruri uerò, quæ
paulò minus porrecta est. Hæc nanque & rectissima
est, & à dolore maximè aliena. Caterum tametsi an-
gularis figura, quæ Græcis ἐγγώνι & dicitur, pro-
priè ea dicatur, quæ acutum angulum, quem recto mi-
nore appellamus, efficit: per ἐγκώνιον tamen, id est,
angularem figuram, Hippocrates eam intelligit, quæ
recto angulo constituitur, non prorsus tamen recto, ut
quodam in loco Galenus est interpretatus. sed propè
ad rectum accedente, ita ut paululum ad obtusum ten-
dat: cuiusmodi in manu, quod uulgò brachium appella-
mus, ea figura est, non quæ prorsus quidem inter ex-
tensionem & inflexionem. media est, sed quæ ad ex-
tensionem procedere incipit. Quo plerumque posi-
tu eos qui dolore afficiuntur, si diligenter inspexe-
ris, manus tenere deprehendes. Porro ut dolor uite-
tur,

tur, cum ad quietem membrum reponitur, non modo naturalis habitus cuius instrumento est utilis, uerum etiam consuetudo quoque conducere nonnihil uidetur. Ergo ut aptè membrum perfractum, & decenter ligatum reponatur, ea situs figura illi inuenienda est, quæ & naturalis sit & consueta, & à dolore maximè aliena. Sed iam hæc indicationes inter se consentiunt, & conspirant maximè. Nam quæcunque figura magis quam alia est à dolore libera, ea & maximè naturalis membro, & ferè consueta esse solet. Atque econtra, quæ naturalis & consueta est, ea à dolore est alienissima. Atque hæc quidem figuræ, in qua custodire membrum perfractum conueniat, inueniendæ ratio est. Ut autem in hac naturali, & quæ doloris minimum habeat, figura immotum prorsus (quoad expediet) membrum persistat, recentiores Chirurghi secundum deligaturam, protinus ferulas etiam circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex inflammatione (si qua adsit) postulat. Veteres autem, ut Hippocrates, Celsus, & Galenus, à die tantum septimo uel etiam nono & undecimo, ferulas accommodabant. Verum non abs re factum putamus, si statim ab initio post deligaturam, ferulæ iniiciantur, modo nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonem (quæ maximè arcenda erat) accersant, uel præsentem (si adsit) exacerbent. Quæ igitur à principio adhibentur à recentioribus ferulæ, non eo nomine adhibentur circumponuntur ue, ut adstringant, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita utcunque fulciant. Primis namque diebus cum phlegmones deuitandæ consilium uinceret, tutum non

Ratio inueniendæ figuræ, i. quæ custodire membrum perfractum conueniat, ex Galeno & Hippocrate.

Ferula quando in fracturis circumponenda.

Quæ nitare oporteat in ferulis adhibendis. Ferula ab initio non ultra adstringenda quam ut ossa contineant.

erat perfractum membrum ita ferulis premere. Cum
 uerò nullus iam amplius futura inflammationis metus
 sit, aut ea quæ prius fuit discussa, membrum aliquantò
 gracilius quàm pro naturali habitu apparuerit, (quod
 intra septimum diem serè solet contingere) tum lice-
 bit ferulas circumponere, & eas (ut fracturam stabiliat)
 ualide satis adstringere. Ferularum enim usus idem
 est, qui & plagularum seu spleniorum, nempe ut fractu
 os contineant, & deligationem stabiliant ac firment.

*Ferule quales
 esse debeant.*

Sunto autem ferule, ut libro qui inscribitur τὸ κατ' 10

ἰκτὺς εἶον, id est, de ijs quæ in medicatrina seu medici
 officina fiunt, rectè præcepit Hippocrates, læues, id est,
 leuigatæ & planæ: æquabiles, id est, neque in latos, ne
 que in superiorem, aut inferiorem partem distortæ: in
 summis partibus, id est, extremitatibus, resimæ, id est,
 leniter deraasæ ac retusæ: minores hinc inde quàm deli-
 gatio est, & ea parte crassiores, id est, latiores & ua-
 lentiores, ἢ ὡς ἐγγὺς πτω τὸ κατὰ γυῖα, id est, qua

Læues.

fractura erupit. Læues autem ferulas, id est, non aspe-
 ras (leui enim asperum opponitur) adhibendas esse 20
 cēset Hippocrates, ne sua asperitate et inæquabilitate
 (quod enim asperum est, continuò etiam est inæquale)
 fractis partibus negotium facebant. Vtroque enim

Æquabiles.

modo comprimunt. Cæterum quoniā fieri potest, ut fe-
 rule læues sint, nō tamen æquabiles. (inæquabile enim
 non protinus necessariò est asperum: ut patet de uia
 quæ ascensus habet & descensus non asperos) ideo nō
 solum læues, sed etiam æquabiles, id est, non distortas
 assumendas esse ferulas monet. Quæ enim distortæ
 sunt, similiter ut aspera lædunt, ac illud insuper effi- 30
 ciunt, quòd deligationem simul distorquent: qua distor-

ta, pars

ta, pars etiam fracta dislorqueatur necesse est. Simas
præterea in extremis partibus eas deligi uoluit, id
est, ut Galenus interpretatur, leniter deorsus ac retusus:
in extrema parte, ne sua acutie articulum ledant, &
equaliter ubique fractam, propter æqualem suam cras-
situdinem, comprimant: quod certè fieri nullo modo de-
bet. Vult enim Hippocrat. ut in media parte, hoc est,
supra locum fracturæ, vix duxes, id est, ferulæ, deli-
gationem magis adstringat. Hinc ea parte, hoc est, su-
Crasse.

pra fracturam ipsam, crassiores esse iubet: quia scilicet,
cet locus is potissimum (ut supra ostēdimus) compres-
sione ipsarum indiget. Vuult item minores eas esse,
longitudine, id est, aliquantò breuiores, quàm sit ipsa
deligatio, ne cutem ultra deligationem attingant: quæ
sepe numero ex eo quod humores à fasciis expressos
suscipit, paulò altius turgescit atque extat. Sed & bre-
uioribus ferulis utendum præcepit senior ille Hippoc-
ne pars eminentior, id est, gibba & carne nudata, attin-
gatur, ut circa cubitum, & malleolos, ubi osium exten-

operationes sunt. Modus autem ac ratio adhibendi fe-
rulas, talis esto. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo
delibuta, super fascias similiter atque equaliter, si
membrum in crassitie fuerit æquale, circumdato. Si uerò
inequale, partibus magis concauis, per splenia re-
pletis, membrum undique æquale ferulis accommodan-
dis effcito. Deinde ferulas lana, aut stupa mediocri-
ter inuolutas, in orbem, non minore quàm unius digiti
spacio inter se distantes fracturæ circumdato, easq; le-
niter ac moderatè constringito. Sed & in hac ferula-
rum accommodatione summopere caueto, quatenus fie-
ri potest, ne articulus aliquis, (ut paulò antè notauimus)

Modus ac ratio
adhibendi fe-
rulas.

mus) & præcipue interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & nervorum inflammationes pariunt. Itaque illic, hoc est, iuxta articulos ipsos, deligatione aliquantò (ut diximus) breviores, tenuiores, laxiores, & magis flexibiles ferulas esse oportet, quemadmodum valentiores, qua fractura excidit atque inclinat. Caterum si nulla prurigo, nulla inflammatio, nulla suspecta exulceratio, nullus uel dolor adest, & ossa rectè cõmissa fuerint, fracturæ rectè procedat, sic manere ferulas, & ligamenta, ad decimum usque diem, uel quintum et decimum, aut etiam uigessimum, utile est. Si uerò in membro perfracto præter solitum cooperto, uel dolor excitetur, uel pruritus creetur, uel eius quod iam infixum fracturæ est perspiratio prohibeatur, propter quam non modò noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur, non abs re feceris, si tertio quoque die, ut iussit Hippo. deligationem solueris, & membrum ipsum aqua temperata perfuderis ac foueris. Hac enim perfusione & 20 acrem atque erodentem saniem discuties, & dolorem mitigabis, & prurigini pulchrè medeberis. Porro cum nec ferulis, nec deligatione, nec figura situ uel membri appposito, diuisæ ossis partes (tametsi exactè atque ad anuissim coniectæ fuerint) citra glutinum aliquod uinculum uel (uti suprà diximus) coire, ac concreescere possint, maxima calli, quem pæron Græci dicunt, gignendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gignendum cogi concreescereq; aliquid proprii ossis alimenti, crassi terreniq; oportet, quod in labris fracturæ coalescit. 30 ipsum igitur nec eluendum, nec foràs euocandum est, sed si =

Quando solueda deligatio.

Tertius scopus.

Pari generatio.

sed sinendum. Crassa autem hæc terrenaq; substantia, ex genuino, maximeq; idoneo ossis alimēto redundans (quæ propria est calli materia) diem circiter duodecimum, aut decimum quintum ab ossis fractura serè gigni, atque accrescere incipit, ut recentiores chirurgi testatum reliquerunt. Ceterum huius generatio (quæ in alijs citius, in alijs uerò tardius aduenit) ijs serè notis deprehenditur. Dolor qui prius aderat, sedatur, nullus amplius inflammationis, aut tumoris alicuius præ-

Callus quibus no-
tis generari de-
prehendatur.

10 ter naturam metus adest, in membro perfractio bonus ac natiuus color efflorescit. Vniuersa autem uiclus ratio p̄ro gignendo accommodata, talis esto. Dum callus gignitur, uicium paulò pleniorē, quàm ab initio fracturæ, laborātī instituito: cibos qui boni succi sint, & multum nutrant, (nisi uulnus adsit) exhibeto. Sed & quæ offeruntur alimēta talia sunt, ex quibus provenire succus soleat non solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maximè expedit. Quippe (inquit

Viclus p̄ro gi-
gnendo aptus.

Lib. 6. Meth.

20 sus nequeat: ex crassa uerò, sed quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expers, gigni quidem poterit non segniter: ceterum tempore siccescens friabilior, atque ita fractioni obnoxius redditur. Itaque p̄ro gignendo conueniunt Auicennæ: Risum, panis similagineus, frumentum triticeum tandiu in aqua coctum, donec fiat (inquit) sicut puls, (id Galli uulgò appellant fromētæe.) Alicam nonnulli esse existimant. Ad hæc, pedes, uentres, & capita animalium, sed præsertim hœdi, & ueruecis: hæc enim & multum alunt, & crassi ac tenacis

30 succi sunt. Circa initium fracturæ usque dum callus gignitur, (quod serè circiter decimum diem contingit)

ægrum

Libro de fra-
cturis.

Peri magni-
tudo.

Quartus sco-
pus.

Symptomata
quæ fracturam
comitantur.

Dolor.

Inflammatio.

agrum tenuissime cibato. Cibi nanque subexiles (ut cen-
suit Hippocrates) & non ualide materiae tunc satis
sunt. Venam interdum, cum scilicet res exposulat, se-
cato, & per uentrem superuacua expellito. Carne &
uino usque ad decem dies, ex Hippocratis praescripto,
abstineto. Post hoc tempus, uinum crassum & stypti-
cum audacter concedito, tametsi Celsus uinum per om-
ne tempus alienum esse dixerit. Magnitudo calli nec
minor quam par est, nec maior iusto sit, sed mediocri-
tatem ad unguem seruet. Qui enim iusto minor est, hic
ossa parum tuta reddit: qui maior est, dolorem muscu-
lis inuehit. Ergo calli magnitudo, ut breuiter dicam, ea
sit, quæ & ossibus tuto uinculo sit, nec musculos tamen
comprimat. Attendendum uerò diligenter est, quemad-
modum nos Galenus admonet, ut uel promoueatur, si
minor iusto proueniat: uel inhibeatur, si immodicè cre-
scat. Quibus uerò hæc efficies, paulò post dicemus.
Atque hæc de peri generatione, qui tertius erat sco-
pus, in curandis fracturis nobis propositus, dicta suffi-
ciant. Superest igitur de quarto, & ultimo scopo aga-
mus, qui dispositionum præter naturam, quæ fracturæ
interueniunt, emendationem, atque ablationem concer-
nit. Eæ autem ferè sunt, dolor, inflammatio, pruritus,
uulnus, immoderata siccitas, aut humiditas callo gigni-
do obsistens: gangræna, durities, peri magnitudo, aut
deficiens aut excedens. Itaque si dolor aut inflamma-
tio adsit, deligationem, si iam facta est, statim soluito,
& lanam, oleum, & acetum, congruèq; id genus alia
auxilia parti dolenti, atque inflammatae admoue-
to. Sed neque priusquam hæc sedata fuerint, uel deli-
gaturam adhibeto, uel ferulas circumponito, nisi dun-
taxat

taxat eatenus, ut membrum fulciant, & ut impositum
 medicamentum contineant, hoc est, laxè admodum. Cel-
 sus consulit liberale fomentum aquæ calidæ, dum in-
 flammatio adest: cum uerò ea deest, modicum: sedata
 inflammatione, & dolore sublato, deligationes, & fe-
 rula, ut suprà diximus, adhibendæ sunt. Si noxius pru-
 ritus accidit, & erosa à saniei acrimonia (ut aliquan-
 do contingit) cute exulceratio concitatur, aquæ tempe-
 ratæ tantum superinfundere oportet, quantum ad euo-

Fomentū aquæ
 calidæ.

Pruritus.

10 candam eiusmodi saniem est satis. Hoc quidem Hip-
 pocratis & Galeni consilium fuit. Recentiores autem
 chirurgici aquam salsam infundi præcipiunt, aut un-
 guento albo, uel eo, quod uulgò populeum appella-
 tur, membrum illini, & ut suprà dictum est, deligari.

Cum ossis fracturæ carnis quoque uulnus accessit, siue
 statim ab initio id factum sit, siue postea à chirurgo
 inductum, ut ossium fragmenta, & ea præsertim quæ
 pungunt, eximantur, si quidem sanguis profundatur,
 hunc prius aptis remedijs sistito. Si inflammatio oria-

Vulnus.

20 tur, præsidij in eam efficacibus utitor. Si carnes con-
 tuse sint, partem affectam, ut gangrænæ periculum
 euitetur, scarificato. Quòd si gangræna quoque ipsa,
 aut alia quæpiam serpens putredo, iam occupauit, cõ-
 uenienter occurrito: horum autem omnium curationem
 in superioribus libris tradidimus. At si nihil horum
 adfuerit, neque magna ossis pars nudata sit, hamulis
 futurisq; usi his medicamentis, quæ cruentis imponun-
 tur, medebimur, prius tamen fragmentis ossium euul-
 sis. Cæterum deligatura fracturæ eiusmodi cum uulne

Contusio.

Gangræna.

30 re factæ, hoc modo adhibenda est: Orbiculares fasciæ
 partibus uulneris utrobique, hoc est, ab utraque ulce-
 ris parte,

Deligatura fra-
 cturæ cū uulne-
 re accommoda.

Hippocrates.

ris parte, injici debent, oblique uerò supra ipsum uulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic ut per decussim ad X literæ similitudinem, iuxta hiatum oclusio ex omnibus fiat. Hippocrates tamen à prima statim circumuolutione, fascia latiore totum ulcus cōprehendit, ita ut nulla eius pars nuda relinquatur. Itaq; si sordidū adhuc uulnus est, expurgantia medicamēta, quando opus erit, impones. Si purum, carnem producentia linteolis illita, aliamq; usu cōprobatam materiam adhibebis. Hippocrates tamen statim ab initio picatum ceratum, quod ceram in rosaceo, aut oleo colliquatam, & picis siccæ aliquantulum assumit, supra uulnus in linteolis adhibet. At Galeno autore utilius à tertio die, cum ea quæ in ulcere sunt concoquat, adhibetur. Cornelius Celsus omnibus his uulneribus primò imponendum iubet linamentum uino madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit. Si æstiuum tempus est (inquit Hippoc.) splenia uino frequenter sunt irriganda; si hyemale, lanæ multæ succidæ ex uino & oleo superimponendæ sunt. Lanarum namque superpositione, & olei commixtione refrigerationis uehementia (quæ in huiusmodi affectibus conuulsionis periculum interdum inuehit) obtrunditur. Vino autem madefactæ plagule, ob uinum reprimendi uim habent. Ceterum ubi purgata ulcera fuerint, & in eis iam caro concreuit, ferulæ non incōmodè injicientur: aliqui uerò etiam ab initio ipsas accommodant, ulceris locū uitantes, et prout necessitas, ac usus tulerit, ipsas modò constringunt, modò remittunt: sed hæc curandi ratio ab Hippocrate, & Corne. Celso non probatur. Hi enim pluribus tantummodò, & latioribus fascijs (ferulas ne uidelicet compri-

Ferulæ quando
in fractura cum
uulnere adhibenda.

Corn. Celsus.

mendo

mendo ledant, similiter & canales omnino reijciētes) deligaturam in eiusmodi fractura, quæ cū uulnere incidit, fieri iubent, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset: adeo ut affulcitæ quidem, non compressæ tamen fasciæ ipsæ esse uideantur. Ita nanque (inquit Celsus) numero fasciarum efficietur, ut laxæ quoque æquæ cōtineant. Ac satius quidem est, sepius circuire, ut ante Celsum scripserat Hipp. quàm adstringi. Sed et in eas fascias multiplices ingerendum subinde, eodem Celfo autore, est calidum oleum, & uinum: magisq; ubi sic cum uulnere fractura à principio incidit, fame, id est, exquisitiore uictu utendū, uulnus calida aqua fouendum, frigusq; omni ratione uitandum, & transeundum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt: maiorq; uulnere, quàm ossi cura agenda. Vt autem de hac re, quod ad ferularum appositionem attinet, sic apud auctores etiam eximios controuersa, id quod res est semel statuamus, hoc tibi tanquàm axioma, id est, pronunciatum esto. Cū fractura cum ulcere interdum in longitudine membri contingit, tunc ex utraque ulceris parte ferulas etiam, ab ipso curationis principio circumdare licitum esto. Cū uerò transuersum ulcus euasit, idq; maxime si maius sit, ferulas statim ne imponito. At si squammula aliqua ex osse resoluitur (id quidem colligi ex eo potest, quod & copiosior, tenuiorq; humor profluit, & caro circa ulcus laxa, & mollis effecta intumescit) deligatura laxiore ad curationem utendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere facile queat: frequentiusq; ut consulit Hippoc. religandū, quoad os recesserit, ferulæq; non apponendæ. Vbi uerò uel hamulo, uel quopiam alio eiusmodi instrumento squamam

Si ossis pars alia
qua recessu-
ra est, non

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

ut supra

squamam euulseris, deligatura iterum ualidiore membrum adstringes. Porro per totum id, quo ulcus curatur tempus, medicamen aliquod, ex his quæ inflammationem arcent, linamentum continens uulnere incubet, ac simplices fasciæ iniicientur, quæ singulis curationibus resoluuntur, cum aliæ supradictæ remaneant.

Si fragmentum ossis eminet.

Lib. 8.

Si fragmenta uelut emoriantur.

Vulnus interdum maius efficiendum.

Si fractura qui

Inter hæc autem, si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem dandū: si acutum, antè acumen eius longius est præcidendū: si breuius, limandum, & utrinque (inquit Celsus) scalpro limandum. Tum ipsum recondendum est: ac si id manus, facere non potest, uulsella (quali fabri utuntur) iniicienda est, rectè se habenti capiti ab eâ parte, qua sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem, compellat. Si id maius est, & membranulis fragmenta, cinguntur, sincere oportet ea sub medicamentis resoluere, idq; os, ubi iam nudatum est, abscindere: quod maturius scilicet faciendum est, potestq; ea ratione & os coire, & uulnus sanescere: illud suo tempore, hoc pro ut se habet. Nonnunquam etiam (inquit) in magno uulnere euenit, ut fragmenta quædam uelut emoriantur, neque cum cæteris cœant. Quod hic quoque ex modo, fluentis humoris colligitur, quo magis necessarium est, sæpius ulcus resolvere, atque nutrire. Sequitur uero, ut id os per se post aliquot dies excidat. Caterum, cum tam misera antea conditio uulneris sit, tamen interdum maius, diutiusq; facies. Sæpe enim integra cutis osse abruptitur, protinusq; prurigo, & dolor oritur. Quæ soluere (si accidit) maturius oportet, & fovere aqua per æstatem frigida, per hyemem egelida. Deinde ceratum myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam

* quibusdam uelut aculeis carnem uexat, quo à prurigi- busdā uelut acu-
ne & punctiōibus cognito, aperire id melius, eosq; leis carnem di-
aculeos præcidere necesse habet. Reliqua uerò curatio uexet.

in utroque hoc casu eadem est, quæ ubi iclus protinus Siccitas callo gi-
uulnus intulit. Haslenus Corn. Celsus de fractura cum gnædo obijster.

uulnere facta. Nunc cetera prosequamur. Dum ualen-
ter nimis siccantur ossa, callus agre prouenit. Expedit

igitur istis ita resiccatīs ossibus, tertio, uel quarto die
modicè, aquam calidam infundere. Hanc met am finien-

1^o de perfusionis habentes, cum carnes in rubrum tumo-
rem attolluntur. Atque in ijs quidem, priusquam substi-
dere incipiant, desistendum est. Contra, ubi digeri quid

uolumus, non prius est desistendum, quàm quod ex per-
fusione intumuit, subsadat. Si uerò humiditas abundan-
tior calli generationem impediāt, ibi hanc siccare con-

uenienti deligatura, & perfusione aquæ, quæ uel mini-
ma omninò sit, uel plurima, conabimur. Quippe mi-

2^o nima (ut sexto methodi Galenus ait) cum prius desi-
stat, quàm aliquid confluat, & qui ad manum, id est, in
superficie, sunt humores, per halitū digerit, & qui in

3^o alto sunt modicè liquat. Expedit autem ita solui liqua-
ta, quæ per deligaturam sunt expellenda. Plurima

4^o uerò perfusio plus digerit, quàm attrahit: atque ita
commodat superflue humiditati. Attendendum uerò

5^o (ut supra monuimus) diligenter est, ut uel augeatur
callus, si minor iustò est: uel inhibeatur, si nimius su-

peruenit. Virumque autem uitium corrigitur perfu-
sionis quantitate & qualitate, ciborum etiam ac me-

6^o dicamentorum, quæ extrinsecus apponuntur, faculta-
te. Ac de perfusionibus quidem, & uicius ratione, iam
suprà est dictum. Ex medicamentis uerò quæcunque
emplasticam

busdā uelut acu-
leis carnem di-
uexet.

Siccitas callo gi-
gnædo obijster.

Humiditas cal-
li generationem
impediens.

Humiditas cal-
li generationem
impediens.

Qua ratione pu-
tus, uel augeri
uel minui possit

Qua ratione pu-
tus, uel augeri
uel minui possit

emplasticam substantiam habent, (cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur) ac modicè calfaciunt, ea (Galeno auctore) callos tum promouent, tum uerò augent. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderatè aquæ temperatæ perfusiones, & idoneæ frictiones. Quæ uerò digerendi uim obtinent medicamenta, ea callos maiores iam factos eidem Galeno imminuunt. Cum recens adhuc callus est, medicamentis ualde adstringentibus Paulus utendum esse censuit, compressamq; admodum deligationem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita: hæc enim calli excrescentiam mirè reprimat ac imminuit. Huic rei efficaciter quoque subuenit Celso, multa leuisq; ex oleo, & sale, & nitro, membri perfrictio, plurimusq; ex aqua calida salsa fatus. Post hæc malagma quod digerat imponendum, adstrictiusq; alligandum esse admonuit: immò uerò oleribus, & prætereà uomitu utendum. Siquidem per hæc (ut existimat) cum carne callus quoque extenuatur. Confert etiã eidem aliquid de sinapi cum ficu, in alterum par membrum imponere, donec, inquit, id paulum exodat, eoque euocet materiam. Atque ubi is tumor extenuatus, & qui nimius supercreuerat callus, ad mediocritatem reductus fuerit, rursus ad ordinem uitæ reuertendum erit. At si solidus, lapideusq; callus, qui sic immodicè increuit, iam euasit, aperta ibi cute detrahendus est, parsq; eius eminens scalpris & terebris etiam, si res exigat, ad motis excidenda est. Cæterum solent aliquando in fracturis diuersa inter se ossa conferuere, membra disorta callo firmari, difficultate functionum obcurdarum haud exigua subsequente. Quod ubi contingit

Si nimius callus superincretuit.

Lamina plumbea.

Si callus in lapideam duritiem & insignem nimis magnitudinem euaserit.

Si ossa diuersa inter se conferuuant, & membrum disortum callus firmauerit.

tingit & breuius membrum, & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. Ergo ubi perfracta ossa sic conserbuerunt, & perperam ferruminata sunt, si tener saltem adhuc callus est, & non ultra sex menses, ut quidam dixerunt, radices egerit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id hoc modo fit: Calida aqua multa, uel decocto aliquo emolliente, diebus aliquot membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, aut emplastro ex althea, uel cataplasmate ex ficibus pinguibus aridis, alijsq; medicamentis callum soluētibus (parolytica Græci dicunt) contegitur. Deinde facta sufficenti emolliōe, modo quē supra posuimus, à ministris duobus, qui in diuersa contendunt, intenditur: & inter hæc medicus chirurgus pertractans ossa, ut callo adhuc tenero existente, manibus ea diducit, compellitq; id quod eminet in suam sedem: et si parum ualuit ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obijcit, atque ita deligando (inquit Celsus) assuescere iterum uetustæ sedi cogit. Non

1^o stræ ætatis chirurgi malè ferruminatum os, in fractura non admodum antiquata, diebus plus minus quindecim, ut supra diximus, primum emolliunt. Deinde id in diuersa extendi iubent, & genu uehementer impulso, iterum frangunt: quod tamen uetustiores medici non probarunt. Mox fracti ossis fines ad amussim secum coaptant, ac ut supra exposuimus curant. Si ab osse perperam ferruminato, uetustas iam occupauit, ac callus uehementer obduruerit, satius est manum illi (ut consuluuit Albucasis) non admoliri. Quicunque enim id

2^o rursus frangere aggressi sunt, post uehementes crucia

Ossa quando iterum frangenda.

Quid agant chirurgi recentiores in osse malè ferruminato.

Si ab osse malè agglutinato uetustas iam occupauit. Albucasis.

tus in extrema discrimina laborantes adduxerunt, adeo ut ualde pauci eorum, qui hoc tormenti genus perpeſſi ſunt, mortem euaserint. Atqui melius eſt, eū qui ſic affectus eſt, claudicatu, aut membri alicuius deformitate affectum, ad annos adhuc multos ſuſtitem remanere, quā poſt talem, tantumq; cruciatum, miſerrime ſic inter manus crudelis chirurgi occumbere. Adde quod ſæpenumero alio loco, quā ubi fractura iam coierat, os ipſum (quod lapideſus callus firmauerat) frangitur, ut præter quotidianum experimentum, nobis autor extitit Auicennas. Quod ſi laborans, & qui illi aſident anuci, importunis precibus, atque aſiduo rogatu te compellant, ut oſis eiufmodi male ferruminati, & cuius callus iam obduruit ac inueterauit, curationem ſuſcipias, in anguſto ſpem eſſe coram illis præſator: deinde opus aggreditor. Summam igitur cutem, & carnem callo ſuperiacentem cultro raſorio aut ſcalpello dextræ ac prudenter ſecato, magna cura habita, ne nerui, muſculi ue lædantur. Deinde oſium, quæ non rectè coaluerant, agglutinationem, ſeu continuationem (quod auiunt) exciſorijs ſcalpris diſſoluto. Mox uerò eorum ſic diductorum fines ſecum ad amuſſim coaptato, ita ut priſtinam unionem, quoad licebit, imitentur. Demum cætera fiant, quæ ſuprà ſcripſimus. Cæterum ſi ex attritu, membri corruptelæ metus impendet, protinus ſcarificandum erit, reliquaq; facienda, quæ ſuprà in gangrænæ & ſphaceli curatione diximus. Si uerò tophacca aliqua durities poſt oſis perfracti agglutinationem remanſerit, ea modo qui in antidotario exprimitur, diſcutienda & tolenda

Auicennas.

Ex recentioribus.

Si membrum ex attritu corruptum fuerit.

lenda erit. Fracturae quaedam, supra diffinitum naturae
tempus, sine callo interdum permanent: quod ob varias *Si fractura sine
callo supra de-
finitum tempus
remanserit.*
causas solet accidere, nempe uel ob assiduas solutiones,
uel ob immodicas superfusiones, quas & fomentatio-
nes uocant: uel ob intempestiuum motum, uel ex fasci-
arum multitudine, nonnunquam etiam quia totum cor-
pus non sufficienter alitur, quo in casu membrum quo
que ipsum (ut Paulus annotauit) gracilius euadit. Opor-
tet igitur cum alijs, tunc praecipue maciei corporis oc-

Lib. 6.

1 o ccurrere: quod commodè fiet, si uel calidis admotis ma-
teriam ad membrum perfractum euocemus, uel ali-
mentū copiosius subministremus, & balnea, reliquaq;
animi uoluptates adhibeamus. Porro eorum quae iam
callo firman-
tur, indicio esse cum alia tum illud prae-
cipue potest, si fasciole cruentae conspiciuntur, nullo etiā
in parte oborto uulnere. Quod ideo forsitan accidit,
quoniam calli substantia, dum coit, in osium cauerno-
sos meatus perumpens, sanguinis guttas aliquot inde
extundit, exprimitq;. Ac de transuersis quidem fra-
2 o cturis, haec dicta sufficiant. De longis uerò, quae non
tam crebro contingunt, reliqua omnia ad eundem se
habent modum. Ceterum comprimendae haec magis (Ga-
leno autore) in ipso fracturae loco sunt, tum quod recesa-
sit, retrudendum introrsus est. Ac de fractis quidem
osibus haecenus in uniuersum dictum sit.


*Note osiū per-
fracti callo fir-
mari impieciū.*

Lib. 6. memb.

FINIS, QVARTI LIBRI.

LL. 4. Formula

Formula Glossocomi, instrumenti ad gignendum callum in fracturis idonei, cuius pluribus in locis meminit Galenus.



A, Axis. B, Laqueus translatus. C, Laqueus in rectum procedens. D, Trochleæ, seu rotulæ. E, Tabella. F, fractura. Vide huius machinæ seu instrumenti descriptionem, apud Galenū libro de usu partium. v. 11. & lib. v. 1. de morbis curandis. Item in cōmētarijs eiusdem, in librum secundū Hippocratis de fracturis.

V. dil. luxu. l. ubi. d. articulo. 533
GENERALIS DIVISIO
LUXATIONVM, IN LIBRVM

QVINTVM CHIRVRGICARVM

Institutionum Ioan. Ta-

gaultij Medici.

10 Luxatio, Græcis exarthrema, ossis è sua se-
de dimotio.

Simplex. Nulli alteri affectui coniuncta.

Composita. Alteri præter naturam dispositio-
ni complicata.

Luxatio tam simplex quàm composita,

Perfecta, siue absoluta, aut completa.

Imperfecta, siue non absoluta.

Completa luxatio, siue absoluta,

Cùm os suo loco omninò excidit,

20 Generis nomen retinet, diciturq; absolute Luxa-
tio Romanis, & exarthrema Græcis.

Luxatio imperfecta, siue incompleta,

Cùm os, non in totum, sed aliquatenus duntaxat
suo naturali posita dimotum est, diciturq; sublu-
xatio Latinis, pararthrema Græcis.

Subluxatio, seu imperfecta luxatio,

Peruersio, siue distortio.

Laxatio, seu e longatio ligamenti.

Peruersio ossis, quæ spinæ uertebri maxime
30 est peculiaris.

Lordofis, } priorem partem.
Cyphofis, } in } posteriorem partem.
Scoliofis, } latera.

Compofitæ luxationum differentia, poſte-
rioris ſeculi chirurgis.

*Hæ præprie dif-
ferentiæ nō ſunt,
ſed complicati
affectus.*

Luxatio cum } fractura.
} inflammatione.
} uulnere.
} dolore.
} duritie.

INSTITVTIONVM

CHIRVrgICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER QVINTVS,

De luxatis ossibus in uniuersum.

Quid luxatio, quæ sint luxationum
differentiæ, & quot modis ossa
luxentur. Cap. I.



VVM LVXATIONES

fracturis proximæ sint. consequens
est, ut de ijs generatim, (quemadmo-
dum & de alijs supra, in quatuor
libris superioribus, commemoratis

affectionibus, fecimus) nunc sermonem faciamus. Luxatio
igitur, ut formula quadam definiatur, est articuli è na-
tuo positi, seu proprio (quod dicitur) acetabulo, in alie-
nam atque insolitam sedem prolapsus, quo motus a bi-
trarius impeditur: Græci exarthrema uocant. Huius
autem (ut Paulus inquit) nullæ aliæ differentiæ habentur,
præter eam quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur.
Quum enim articulus sua sede in totum excussus
deciderit, communi generis uocabulo Græcis exarthrema,
Latinis luxatio dicitur. Si autem è compagibus suis paululum
duntaxat emotus est, aut usque ad sinus seu cavitatis
supercilium (nonnulli marginem uocant) prolapsus, nobis
subluxatio, Græca uerò consuetudine pararthrema
nominatur. Sub qua sanè differē-

Luxatio quid.

Exarthrema.

Pararthrema.

LL iij tia, &

Cap. 11. lib. 8.

Quæ ossa inter
se debiscant.Quæ ossa pro-
priè luxentur.Affectus cum
luxatione com-
plicati.

tia, & laxationem seu ut uulgares chirurgi Auicenna interpretem secuti loquuntur, elongationem ligamenti comprehendimus, sicuti & distortionem, ac peruer-
siones cum pluribus ossibus, tum uerò maxime spinæ
uertebris familiares. Ossa duobus modis potissimum
suis sedibus Celsò mouentur. Nam modò quæ iuncta
sunt inter se duntaxat (inquit) dehiscunt, (ut cum latum
scapularum os ab humero recedit, & in brachio ra-
dius à cubito, & in crure tibia à sura, atque etià inter
dum à saltu, calcis os à talo, quod rarò tamen fit) modò
uerò suis acetabulis ex toto prolabantur, hoc est, suis
omnino sedibus excidunt. Vertebrae nanquæ & arti-
culi propemodum omnes, tametsi ualidis neruis ac li-
gamentis comprehendantur, sæpius tamen suis sedibus
elapsi decidunt, aut ui scilicet expulsi, aut aliquo casu
nerueis ligamentis uel ruptis uel infirmatis: faciliusq;
in pueris & adolescentulis, quàm in robustioribus.
Itaque modus hic posterior, exarthrema: prior uerò,
quo tantum ossa dehiscunt, & suis ex toto sinibus haud
quaquam prolabantur, pararthrema non immeritò ap-
pellabitur. Atque hæc sunt luxationum discrimina seu
differentiæ. Præter has tamen aliquot adhuc alias po-
sterioris ætatis chirurgi statuerunt, quæ re uera diffe-
rentiæ non sunt, sed potius quedam ueluti præter na-
turam dispositiones, cum luxatione complicatæ: ut cum
ipsi luxationi accedit inflammatio, aut fractura, aut uul-
nus, aut dolor aliquis ingens, aut tephacea quedam
durities. Hæc enim, dolor inquam, fractura, durities,
uulnus, & inflammatio, cum seorsum & per se subsi-
stere possint, nullius unquam alterius (si saltem Gale-
no credimus) differentiam constituent. Si quis tamen
proteruè

proteruè contendat differentias esse, cum eo certamen inire recusamus: quandoquidem hæc curandæ luxationis rationem & peruertunt, & non paruum aliquando interturbant. Ac de his quidem in sequentibus suo loco dicemus. Ceterum modis quatuor potissimum, quod ad situs differentias attinet, contingit ossa luxari aut perueri, seu aliquatenus detorqueri: in partem nimirum priorem seu anteriorem, posteriorem, interiorem, & exteriorem. Alij superiorē & inferiorē ad-

Modi luxationum à situs differētia sumpti.

1^o dunt. Quædam autem in omnes quatuor partes, quædam in certas promouentur. Sed præstat singulorum exempla subijcere. Maxilla superior, cum non in homine solum, sed & in omni animante, præterquam in crocodilo, immobilis existat, luxatione non periclitatur: inferior uerò subinde oris hiatu in anteriore partem luxatur, alternatur ue ac peruertitur, hoc est, aliqua ex parte distorquetur, et ex naturali situ in alterū repente transmutatur, quod uerbo *ἑκστασις* expressit Hippocra. Sed modò altera parte, modò utraque: toto

Maxilla inferior, qui luxet.

2^o autem loco non admodum excidit, ut idem annotauit Hippocrates: quippe quòd capita, id est, extrema, qui & processus appellantur, habeat in superiori maxilla, firmiter ac tutò cardinis modo infixæ, ex quibus nervosi tendones, ualidis annexi musculis exoriuntur. Itaque hanc nunquam luxari contingit, nisi quammaxima oris apertio fiat: ut cum uel maximam rei aliquius molem ore excipere quispiam conatur, uel cum oscitando quamaximè potest, os diducit, & in alteram partem os traducit: quorum primum rarò contingit, secundum (inquit Galenus) euentre dementibus tantum potest. Capitis processus, in duos sinus summæ uertere

Capitis luxatio.

vertebræ dimissi, in omnes partes prolabuntur: sed dum in partem posteriorem excidunt, mentum pectori agglutinatur, æger neque bibere, neque loqui potest: atque illi celerrimè mors superuenit. Vertebrae in spina, & in posteriorem partem & in priorem, tam supra septum transversum, quàm infra subinde peruertuntur, ac nonnunquàm etiam ex toto prolabuntur. Sed cum toto loco mutatae sunt, nulla restitutionis spes relinquitur, præcipitemq; etiam mortè inferunt: nam intra triduum (ut Celsus ait) homo moritur. Clavicula (quam soli homini inter cetera animantia concessam esse Paulus existimauit) nunquàm in totum excidit: quippe quæ pectori ita committatur et inhereat, ut ne moueri quidem in ipso possit. Interdum tamen ex uolenta quadam extrinsecus facta percussione, paululum auellitur. Sed neque altero fine, qui humeri articulo inseritur, excidere admodum potest: nam & à bicipiti musculo, & summo humero prohibetur. Brachij seu humeri caput, quod in sinum omoplate seu scapulae demittitur, modò ad ima in alam decidit, idq; frequenter, sed in ijs maxime qui non multa carne præditi sunt: modò (licet rarò) in priorem & anteriorem. In superiore uerò serè nunquàm promouetur, ut quod ab utroq; scapularum processu, & eo scilicet qui anchoræ similis est, & eo quod acromion Græci uocant, impediatur. Genu in tres partes excidit, anteriorem nimirum, posteriorem, & posteriorem iuxta popliteum. In priorem prolabi opposita patella prohibetur. Meges tamen cum cui in priorem partem excidisset, à se (ut Celsus refert) curatum esse memoriæ prodidit. Cubitus, manus, & femur, in omnes quatuor partes pro-

Vertebrarum
spinae luxatio.

Clavicula quæ
uolunt.

Brachij caput.

Genu in tres
partes luxatur.

Cubitus, manus

10

20

30

tes prolabantur, nempe in interiorem, anteriorem, & posteriorem. Atque hæc pro exemplis adducta sint. Nunc ad communem de luxatis ossibus tractationem reuertamur, & iuxta morem à nobis hætenus obseruatum, causas, signa, prognostica, & curationem luxationum in uniuersum persequamur.

nus, & femur, in quatuor partes prolabitur.

De causis & signis luxationis ossium
in uniuersum. Cap. II.



AVSAR luxatorum ossium, & à sua sede motorum, quedam sunt extrinsecus ingruentes, ut casus, percussio, & uiolenta atque incongrua membri alicuius extensio, aut distorsio, seu peruersio. Quedam uero intrinsecus eueniunt, atque ideo internæ dicuntur, sicuti & superiores externæ: ut cum mucosus aliquis humor & pituitosus, in articulis seu iuncturis acervatur, qui articulationis ipsius ligamenta primū madefacit, deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinē, sua sede os ipsum protrudit. Signa luxationum, quedam sunt omnium communia, quedam uero propria cuiusque. Ac de communibus duntaxat hic agemus. Hæc autem factionis Arabicæ principi Auicennæ, à tribus potissimum desumuntur: nempe uel à substantialiter (ut loquuntur) inherentes, hoc est, ab ijs quæ secundum essentie rationem insunt: ut à mala partis ipsius laborantis constitutione seu cōpositione, in qua & tumor præternaturam ea parte qua os prorumpit, & sinus seu cavitatis insolita ea à qua recessit, manifestò apparent. Vel ab ijs, quæ ex necessitate consequuntur, casus & acciden-

Cause externæ.

Cause internæ.

Signa luxationum omnium communia, à tribus potissimum desumuntur.

tia uocant) ut à dolore, qui ex luxatione contrahitur. Vel ab actione læsa, seu operationibus etiam ex necessitate consequentibus, ut à motus afflictæ partis difficultate, aut priuatione. Hæ itaque notæ in luxatis omnibus deprehenduntur, aliæ uerò in singulis.

De prognosticis, seu iudicijs luxationum. Cap. III.

CONSEQUENS est, ut communia quædam de luxationibus iudicia, quæ & prognostica uocant, hoc loco subiiciamus. Primum prognosticum ex Auicennæ & aliorum quorundam scriptis erutum, ad hunc modum habet: Quibus luxationibus inflammatio, aut uulnus, aut dolor ingens & acris accedit, hæ præterquam quòd curatu admodum difficiles sunt, periculo quoque non uacant. Adeò ut aliquoties in ijs casibus tutum non sit, luxatæ particule reductionem aggredi, sed sic eam remanere (ne pro læsione mors sequatur) melius esse censent. Aliud: Vexatæ omnes luxationes, & quæ spatio temporis iam callo obduruerunt, uel difficillimè uel nunquam consanescunt. Proinde statim, si fieri potest, reponi luxata debent. Luxatio, in qua (inquit Guido) franguntur margines osium, hoc est, sinus seu cavitatis supercilia, pessima iudicatur. Repulsi enim in suum positum articuli, inibi diu persistere non possunt: sed leuissima quaque occasione iterum relabuntur. Articuli qui nervorum ac ligamentorum uitio prolapsi sunt, & postea in suas sedes compulsi, iterum excidunt. Indicium euidentis ossis in suam naturalem sedem reducti, est, cū ue-

cū ueluti strepitus aliquis auditus est, dum in natium suum acetabulum ingrediebatur: & membri nuper luxati figura, & conformatio, suæ ipsius aut alterius partis figuræ, quàm simillima tum uisu tum attactu deprehenditur. Cæterum si reposito osse nervi distendantur, rursus id protinus (ut consulit Celsus) expellendum est: nā ut excidere omnes articuli nō possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim si in partem (ut supra diximus) posteriorem aliquando prolabitur, nunquā in suos sinus compellitur, sed mortem statim adfert ineuitabilem. Sic neque in spina uertebra, cū toto loco mutata sunt: neque etiam maxilla, quæ utraque parte prolapsa est, & antequā reposita sit, inflammationem concitauit, ut Celsus memoriæ prodidit. Ossa, quæ suis sedibus mouentur, alia alijs facilius, alia difficilius & excidunt & reponuntur: nempe pro ratione & natura iuncturæ unde propelluntur. Itaque genu ut faciliè prolabitur, sic non magno impendio in suam rursus sedem compellitur. Digtorum luxatio nullum etiam facessit negocium. Cubitus uero, ut tardius quidem ac difficilius excidit, ita prolapsus negocij plurimum exhibet: ægerrimè enim propter tuberculorum seu eminentiarum, sinuumq; frequentiam reponitur. *Humerus,* Humerus autem ut neque difficulter admodum, præsertim in macilentis, elabitur, sic nec difficillimè in sedem suā reponitur. Et ita de alijs. Multum quoque eò confert (ut Celsus inquit) & corporis, & neruorum, hoc est, tendinum, habitus. Nam si *Neruorum nomine apud Celsum ligamēta intelliguntur.* corpus tenue ac macilentum, si humidum est, si nervi & ligamenta infirma, expeditius os reponitur. Sed & primò facilius excidit, & postea minus fideliter continetur.

continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent,
sed id quod expulsus, est difficulter admittunt. Qui-
bus in pueritia articuli exciderunt, neque repositi
sunt, minus quàm ceteri crescunt. Quæ loco suo non
sunt, caro ea increfcit, magisq; in proximo membro,
quàm in ulteriore. Vtputa si humerus loco suo nō est,
maior in eo ipso fit, quàm in brachio, & in hoc (bra-
chio inquam) maior quoque, quàm in manus acie. Tum
pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior
aut minor usus eius membri relinquitur: quoq; in
eo plus usus superest, eò minus id extenuatur. Inter
luxatorum eiusmodi prognostica, numerantur & duo
hi sequentes Hippocratis aphorismi: Quibuscunque
à coxendicum dolore molestatis, excidit coxa, & rur-
sus incidit, ijs mucres superueniunt. Quibuscunque
à coxendicum dolore molestatis diuturno excidit co-
xa, ijs crus tabescit, & claudicant. si non urantur. Hos
autem nunc sic coniunctim legimus & interpretamur:
Quibuscunque à diuturno coxendicum dolore consti-
tatis, propter mucoris seu mucosi humoris ac pitui-
tosi copiam, in articulo siue iunctura coxæ coacerua-
tam, τὸ ἰσχίον, id est, coxa ipsa, (hoc est, femoris cae-
put, quod in coxæ siue ossis ischij cauo inseritur) suo
naturali acetabulo propulsa excidit, & rursum inci-
dit, (id est, in nativam suam sedem iterum spontè resi-
lit, aut aliter repulsa est: inibi tamen diu persistere
non potest sed soluta compage lubrica continenter re-
labitur) ijs processu tēporis crus (quod Græcis σκέλος
dicitur, hoc est, totum membrū, tam tibia scilicet quàm
femur) necessariò alimonix penuria cōtabescit, & ari-
ditate conficitur, omnesq; in claudicationē euadunt, si

Ex Hippoc. &
Celfo.

Alior. 49. &
50. lib. 6.

Interpretatio
duorū aphorif-
morum Hippoc.

non urantur, hoc est, nisi prius ferramenti igne candentibus urendo, & mucus ille qui ossis ischij sinu occupat, absumatur, & laxitas cutis, ad quam femoris caput subinde lubricum procidebat, contrahatur.

De ratione curandi luxata in uniuersum.

Cap. IIII.



QUUM luxata suo nativo positu, in alienam atque (ut supra retulimus) insolitam sedem prolapsa sint, una nimirum communis omnium luxationum curandi indicatio erit: nempe luxati articuli & suo loco moti, in propriam ac naturalem sedem reductio. Porro, ut scopum hunc primum & uniuersalem assequaris, luxatum membrum in diuersas partes decenter extendendum est, donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod suo loco excidit, ab ea parte in quam prolapsum est, in contraria impellere oportet, atque ita in germanum suum acetabulum restituere, ut sinus seu cauitatis insolita uacuitas impleatur. Hæc autem leniter, & sine dolore, quatenus fieri licet, agenda sunt. Ceterum non una eademque in omnibus extendendi ratio est, sed alia atque alia, pro natura scilicet partis luxatæ, proutque nerui ac tendines ualent, aut ossa huc illuc ue sederunt. Modò enim manibus solis, modò habenis iniectis utendum est, modò uerò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, ut ex uno Hippocrate lecto, libro de luxatis & fractis, discere poteris. Ab ijs secundum, quò tendes, fuerit, ut membrum quod exciderat, & iam repositum est, non amplius deinceps sua sede prolabatur, sed inibi con-

Secundus scopus.

bi con-

bi continenter persistat. Repositi igitur articuli, iun-
 ctura modis omnibus statim firmanda ac roboranda
 est. Firmabitur autem optime, si rosacco perlinatur, ac
 postea pannus aliquis lineus gracilis, uetus, & le-
 nis rhodino delibutus, ipsi applicetur: deinde si stu-
 pæ lenes ac panni multiplices, ouorum candido per-
 fusi superaccommodentur: & postremo si fascijs po-
 sca madentibus, pro ratione particulae longis latisq; su-
 bligetur. Quinetiam ferulae ex corio aut densa papy-
 ro factae, si necessitas uocet, circumdandae sunt. Cauen- 10
 da autem semper est uehementior perstrictio, ne in-
 flammationem moueat. Iis ita rite apparatis, membrum
 in figura ei maxime naturali, atque à dolore alienissi-
 ma, ad quietem reponendum est. Nec uero ante diem
 septimum, aut etiam decimum, si nullum symptoma
 prauum accesserit, ipsum resolvere oportet, aut alijs
 adhibitis medicamentis curare, sed ita sinere. Porro
 nihil noxae attuleris, si dum legitimo tempore resolu-
 tur, & secundo curatur, aqua modice calida foueris.
 Hic enim fons gemina tunc ratione prodest. Nam & 20
 dolorem (si quis sit) demulcet, & quod in laborante par-
 ticula noxium conceptum est, digerit. Vbi autem sic
 ut res exigit luxationem membrum foueris, mox huic em-
 plastrum adhibebis, quod constet polline, id est, farina
 uolatili, puluere rubro communiter appellato, & albo
 oui in unum corpus redactis. Post hæc uero membrum
 strictius obligandum erit, ut Razes medicus Arabs
 percelebris consuluit. Ad eundem quoque modum, ue-
 tus omnis luxatio, & quæ spatio temporis callo iam
 obduruuit, non modo fons eiusmodi aquæ simplicis ca- 30
 lida (qui in hac re plurimum cofert) antequam redu-
 catur,

- catur, desiderat: sed etiam & eum, qui sit ex decocto
maluæ, althææ, fœnigræci, atque id genus aliorum po-
stulat: quippe qui molliat, laxet, discutiat, & mem-
brum aptius extensioni efficiat. Recentes uerò adhuc
luxationes, et quæ nuper inciderunt, eius naturæ solus
tanquàm sibi non parum incommodantes auersantur
& respuunt. Hi enim calfaciendo ac humectando rela-
xant & dissoluunt: unde pars ipsa afflicta imbecillior
redditur, & ad recipiendam fluxionem promior. Proin-
- 10 de & inflammationi opportuna efficitur, & luxati si-
nus superflua humiditate oppletur. Inde consequitur,
ut articulus in nativo suo acetabulo diu persistere nō
possit, sed lubricus ac subterfugiens delabatur. Vetat
etiam Auicennas pannos impensè calidos membro re-
center luxato admoueri, ne fluxionē etiam euocent, &
inflātionē eo loci excitent. Quin potius eos cerato
(inquit) refrigeratorio, aut uino aliquo austero imbu-
tos adhibere conuenit. Ceterum luxato, ita ut dictū Tertius sco-
pus.
est, in suam sedem reducto, firmatoq; , & ad quietem
- 20 conueniente schemate seu figura reposito, ipsum à do-
lore, & inflammatione uindicandum est, qui tertius
est scopus in curandis luxatis medenti propositus. Hūc
igitur si consequi studueris, humorum in partem affe-
ctam influxum modis omnibus prohibeto. Si enim flu-
xione tentetur, & dolorem statim persentiscet, & in-
flammationem experietur: quæ duo incommoda in lu-
xatis & fractis maximè uitanda sunt. Hæc autem de-
uitabis, si quæ roborant & repellunt, parti luxatæ, ut
paulò antè docuimus, apposueris: si præterea tenuem
- 30 ab initio probamq; uicissitudinem ægro imperaueris,

illiq; uenam, si nihil prohibeat, iuxta periti alicuius
 medici præscriptum secueris: & uentrem, si opus est,
 purgante medicamento subduxeris. Vtroque enim au-
 xilij genere (purgatione inquam & sanguinis missio-
 ne) fluxionem (si commodè adhibentur) à laborante
 particula auertimus. Verum enimuero si antè quàm
 ad curationem uoceris, luxata pars iam dolore infeste-
 tur, aut inflammatione occupetur, non priùs eam in lo-
 cum suum à quo excidit reponere tentabis, quàm dolor
 finitus fuerit, & inflammatio conquieuerit. Si enim
 membrum sic dolore, aut inflammatione affectum di-
 stendendo lacessiueris, periculum est ne conuulsio, uel
 neruorum distentio, aut aliud prauum id genus sym-
 ptoma suscitetur. Hoc præceptum in luxatis omnibus
 diligenter, curiosèq; obseruandum, à Cornelio Celso
 ex Hippocratis sententia, non minus doctè quàm elegã-
 ter, his uerbis traditum est: Quicquid loco suo (inquit)
 motum est, ante inflammationem reponendum est. Si il-
 la iam occupauit, dum conquiescat, baud quaquàm la-
 cessendum est. Vbi finita est, tentandum est in his mē-
 bris quæ id patiuntur. Oportet autem inflammatio-
 nem ipsam atque dolorē leuare succida lana ex hydre-
 læo, id est, aqua & oleo moderatè calido, aceti-
 mento superimposita. Si uerò etiam febris accessit, &
 ossa quæ suo loco mota sunt, ualidisq; plenisq; musculis
 & tendonibus contineantur, curiosius omnia faciendã
 sunt sed maxime quæ ad uictus rationem, uenæ sectio-
 nem, & purgationem attinent. Cæterum sedato dolo-
 re, & finita omninò inflāmatione, pleniore uictu (sicu-
 ti & de fracturis dictum est) laborans refici potest, ci-
 bisq;

Quartus sco-
 pus, qui est ac-
 cidentium cor-
 rectio.

Cap. 11. lib. 2.

- 90 -

Locus hic corru-
 ptus est apud
 Cel. quem ita re-
 stituendum pu-
 tamus.

2

1

30

bisq; uti bonis, ut uino modicè. Ac sub finem quidem curationis, si è sententia res cesserit, luxatum ipsum roborabis perfusione aquæ decoctionis rosarum, absinthij, & musci albi quercini. Peracto fotu, Guido à Cailiaco iubet superponendum esse spanadrapum, quod uocant, aut oxycroceum. Sed iamq; ad usus quoque suos, id membrum sensim ac suauiter promouere oportet. Motus enim ut in dolore atque inflammatione noxius ac (ut ita dicam) pestifer, sic aliàs, luxato præsertim iam obfirmato, saluberrimus corpori est. Si luxatis ossibus uulnus quoque accessit, multa diligentia ac etiam prudentia est opus. Dum enim hæc reponuntur, ingens periculum, nonnunquam & mortem etiam maturam inferunt. Nam cum ex distensione adiacentes nerui & musculi inflammantur, dolores ualidi, conuulsiones, & febres acutæ oboriuntur, atque hoc præsertim in cubiti gibbero, genu, superioribusq; articulis etiam magis. Quantò enim principalibus membris, luxati cum uulnere articuli, uiciniores sunt: tantò maior timor est. Sed eò quoque grauius periculum concitatur, quò maius membrum est, quò ue ualidioribus neruis, aut musculis continetur: idcoq; humeris femoribusq; metus mortis est. Ac si reposita ossa sunt, spes (inquit Celsus) nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in utroque timor est, quò propius uulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates horum repositionem, ualentioresq; deligaturam omninò auersatur, solisq; inflammationem abigentibus, & mitigantibus præstidij, per initia uti iubet: sic enim (inquit) ipsis superesse licebit. Itaq; nihil tu-

Lib. de luxato-
rū fracturum ue
ossium coapta-
tione.

tò reponi posse præter digitos, & plantas, & manus, dixit: atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipient. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet, nisi ante inflammationem, aut postea cum iam uetus res est. Cæterum quod ipse in solis digitis faciendum consulit, id nos in reliquis quoque articulis facere aggrediemur, ac statim quidē inter initia, dū pars adhuc inflammatione uacat, prolapsum cum uulnere articulum mediocri intensione (ualidam enim citra periculum perferre non potest) reponere tentabimus. Quod si iuxta animi institutum euenerit, in sola ratione, quæ inflammationem arcet, persistemus. Si uerò inflammatio aliqua, aut conuulsio, aut quidpiam ex supradictis, reposito osse acciderit, rursus id (si modò sine ullo ui potest) suo loco protinus expellendum est. At si hoc quoque discrimen, seu periculum metuamus, (non enim inflammatus articulus sine ui fortasse cedit, & sua sede iterum propelletur) satius fuerit per initia in maioribus quidem membris, ut femoribus & humeris, super sedere, & repositionem differre. Vbi uerò inflammatio conquieuerit, (id autem fit communiter post septimum nonnun'ue diem) præfati etiam periculum apud necessarios ægrotantis, quod ex repositione futurum sit, tum quòd si non reponatur, debilem ea parte hominē, & claudum mancum'ue prorsus fore, conabimur tuto, & sine ulla uiolentia, os in suam sedem compellere. Porro ulceris curationē eandem quæ proposita est in fracturis cum ulcere, administrabimus. Omne autem membrum, quod cum uulnere loco motum, neque repo-
situm

fitum est, sic (si Celso & Hippocrati credimus) iacere conuenit, ut maximè cubantem iuuat: tantum ne moueatur, ne ue dependeat. Si luxatio cum fractura, sine ulcere tamen, euenerit, communi ratione membrum extendendum est, ac manibus conformandum, ut in simplicibus fracturis superiore libro docuimus. Si uerò etiam ulcus accedit, rursus ab ijs quæ de fracturis cum ulcere, & luxationibus etiam cum exulceratione incidentibus priuatim à nobis dicta sunt, congrua repeten-

Si luxatio cum fractura euenerit.

- 10 da curatio est. Cæterum, ut uerbo uno dicamus, si cum fractura luxatio incidit, hæc primum, si fieri possit, illa uerò secundò curanda erit. At si ante fracturæ administrationem luxatum commodè reduci non possit, fracturam ipsam primum curabimus, deinde cum fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis curationem aggrediemur. Quòd si luxatio inueterauerit, & ob temporis spatium, callosa inibi durities contracta fuerit, ea decocto maluæ & altheæ (quam officinæ bismal-uam appellant) perfundenda est, deinde unguento di-
- 20 altbea uulgò nuncupato, collinenda: post hæc, em-plastrum quod Diachylon magnum nominatur, super apponendum erit, uel eius loco, lana succida uiscillagine quapiam emolliente delibuta. Ad hoc etiam efficax habetur, cortex radicis maluanisci, hoc est altheæ, in aqua decoctus, & cum axungia, uel anserino pingui subactus, ut quasi malagmatis lentor contrahatur. Itaque loco sub his sufficienter emollito, luxatum in suâ sedem dandum est.



A Os coronale, quod & os frontis appellatur.

B Clavicula, & ossa furcula.

C ἀνωτέρω processus superior omoplate.

D Caput brachij, seu pars humeri superior.

E Os pectoris, quod ἑπὶ πρὸν Græci vocant, constat in ossibus septem, excipientibus septem ueras costas, quæ superiores sunt & perfectæ: inferiores uerò, quæ numero sunt quinque, nothe, imperfectæ, & mendose dicuntur.

F Chartilago fini sterni adhaerescens, ab ensis similitudine dicta Græcis ἑπὶ στήνης, hoc est, ensiformis, uulgo malum punicum seu granatum appellat.

G Brachium, seu humerus, & os adintorij Guidoni, omnium ossium (femore excepto) maximum.

H Collum brachij.

I Humeri orbita trochleis similis.

K Os inferius & longius cubiti, quod Latinis ulna, & nomine totius cubitus dicitur, Guidoni & uulgo focile maius, Græcis πῆγξ: minime occurrit digito, estq; uerectum, ut superius obliquum.

L Os superius cubiti (latius sumpto nomine) quod Latinis radius, & focile minus Guidoni, Græcis uerò ὑπερὶ πῆγξ uocatur: occurrit pollicis,

N Καρπὸς Græcè, Latine brachiale, & rasceta Arabicè, constat ossibus octo duris & exiguis, si os quod ad pollicem pertinet, non numeraueris.

O Μετακάρπιον id est, postbrachiale, & pecten, constat tantum ossibus quatuor Galeno, à sese distantibus, palman inter digitos ad carpum explentibus.

P Ossa digitorum; quæ numero sunt 15. nempe tria singulis.

Q Patella & rotula genu, græcè nonnullis μύλα, id est, mola, alijs ἐπιγονάτις, quasi supra genu, os cartilagineum nulli alteri conserutum.

R Os baliste uulgo, Latinis talus, ἀσπράδος Græcis.

S Os σκαφοειδές, hoc est, nauiforme, sua cavitare naui simile, unde nomen sumpsit, circumambit caput astragali.

T Ossa tarfi, & rasceta 4. carpo respondent.

V Ossa pectinis, seu pedij ac plantæ 7. figura tereti & oblonga metacarpio respondent.

X Ossa digitorum pedis, quæ numero sunt quatuordecim. In singulis digitis præter pollicem terna.



B Sutura lambdoeides, posterior in occipitio: anterior, quæ in sincipite est, στεφανιαία, id est, coronalis dicitur. Vide in prima figura.

C Sutura ὀβελιαία dicta, quæ recta, et sagittalis uulgò appellatur.

E Scapularum ossa duo, pone pectus sita, lata, figura triquetra, Græcis ὀμοπλάτου, Latinis scapula operta, uulgò spathulæ. Nulli alteri ossi committuntur.

10 G Collum omoplatæ.

H Os sacrum, ἱερόν Græcè, amplum seu latum quibusdam appellatum, finis spinæ dorsti.

K Os femoris, quos brachio seu humero, hoc est, ossi adiutorij respondet, Græcè ὑπὸς dicitur.

L Caput femoris.

M Collum femoris.

N Throchanter.

P Tubercula duo ossis femoris.

20

D I S T I C H O N O S S I V M
N U M E R V M C O M P L E C T E N S.

Adde quater denis, bis centū senaꝑ, habebis
Quàm sis multiplici conditus osse, semel.

Ossa fiunt è semine, cum id quod est crassissimum,
à calido urente induratur, sicut lapides coquuntur à
calido urente. Sunt autem ossa ueluti truncus susti-
30 nens reliquum corpus.



- A Ossa βρεγματός, id est, sincipitis 2. uulgo parietalia appellantur.
- B Ossa λιθοειδῆ, id est, lapidosa uel petrosa 2.
- C Os frontis 1. quod & coronale uocant.
- D Os occipitis 1. densissimum & firmissimum.
- E Ζυγωμα, uel os ζυγοειδές, id est, iugale, & paribus uulgo, superiorem maxillam capiti coniungit.
- F Os σφαιροειδές, cunei forme, basilare, aliquando à multiplici forma τριφυλοειδές, colatorij, cauilla.
- 10 G Maxilla inferior: hæc in maximis oris hiationibus interdum à sua sede distorquetur.
- H Processus duo maxillæ inferioris.
- K ὀλέκρانون, seu cubiti tuber, superior ulnæ processus grandior: Hippocr. ἀγκῶνα nominauit.
- L Ossa ualidissima quæ ossi sacro cōmittuntur, Arabice gaf herua dicta.
- M Os ilium, & anche, pars superior ossis coxæ.
- N Ισχίον, seu os ischij, quod recipit femoris caput. Pixis coxæ dicta.
- 20 O Os pubis & pectinis, pars est anterior ossis coxæ ad pudenda.
- Q Os maius tibiæ, quod & tibia nomine totius appellatur, & crus: ulnæ seu cubito respondet, κνήμη Græcis nominatur.
- R Περόνη seu fibula, & os suræ: os minus tibiæ radio cubiti, quod facile minus appellant, consimile.
- S Malleolus externus, ima pars fibulæ.
- T Malleolus internus, pars infima cruris seu tibiæ.
- 30 V Os calcis, seu calcaneus, Græcè πτέρνη ossium pedis maximum.

INSTITVTIONVM

CHIRVRGICARVM IACOBI

HOLLERII STEMPANI,

LIBER SEXTVS DE

Materia Chirurgica,

PREFATIO.

Interpretes ma-
teria chirurgi-
cum.



DE MATERIA REMEDIO-
rum, quæ ad chirurgum pertinent, 10
plurima quidem Hippocrates, Gale-
nus, & ante hunc Anazarbeus Dio-
scorides memorie tradiderunt. Quæ

Laus aliqua Ara-
bum et postero-
rum.

dam posteritas addidit non fraudanda laude: sua enim
ueterum, sua posteriorum gloria est. Atque iniquum decreti
genus est, quod omnem fructum laudis & gloriæ huius di-
scipline uni Græciæ detulit, ut Arabum ac posteritatis
studia perpetuis tenebris opprimantur. Illaudato solo
laudatæ fruges sæpenumerò proferunt. Vixerunt
Græci in media luce literarum. Extiterunt Arabes, & 10
inde ductæ familiæ, iam desertis ac sepulcris melioribus
disciplinis, digna tamen luce, æternamque memoria nobis
reliquerunt. E uiuis fontibus Græcorum remedia pri-
mum petenda sunt: sed ita, ut nec Arabum riuos, nec
posteritatis ingenia contemnamus. In his hauriendum
quod saluum & incolume: repudiandum, quicquid se-
cerit coenum, & discipline ueterum male conuenerit.

Vnde petenda
materia.

Natura fertili-
tas in materia
chirurgorum.

Atque cunctis hac parte perlustranda nobis naturæ
fertilitas, à qua omnis ubertas, & quasi sylua reme-
diorum ducta primum est. Nusquam natura magis lu- 30
xuriat, nulla in re pariter atque his chirurgiæ opibus
ambi-

ambitiosa est. In quibus tam prolixè numen suum explicat, ut Pronceâ illa non tam Epicurea, quod quidam ait, quàm chirurgos fuisse uideatur. Plurima quidem ad uoluptatem & delicias hominis: omnia uerò ad salutem eius & conseruationem chirurgus comparauit. Nam quæcunque tota rerum facie exposita, quæcunque cauernis terræ ac uisceribus latent, quicquid est aquarum, stirpium, animalium, terra, ignis, maria, chirurgi inserviunt. In facie rerum & excrementis, in

Pronceâ chirurgos potius quàm epicurea.

- 1^o carie, in rebus minimis, obsoletis ac propè nullis, remedia condita sunt. In re una multiplex natura uario genere remediorum foeta est. In apicula quàm uariè lussit: quàm multas diuitias chirurgus condidit: mella, ceram, metyn, sandaracham, fauos, propolim, quicquid denique locuples illa alueorum Respublica continet. Quin & apes ipsas ad auxilia transtulit. Et in homine multa sunt, quæ prosunt homini, ut quocunque antimum aduertas, quocunque oculos conijcias, remediorum turba sese offerat. In quo summopere probanda est maiorum diligentia, multoq; magis imitanda studia, qui in ea uastitate rerum nihil intentatum, nihil inexpertum reliquerunt. Omnia elaborata, & summo iure existimata, literis consignarunt, quibus iam perfrui datum est, alienis scilicet bonis. Primum ergo consuetudine, natura, & maiorum historia, infinita nobis materia comparata est, quæ iam deserta ac suppressa iacet, quia neglecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta: satis pyxidicula: hic uno atque altero remedio contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec ulli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia, quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri elementa sordent,

Taxantur nostri homines.

Argumentum li
bri explicatur.

Antidotarium.

sordent, & quicquid elementare est. Hinc noua elemen-
torum soboles, hinc æther & cœlum ipsum ad reme-
dia exprimenda sunt. Vernaculæ sunt nobis atque do-
mesticæ, naturæ opes, quibus uulnera coniungas, repur-
ges sordida, sinus impleas & cicatrice tegas, cate-
ræq; præfices omnia, quæ chirurgi opere continentur.
Verum suis cuique studijs frui liceat. Nos ex immensa,
omnibusq; exposita naturæ sylua, & maiorum histo-
ria, quæ iam publica uel multorum fide consent, reme-
dia transferemus, exhibebimusq; rudimentum operis, 10
suis quidem lineis descriptum, quod alijs impleat, in-
formet, suis denique numeris absoluat. Nos speciem
aliquam & formam argumenti adumbrabimus, secuti
Cosmographos, qui totius orbis ambitum angusta
tabula contrahunt. Idem enim condonandum nobis,
cùm non alios fines imperij, alios materiæ, de qua præ-
sens instituta oratio, natura posuerit. Genera quædam
rerum & præcepta artis primum explicabimus, uten-
di methodum, & leges aliquas inslituemus, ex quo cen-
sebitur particularis materia, & formulæ describentur, 20
quas partim ars ipsa reperit, partim optimorum me-
dicorum usus atque experientia comprobauit. Antido-
tarium inscribunt hoc genus argumenti, nulla ratione
aut usu ueterum, sed, ut fuit annorum licentia, è Græ-
ca uoce Latina analogia nomen detorserunt. Multa
nobis, plurima alijs reliquimus, ne uolumen, quod quin-
que libris Ioannis Tagaultij, & hoc de materia chirur-
gica commentario cogendum erat, in maiorem molem
accresceret: deinde non plus operæ hac in re licuit col-
locare nobis, quàm à quotidianis studijs, stataq; inter 30
pretandi curâ relictum fuit, idq; breuiori tempore,
quàm

quàm hoc institutum nostrum, breue quidem, sed uarium, ex postulet. Ideoq; dignum uenia, si contracto ambitu uerborum, pressaq; periodo, quædam describentur, et in tam numerosa medelarum turba potior est uerborum moderatio, breuibuscq; sententijs res præmenda est. Ad hæc ponimus idoneos esse huic doctrinæ, qui iam intineli fuerint præceptis artis, quam Ioannes Tagaultius singulari ingenio atque incredibili studio informauit. In qua genera morborum diuisa sunt, circumscriptæ formæ, designata indicia, notata præsentia, institutæ leges, scriptæ medelæ plurimæ. In qua quæcunque collabebantur in disciplina uetere, constituta, quæ uitium fecerant, reformatæ: tota denique ars, quæ si rediuiuo lapide instaurata est. Vnicam hanc partem operis interceptus negotijs in nos trāstulit, quam ideo recepimus, ne & publica ratio deseri à nobis, & officium necessitudinis repudiari uideretur. Multa igitur è Græcis, quædam ex alijs transtulimus. Quæ à Guido ne, cuiuscq; notæ scriptoribus rudiùs tradita sunt, paulò puriùs reddere contendimus, etiamsi intelligamus uitia corporum non curari eloquentia. Sed nec barbarismo depelli possunt. Probamus quidem omnem orationem, modò sententijs rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit. Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quod barbarismus ille multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque sordescunt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris uocibus describuntur. In damnandis quibusdam rebus, authores

Græcos adhibui: in remedijs ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæq; ut res præstio sunt

Laus operis Ioannis Tagaultij.

sic sunt facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus ueniamus.

De repellentibus. Cap. I.

Vtilitas repell.



Πονεστικὰ Græci uocāt, quibus & initijs fluxionū, & post initia utēdum est, quamdiu uidelicet humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atque incrementa, hinc uomicas, maligna ulcera, febrium dolorumq; causas, alia denique permulta uitia corporum declinamus: ideoq; principijs obsta. Sed uacuandum prius corpus est, si quidē postulat casus, ac ferē postulat: quia in phletora & caecobymia, rheumatismi plurimū commouentur: quam etiam in mediocri uitio humorū & copia, ubiq; phlebotomo uel pharmaco natura leuanda est. Idem remedium sæpius innouandum, si quidem metus, ne cū incaluerit mora, affecta inde pars nimium recalescat. Vis quoque remedij uitio conferenda. Leuius enim pharmacum, ut lactuca, in graui ardore frustra est: fortius, qualis est succus ē pomo Mandragoræ, liuore inficit, indurat scirrhum, & aliquando ita reprimat, ut in uiscera fluxionis impetus rapiatur. Ad consilium adhibenda hæc omnia, natura, stus, figura, sensus, robur partium, humoris copia, qualitas, corpus, uia præterea per quas is illabitur. Neque perpetuò satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi: aliquando enim superius collocandum, ut ueluti præmissa manus uas intercipiat, ne quid transfluat: ubi uenarum ductus atque coniugia animaduertenda. Ceterū reprimentium consuetudine naturæ admodum controuersa est. Ar-

Vacuatio.

Modus.

Quæ ad consiliū adhibenda.

est. Arabibus repellunt quæ influxum prohibent, refrigerant, crassant, illinunt, oppilant, quæ denique robur partium confirmant. In Græcorum libris adstringentium materia cum repellentibus ferè commiscetur. Apud Latinos Corn. Cels. scripta reliquit, quæ simul repellant atque refrigerent, & rursus quæ sine frigore repellant. Aurelianus in chronicis alia scribit unâ adstringere atque reprimere, alia adstringere quæ non reprimant. Sed utriusque, ut aliquot locis Arabum, in censenda

Conuersa repellentium natura.

- 10 materia non sine uitio est oratio. Iustissima Græcorum sententia, eaq; nobis explicanda est. Repellit perpetuò quod frigidum est. Frigidum aliud aqueum natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia, quod quia adstringit & magis contrahit partes, efficacius reprimat: aut certè solū id efficit si quidē ab actionis uehementia repellentibus nomen inditum est. Ac certè in rheumatibus præstantissima medicamenta sunt, quæ cum quadam adstrictione uehementer siccant ut non mordeant: qualia terrena sunt. Quamquàm & alterum genus, quod aqueum est, utcunque reprimat, & ex æquo frigidum uel terreno frigidius est, ac refrigerio magis conuenit. Verū præterquā quod humor frigore repercutitur, si quidē accessit constringendi uis, quod iā in loco exstringitur, magis etiā si tenue est: et si quid reliquū sit, sæpenumero resiccatur: confirmatur pars, ut si ne pharmacorum opē quod postea insuat, possit retundere. Verū hac parte prouidendum ne quid nimis, ne cutis grauius contrahatur, crassescat humor, dolor exasperetur, fluxio increseat: grauius denique incendium
- 20 irritetur. Atque ut initio quidem inuisse putes, reliquū tamen & scirrholes & contumax persistit, quod
- 30

Græcorum sententia.

Cautio in adstringentibus.

imposuerum agerrimè discutias: ac grauior metus, si
 quid uiscerum infirmius est. Excipit enim celeriter
 quicquid retunditur: ubi omnia firma sunt, in magnas
 uenas & uiscera citra periculum aliquid refluat. Vi-
 dendum quoque ne ultra modum contrahas in mate-
 riæ copia, crassitie, uitio, molli uegetoq; sensu corpo-
 re, dolore graui pariter & calore. Vbi laxanda po-
 tius uia est, ut diffuset calor, ac dolor temperetur: qui
 ubi cruciat uebementius, ad laxantia & anodyna om-
 ninò confugiendum est. Adstringenti simul atque re-
 pellenti auxilio uis efficacior est, si quid tenuium par-
 tium uel natura insitum, uel arte commixtum est, mo-
 do non mordeat. Iusto enim calore temperari potest,
 multò magis, si (quod fere fit) ab infirmitate fluxio, à
 frigore infirmitas orta est. Pestifera materia non oc-
 currimus, ubi in superficiem diuertit: sed potius illici-
 mus, atque rapimus ui maiore, si tardius mota resistit.
 Neque dissimilis ratio est in criticis apostematibus,
 coxarijs, lue uenerea, ubi non repellenda in corpus,
 sed foras potius materia trahenda est. Iam uerò quæ
 illinunt, oppilant, offarciunt, aliàs quidem dolorem
 leniunt, aliàs acrimoniam hebetant, uiasq; interci-
 piunt. Ex quibus si uis reprimant, ac re uera nonnun-
 quam reprimunt, oleum rosaceum, omphacinum, myr-
 tinum, oui candidum, aliq; id genus. At gummi ge-
 nera, resina, gluten, farina pistirinalis, gyrystitici, hy-
 dreleo, oxeleo, Rhodino, repellente succo, austero ui-
 no dissoluta, non tam sponte sua, quam aduentitia ui re-
 primunt. Adstringunt calida, folium, cassia, cinamomū,
 spica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myr-
 rha, absinthium, marrubiū, polium, salua, centaurium,
 uina,

1. ubi non repel-
 lendum.

1. ubi non repel-
 lendum.

Oppilantia.

Que calida ad-
 stringunt.

uina,

- uina quidem austera, & aromata plurima. Reliqua uero tum austera, tum acerba in proximum ordinem referemus. Leniter repellunt, aqua, uinum, lactuca, intyba, polygonium, trifolium, auricula muris, lenticula palustris, psyllium, liquor oui, umbilicus ueneris, semperuiuum, portulaca. In summa, quaecunque frigida aqueo elemento soluta sunt. Omphacium adstringendo efficax: Solanum ambigit. Hoc potentior rubus est immaturo fructu & floribus: mollioribus autem folijs & asparagis plurimum aquae continet, ideoque leuius contrahit. Adstringunt uitium folia, et capreoli, plantago, sorborum, cornorum, mespilorum, pyrastrorum, cydoniorum, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, rosarum capita, obelisci: deinde, sed minus, semina, flores, & folia. Oxyacantha mediocriter, malicorium magis, cytinus, balaustra, rhus, acacia, bolus Armenius, terra sigillata, quercus, cupressi folia, germina, & nuces. Vehementer refrigerant pomi maderagorae, hyoscyami et papaueris succus: quae reliquis interdum temperari possunt, ubi
- 10 acrior inflammatio est, sed prius auferenda, quam inde partes liuorem ducant. Spongia est frigida expressa partim contrahit, fluxum inhibet, dissipatque in uiciniam, quod iam coijt. Eodem modo lana succida & splenia austero uino insuccata. Magis etiam, si aqua prius, galla, & similia incoxerint. Vinum aquae praefendum, & maxime austerrum, ubi reprimendum est. In deligationibus fasciae uino insuccantur. Acetum repellit, adstringitque uehementer. Caphura repellit, & tenuitate partium facile permeat. Oculis populi ueteribus Graecis calfacit. Repellit gypsum oxycrato maceratum. Olei rosacei frequens usus est, sed sit ex oleo
- 20
- 30

Materia repellentium.
Aquea.

Omphacium.
Rubus.

Quae uehementer refrigerant.

Aqua.
Vinum.

Acetum.

Rosaceum.

omphacino, in quo rose sæpius mutatae maduerint. Quod annum superat, exoletum est. Oleum omphacinum si defit, recenti oleo & uuae acerbæ succo unâ coctis, dum succus omninò exhalauerit, fingito; & ad ignem saligno ramo, uel simili assidue commoueto.

Ratio in oleis. Oleum uerò nec sit conditum sale, nec etate rancidū: in myrtino, melino, lentiscino, & similibus eadem uitia fugienda sunt, uetustas, rancor, falsugo. Mastichinum, nardinum, costinum, adstringendo roborant, & calfaciunt. Vitiosum oleum, cum integrum defit, tan- 10
Olea scilicet. dum eluatur, dum uirus exuat. Eluatur aqua uel simplicis, uel rosacea. Descriptæ materiæ oleum uim cōhibet, si uel materia ipsa, uel succus eius oleo incoquatur.

Cautio. Plantaginem, gratia exēpli, oleo recenti & pari aqua aut uino coques, dum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculosus olei usus est, quia calore incenditur & frigit. Expressis succis melius utimur in la-
Succorum usus. na succida, panniculis, ac splenijs. Portulaca, semperuiuum, umbilicus ueneris, ægrè succum reddunt: nisi in mortario tritis aliquid omphacij, uel liquoris similis 20
Cataplasmata & cerota. affundatur. Cataplasmata fiunt farina in succo pista. Ex oleis cerota cōiunt, & succis imbuuntur. Remedia neque dura sint, neque graua, ne presso loco dolores augeant. Cerusa cichorij succo & aceto leniter diluitur. Ceratum à psyllio, Psyllij unc. quatuor in aquæ lib. quatuor macerentur percoquanturq; expresso succo adde rosacci libram unam, ceræ unc. sex: contra articulorum rheumata. Non absimile ceratū rosaceum. Duplici uase cera cum oleo liquefit: ubi refrixerint, con-
Cautio.
Ceratum & psyllio. spersa aqua commouentur, aqua reieitur, succus plantaginis affunditur, ut quantum fieri potest, absorbeant. 30
Ceratum rosaceum. Inflamma

Inflammationes, sinus, ulcera genitalium quæ serpunt, adiuuat. In teneris corporibus idem ceratum coriandri succum imbibat. Coriandrum leuiter adstringit, alijs refrigerat, Galeno calfacit: utere in incrementis. E coriand. Cera magis adstringentia.

Cerati myrtinum et melinum magis adstringunt. Herpetibus, & nimio humore flaccidis ulceribus conuenit, Myrtini libra una, ceræ unc. duæ, pollinis myrtorum uncia una. In ceratis utendum cera, quam adole- Cera.

scantior apum populus confecerit, ceram uirgineam, Cera. apiarum nominant, eaq; è nouis fauis separada. Alioquin cera alba utendum erit, non sponte quidem nata, sed fa-
littia, qualis olim Tyrrhenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus remediorum carere debet, ideoq; præ-
ferenda: cera è dulci ac diluto melle. In coagulato lacte
& inde nascente inflammatione, farina fabacea hydre-
leo uel rhodino pista, mammis imponitur. Idem opitua-
latur testibus inflammatis. διὰ χαλκίτεως contra Διὰ χαλκί-
τεως. rheumata hoc modo temperari debet: Adipis suillire-
centis, exemptis fibris unc. duæ, olei recentis, lithargy-

ri, ana unc. tres, chalcitidis unc. dimid. Conficiendum
arte medicamentum: usus tempore, unc. duas medica-
menti, olei rosacei unc. tres colligabis: ubi refrige-
rint, aqua frigida, succo portulacæ, psyllij, lactucæ, ui-
no austero, ut res postulat, subiges, animaduertēs quan-
tum repellendum, adstringendum, refrigerandum, sicc-
candum, leniendum, ut modò rhodini loco myrteum
aut melinum misceas: oxycratum hunc uel illum suc-
cum alijs præferas. Quod sequitur, exprimit ulcera-

bus quod influxit: et quod influat, repellit: Lithargyri De lithargyro
& hydrel.
unc. quatuor, olei dulcis uel rhodini unc. quatuor, aquæ
unc. tres: lithargyrum die uno hydrelæo coquitur:

Defensiuo. difficilius enim illi quiescit: teneris corporibus & par-
uis ulceribus conuenit. Defensiuu uocant è boli Arme-
ni parte una, terræ sigillatæ dimidio, rosacei triplo,
aceti uel succi repellentis dimid. Liquidis reliqua in-
friata commiscuntur: uel è bolo Armeno liquore oui
conleuato: deinde affuso succo è capreolis uitium, aut
Deligatio. omphacij. Fasciæ ritè conuolutæ in repellentibus cen-
seri possunt, quales in fracturis, & quæ ab ulcere sur-
sum adducuntur: ut adstricta parte, & ita ductis orbi-
bus paulatim laxes. Similiter cum altero membro atro-
phia intabescente, alterum deligamus. Vincula quoque
superioribus partibus iniecta, quæ uidelicet materiæ
cursus est. Aliquando etiam inferiores illaqueamus, ut
eum è crure exhalat uirus quod uiscera appetat, ex
quo & epilepsiæ & syncopæ causa præciditur. Sed in
ulceribus plurimum & fracturis, uias laqueo compre-
hendere oportet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmo-
ne, putredo, syderatio, aliq; id genus concitentur.

De attrahentibus. Cap. II.

20

*Attrahentium
materia.*



*Multiplex
usus.*

Ἀττράχων & ἐμπίπτων Græcis appel-
lata, usu quidē repellentibus conferri pos-
sunt, sed natura plurimum dissident cali-
da, tenui substantia, quæq; ui quadam rapiant, quæ
in alto corpore posita sunt. Ideoq; uiscera, internumq;
corpus exonerant, foras translata materia, uenena in-
cutim euocant: criticos abscessus accelerant, despera-
tos pleuriticos & fortasse attonitos releuant, ingui-
num tumores amplificant, quodq; uel pestiferum, uel
nimis uitiosum medio corpore cōceptum est, aliò per-
trahunt.

trahunt. Tabidas ac uelut syderatas partes uitæ res-
 stituunt, perfrigeratas spiritu resouet, uitiosam saniem
 exhauriunt, quæ neruis & cuniculosis ulceribus latet:
 squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant, hydropi-
 cos exugunt, paxillos, clauos, spinas, sagittas renocant:
 multò magis, si locus ulceris periculo inciditur, nec pa-
 titur eger angustiore plagam ferro ampliari. Quod
 in uomicis, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus, veli-
 quisq; partibus altius desedit, eliciunt. Multiplex ergo *Differetia attra-*
 hentium. *bentium.*
 1. *attractum* usus, sed nihilominus uaria materia est.
 Alijs ea uis à natura insita est, atque in his modò ma-
 nifesta qualitas elementaris, modò occulta quedã pro-
 prietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus
 hoc habet aduentitia qualitate ex putredine contracta
 acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod
 attrahit, non protinus calidum est. Aphrodiseus aliud
 sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisugæ, pyulcus su-
 flus, dolor, uincula, frictio, cauteria. In attractum
 usu aliquãdo quòd fuerit attractum, corpore excludi-
 mus: sed hic modus est, ne cum uitio partem frugi ma-
 teriæ eripias. Nonnunquàm tantum attrahimus, non
 etiam discutimus: ut quum in partem emortuam calor
 & spiritus attrahitur. Argenti spumam, ceram, res- *Que miscenda*
 nam, picem, oleum, epispasticis ueteres miscuerunt, ut *attractantibus.*
 & temperarent, & magis emplasticum pharmacum
 efficerent. Quidam etiam adstringente materia obtun- *Particularis*
 di uoluerunt. In primo genere sunt dictamus, propolis, *materia.*
 ceram uirgineam uertit Scribonius. Rudis est & cras- *Propolis.*
 sa materia in apum officinis, nondum cera: odore graui,
 2. *out* qua pro galbano ueteres uterentur. Ea mellatione
 uerna, separari potest fauorum pars quæ cellas obli-

pat. Sed iam exemptis fauis, posteaquam mella diffu-
xerunt, quicquid est in fauis, una confundunt, ut nihil
syncerum haberi possit. Magna uero syncera propo-
leos uirtus est, spiritus crassos & uitiosam materiam
ex alto elicit: recēs per se satis est mollis & pinguis:
sic in puncto neruo agricolæ Galenus usus est: quæ
etate induruit, oleo ueteri molliari debet. In molliori-
bus corporibus oleo illiquatur. In duris lacte multo ti-
thymalli, cum terebinthina satis attrahit. Thapsia re-
cens utilis, bimula & uetustior exolefcit. Cerato misce-
ri solet: quæ quia ut uiscum plurimum aquæ continet,
quatuor & quinque horas insistere oportet. Radix
arundinis cum melle. Sagapenum, galbanum, ammo-
niacum, opopanax, calx uiua, cinis e facie uini uel ace-
ti, quæ loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ
& spicula & squammas extrahit, lepidium, sinapi, na-
sturtium, tithymallus, dracontium, pyrethrum, ranun-
culus, sales, tū qui edi possunt, tam ammoniaci. Quedā
infusa affricantur, aut gummi & resinis concorporan-
tur. Lixiuum in subtili calidaq; materia extillatum: 20
ex eadem cinis Anemone, calanmutha, narcissi radix,
cyclaminus. Sparthi quo uites alligant fructus, & e fo-
lijs succus. Acetum, sed hoc suspectum, ubi siccitas, do-
lor, inflamatio, ulcus, adstrictio, & a neruis dolor est.
Cantharides ex polenta & melle pistæ. Medullæ &
adipes etate acrimoniam contrahunt, ursinus adeps,
hyemius, pardalinus, leoninus, & alij, sed hi maxime.
In alopecijs & profluuijs capillorū uitium discutiunt,
attrahuntq; quod ad capillitium utile sit. Oleo & oleæ
flore, tela sibi refrigerare elephantos, testis est Aelianus: 30
uetus sit oleum, tenue, & calidum. Sulphur infriatum
melle,

Thapsia & bi-
scum.

Loco nitri sex
cremata uini
uel aceti.

Acetum.

Medulla &
adeps.

Oleum.

Sulphur.

melle, oleo, terebinthina, saliuā hominis, axungia. Idem in tenoslagmate seruescit dum enatet lentor quidam, (oleum appellant) quem concha excipere oportet, aliquoties commutanda aqua dum satis olei collectum sit; quo demersum corpore hydrargyron foras elici uoluerunt, statim illito à balneis. Euphorbium recens acrius est: bimum trimumq; paulatim remittitur, quinto & sexto anno exolescit. Cerato temperatur, quod uel decuplum, uel duodecuplum oleum habeat, & tri-

Euphorbium.

10 plam ceram. Modus est ut tantum erubescat locus & pruriat; non uratur, nec ulcus contrahat, nisi & hoc etiam necesse sit. Cerato largiore dilui potest, quod est acrius: quod uero languidius pharmacum, aucto euphorbio, cerato imminuto augeri debet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est. Ardor affusa aqua, aceto (quod uim thapsie efficacissime diluit) cerusa & rhodostagmate lota extinguitur. Succus cyrenaeicus medicus, opobalsamum, & alia quae partim exoleta sunt, partim usui esse possunt, ex. 3. de comp. pharmacorū

Modus euphorbij & similium.

20 κατὰ γένν, & alijs Graecorum libris repentenda.

Aduentitio calore trahunt fermentum, sterco anserinum, gallinaceum, columbinum, arletinum, humanum, & quaecumq; talia sunt: Scatebat quidam e grege mendicabulorum. lue uenerea: aliquot diebus uniuersum corpus equino fumo obruit, ut tantum esset quā respiraret. Erat sterco stabularium; equino lotio saepius perfusum, quodq; iam computruerat: Effecit ille hac arte, ut totum uirus exprimeret: addidit aliquoties enchryston ex axungia, lartigna, & hydrargyro. Nec

Quae trahunt aduentitio calore.

Mendicus lue uenerea curatus.

30 alia uitae lex seruata est, quam mantica offerebat: atque his remedijs curatus est. Fermentum oleo inco-

Fermentum.

quitur:

Coagulum.

Que qualitate
occulia.

Ostrea uiua.

Scorpio.

quitur: fundit, liquat, surculos trahit, pedes contusos
 sanat, mollit, discutit. Axungia ueteri, larigna, & te-
 rebinthina, resinis liquidis pistum efficacissimum est.
 Alias cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discu-
 tit, aperit. Coagulum quò uetustius, eò efficacius. Ex
 echino animalium (quæ τριφυλον λεπρε) lepore & uitu-
 lo marino colligitur. Lac est in lactentium animalium
 uentriculo uel omaso ita concoctum. Aristoteles ad
 alui profluvia utile facit magis leporinum: equinum
 Dioscorides, Arabes, & quidam è Græcis adstringens
 frigidum, ac reprimens auxilium faciunt. Alij acrimo-
 niam elementis, reliqua occultæ qualitati attribuunt.
 Hoc certò habet, quòd dissipata cògit, & coacta dis-
 soluit. Magnes ferrum attrahit: repellit Theamenes.
 Succinum illicit festucas ignorata ui. Cancer fluuiati-
 lis tritus tela extrahit, lacertæ caput, rana summis
 partibus rescctis. Cochlearum & limacii carnes, alias
 per se, alias cum suis uolutis tritæ, ac mixto interdum
 coagulo, tela rapiunt, atque hydropicis aqua exigunt:
 non prius soluere oportet, quàm totus humor exudaue-
 rit. Ostrea uiua pestiferos bubones loco transferunt,
 & ad se trahunt. Scorpio tritus & impositus, quod
 infixit uirus, retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem effi-
 cit, & calculos educit illitum glandi, si in cole resite-
 rint: uel pubi ac perinæo, si superius inhæserint. Cucurbitula summa ui rapit. Hirudines superficiè sugunt:
 Pus, urinas, calculos, suctus elicit: ore mundo ac prius
 loto sit qui exugit. Pyulcus, catheter ijsdè utilia sunt:
 uincula, frictio, phoenygmus, dropax, sinapismus, fer-
 rum candens, uel admotum uel impressum, calore tra-
 hunt. Sed hoc uiolentum remedium est. Verum quæ
 non

non sanant pbarmaca, sanat ferrum : quæ nec ferrum, sanat ignis: quod Hippocratē in Aphorismis scripsisse uolunt. Mixta remedia sunt theriaca. Psoricum dupla chalcite & lithargyro, aut æquis partibus cadmiæ & chalciteos: uel duabus chalciteos, et tribus cadmiæ: fortius est quod cadmiæ, quàm quod lithargyrum recipit: minus acre lotis metallicis. Ex acerrimo aceto trita & fictili clausa sepeliuntur fimo. Hac arte macerata, triplo, duplo uel cerato excipiuntur. Ceratum sesa-

Aphor. Hippoc.

Psoricum.

Quomodo tenuiora metallica.

1. quialtera ratione dupla, tripla olei, ad ceram conficiuntur. Ea metallicorum cura pbarmaca tenuiora sunt, facilius penetrant, & inde trahunt. Oleum sit uetus, ricininum, sinapinum, scyonium: raphaninum, è terebinthina, larigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica si uis distillatum: quæ resinæ etiam è profundo trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina: in quibus non modò calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt: Cerati unci quatuor, terebinthina unc. dimid. liquatis immisce pul-

Olea comoda.

Resina & inde oleum.

Formula ex Galen. Orib. Act.

2. uisculi, euphōbij drach. tres: interioris fermenti unc. una, terebinthina liquidæ unc. una: concorporata plurimum ualent in punctis neruis. Propoleos acris & pinguis (nam cera uirginea abutendum non est) unc. duæ, olei ueteris unc. quatuor, galbani unc. dimid. coëat ad ignem. Picis liquidæ, picis aridæ, propoleos, partes æquales, lithargyri, cerussæ, salis, ana drach. decem, seorsum tusa, & cum olei unc. tribus in mortario pista, ad ignem diu uersentur, paulatimq; decoquantur. Lithargyri, cerussæ, nutri, cetræ Colophonis, ammoniæ-

3. ci, ana unc. una, olei ueteris unc. sex: reliqua uncij sex lixiui ficulnei dum non inquinent, concoquantur: deinde

Relatum ad An
dromachum.

deinde vera Colophoniam ammoniacum, deinceps quidem ac paulatim adijciantur. Nucleorum ē dactylis crematorum, nitri rubri, salis ammoniaci, uel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinæ, ana drach. uiginti, piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylobalsami, myrrhæ, resinæ siccæ, capitum lacertæ, lactei succi miori, ceræ, ana drach. decem, adipis caprini drach. quindecim, olei lirini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest, nisi ad uocata ὀνίβαλα μόρον confugias. Quod sequitur admirandū ad strumas, ramicæ gutturis, parotidas, omne duritiæ, ædemata: Cupressi folia neque teneriora, neque duriora in puluerem comminues: tortilio uino consperges, atque ita uolutabis, dum in facis corpus coeant: inde struma uel ramex inducitur, tertio prium die soluitur medicamentum: contractum locum inuenies, qui digitis exprimi debet. Rursus ad tres dies idem pharmacum applicabis, eodemq; modo solves & exprimes: septimo die, uel ad summum nono, strumæ uelut miraculo abolebuntur. Exugit hoc sanie per poros affectæ partis: Olei antiqui unc. uigintidue, ceræ albæ unc. quindecim, nitri uel salis torrefacti, aut scæcis crematæ uini unc. tres, terebinth. unc. duodecim, lixiuij querni, uel ficulnei unc. octodecim: cera cū oleo liquatur, terebinthina adijcitur, refrigeratis nitrium conspergitur, lixiuium paulatim affunditur: omnia pistillo conuoluuntur. Plurima ex tertio & sexto de compositione pharmacorum κατὰ γένιν, & i. 5. Aët. repetenda. De sinapismo, dropace, phœnygmo, & alijs alio loco. Addunt Apostolicon Nicolai, Oxyroceum, & alia.

De resoluētibus. Cap. III.



INCREMENTIS rheumatum discutiens materia cum repellente misceri debet. Inclinate utio diaphoretica pura sint, & horum unicum fortasse genus est: sed clarior doctrina fuerit, si duplici differentia separemus, ut alia quidem leuiores, quæ ἀραιωτικὰ: alia fortiora, quæ διαφορητικὰ si uis appelles. Aræotica mediæ naturæ uicina

ἀραιωτικὰ.
διαφορητικὰ.

1. sunt eo calore, quem humiditas temperet: ex quo minime siccant, dolorem leniunt, relaxant cutem, spiramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partium intrò penetrant, quodq; inhæsit parti, liquefaciunt. Hunc ex humore uapor fit, qui subinde expirat, dum omninò locus detumeat. Et adhuc quidem satisfaciunt, ubi tumor in superficiè exponitur, locusq; mollis est ac rarus, materia uerò calida, humida, & tenuis est. Quòd si in alto corpore humor deponitur, si idem frigidus, crassus, glutinosus: si dura densaq; cutis, si uix longitudo quædam est flexus & anfractus, iam ui maiore opus est, uidendumq; non quale in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, quum eò peruenerit. Ex quo nec acribus quidem pareendum erit. Etenim pars exterior perferret, quæ agra dolensq; tolerare non potest. Maiora uerò remedia in diaphoreticis numerentur, iam uicina epispasticis: quanquàm utraque uirtus euocandi atque digerendi plurimis rebus insita est: sed ut in uno quoque uis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, uentriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus metus est ne dissoluant uires: ideoq; adstringens materia, qualis est aromatum,
- 2.
- 3.

Consilia in usu
resoluentium.

tum,

Cautio.

Ab acrioribus
quom cōtingat.Particularis ma
teria.

Olea.

Oleum liliorum
cum croco.

Nux rancida.

tum, misceri debet. Frigida crassaq; materia, incidente auxilio prius comparanda. Mollienda quoque ubi durior concreuit, ex quo à leuioribus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, ut sine periculo discutias. Alioqui diffilabit tenue, lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida, durius: cū ea quæ uegetius sentit, clementius agendū est: quanquā stupore partis abutēdum nō est, ut ea imperes, quæ exulcerent. Sic enim sensile corpus intabescet, contrahetur, non rarefcet: cogetur materia, nō liquefcet: horror, dolor, fluxio irritabitur: debiscent uenæ, omnia in deterius commutabuntur: multo magis si pharmaca crassiore consent materia, et siccent. In phlegmone quæ uetus est, uidentum nunquid affluat: id ferè accidit tumoribus qui inueterascūt, ubi medela quæ reprimat, commiscenda est. Posteaquam uerò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquum est, confirmanda pars, quæ longo uitio elāgit, multo magis si statis periodis, rheumatismo uexari solet. Aræotica sunt, chamæmelum, lini semen: in maluis efficacissima althea, sequitur agrestis, domesticæ uis nimio humore elanguit. Aqua calida utitur Hippocrates, in fracturarum exolutione, quam uocat ἐπίλυσις: uinum exiccat, reprimat, et digerit: lana sordida bene carminata inebriata uino, et inde pressa: ceratū similiter. Butyrum digerit, mollium corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas aliāq; innumera, ut per se satis esse possit. Oleum dulce, calens, et in quo illa efferbuerint. Sicyonium ē folijs, fructu et radice cumeris aggressis. Crinelaon intinctum croco, omnes inflammationes discutit. Oleum caryinon efficacius ē rancidis. Nux rancida per se, uel cum melle trita efficacissime

- efficacissime suggillata rapit, inuritur, aut candente ferro premitur, ut reddat oleum, quod optime discutiat. Omne oleum concalfactum igne, quale est lucernarum, uel ignito ferro extortum, efficacius est. Oleum uetus, ricinum, canabinum, anethinum, quod est rosmarino, maiorana, zambace, leucoio, hyssopo, alijsq; eiusmodi œneleo coctis, dum omnino expiret uinum. Rhabbanum, sinapinum, melanthinon, terebinthinum, hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ, & uocatæ sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydropicis & cedematis olea comparantur. E galbano, ammoniaco, & similibus quæ molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, ut status excutias, cui rei galbanarium utile est. Si quid incidendum, detergendum ue, aliquid acetum uel oxymelitis affundi potest, quo tempore absinthium, polium, centarium, iris, aristolochia, gentiana, urtica, hyssopus, & similia œneleo incoquantur. Hic uinum melius non adstringens, giluum, tenue & odorum. In phymatibus & parotidibus duriorum corporum talia ex usu sunt. Brassica per se, uel cum axungia trita, induratas phlegmonas & uetera erysipelata discutit. Adipe & medullis recentibus laxando, ueteribus discutiendo utendum est. Mastiche, furunculis: Ammoniacum & similia chœradibus & articulorum tophis conueniunt. Fermentum oleo pisum, & cum cocta cepa mixtum, potenter coquit, molliat ac digerit. Pellibus animalium recens detractis, in contusis uerberumq; plagis uti conuenit. Foenumgræcum duris phlegmonis adhibendum. Acetum achoribus & cedematis utile est. Acetum.
- 30 Agrippa concalfacto aceto pedes immergit, unde intolerabili pedum cruciatu liberatus est, περιόπτετο collo Agrippa aceto li cratus.

collo appenduntur & ui latente, uel elementari qualitate uitia corporibus excutiunt, corallus, uiscū, pœonila. Mirum est quod affirmant. Coluber è cauda suspenditur subiecto uase aqua pleno, in quod ille dehisceat ore: aliquot pōst horis uel diebus lapidē euomit, qui in breui totam uasis aquam combibat. Alligatur lapis hydropicorum uētri, atque in totum exhausta aqua liberat. E sambuco & ebulo oleum oedemata iuuat, & hydropicos. Composita sunt Cerata, quæ simplicia, oleo minus digerunt, sed fortius hærent. Oleum abietinum, chamæmelinum, anethinum, sampsuchinū, & similia, cum subquadrupla cera uase duplici colliquabis, liquatis duodecimam partem terebinthinae, uel larignæ cōmiscbis. Aisdem oleis & gilio uino erinaceus coquitur, dū putrescat, oleū pinguius relictū arthriticis conuenit: idem è uulpe, lutra, mele, fieri potest. E lini semine oleum mola exprimitur, cum sarmentitio lixiui subigitur, modicum larignæ ad lentorem adijcitur. Panis cibarius falsus fermentatus è ricinino pistus, sugillata delet. Fauos mellis è uino friges, cum loliace. farina, momento butyri, & larignæ subiges. Bdelium cum melle teritur: calx cum ueteri axungia: laserpitiū cum sulphure: hæc omnia, molliunt, tergent, discutit. Sulphur cum oleo uetere, melle, terebinthina, uel salina mixtum, aut urina maceratum, in uenenatis moribus deterget, attrahit, discutit. Calce lota, & recentis axungia mixta in tenellis corporibus utendum erit. Lixiuum cum melle, farina hordeacea, fabacea, conuenienti oleo pista solidiori phlegmone conuenit. δισχάλκιτος uncia una, in olei ueteris, uel ricinini unc. duabus liquefit, declinanti phlegmone: ante declinationem,

Cerata.

Sulphur-

Ἰσὺς δισχάλκιτος.

20

20

30

nationem. & in uigore oleum sit dulce etate media.
Orobi farina diluto oxycrato cocta, ut sit calidum cata-
plasma, crassa & uiscida secat, & discutit. In contuma-
ci uitio & minus calente: olei chamæmeli unc. tres, ce-
ræ drach. tres, axungie anatis & gallinæ, ana unc.
una, chamæmeli & anethi, ana drach. duæ: omnia len-
to igne cocta percolantur, ut fiat unguentum. Olei
sicyonij unc. tres: ceræ drach. sex: terebinthinæ drach.
duæ. In frigidiorē materia ita tēperabis: seminis fœni-
culi, anisi, anethi, ana drach. duæ: farine lupinorū, semi-
nis fœnigræci, lini, ana unc. una: cocta uino, tusa ex
oleo & aceto imponentur. Papaueris cornuti folia cū
axungia & propoli pingui trita, strumas, bubones, &
similia molliunt, atque discutiunt. Colophonie lib. una,
ceræ sesquilibra, oleo liquentur: liquatis addito salis
torrefacti unc. sex: ubi refrixerint manibus conuolui-
to, cylindros uel magdaleones fingito, usus tempore
luta intendito: adhibitum hoc pharmacum, pus in se ra-
pit, quod cum hæreat, eradi debet ac rursus aluta im-
poni, idq; sæpius repetendum. Nam ueluti miraculo
conditum pus emulget, & uitium discutit: sed quia du-
rius, in dolore abstinendum. Eidem rei picis aridæ, ce-
ræ nouæ, ana lib. unam: olei lib. duas: blando igne fusa
coniungito. Adipis porcini, picis, ceræ nouæ, saponis ni-
gri, ana unc. duæ: liquata transcolato, hydropisimos &
dorbienas adiuuat. Vehementer discutit galbani, casto-
rei, ana unc. una: liquefiant in olei ricinini sesquilibra:
expresso & colato oleo adde picis, terebinthinæ, ana
drachmas quatuor: ceræ quod sufficit, ut fiat solidum
pharmacum. Hæc autem contumacibus uitij imperan-
da sunt, in quibus est quod molliat, coquat, trahat, di-
scutiat.

scutiat. Plura sexto & septimo de compositione phar-
macorum κατὰ γένη, 15. Aëtij, & alijs Galeni li-
bris. Partem chalaſticis ſouebis, ex quo diaphoreticum
induces, quod initio quidem lenius: poſtea uerò ut ſub-
ſidet tumor, efficacius eſſe oportet.

De mollicentibus. Cap. III.

Malagmatum
natura.



Μαλακτικὰ ſunt, quæ modicè calida nulla
ui ſiccandi uel humectandi manifeſta, indu- 10
rata corpora emolliunt, quanquam (ut om-
nia ſerè multiplici natura coierunt) in malaſticis cen-
ſentur plurima, quæ primo ordine calfaciant, ſecundo
ſiccent, ac tertio. Sed quæ malaſtica ſunt, humido cali-
doq; elemento temperari neceſſe eſt. Plurimus uſus eſt
in tumoribus, quos οχιρρῶδεις Medici appellant. Hi
in muſculorum finibus ſerè concreſcunt: aliquando in
medijs muſculis, glandibus, uiſceribus, ulcerum labris,
ex materia craſſa, lenta, & frigida, qualis eſt pitui-
ta, et melancholicus ſuccus. Sed e melancholico ſucco 20
omninò cancroſi ſunt, & malagmaticis exaſperari ſo-
lent. Inflammationes in ſcirrhum cogi. contingit, ſi
materia craſſa & lenta eſt: ſi adhibita pharmaca, quæ
nimium ſiccent & calfaciant, qualia ſunt ἐπισπασ-
τικὰ & ἰσχυρωτικὰ. Hinc enim tenue exprimitur,
reliquum occaleſcit. Sic enim tophi in articulis, & cal-
culi in renibus lapideſcunt. In tenui ſeroſaq; materia
non ita metuendum: tota enim facile exhalat. In craſ-
ſa & uiſcida omninò declinanda quæ ſiccant, diſcu-
tiūt, adſtringunt: ſiquidem ſola molliendi cura eſt. Ma- 30
laſticis quod elementer digerat, interim commiſce-
mus,

Uſus.
Scirrbi genera.

Scirr. cancroſus
irritatur mala-
ſticis.

Cautio.

- mus, ubi iam malagmate coeperit tumor durus edomari. Phlegmone & erysipelata in scirrhum degenerant, nimis refrigerante atque adstringente materia. Sed à phlegmone scirrhus amplior est. In usu malagmatum *leges in usu malagma.* certæ sunt leges. Primum enim cognoscendum, quantum pars ægra à sua symmetria recesserit, quantumq; uitium increuerit: ex quo æstimandæ remediorum uires. Tum naturas partium distinguere oportet: postremo artificiosè colligendum, qua ratione emollias; nunc
1. quid ammisceas quod detergeat, incidat, discutiat. In quorum omnium usu, modum, occasionem, quale, quantumq; animaduertas. Desperatur scirrhus, qui sic occidit, ut iam non sentiat, & inde glabrescat locus. *Desperatus sciribus.* Desperari dico, quia nullo malagmate domari possit. Et enim rescindi ferro, & septis exedi potest, nisi à subiectis neruis, uenis, & arterijs metus est. Scirrhus cui sensus aliquis uel obscurus, ut magis minusue induruit, ita leuius aut efficacius auxilium requirit. Mulieribus, eunuchis, pueris, urbanis, ociosam atque umbratilem uitam degentibus, lenior medela: messoribus, fossoribus, duris omnino & laboriosis corporibus, fortior utilis est. In lenta & contumaci materia miscendum aliquid quod incidat, atque detergeat: quod in chordis & tendonibus facilitari solet. Tale est acetum mulsum, uel per se, uel in quo hyssopum, thymum, pulgium, & similia præcoxerint. Est et hoc animaduertendum. Scirrhus quidam simplex alius $\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\delta\iota\varsigma$, ut quædam inflammatio $\sigma\kappa\iota\rho\acute{\rho}\omega\delta\iota\varsigma$ est. Scirrhū malaclick & diaphoretick excuties: phlegmonem lenies et concoques. Vbi utrunque coijt, ut hoc uel illud superat, ita remedia temperabis. Leniter emolliunt
- Particularium materia.*

Olea malactica.

butyrum, œsypus, & lana succida: hæc oleo insuccanda amygdalino, chamemelino, in quo semē lini, althææ, fœnigræci: in quo maluæ, cucumeris agrestis, et liliorum radix, tenella maluæ agrestis, & liliorum folia, uel anethi caecumina præcoxerint: in quo illiquatum fuerit aliquid galbani, ammoniaci, bdellij. Lētiscinum, terebinthinum, mastichinum, usurpari debent ubi molliendum, digerendum, ac leniter repellendum. Hyoscya-
mino locus est in calida & iam durecente inflamma-
tione. Hæc ergo olea in lana sordida molliter appri-
menda sunt: hinc enim multò cōmodius malacticon im-
pones. Omnia uerò prius intepescere oportet, & fri-
gida omninò uitanda sunt. Expressa oleorum materia,
& cū adipe pista, malaginata confinges. In hoc quo-
que genere censentur, uitellus oui, crocus, cera pinguis,
caricæ pingues, καρέλας est duplo oleo, ut sit humi-
dissimum: equali, ut sit medium. Tam crassius est, quod
cere partes quatuor, & olei tres continet. Caricæ pin-
gues cum irinò tritæ, scirrhis hepatis & lienis opitu-
lantur. Id habet peculiariter scirrhus hepatis, quod
leniter mollicentia desiderat, mixtis aromatibus, quæ
calfaciant, & attenuent. Siræon est pinguibus caricis
ad melliginē coctis mollior, deterget, ac digerit. Adeps
& sebum, utrumque coquit, laxat, & mollior: quæ quia
materia undè generantur, genere animalium, & loco
ubi concresecunt, natura denique (nam adeps humidior
est) differunt, cum Aristotele distinguas licet: ut in na-
tura molli, adipe, in dura sebo potius utendum putes.
Rursus quia minimum est quod dissident, misceri pos-
sunt: uerum utrumque genus natura, & specie anima-

Siræon.

Scbū & adeps.

quia

quia hæc recentia, illa uetusta: alia syncera, alia condita sale, aromate, uel externa imbuta qualitate, distinguendum est. Lenissimus suillus adeps axungiam uocant, in qua mirum est, & experimento constare ueteres scripserunt, quod ea genibus adligata, redit in os sapor, ut etiam expui uideatur. Ex quo fortasse non unius hydrargyri qualitati, sed totius mixturæ ex hoc & axungia illitis in lue uenerea, os grauius exhalat, & salua madet. A suillo sunt utulinus, hoedinus, caprinus, bubulus: quibus si uis, uulpinum & leporinum adijcies. Atque hi leniunt magis, & concoquunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sunt hyemini, pardalinus, ursinus, & hi duriora corpora emolliunt. In medio sunt, taurinus, hircinus, ceruinus. In uolatilium genere efficax anserinus, anatinus, olorinus: siccior è gruibus, suauis gallinaceus, calidior columbinus. Ex anguillis & piscibus fluuialibus languet: humanus mediocriter ualet ad omnia. Domesticorum animalium pinguia humidiora sunt, ut suum, quam aprorum: è maribus sicciora & calidiora. Castrati mares foeminis respondent. E iunioribus humidior, è senioribus siccior est adeps. Pinguia oleo magis molliunt, & calfaciunt, etate tenuiora fiunt, & acrimoniam contrahunt. Purgatur adeps exemptis uenis, quas fibras uocant. Salsus uel conditus aromate siccior est: constat uero pepticiis & malacticiis aduersari, quæ rumium siccant: quanquam Plinius conuenire scribit salsam axungiam molliore magis. Id in suillo fortasse concedi potest. Recens adeps si desit, & uetus ad curam reuocandus est, lique fieri prius oportet, mox frigida sepius lauari: postremo etiam

Mirum de axungia.

Tres naturæ adipum.

Salsus adeps.

Vetus adeps recens fiat.

Medulle.

uino quàm odoratiſſimo . Eo modo ſæpius liquatur, cogitur, lauatur aqua, dum omne uirus exuat. Medulla in ſebalibus ſebo, in adipofis animalibus, adipe reſpondet: uiſcera, chordas, tendines, muſculos emollit. Ex oſſibus humidior, è ſpina ſiccior eſt. Prima laus ceruina, quæ nullis malaſticiſ inferior eſt: uitulina ſequitur, tum ouilla, & caprilla: acrior taurina

Secūduſ ordo.

quàm ut emolliat. Atque hæc leuiora ſunt. Durioribus naturis conueniunt: Ammoniacum quod aceto liquari poteſt, leniter decoquendum, ne efferueſcat. 10 Bdellium molle ac pingue ſaliua hominis ſubigitur, mollit, coquit, modicè digerit. Styrax idem efficit. Galbanum præter hæc ſepton, & anodynon eſt: reſpurgatur, liqueſcit uino uel aceto, neque coctionem ſuſtinet, hiſ efficacior opopanax. Ladanum mollit,

Emplaſtica eſſe oportet malag.

ac repellit. Propolis ammoniaco uicina eſt. Sint hæc omnia mollia & pingua, pro ſua quæque natura. Malaſticiſ reſinae commiſcentur, quia hæc emplaſtica eſſe oportet. Reſinae ſint, quæ acrimonia careant:

Reſinae.

Chia, larigna, picea, abietina, terebinthina. Pineæ nimium ſiccant, ſtrobilina acrior eſt. Bitumen, pix, aridior: in ſumma, quæ nimium ſiccant, quæq; acria ſunt, reiſcienda. Pix mollis & bene pinguis, qualis

Aceti uſus.

olim brutia, commiſceri poteſt. Succedit hiſ miraculoſum ex aceto remedium. Scirrhuſ malaſtico oleo fouetur, tum emplaſtico malagmate inducitur: idq; aliquot diebus repetendum, ſitq; initijs leuius malaſticum, poſtea etiam paulò efficacius, ac poſtremo aliquid aceti combibere oportet: ubi uerò mollior tumor extiterit, pyritem, lapidem molarem, aut ſilicem unde ſcintilla decutitur, candentem igne, acerrimo aceto demergeſ. 20 30

demerges. Exhalabit plurimus uapor, quo scirrhus aptè infumandus est, contestâ parte, & omnino præclusa uia, ne dissipetur fumus, sed totus in scirrhum coëat. Locum uerò satis infumatum oleo tepido fouebis, & ut prius, malagmate conteges: post dies aliquot aceti usum reuocabis, ut sit aceti & remediorum iucissitudo. Verùm neque diutius, neque sæpius haliatu aceti pars uexanda est, ne in lapidem concreascit, & nervosum genus grauius lædatur. Sed ut molliendo profeceris, ita acetum repetes. Et in malacticis usus similiter interpellari debet: primum enim è caricis, medullis, adipibus, cera & oleis, exigua resina, malagma conficies: Tum ut res succedet, ad ammoniacum & similia ueniendum: ac primum quidem citra acetum, post etiam cum aceto comparentur: quibus cum uno uel altero die fueris usus, ad ea quæ leniora, quæq; sine aceto sunt, redeundum: ut ueluti circulo quodam, & è re nata auxilia repetantur. In musculis & liene tutior aceti consuetudo est. In chordis & tendonibus neque diutius neque frequentius utendum erit. Ammoniacum aceto fustum manibus diducitur, ut sit luti crassitudo: Fermentum coquitur aceto, hepatis duro & lieni. Ac fortius acetum in quo tritum hyssopum, thymum, pulegium, & similia maduerint. E' lini semine hydrelæo cocto, & adipi mixto: altheæ radice arida trita, uel inde rasa parte medullacea, resinae momento mediocre fiet malagma. Πάπυρος recens (si quid phlegmones) inueteratum alioqui, Heræ & ueteribus laudatum est: Adipis suilli recentis

30 & bene purgati unc. quadraginta quatuor: cera unc. uigintiquatuor: ceruse, lithargyri, ana unc. sex: li-

00 iij quabilibus

Aliud $\omega\alpha\rho\upsilon$ -
γρον.

quabilibus fustis reliqua trita misceantur. Aliud: Lithargyri, ceruse, ana unc. tres: succi seminis lini, olei, ana unc. uiginti: ceree unc. octo: adipis suilli, unc. quatuordecim: Colophonie unc. octodecim: per-
nionibus, & callosis rimis calcaneorum competit. Διαλθαῖον, carbunculis, clavis, furunculis: lithargy-
ri, olei, ana lib. unā: galbani libræ dimidium: ceree,
terebinthine, ana libram unam: radicum altheæ fa-
sciculos quatuor: litharg. diu ex oleo teritur in mor-
tario, cera & terebinthina fusa commiscentur, po-
strems radices, tuse ligneo pistillo. concorporantur.

Διαλθαῖον ue-
terum.

Mnasee secun-
di ordinis.

Radicum altheæ & liliorum, ana unc. duæ, coquantur
in hydreleo ad aquæ consumptionem: tum & olei inde
expressi, adipis suilli, lithargyri, ana libram unam:
litharg. ol. coquitur dum non inquinet, & adeps com-
miscetur. Colophonie purissimæ unc. duæ: ceree albæ
unc. quatuor: mastiches unc. una: olei, quod suffi-
cit, ut sit iusta crassitudo. Terebinth. ceree, ana unc.
nouem: galbani, nitri, ana unciam: thuris pinguis
sesquunciam: medullæ cerui uncias duas: propolis
pinguis sesquunciam: olei taurini, sepi uitulini, ana
drachmas duas, uel eo plus, uehementer molliet, at-
que discutiet. Violentum quod sequitur, tantum ru-
sticorum, & iam præmolito scirrho: Caprinum ster-
cus solutum oxycrato, potentæ iunges, & affuso si-
uis oleo, cataplasma finges. Stercoris caprini unc.
duæ: radicis cucumeris agrestis, ficuum immatura-
rum, ana uncia una: staphiosagrias, bdellij, saria-
næ fabarum, amygdalarum amararum, ana drach-
quatuor: facis olei antiqui, quod sit satis ad emplæ-
strum. E' ueteri caseo ac iam putri, potentissimum
fit reme-

Διακοπράγλις
Gal. & Auic.

E' putri caseo.

fit reme-

fit remedium : Subigitur caseus è iure in quo suilla perna bene pinguis coxerit. Tophos mollit quasi miraculo coctum nudum desquamatum, cum myrrha

et aceto tritum. Διὰ χυλῶν, Aquæ sext. uiginti

Διὰ χυλῶν.

(Orib. duodecim) radicum altheæ recentis, lib. tres.

(Orib. quatuor) scængræci, seminis lini, uncia nouē:

(Orib. unc. octodecim) radices purgatæ, tusæ, diem

integrum macerentur aqua, postridiæ scænumgræcum

lotum fideliter et purgatum adiicitur, tertio lini se-

10 men similiter lotum eadem aqua, in qua reliqua etiam-

dum madent, immergitur, quarto die coquuntur omnia

ad crassitiem, tum expressa et traiecta colo materia

usui seruator. Iam uerò 12. ol. pinguis æstate lib. se-

ptem et semis. hyeme lib. quatuor : succi prioris lib.

quatuor : mixta in primis coquito, dum bullæ extent,

tum litharg. triti lib. duas sedulo commisceto, agitato

bene puro foco, bullire finito dum non inquinent, et

medicamentū colorem flauum iucundumq; trahat. Hoc

sublatum igne conuoluito rude, manibus subigito, in

20 pastillos fingito : Vsus tempore 12. pastillorum unc.

duas : ceræ, olei, ana unc. unam, colliquato. Potest medi-

Vt medicamentū

Διὰ χυλῶν.

camentum alijs malaclicis uniri, tam efficax, ut hoc

unum sine alijs chirurgus satis esse possit : glutinat su-

perfacialia ulcera solutum rosaceo, uel myrtino : aliās

implet, et cicatrice tegit. Liquatum chamæmelino,

uulnera neruorum inflammatione liberat, podagricis

quouis tempore opitulatur, ueteres uteri phlegmonas

perfanat inditum pessario. E semine lini, scængræ-

Διὰ χυλῶν

Oribasij.

ci, hordei, radice altheæ, ut prius maceratis, coctisq;

30 succus exprimitur : tum libris duabus succi, adduntur

litharg. olei, ana libræ duæ : ceræ unc. octo : lithargy-

rūm cum oleo diu teritur, et cū cerā leniter concoquitur, infuso oleo: postremò succus adijcitur, uersantur omnia, & sedulò cōmiscentur. Sunt & alia Διάχυτα malagmata, ut Alexandri ē psyllio, quod Aëtius describit: & magnum Mesuæ ad strūmas sine gummi, & gummosum quodq; paruum, album, & magnum, passim cōficiuntur. Paruo utendum in duris inflāmatiōibus, album mediocres scirrhus adiuuat, magnū reliquis cōficacius est. Est & διάμελιώτης ueterum & recentiorum dialtheas de muscillaginibus. Oleo ē maiorana & sicyonio, alijsq; id genus molliiri possunt, & adiectio galbano, & similibus, fortiora reddi. Priuatim conueniunt duris inflāmationibus mammarum, uiolaria & altheæ folia hydrelæo cocta, adipe uituli conteruntur ouorum uitelli duo, infecta croco commiscentur. Hædina capita, ueruecini pedes cum althea & uiolaria percoquantur: in expresso succo, oryza bene munda, & asperiore linteo attrita, decoquitur: butyrum recens iniicitur: postremò cū iam corpora lenta pulcra est, ouorum uitella croco tincta commiscuntur. Plura malagmata ex septimo de compositione pharmacorum κατὰ γένη, & decimoquinto Aëtij describuntur. Sed octauo κατὰ τὸ πρῶτον alia sunt, quæ siccant, contrahunt, indurant, nec emolliunt: quanquā malagmata & Asclepiadi, & Andromacho appellata. Quæ uerò malafrica, corpulenta & emplafrica sunt, si neque dolor, neque phlegmone prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo subijciatur malagma re mollitum pingui uel oleo, ne celerius exarescat: tum enim reuellendum est, & aliud imponendum: alioquin pluribus diebus hæcere conueniet.

Malagmata quæ
usurpanda.

De suppu-

De suppurantibus. Cap. V.



AM hoc genere utendū nobis est, cū ab alijs remedijs desperatio est, ac ferē maiores phlegmonæ suppurant, pulsant, dolent.

Quando & ubi praecepit utendum.

Dum pus conficitur, inquit Hippocrates, dolores sūt ac febres. Suppuratis, omnia ferē conquiescunt. In sugillatis hæc eadem remedia sepe conueniunt. Sunt autem natura modicē calida & humida, iisdem limitibus

Natura suppurantium.

10 circumscripta, quibus temperiem hominis definias.

Ideoq; eligenda materia, quæ naturæ corporum elementari familiaritate consentiat. Emplastica sunt διαπυϊπικὰ (sic enim hæc appellant ut ἐκ πύϊπικὰ & πεπτικὰ)

ἐκ πύϊπικὰ.

ut præclusis inde spiraculis, natium calorem inhibeas, in quo cōcoquentis naturæ robur est. Ita substantia quidem calor augebitur, neque qualitate crescet: solidæ partes confirmabuntur, insitus humor saluus persistet: dissipabitur uerò, qui inanibus spacijs alienus est. Ex quo uitium concoquetur, & consuetudine

20 ne partium similariū exalbescet, fietq; tandem pus album, lene, & uniforme: quod quia alimento esse non potest, exesa cute uias sibi faciet, atque ita effluet.

Nō absimili ratione χαλαστικὰ uocata, ἐκ πύϊπικὰ

χαλαστικὰ sūt ἐκ πύϊπικὰ.

fient, si accefferit crassities partium: eodem modo quæ leniunt, calfaciunt, & adstringunt. Emplastica modicē calida, omnia concoquunt. Præit in ijs, quod est tenue: reliquum uerò uel contacta, uel illita cute uias intercipit, ne quid spiritus exhalet. Contrā uerò si expirat calor, nec emplastica materia est, nihil suppurat, &

30 aliquandò alienus calor succenditur, undē putredo.

Echecolla per se hærent: reliqua uerò uel gummi, uel resinis

*Malactica quo-
modo differant
à pepticis.
Vitanda.*

resinis implicanda, uel commodè alliganda sunt. Mala-
ctica calidiora sunt & leniter siccant, insitumq; humo-
rem paulò minuunt: quo nomine à pepticis distinguen-
da, ne similitudine fallant. In pepticis uitanda, quæ de-
tergent, & uehementer calfaciunt. Nihil enim quod
ualde discutiat, pepticum est: & quod deterget, poros
expurgat, quos illinere oportet. À siccantibus metui-
tur, ne frugi materiam exorbeant: multò magis, si præ-
tereà calfaciant. Neque uerò contra nos faciet, quòd
in hystorijs medicorum permulta peptica sint, quæ
mixtis diaphoreticis, deterforijs, atque siccantibus tem-
perantur. Qualitas enim rerum mixtura retundi po-
test, & multa uitia eodem tempore interdum coeunt,
unde uaria misceri necesse sit. Ac sepè facit abscessus
natura, ut acria etiam misceamus. Peptica sunt, aqua
temperatè calida affusa parti: modus est, ut inde eru-
bescat locus ac leniter extumeat. Nimum fit, si inde
subsudet, aut expalleat. Hydrelæo, & oleo pingui ac
dulci, modicè calido, & butyro similiter utendum est.

Materia.

Aqua.

Oleum.

*Triticum, fari-
na, panis.*

Triticum ore præmansum, saluaq; hominis commoli-
tum rusticis corporibus conuenit: leniora sunt, farina
tritici, & inde panis, perpurcata fursure, dissoluenda
aqua, oleum uel butyrum additur: coquuntur omnia ut
sit cataplasma, quod lenit inflàmationes uulnorum, &
celeriter maturat. Vbi calor aliquis superest, minus co-
cto pane ac recenti, quem uel hydrelæo, uel pauciore
oleo insperferis, utendum erit. In contumaci uitio, sed
minus calenti, panis siccior ubertore oleo molliri de-
bet. Panis conditus sale, efficacior est. Farina hordea-
cea per se inutilis, uerùm quæ bene purgato grano ex-
tunditur, & castratur fursure, eodem modo quo triti-

*Farina bor-
deacea.*

- cea comparari potest, hydrelæo cocta, confersa oleo, mixta butyro: sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis conferet, præsertim hydrelæo cocta. Tale fuit cataplasma ueterum ὠμὴ λυσις, uel ὠμὴ λύσις ex farina hordei, quod prius tostum non fuerit: quam etiam licentia quadam ad alia farinarum genera nomen translulerunt. Est & alia ὠμὴ λυσις ex farina hordei, scenigræci, seminis lini, in sapa coctis ad glutinis corpus, adieclis interim duobus uel tribus uitelis. Adeps suillus phlegmonæ familiarissimus, deinde uitulinus. Taurino & caprino in duris frigidisq; tumoribus utendum est. Leoninus, & reliqui huiusmodi, inutiles. Gallinaceus, et hoc paulò acrior anserinus, usurpari potest. Pix & resina in feruenti phlegmone, rosaceo, in frigidiore, uetere oleo, Sicyonio, uel simili liquanda sunt. Pix arida, qualis Coracina & Colophonina, uberiore oleo dissoluitur: pauciore, quæ liquida est: mediocri, quæ natura mollis, digitis cedit, lentoris particeps, qualis olim Brutia & Lycia. Picatum ceratum, & anodynon, & pyopæon est, ideoq; inflammationis ulceribus conuenit. Resina sit terebinthina, & lentiscina. Cera languidior, resina acrior, confusa ad suppurandum ualent. Eluanter prius, si quid acrimoniæ conceperint: molliantur oleo, uel butyro, cum exaruerint. Oesypon ueteres in pepticks censuerunt. E flore lilij succus exprimitur, suppurationes concoquit, & uulnus mollit, quod mel, & syrian ueteres appellarunt. Syraeon uerò melligo è coctis caricis, detergendo & molliendo idoneum est. Decoctum caricarum lenissimū est, quòd maximè coquit ac digerit: In aquæ sextarijs sex, pinguium caricarum lib. quinque decoquēde, dum sextarij

.n. 22. 10. 10

ὠμὴ λυσις.

.n. 10. 10

.n. 10. 10. 10

Adeps

Pix.

Picatum cera-
tum.

.n. 10. 10. 10

Syrian.

Siraon.

Decoctum ca-
ricarum.

Cataplasmata.

111976

Crocus.

Melligo passæ
uuae.Efficaciora
remedia.

111977

111978

Loco nitri.

Tetraphar-
macos.

sextarij duo reliqui sint: magis maturabis, si inde pi-
 fla farina triticea, cataplasma finges. Vbi uerò dige-
 rendum magis ac refrigerandum, bordeacea melior
 est. Eodem modo. altheæ decocto, & uuae passæ succo,
 farinas uel panem purissimum incoques, & inde ca-
 taplasmata intinges croco. Crocus coquit, & leni ad-
 strictione confirmat partes, & poros contrahit. Pin-
 guissimas passas, exemptis nucleis, per noctem aqua
 macerabis, postridiæ coques ad melliginem. Inueteratis
 & callosis tumoribus conueniunt, colla librariorum 10
 quæ sit è purissima farina, uiscum aucupatorium, sty-
 rax pinguis, ladanum, galbanum, thus in corporibus
 temperatis molle, album, pingue, dumq; manditur, mini-
 me friabile. Rhodinum & myrteum in calidioribus & do-
 lenti phlegmone misceri possunt, ut pix, resina, uiscū,
 colla, & similia: ubi peruitax malum, & platysmata
 diutius hæere necesse est. Miscentur quoque stercus
 suillum, columbinum, caprillum, nitrum. Et iam notum
 mulierculis remedium, pueri stercus calidum, duris &
 inflammatis mammis, alijs quoque partibus imposi- 20
 tum. Certum experimento est, breui tempore conco-
 quere: ac in sceditate excrementorum auxilia inuen-
 ta sunt. Furunculos & parotidas mollit ac suppurat
 cataplasma è coctis ficibus, calce, iridis radice, uel ni-
 tro. Omnino si nitrum desit, sale torrefacto in mollio-
 ribus: usta fæce uini, uel aceti, quæ acrior est in durio-
 ribus, utendum erit. Fæx sit recens, nam celeriter exo-
 lescit: uulgo etiā nota est medela è cepis sub cineribus
 coctis. Tetrapharmaco ueterū primas tribuit mouen-
 do puri, non aspernabilis autor Cornelius Celsus. Idē 30
 remedium à Græcis suppurando usurpatum: Constat
 pice,

- pice, resina, cera & adipe: usus tempore, oleo, uel buty-
 ro subigitur. Pix sit mollior, resina friela, uel Colo-
 phonia; quæ in teneris corporibus oleo moliri potest:
 cera pinguis, adeps in mollibus naturis, uel suillus, uel
 uitulinus in durioribus, taurinus, uel hircinus. Hoc te-
 trapharmacum Paulus basilicon, Scribonius empla-
 strum Aristi nigrum appellauit, & aliud basilicon
 descripsit. Tetrapharmacum thus additum facit Ma-
 cedonicum, quod & pepticon est. Basilicon minus, hoc
 10 imbecillius commutato adipe in oleum; quanto adeps
 oleo efficacior est. Sic oleum quoque, uarie commutare
 licet. Oleo rhodino, myrtino, uel simili, tetrapharma-
 cum, durius molliatur, ut corpus & affectuum natura
 exigit. Mirabile hoc ad molliendum & suppurandum:
 Cera, cerebintina, medullæ cerui, adipis uituli, anseri-
 ni, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosarum,
 myrrhæ, ana uncia una. Myrrha cum melle subigitur,
 & prunis leuiter incoquitur, ex quo reliqua adiecta se-
 dulo misceantur. Picis unc. una: cera unc. tres: axun-
 20 giæ ueteris purgatæ unc. sex: adipis taurini, æsopi, ana
 unc. tres: resinæ pineæ uel magis piceæ unc. quinque:
 liquatis utitur. Resinæ unc. duodecim: cera, eruginis
 rase, ana unc. 8. sæpi uituli unc. duæ: aceti, mannæ,
 ana unc. 1. manna & erugo cum aceto liquantur &
 conteruntur, reliqua dissoluta commiscuntur: molli-
 coquit, purgat, digerit. Ceparum & alliorum cocto-
 rum in cinere, ana lib. unam: uitellorum numerum qui-
 narium: radicis lapathi coctæ lib. dimid. farine, foeni-
 græci, unc. tres: fermenti unc. duæ: axungia lib. unam:
 30 fiat corpus: in frigidis & crassis humoribus conuenit.
 Locus oleo peptico, succo, uel hydrelæo foueatur. Sym-
 pepticon

Macedonicum.

Viride Andro-
macbi.

Vtendi modus.

pepticon medicamentum inducatur, mollis flupa, uel lana succida superponatur: omnia decussata fascia colligentur, ut qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affectum locum opprimas. Semel in die uel rarius commutari debet, nisi uel dolor urgeat, uel pharmacum exarescat. Ita uero formari sympeptica oportet, ut neque liquidiora diffuant, neque corpora lenta nimis locum opprimant. Iustum corpus est ceroto malagmatum & emplastrorum, ac quod ante dictum est ἐχνομα & glutinosa esse melius est, ut per se sine uinculis hæreant: quanquam & emplasticis lanam succidam, aut mollicula splenia superdari, & omnia colligari nihil prohibet, idq; hyeme magis & frigore.

De aperienda uomica. Cap. VI.

Noxa suppressa saniei.



QUAE SUPPURATIO sponte sua non rumpitur, ferro, igne, uel medicamentis aperienda est. Alioqui serpit sanies, & cuniculos agit: uenas, neruos, arterias, & uicina corpora depascitur: atteruntur ossa, & cariem ducunt: liuescit cutis, & in rugas quasi senio marcescens contrahitur: idq; metuendum magis in digitis, articulis, partibus corporis, quæ in decliue patent. Sic enim parotides semorum, abscessus in fistulas cauantur, & quæ facile putrescunt, qualis anus est, os, & loci genitales. Quare etiamsi tumor nondum satis maturuit, ea pericula ferro anteuertunt, multo magis si pestifera aut uirulenta materia, uomica includitur: quanquam animaduertendum, ut ne nimis citò. Nunquam enim uis naturæ gratis inferenda est, sed semper aliquid beneficii, nihil

- nihil maleficij proponi debet. In uomica quæ tardius erupit, membranæ, neruacea corpora, & alia semiputria sæpe occurrunt, quæ nec intempestiuè rescindenda sunt: sua enim putredini maturitas est: alioqui noua inflammationis & conuulsionis pericula creari solent. Neque perpetuum est aperire ui, quod suppuratum est, sed si nullum in mora periculum apparet. Diaphoreticum remedium imponendum, quo loco mollior abscessus est, & digito cedit: sic enim sanies exugi potest. Idq; faciendum magis, cum alta parte uomicæ, non decliui, suppuratio se colligit. Quod si ferro, uel igne utendum est, prius animaduertere oportet, ne quod uas insigne, neruus, tendo, uinculum: ne quid neruosum, quales membranæ quædam sunt, aut potius lati tendines conuulnerentur. Parcendum etiam quibusdam partibus, quæ uegetius sentiunt, & à quibus uis ignis ad principia transeat celerius. In musculis fibrarum interstitia cultello ligneo, uel digito diducenda, ne fibræ præcidantur: idq; cum in profundo sanies resedit. In
1. his omnibus anatomica disciplina opus est. Cauteria Vbi cauteria periculosa. periculosa, occipitio, temporibus, & ubicunque caluaria mollior est, ubicunque uel exitus neruorum, uel aditus uasorum est: nec ea ipsa oculus sustinet. In crâ- In capite. nij fracturis, ubi modiolis, cycliscis, terebellis, uia parari fit, à futuris neruorum radicibus molliori osse ferrum declinamus. In strumis, & colli abscessibus, à carotide In collo. de arteria, uena sphagitide, uocali neruo abstinendū. Illinc hæmorrhagia, quam agrè suppressas: hinc uel omnino mutus, uel certè semimutus homo relinquitur.
3. Extérieure parte humeri tendo est, qui ignem ferrumq; non sustinet. In empyicis & deploratis pleuritidis, In exteriore humero. In mesopturijs.

scalprum & cauterium inferiore parte mesopleurij collocamus, quia uidelicet superiore uena, arteria, neruus est. In extremis ilibus multi sunt tendines, multa uasa coeunt, ex quo uomicas hac parte prudenter aperire necesse est. Inuritur carnosus podex, & ferrum sustinet, non ita, quod illic neruaceum est. Eadem ratio in genitalibus seruari debet, ubi ab arterijs cauendum, quae illuc plurimae coeunt, hiantq; maioribus clausulis: nam inde haemorrhagiae non ita facile supprimuntur. Sub natibus neruus est, qui si iuxta suppurationem, praeciditur, aut nudatus uiolatur frigore, subiectum crus stupidum relinquit. Idem animaduertendum in reliquis partibus, ne nudi maneant nerui, & frigore contrahantur. In bubonibus glandulae sunt, quas perreptant uenae & nerui. Ideoq; si quando inurendum, apprehendenda prius cutis est, & in uulneribus quae ferro fiunt, eadem ratio seruari debet. Hoc reliquis partibus commune est, quibus subiectae uenae, nerui, & arteriae. In articulis perpetuo suspectus ferri & cauteriorum usus. Ideoq; ischiadicis inferiore parte quam malum est, ignem adhibeamus: in perinaei tumoribus qui inciduntur, summo opere cauendum, ne quid intus uulneres, quod postea egerrime glutinetur. Haec omnia pericula facile declinabit, & alia, quae breuitatis studio omissa sunt, quisquis in anatomicis operibus fuerit exercitatus. Alioqui saepenumero errare necesse est. Et quia non semper similiter sed uariè, nerui, uenae, arteriae, in corpus diducuntur, si quid è profundo rescindendum ferro, lente quidem, & perpetuo duce oculo culter dirigendus est. Id quod in strumis, & ubi pus altius desedit, facere oportet. Primum ergo

ergo cutem nudabis, si quid uasorum aut nerui occurrerit, id ipsum digito, uel ligneo ueruculo separandū, distinctis fibris, nec ita momentaneis membranis, quibus illa inter se coniugantur. Atque ubi ad locum peruenis, in quo colluuius latet, & iam omnia tuta sunt, opportune parti gladiolum infiges, & ita uomicam repurgabis. In reliquis uomicis uidendum, ut quantum oporteat, culter descendat. Profundius uulnus hæmorrhagias comouet: superficiale sæpenumero frustra est.

- 10 Eodem modo cauterium superficiem exurit, uel al- Cauteria.
tius imprimitur. Et hoc quidem in molliore corpore mollius, quale è subere, & quibusdam radicibus con-
fingi potest. In metallicis aureum æneo & ferreo cle-
mentius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectū uerò, Figura uulne-
tum.
an trāsuerſum, uel obliquum uulnus esse debeat, figura
partiū, flexus, rugæ, fibræ, primū indicant, quæadmodū
conſiliū iuuant ſubiecta uafa & corpōra: propterea in
collo, qua parte eunt uena, arteria, & neruus, rectum
magis quàm tranſuerſum adigitur: alioqui trāsuerſum
20 melius. In frōte è rugis tranſuerſum ſit, nec ita profun-
dum, quia mēbrana ſubeſt: alijs rectū placuit magis. In
inguinibus è flexu tranſuerſo ducitur: duplex interim
angultum, & oblongū in myrti ſoliū. In uentre, niſi ſle-
xus prohibeant, ut ſunt fibræ mufculorum. Eodem mo-
do in reliquis. Simplex aliquando ſufficit decliui par-
te, duplici aliquando & trigono opus eſt. Atque omni-
nò ea parte ſcalprum imprimatur, quæ mollior digito
cedit, magis acuminatur: & quā commodiūs ſanies ef-
fluat, ὡς ὁ γῆυστις appellant exanitionem: uel ut alij, ὡς ὁ γῆυστις
ἐπιδιαίρεσις.
ἀντιδιαίρεσις.
30 exanitionē, in qua et ἐπιδιαίρεσις eſt, et ἀντιδιαί-
ρεσις. Nam ubi propenſa parte foramen eſt, facile

purgatur sordes: ubi uerò in sublimi, resistare solet,
 deorsumq; subsidet, & sinuat: siquidem uomicosa pars
 nequeat pro arbitrio commutari: quale est in trunco
 corporis, ac ferè capite, & parotidibus. In manu &
 crure, etiam si altius os ulceris positum sit, poterit ta-
 men ita inclinari, ut sanies liberè excurrat: tumq; ma-
 nus quidem è mitella suspendi debet, ut carpus gibbe-
 ro sit altior. Crus autem puluino innitatur, sublato ge-
 nu & decliui in coxas femore. Vtrumque ea ratione
 collocandum, ut sine dolore ita persistat. At si cui par- 10
 ti id denegatum est, nec ea potest pro libidine conuer-
 ti, aduersa parte uulnus inferendum, quod αὐτιότολ-
 γεσσι appellant. In alijs quoque manu & crure, quæ
 commodè inuerti possunt, quum sinus longior, cunicu-
 losum ulcus, sordes uberior, etiam aduersa parte lan-
 ceola immittitur, ut duplici exitu dato, uitium celerius
 expurgetur. Est cùm ab ore ulceris ad fundum ducto
 gladiolo tota cavitates detegitur, ut in fistulis: nonnun-
 quàm angustius orificium ferro ampliatur, aut quod
 amplum quidem sed rotundum, aucto uulnere in lon- 20
 gum, aut aliter deformatur. Sed hoc non tam purgan-
 do, quàm glutinando fit. Quibusdam locis plurimæ
 concurrunt arteriæ, plurima uitalis spiritus materia
 est. Hic paruo uulnere contentus eris, ne confertim ac
 semel erumpente sanie, simul magna uis spiritus dis-
 fluat, unde animi deliquia, & nec opinatæ mortes con-
 sequantur. Et hæc quidem de ferro & cauterio in ape-
 riendis uomicis breuiter dicta sint. Reliquum est, ut
 eodem compendio de medicamentis quæ aperiunt, di-
 camus: quibus ideò utendum, quia mollior ager est, 30
 quàm qui uel ferrum, uel cauterium sustineat: quan-
 quam

Cautio.

Medicamenta
aperientia no-
mias.

- quàm medicamenta hæc, cauteria quædam sunt natura quidem caustica: ideoq; à quibusdam ueterum cauteria frigida uocata, à recentioribus potentialia. Cauteria quidem, quia re uera urunt: frigida, ut ad ferrum & similia quæ igne rutilent, comparentur. Neque tamen sic urunt, ut quæ caustica & septica postea describentur. Theriaca igitur adhibita, uomicis aperit: urtica semen è uino tritum, frangit, purgat, incarnat, cicatrice tegit. Caulium radices usæ, tritæ, & uetere axungia exceptæ: ita & radices caninæ, uolutis ostracodermion, & testis prius crematis: adeps collectus è ranis uiridibus arboreis, lac ficulneum & tithymalli, cantharidum puluis, batrachij caulis & folia, caninum stercus album tritum, terebinthina uel adipe uetere concorporantur. Melligo anacardina similiter excepta. Sed hæc ita insillere oportet, ut aperiant, nec crustas ducant. Mixtum est: Facis cremati uini unc. duas: fimi columbini, propoleos, salis torrefacti, æruginis, ana drach. tres: aquæ marinæ, uel in qua subduplum sal illiquauerit, unc. unam: olei antiqui, aut feruescenti, unc. duas: aridas seorsum tridito, æruginē, facem, sale in mortario simul terito: tritis in puluisculum aquam conspergito, & iterum oleum misceto; ut fiat unum corpus. Ex quo fictili uase placido igne omnia coquito, dum tota exhalet aqua: postremò præmolitam propolim imposito: & ubi sublata igne paululum refrixerint, columbinum fimum inspergito, pusillæ plagulæ & oblongæ, quantum medicamento opus est, inducito, & conuenienter adaptato: tum amplius splenium
- 3 malagmate illitum superdato. Fimi columbini, nitri, ana drach. quatuor: caricæ septem: quibus arida trita
- P P iij commisceto,

commisceto, ac bene pinquito, inducitoq; ut prius: quod si durius medicamentum uidebitur, purgatam axungiam & mel coniungito. Arsenico, puluere angelico, uel uocato mercurio, prudenter utendum est, ut habeatur ratio corporum & uomicarum. Excipiantur butyro, axungia, terebinthina, uisco. Superponendum folium ex ijs quæ leniunt, uel molliunt: alioqui splenium epicrastico, uel malactico illitum. Obseruandum in usu horum medicamentorum, ut æstus uomica, & phlegmones acquiescat: ut quantum uulnus esse uelis, tantum splenium constituas, in quo aperiens pharmacum positum est: uidendum ne uenam, neruum, arteriam uioles, ne diutius relinquas. Quod si dolor acciderit, non committendum diutius ut uexetur ager, sed statim reuellendum pharmacum, & leniendus dolor est, pauloq; clementius agere oportet. Minus uexabit pharmacum, prius fota parte laxante remedio. Epicrastico iam facto uulnere, temperandus calor. Plura libro decimoquinto Aëtij, & capite de pyroticis.

De purgantibus. Cap. VII.

Ratio purgandi.



REQVITVR, ut purges. Ac si uomica dehiscit foras, neque fistulosa est, molli foculo uel linteolo, tum sinum ipsum, tum labra ulceris expurgabis: deinde medicamentis in concepto linamento cauum implebis, dum rubens, ac nimium neque siccum, neque humidum cauum extiterit. Quod si non ita expositum uitium est, sed intus latet, difficilior cura est. Et si quidem capite includitur, neque per aures, nares, uel aliter diffluit, modiolis, cyclifco, ac terebillis

ac terebellis patefacere uiam oportet. Ad thoracē unica ferē uia est, ab ore per asperā arteriā, nisi uulneris orificiū in superficiē ueniat: hīc pyulcis, collyrijs, succu, suppuratio exorberi potest: ijsdēq; machinis, uel melicratū, uel aliquid tale iniicere licebit, ut aliquid spiritus repurgetur. Ad uentriculum, & intestina prima per gulam aditus est. Clysteribus intestinum crassius expurgabis. Medicamenta uerò καθαρτικά detergeant modicē, & siccent. Detergenda sordes, quæ cor

Καθαρτικά.

10 ruptela corporis concrescit. Exiccanda sanies, humidumq; recrementum, quod statā naturæ lege ab alimento partis reliquum fit, aut aliunde illabitur: ac ἐμπύριον peculiariter appellant, quibus uis purgandi data est. Vitanda quæ adstringunt, undē sordes per tinaciū inhereat: quæ laxent, undē robur partium elangueat: acria, ut quæ colluue sordium cauum impleant. Sale, et eadem materia idē abstinendum, quia ut detergent, adstringunt tamen, & sordes impingunt, ac sepe numero uellicant. Hæc autem ita inaudi-

Triplex excrementum ulcerum.

Vitanda.

20 re necesse est, si non serpit ulcus, atque putredine uicina depascitur: si non est callus, aut aliquid tale undē consilium euariet. Ut sunt corpora, & sordes ulcerū, ita qualitas remediorum distinguere debet. Adde quod uel recens, uel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque sordido, neque humido, parti prætereā sensus acrioris leniora auxilia conueniunt. In contraria conditione, contrarijs consilijs locus est. Quod si pars aliqua apostematis maturuit quidem, & pus reddit, alia uerò cruda est, huic sym-

Scopi distinguendi remedia.

Anima. luerendum.

30 peptica, illi cathartica: si quid durius, illic malactica: si quid phlegmonodes, lenientia, suis quæque locis eodem

De ratione
abluendi.

tempore accommodabis. In purgando plurimum ualeat recta abluendi ratio, de qua obiter dicendum est. Vbi ergo molli uellere, uel linteolo sinum & labra exteferis, si præterea abluas, magnoperè curationem adiuuabis, ut ad cætera per se natura sufficiat. Itaque si sanies acris est, sero: si copiosa sordes, melicrato: si multa simul, & acris, sero in quo sacchari ocluplum, uel tantundem mellis diffusum sit. Cùm iam coeperit cauum esse purius, œnomelite: post etiam uino è dulci austriusculo utendū erit. In foetido sinu putri et cruento, oxycratum conuenit. Acetum, oxymeli, œnomeli, dilutum marrubij, absinthij, aloës, myrrhæ, pauculo conditum melle, putredines efficaciter iuuant: & assato melle uti, melius fuerit. In fluxis, humentibus, & malignis ulceribus, ex atramento sutorio, & caricis in cinerem uscis, puluisculus œnomeliti inspergitur. Nec improbandum ligni sancti remedium. Alij œnostagma probant, quia siccatur, & putredinem prohibet, cui aliquid mellis infundere licebit. In nomis, phagædenis, chironijs, & omninò malis ulceribus, ueteres usi sunt ijs, quæ & detergeant & adstringant: sed hæc rectè diluas, ut liquida infundantur. Ideoq; aqua aluminosa, uel in qua malicorium, myrta, cæteraq; eiusmodi coxerint, usurpari possunt: uerùm melius fuerit detergente materia prius expurgare, quàm adstringentia iniicias. Lixiuium è calce sæpius elota terget & siccatur, nec sine re laudatum est. In callofis, ægrè coherentibus, cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithymalli, alijsq; id genus lixiuia fit, qua quotidie sinus perfunduntur. Cancerosa adimit, quæ è sansa, id est, oliuæ nucleo comparata est. Aqua è larigna destillata, & resinis eius

nis eiusmodi detergendo idonea est. Melicrati, & eorū
quæ mel uel saccharum recipiunt, modus est, ut sit de-
cupla, sexcupla, uel octupla aqua: dilutione uti oportet-
bit, cum iam purior sinus est: in sordidiore, acrius con-
uenit. In ulcere satis exposito linteolum prius insuc-
catur, leniter exprimitur, insinuatur cauo. Humidiori,
exactissime triti puluisculi insperguntur. Sicciori, &
quod sorde offarctum est, emmota uel sine tiltis phar-
maca mollia imponuntur: ex quo bene carminato uel-

Cathartici quo
modo utendum.

Amulet. Amulo N
Amulo ad

1^o lere, os ulceris obstipandum est: deinde superponenda
mollis spongia, uel quod Syriaca, & iam uulgari lin-
gua cotton, appellatur. Alioqui luteo aliquoties in se
conuoluto, tota ulceris regio contegenda est. Atq; hæc
omnia uino inculcabis, & expressa inijcies. Postremo
artificiosè colligabis. Omnino tamen cauendum erit,
ne quid durius aut grauius ulceri incumbat. Postea
uerò quam tempus redierit, in quo uincula soluantur,
atque reuellantur indita cathartica, recognoscendum
sedulo, quanta, qualisq; sordes fuerit. Si enim minor

Probatio medi-
camenti.

2^o appareat, bene est. Optimè uerò si purum ulcus est, &
iam aliquid carnis succreuit. At si solito magis sorde-
scit, ita distinguendum est. Nam si caultas maior, nouus
calor & dolor adfuerint, id acriori medicamento at-
tribues. Temperabis ergo cerato rosaceo, si maior ca-
lor est: si uerò flaccidū ulcus apparet, myrtino. Quod
si nihil horum extiterit, magis tamen obsoruerit ul-
cus, imbecillius catharticum adiecto melle tempera-
bis. Et si humidius, siccantem pollinem sine mollibus
insperges. Aliquando uerò nimium siccando, & contra-
3^o ctum & exuccum ulcus reperiēs, qua in re siccantia
humido dilues. In summa, iustam pharmaci qualitatem
asimabis,

Amulet.

æstimabis, si purum ulcus inde redditum est, si naturaliter sentit locus ulceris, qui sensu præditus est: si modice rubet, ac nimium neque siccus, neque humidus est. At quicumque sensu caret, si non naturaliter sentit, si nimium aut aridus aut flaccidus est, si pallidus, albidus, liuidus, aut niger est, is nondum purus est. Accedit aliquando ad sordes ulcerum, ut etiam vermiculenta, quo tempore aloë cremata inspergitur, ueratrini album cum melle, polij & absinthij puluis cum pice imponuntur, uel nuclei perfici è persicariæ succo pisti: 10
 plantago arefacta, centaurium minus, marrubium, calamyntha, porrum, & similia usurpantur. Arida teruntur, uel inde exprimitur succus. Eidem rei lixiuium conuenit, urina, tilia denique imbuta ieiuni hominis salua. In cancerosis, canceri fluuiatilis cinis cum cadmia, aut cerato inditur. Irionis semen conleuigatum melle, lens cocta cum melle: mel in tegula torrefactum, & solani succo madidum, oleæ uirentis surculi exucati, malicorium ustum, aizoi succus, umbilici ueneris, solani, intybi, lactucæ, psyllij, omphacis, attriplicis. 20
 Exprimere oportet, diu trita materia pistillo & mortario plumbels. Eodẽ modo trita pompolyx diu conuoluitur, affuso succo qui conueniat. Floccus, aut vermiculus iisdem succis madidus imponitur, ac sæpius repetitur, ut succi frigus contineat. Sed hæc ad accidentia ulcerum magis pertinent, quamquam & quedam in his cathartica sunt. Repurgant tincta melle linamenta, aridum mel quod melitæis uasis inhæsit, quodq; in tegula crematum est: mel rosaceum, quod & alieni calorem attemperat: serum lactis, terebinthina cum melle 30
 & rosaceo pari mensura. Eadem cum butyro nerui utilis est:

Vermiculantia ulcera.

Cancerosa.

Materia.

lis est: lique fieri oportet, & unâ cōmisceri. Iris serpen-
tibus & plenis sorde, mārubiij succus conditus melle,
ærugo lota, caprinum stercus exustum & è uino pi-
sum desperata sanat. Maligna curat dracontij radix,
colligitur sub caricula, siccatur umbra, aliquot post
diebus secta in taleolas, filo traicitur, atque ita pen-
dens umbrosa domo, asservatur: usus tempore trita in-
spersgitur: melli mixta uel cerato, ne acrior sit, imponi-
tur. Ex eadem radice cerusa facititia clementer pur-

Radix dra-
contij.

10 gat. Cicer, orobus, faba, hordeum, fresa omnia, & melli
infriata. Lupinus uetus, tritus, & inspersus, maligna
tibiæ ulcera purgat, implet, cicatrice claudit. Te-
starum, & uoluminum crematorum, cinis eorum quæ
ὄστρακον ἐσθλόν . Erinacei cinis, amygdala, stœchas,
anagallis, aristolochiæ radix, gentianæ, cyperi, urticæ,
semē & irionis, humidioribus, cæcrosis, putrilaginosiss,
gangrænosiss, mirificè profunt. Dipsaci radix in cinerē
usta, eadem ad melliginem uino cocta, & pyxide ser-
uata. Radices solani, cortex, herba, succus, cacoëthe

Lupinus.

20 iuuant, & nomode ulcera. In summa, quæ nitrosa, &
amara: quæcunque ita detergent & siccant, ut nō mor-
deant, non adstringant, purgandis ulceribus idonea
sunt. Arsenicum, & quæ ex hydrargyro conficiunt,
quandiu acrimoniam retinent, irritant ulcera, sed pu-
tredini repugnant, ubi nec adstringentibus, ut alumine
scissili: nec mordentibus metallicis stimulis, & adstrin-
gentibus, ut squama æris, ferri, stomomathis, abstinen-
dum est. Nam & arsenico, & chrysocolia, ueteres usti
sunt. Minium quod è sulphure & hydrargyro fit, his

Minium.

30 coniungi debet. Clementius, quod cerusa usta compara-
tur, uel plumbi gleba sterili. Secundum genus Græci

Mixta.

στυφινὰ

- E sandice.* *σάνδις* uocant: ex quo diuturnis ulceribus & maleficis medicamentum parant: Sandic. lib. una: olei dulcis. lib. duæ: coquantur lento igne, dum non inquinent.
- Ex ærugine.* Aerugo octuplo, decuplo, & duodecuplo cerato mixta. Cerae, terebinthina drach. sex, uel unc. una: olei unc. tres; uel. 4. liquefiant in uase duplici: liquefactis adde ærug. drach. 3. Clementius est uisita prius, & lota ærug. Potest dupla cera terebinthina commisceri: terebinth. lib. 2. cera lib. 1. rosacei unc. 3. uel 4. ærug. unc. 1. uel 3. liquatis & coctis reliquis ærugo inspergitur. 10
- Aegyptiaca.* Quod plus æruginis recipit, magis siccatur, & deterget: quod minus, glutinando idoneum est. Aegyptiaca fere similia sunt: Aeruginis unc. 1. squammæ aris unc. 2. aceti unc. 8. mellis unc. 2. arida cū aceto terito, mel adijcito, omnia dum ruffescant, coquito: maleficis conuenit. Clementius est, ex mellis, & terebinthinae pari pōdere. Cera uiridis in Aegyptiacis numerari potest, trita inspergitur, uel mollita oleo imponitur. Maligna iuuat: Lithargyri libra una: leniter coquantur in aceti libra una, olei lib. duabus: iam inspissatis adde ærug. 20 unc. 1. iterum coquantur, dum ruffescant. Mellis lib. 1. aceti, lib. semis: ærug. unc. 1. aluminis, drach. 4. coque ad spissitudinem, dum ruffescat. Alij quoque aliter modò uisita, modò lota, aliàs etiam uisita & clota ærugine parant cathartica. Modus sit, ut ne mordeat. Habes *Χλωρόν* è cruda, *κίρρον* è cocta descripta à Gal. pri-
- Alia è farinis.* mis libris de comp. phar. κατὰ γένν. E farina hordei, cicerum, fabarum, orobi, cum uitelis, momento mellis, & terebinthinae. fiat catharticum. Alioqui serinae conuenientis, unc. tres: succi apij, absinthij, marrubij, 30 uel similem, lib. 1. mellis, unc. nouem, ad iustum corpus

- pus concoquuntur. Hordeacea in duabus partibus aquæ, una mellis rosacei percoquitur: purgat, lenit, ealorem temperat: poteris addere momentum larignæ, quam è succo plantaginis elueris. Farinæ in memoratis succis coctæ, contra caneros & fistulas valent: in laboribus neruorum, terebinth. conuenienter additur: myrrha & aloë, in putredine: in calore, fabacea & hordeacea præferenda: calidior orobea, & è ciceribus. Amicissimum neruis quod sequitur: Resinæ, mel-
 1. olis, terebinth. ana selib. myrrhæ, sarcoc. farinæ fœnig. semis lini, ana unc. 1. liquatis alijs reliqua cōmiscetur. Pus educit & purgat, mellis selib. terebinth. unc. 3. farinæ fœnigræci unc. 1. radic. ireos drach. quatuor. Puri crassiori, Galbani, ammoniaci, resinæ, terebinth. sepi taurini, ceræ, olei antiqui, ana in aceto mersa, paulatim fundantur igne. Efficaciter purgat & siccat: Iris Illyricæ unc. quinque: farinæ orobi unc. cie tres: manna, thuris, calcis lotæ, ana uncie tres: aristolochiæ uncie tres, & drachmæ quatuor: terantur
 2. omnia in puluerem: fistulas expurgat & glutinat. Quod sequitur, uetera ulcera repurgat, excrecentem carnem reprimat, cicatricem ducit: Chelidoniæ, plantaginis, scabiosæ, ligustici, urticæ, ormini syluestris, ana manip. 1. conuassata septem diebus in oleo macerantur, deindè cocta exprimuntur: expresso succo adde ceræ unc. 3. terebinth. unc. 6. resinæ. unc. 2. bulliant ad corpus. Subductis igne, adde sarcoc. aloës, ana unc. 1. aristolochiæ longæ, eruginis, ana unc. sex. Fiat unguentum. Vnguentum Apostolorum uariæ describunt:
 3. respondet ferè ueneri antiquorum, quo hi usi sunt, attrahendo, molliendo, glutinando, & contra ferarum

Neruis amicum.

Pus euocans.

Puluis Off. ad fistulas.

Viride exherbis.

rum

rum morsus: quod quia uariè describitur, ex Aëtio uertimus, tantum thure addito, & myrrha: Litharg. unc. 2 5. ammoniaci unc. 9. Colophon. unc. 16. æruginis, galbani, ana unc. 2. bdellij, opopan. ana unc. 3. aristoteli. longæ, uel rotundæ, thuris masc. ana unc. 6. myrrhæ unc. 4. ceræ, olei, ana lib. 2. Lithargyron in oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo recentioribus, decoctionis fine, ut melius purget ubi non inquant, pulvisculus Colophonie inspergitur: summotis igne, reliqua ex aceto trita immittuntur: postremo uersata in mortario commiscuntur. Mellis cocti lib. 1. thuris drach. 4. myrrhæ drachmæ. 2. Efficacius est, si drach. 1. æruginis, & tantundem terebinthinæ exceperit. Plura ex primo de composit. phar. κατὰ γέν. 14. & 15. Aëtij.

De sarcoticis. Cap. VIII.

Απρίστος
υλκος.



QUOD IAM prius quodq; ἀπρίστος top ulcus est, carne impleri debet. Tale est, quod sordibus purgatū, modicè siccātū, sine rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie constitutum est. In summa, cui nihil accidit, quò minus impleri possit. Hic ergo carnem regenerato. Sed hoc naturæ opus est, quæ carnem è sanguine conficit. Oportet ergo tantum talemq; sanguinem naturæ suffici, ut inde carnem procreet. Instituenta uitæ lex, cibi boni succi, uitatis acribus: auis, uenatio, suilla elixa dari potest. Vinum in dolore & phlegmone alienum est: datum alioqui modicè, nec ita uetus, aliquando prodest. Reliquum uerò sarcoticis medicamentis perfici debet.

Sarcotica.

Que

Quæ re uera sarcotica, iustam naturæ com-
parant, modicè detergent, siccant primo gradu: uel
ita, ut ne nimis calfaciant. Licentiæ est uocare sarco-
tica, quæcunque repellunt, temperant, molliunt, intem-
periem corrigunt: in summa, summovent omnia, quæ
naturæ opus intercipient. In sarcoticis uitanda, quæ

Vitanda.

- 10 amplificant. Seligenda materia, quæ naturæ corporum
et partium conueniat. Nec si quid Dionis ulcus im-
pleat, statim et Socratem iuuare potest. Nec quod in
glande carnem instaurat, protinus et præputium in-
carnabit. Finge Socratem, cui semur ulceratum sit, thu-
re aliqui sarcotico putredinem gignes, aristolochiæ
pulvere carnem restitues: etenim Aristolochia carnem
generat, ubi thus sordes commouet. Ac rursus Dion sit
paulò humidior temperatis: huic thus commodum,
aristolochia inutilis est. Thus quod in Dione carnem

*Distinguenda ma-
teria quomodo.*

*Thus et Ari-
stolochia.*

- 20 constituit, in humidior, uel siccior, nihil tale efficiet.

In siccioribus partibus, sicciora: in humidioribus, mi-
nus siccantia utilia sunt. Ideoq; et præputio, et toti
pelli, quæ colem induit, sicciora: peni, et glandi minus
siccantia conueniunt: carni etiam, quæ minus siccet:
oculo minus, quàm nari: huic, quàm auri. Sinus humi-
dior, siccior: aridus, minus siccate curari debet. Nuda
tis ossibus uitanda pingua, aridis utendū, ut carne im-
pleas. Vlcerebus pudendi, quæ humidiora sunt, anethū
ustum inspergitur, cucurbita sicca, uisla pompholyx,

Natura partiū.

*In ossibus nu-
dati.*

Vlcera pudēdi.

- 30 lapis hæmatites, pini cortex: horum aliquid in polli-
nem tritum, et mannae momento mixtum. Quæ uerò
madida

Signa imbecilli
sarcotici, &
acriori.

Sarcotica im-
proprie.

Viride Gal.

madida non sunt, aloë sicca, & mannæ portiuncula in-
carnantur. Eadem ratio in ano, & eius naturæ parti-
bus seruari debet. Omnia ergo remedia suis finibus di-
stinguenda, & naturæ partium ulcerumq; accommo-
danda sunt. Languidius sarcoticum, uel saniem acer-
uat, uel mollem carnē flaccidamq; gignit. Efficacior e-
cauum exarescit, uel callosum germen enascitur, sæpè
etiā excitatur dolor, & grauitur ulcus arroditur. Sar-
coticorū genus, quod multa perficit, sæpè usurpatur:
quia uidelicet eo cura celuius absoluitur. Quod uolu-
mus subiecto exemplo intelligas, idq; in usu reliquo-
rum pharmacorum semel dictum sit. Glutinat, siccatur,
deterget, & carne implet: Strobilina unc. 3. ceræ unc.
1. æruginis rasæ drach. 4. thuris masculi drach. 2. ace-
ti, quod sufficit: æruginem pluribus diebus conterito:
thus uno die, tum ceteris liquatum commisceto: gan-
granis, nomis, putrilaginosi, & uetustis conuenit. Fiet
clementius, strobilina mollita prius rosaceo, uel tere-
binthina strobilina loco myxta. Quod si terenbinthi-
na careas, quod sæpè fit, larigna, quæ omnino terebin-
thina similis est, utendum erit. Alia larigna differen-
tia, cetera quidem terebinthina similis, sed gustu mor-
daciore, sensu acrior, & odore grauior est. Mitius quo-
que fuerit cerato mixto, cera lota, diutius trita ærugi-
ne, aceto non ita forti, sed uinoso: postremo, si ærugi-
nem minuas. Atque ubi uincit consilium glutinandi, sit
thus pari pondere cum æruginē: si magis siccandum,
lithargyri, uel similis metallici bene triti partem ali-
quam commiscebis. Ex alijs etiam acrioribus, ut squam-
mis, tostis, tritis, lotis, aliquid poterit adiungi. Si flac-
cidior caro est, præter metallica, myrteo oleo, uel meli-
no, si

no: si calor extitit, rosaceo uti oportebit: si parum processit caro, aristolochiam, & aliquid è sarcoticis unies. In duritie, adipēs, medullas, ammoniacum, & similia colliguabis. Alumen interes, si quid affluit. Ladanum quod simul mollit ac reprimat. Aloē, quæ repellit, terget, digerit, & sarcoticon est. Sic ergo ὡς ἂν χρῆσθαι temperabis, quod & aliter alijs accommodes, & ad multa uitia transformes, ut interm carnem repleas.

Ladanum.

Aloē.

In contumaci ulcere animaduertendum, aliud quidem tale esse, quod suauissima desideret: aliud, cui non nisi acribus, extremisq; auxilijs prodesse possis. Pudendum, & sedis ulcera maligna, neque acria, neque uim ignis sustinere possunt, qua uidelicet parte neruacea, & suauissimis medicamentis curari debent: qualia sunt, oui candidum, cadmia lota, cerusa, pompholyx, amydon, manna, myrrha, styrax, succus solani, aizoi, & similia extusus in mortario plumbeo, pistillo plumbeo: uel chymicorum oleum, quod extillant plumbo.

Duplex genus
ulcerum contumacium.

Spodion, antispodion, quod fit ex oleastri floribus & folijs, ebore, cornu cerui, crematis nucleis dactylorū, ficulno ligno, lentisci, cytonij, myrti folijs, cum teneris ramorum partibus, moris immaturis in sole arefactis, uel è buxi coma, rubi, & terebinth. testis & uolutis ostraeorum, buccinorum, purpurarum, & similia: taurino glutine, & linteorum cinere, faece usta et elota. Vritur ea omnia crudo fictili in fornacibus, donec figlina percoquatur. Tenuissimè leuigare, & si quid superesse putes qualitatis ignis, eluere oportet: si nolis adstringere, aceto macerabis, & stecabis. In fluxionibus leniter adstringere melius est: in putredinibus, aceto, oxycrato, ænomolite, uel oxymelite: in can-

Antispodion.

Cryſtallus.

Fuligo.

Pix & reſina.

Colophon.

Caries.

Secūdus ordo.

Pumex.

Ibi uitanda
acria.

Metallica.

Chryſocola.

croſis, ſolani ſucco & plantaginis imbui, & inde ſicca-
 cari conuenit. Corallo ſimiliter uti licet. Cryſtallum
 laudant in oris ulceribus & cancris. In clementibus au-
 xilijs aloë eſt, fuligo thuris, terebinth. myrrha. E ſty-
 race, & pice liquida ualentior eſt: ex æſypo, & buty-
 ro, ſuauior. Elui poteſt quæ acrior uideatur. Manna
 repellit, & ad multa utilior thure eſt. Coloph. pix, re-
 ſina, præſertim ſicca, humidioribus corporibus con-
 ueniunt. Colophon modò per ſe, modò cum thuris polli-
 ne ulceratis genitalibus inſpergitur. Caries lignorum, 10
 magis ex adſtringente, & detergente materia peculia-
 riter, quæ ulmo collecta eſt, expurgat, impletq; humi-
 da. In Chyronijs, maleficijs, & extremorum ulceribus
 per ſe, uel cerato mixta uſurpatur: farina corticis
 capparis interdum commiſcetur, quæ eadem purgat,
 ſiccâtq; maligna: farina bordei & fœnigræci humi-
 diora corpora iuuare poſſunt. In ſecundum ordinem
 referuntur, Ariſtolocho. iris, & ſimilia, quæ detergent,
 digerunt, euocant, farina lupinorum, orobi. Pumex
 crematur carbone puro, & uino albo eluitur: per ſe 20
 tritus, uel cum ſexta ſulph. parte, iuuat. Chironia: his
 longè optimum medicamentum eſt: plumbum uſtum
 & elotū, ut & putrilaginoſis, & cancroſis. In acio-
 ri ſanie, contumaci ulcere parte humida, quæq; faci-
 lius putreſcat, acria uitanda ſunt. Acrimonia multo-
 rum, partim uſtrina, partim lotura, uel utroque dilui-
 tur, uel cerato roſaceo miteſcit. Talia ſunt quædam
 metallica, ſquamma, chalcitis, attramentum ſutorium,
 quibus uſlis, lotis, & alijs rebus temperatis, & parcè
 quidem utendum erit. Lauantur pluuia, ſi quæritur 30
 adſtriſtio, alioqui puteali, fluuiali, uel fontana. Chryſo-
 colla,

- colla, concreta sanies è putri uena metallica, difficiliù
 ulcerum efficax remediù est: facilitia quoque ex æru=
 gine, quæ alumen recipit & salem, in ijs quæ nimio hu=
 more madent, & rheumate utilior est. In hoc gene=
 re censentur, quæ Græci uocant κεφαλικά & κα=
 ταγματικά. Illa caluaria, hæc reliquis quoque ossi=
 bus fractis imperantur, quanquàm interdum utriusque
 ratio cōmiscetur. Cephalica catagmaticis acriora sunt,
 squamas & ramenta ossium detrahunt, foras euocant,
 10 quæ in alto latent, utraque tergent, digerunt, & sic=
 cant. Miscetur his quod adstringat, sed oportet ex
 aceto forti tam diu in æstu atteri, dum in tenuissimum
 pollinem abeat. Sic enim quod insuat repercutitur, &
 uis tergentium altius penetrat. His autem sic uten=
 dum est nudato offe, quod in caluaria sæpe fit ad uoca
 tam διωλόρη, arida inspergēda: nudatis enim ossibus
 pinguia malè conueniunt. Sintq; paulò acriora, ut non
 solum squamas, sed uiscidū humorem ex alto trahant.
 Videndum etiam ne qua parte syderatum uel corru=
 20 ptum os lineat: eliminandum enim, ac omninò repurgan=
 dum. Atque ubi cœperit caro succrescere, & os inte=
 gi, cephalica cerato temperanda: sic enim coges sarco=
 ticon, quia uidelicet quæ euocant, tergēt, discutunt, ce=
 rato mixta implere possunt. Cerati modum desinient
 natura uitij corporis, uirtus denique medicamēti. Pa=
 rantur cephalica, ex iri Illyrica, crui farina, manna, Materia ce=
phalic.
 aristolochia, panacis Heraclij radice, magis cortice,
 (opopanax calidior est) radice bryoniæ: in summa, bis
 quæ detergeant, sed non rodant. Acria enim miscētur,
 30 ut ramēta auferant. Cephalicon quod tollit squamas, Cathectis.
 ossa corrupta rapit, & caua implet: Iridis Illyricæ, pa=
 naci,

Ex crobis.

nacis, ana drach. quatuor: arisol. rotundæ, manna, ana drachmæ duæ: tusa leuissimè, & traiecta cribro insperguntur, uel melli mixta imponuntur. Farinæ crobi rubri drach. octo: iridis drach. decem: manna, arisol. rotundæ, squamæ, ana drach. quinque: tritis, uel cum melle utitor. Sunt qui addant radicem bryoniæ, & aliter parent. Corticis pinci, squamæ, pumicks usti, ana drach. sex: manna, thuris, aristolochiæ, iridis, resinæ pityniæ, ana drach. quatuor: myrrhæ, aloës, ana drach. duæ: tritis utere, uel cum melle. Athenæus loco corticis pini, drachmas quatuor gallæ miscuit. Plura ex secundo et quarto de cōpositione pharmacorū κατὰ γέννα. Iam uerò multa per se nocent, mixta sarcotica sunt.

Sarcotica mixta.

Oleum sordes colligit, sic & cera: ærugo rodit: tria hæc mixta, carnē regenerant: magis etiam, si quid sarcotici ammiscueris. Sic enim purgant, & carnē implent: quale est, Cerati rosacei lib. una: æruginis unc. 1. manna, thuris, unc. duæ. Cera, terebinthinæ, ana unc. quatuor: æruginis ex aceto lotæ unc. una: uel ut efficacius, unc. duæ: thuris unc. duæ. Ita ex oleo, cera, æruginè, resina, terebinthina, thure, manna, et materia sarcotica, sexcenta pharmaca confinges ea arte, quam Galenus tradidit: quibus extergeas, sicces, repellas, ac simul impleas. Trigener, Cera, colophonina, terebinthina, pariter colliquatis, refrigerata hæc in frigidam conijcies, diuq; manibus uolutabis: nuda ossa capititis incarnat, squamas deducit, & cicatricem trahit. Admirandum est mastiche pariter mixta in ossium fracturis. Iudei, Colophon. lib. una: mastiches unc. una: olei sesquincia: liquata, & in frigida pista sine lamento ulceri impones: purgat, & præ cæteris implet, sed ci-

In fracturis ossium.

sed ci-

sed cicatricem non generat. Optimè incarnat farine
pistrinalis è tritico unc. duæ: picis, Colophonie ualde
tritæ, unc. una: arido cauū impletur. Gal. Cere drach.
sex, olei unc. tres: liquefactis adde thuris, iridis, aristo-
lochie, ana drachmam unam: æruginis drach. dimid.
Aliud, Radicis Anchuse unc. duæ: aloës unc. quatuor:
fiat puluis. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat,
cicatricem ducit. Maleficis ulceribus tibiarū, litharg.
unc. sex, cum adipis caprilli, olei rosacei, ana unc. sex,

E' farina pi-
strinali.

Theriaca.

Maleficis ulce-
ribus tibiarum.

- 10 coquito: costis adde mastiches unc. sex, parum refrige-
ratis misce utella quinque ouorum. Hactenus experi-
menta ueterum, nunc ad recentiorū remedia transeun-
dum est. Aureum Mesuæ: Cere unc. quinque: resine
unc. tres: terebinthine lib. unam: mellis sesquunciam:
mastiches, thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloës, croci, ana
drach. tres: fiat unguentum. Fuscum Nicolai multa
habet undè concoquat, & emolliat. Similiter & quod
Croceum describunt. Tetrapharmacum dolorem le-
nit, maturat phlegmonem, putredinem augere potest:

Aureum Mesuæ

Fuscū Nicolai

Croceum.

Tetrapharma-
cu n.

- 20 siccare uerò & expurgare non potest. Galenus locis
aliquot Thessalū reprehendit, & alios, qui tetraphar-
maco ut siccante, purgante, & incarnante, uterentur.
Actuarius iam à doctrina ueteri degenerans, uim mola-
liendi, coquendi, & incarnandi tetrapharmacum tribuit.
Omnia ulcera per sanat: Artemisiæ, scabiosæ, absin-
thij, ormini, senecionis, tamaricis, apij, uerbene, pilosel-
læ, lanceolæ, pimpinellæ, lingue canis, millefolij, cheli-
doniæ, ana manip. unus: ex omnibus reiectis radicibus
exprimatur succus, cui adde axungie ueteris lib. duas,
30 sepi hircini libram unā, olei libras duas, mellis uncias
tres: mediocriter bulliant, & in mortario pista unian-

Omnia ulcer.
per sanans.

Dia ireos.

tur. *Dia ireos* : Sepi uaccini selibra: olei rosacei unc. tres: ceræ unc. duæ: radicis ireos unc. una: thuris, sarcocollæ, mastiches, aloës, aristolochiæ, ana drach. duæ:

Puluis Rasis.

cum terebinthinæ unc. tribus fiat unguentum. *Puluis Rasis* : Olibani, aloës, sarcocollæ, sanguinis draconis,

Pulvisculi quomodo parandi.

radicis ireos, ana. Ita cum masliche, farina fœnigræci, & id genus remedijs, sarcoticos pulveres confinges.

Oportetq; exactissimè cōleuari, ne asperitate lædant. Itaque materia in pila tunditur, tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius cribratur: quicquid non transmeat, repetitur in pilâ, ac tam diu conteritur, dum ad extremam tenuitatem perueniat. Hæc arida sunt, quæ humidioribus ulceribus conueniunt.

Vtendi modus.

Alia per se induntur cauo, uel penicillo uulnerario capta imponuntur. In fistulas mittuntur clysterio, sed diluta. Ab his thorulus mollis uino madens superdatur. Vinum sit è dulci austeriusculum. Postremò omnia commodè alligantur. Aestate bis, hyeme semel in die commutantur: sæpius etiam si dolor phlegmonæ, uel aliquid tale intercesserit. Ac lintei lanugo bene munda impacta cauo sepè sufficit. 10 20

De epuloticis. Cap. IX.

Natura epulotici.

ELENVM ulcus clauditur cicatrice. Epuloticū siccatur, adstringit, sed citra morsum, atque hinc reprimat, & quod in carne humidum est, sorbet: carnem contrahit, & cute tegit, aut certè callo tenui, qui cuti similis est. Ex quo siccare magis necesse est, quàm quod carnem gignit, uel glutinat. Aliud genus est, quod quia excrecentem carnem adimit,

Secundum genus epulot.

mit, epuloticon appellant, acri natura, etiam mordaci. Addunt & tertium genus, quod siccatur quidem, sed non adstringit. Cicatricem ducunt, galla immatura, myrta, malicorium, æris squama, chalcitis, misy, ærugo usta lota, et quod præstantissimum est, æsustum & elotum. Metallis acribus excrescens caro consumitur, ustis & elotis trahitur cicatrix. Vruntur hæc fictilibus crudis, carbone puro: extinguuntur uino, mortario interuntur affusa pluuia, mox siccantur, cribrantur lin-

Tertium genus
epulot.

Ratio utendi
metallica.

Distinctio re-
mediorum.

10 teo: in mortarium aliquoties repetuntur, ne quid arenosum aut scabrum reliquum fiat. Abluuntur etiam ea ratione, quæ ex Dioscoride & Galeno repetenda: ut eadem materia excedentem carnem adimas, in duris ac mollibus corporibus cicatricem ducas. Erysimi semen, scoria plumbi, stibia, cerato myrtino excepta. Erinaceorum, purpurarum, buccinorum, ostreorum, calculorum marinorum silicum, & similibus crematorum cinere, metallis acribus similiter utendum est: ut crematis quidem superfluum carnem adimas, ustis & elotis

20 cicatricem contrahas. Hæc omnia tam possunt manescere lotura, quam suavis est cerusa lota. Flaccidis carnibus balauslia affatim insperguntur. Liberalius iniici oportet, ubi caro demenda est: parcius, et in subtilissimum puluerem conleuata, atque acie cultelli capta, ubi cicatrice plaga tegenda est. In calloso stupidiq; sensus corpore, si neque plethora, neque cæcocy-mia, acrioribus ad cicatricem uti licet. Quæ enim molliora corpora colliquant, duriora in cicatricem contrahunt: & acria cerato rosaceo fracta epulotica sunt, ut

30 uel pluuia, uel adstringente uino lota. Vinum sit neq; recens, neque ætate mordax, aut languidum: præstat

Vinum.

QQ iiij quod

ἐπίπασα.

ἐμπλάσσωδν.

Vitanda.

quod annis est & qualitate medium. Siccant, nec ita stringunt, myrrha, argenti spuma, osirea, diphryges. Iam uero alia ἐπίπασα, quæ arida tenuissimè insperguntur: alia ἐμπλάσσωδν, & firmo corpore: hæc in platysmate adhibentur. Corpus accipiunt à cera, quæ pinguis sit, uel natura sua, uel myrtino, melino, lentiscino oleo remollita: ac sit olii pars decima, uel duodecima. Terebinthina quoque, & larigna temperare licet: ut æsypo, si quid tumoris, uel calli ulcerum labris reliquum fuerit. Eodem modo, medulla cerui & 10 uituli. Sic enim epuloticon diutius insistet, neque breui exarescet, unde lædat scabricie, & ante tempus decidat: ac tertio quoque die absoluerè satis est. Cerata conueniunt è rosaceo, myrtino, melino, terebinthino, lentiscino, fraxinino. In ceratis epulotica applicantur multò magis, si hæc acriora: nec ita malignum ulcus est. E' larigna, & dupla cera cerotum confici potest. Spodos factitia, quod antispodiū uocant, in epuloticis censetur: uis eius eluatur, ut sunt corpora, & ulcera: fugienda 15 μάλα πικρά, quæq; μάλα κπικρά: adeps, 20 maxime suillus, oleum, cera, resina, ammoniacum, et similia in ulceribus, quæ difficilius cicatricem trahant. Fugienda acria piper, sinapi, sed præcipuè ubi uel plethora, uel cacochymia. Ad hæc quæ humectant, ut aqua. Quod si omnibus ritè institutis ulcus cicatrici pertinaciùs reluctatur, aut iam opertū, clausumq; rescinditur, horum aliquid subesse conijcies. Nam uel plethora, uel cacochymia est, unde perpetuò madescit ulcus: hic purgante pharmaco, illic phlebotomia, quæ uacuet & reuellat, opus est. Aliquando in quantitate & qualitate 30 utiū est: tumq; primū phlebotomo, deinde cathartico

tico medicamento occurrere oportet. Emulgendus atq; *Causa rebellis*
etiam præcidendus uarix est, si inde materia transfluit. *ulceris.*

Quibus ab hepate, liene, capite, aut alia corporis parte scaturit colluuius, necessarium parti remedium adhibebis. Aliàs uicina male habita scalp pro lacerabis, callosa labra adimes, partem agram totamq; uiciniam pristinae naturæ reddes, os subiectum si qua parte syderatum, aut cariem duxit, abrasdes, aut etiã cauterio inures: uel si qua resituant ramēta, maturè detrahes. In

- 1 o summa, omnia sum mouebis, quæ cicatricē tardant, aut eandem refricant. Lithargyrus per se trita, attrita operit. Eadē è uino lota tritaq; resiccatur: tenuis plumbi lamina, plumbū ustum, lotum, summoperè medetur cancris. Implet, & ad cicatricem ducit cadmia cremata: pluribus diebus ex aceto, uel uino modò gilio, modò albo austeriusculo terere oportet. Ladanū molle & recens è uino, uel salina piscum cum elegantia iuuat.

Redit ad materiam.

Cerusa, pompholyx, calx elota, bolus Armenus, terra sigillata, et similia quæcunque siccant, adstringunt, nec

Mixta remedia.

- 2 o mordent. In mixtis prætulit Galenus δὶ ξ καὶ δ μ ι α ς, & δ ξ λ α δ ε ρ ο s medicamenta. Quæ cum multa sint, ac uariè concinnentur, pauca, et paratu facilia describemus. Cadmiæ, litargyri, cerusæ, ana unc. una: ceræ unc. quatuor: rosacei unc. tres. Cerusæ, cadmiæ, ana unc. quatuor: ceræ, myrtini, ana unc. sex. Plumbi usti unc. tres: cadmiæ, æris usti, ana unc. duæ, Colophonie, olei myrtini, ana lib. duæ: uini antiqui odorati, quod sufficit. Cadmia pluribus diebus in sole teritur ex aceto, uel conueniente uino. Quod si æs ustum similiter la-

- 3 o uatur, melius est δ ξ καὶ δ μ ι α ς medicamentum. δ ξ λ α δ ε ρ ο s præhumidis ulceribus auxilio est, implet, & ad cicæ-

Δὶ ξ λ α δ ε ρ ο s
Cristonis.

ad cicatricem perducit: Picis aride denar. centū: æruginis rasæ denar. uiginti quatuor: æris usti denar. quindecim: squamæ rubræ denar. uiginti quatuor: ladani unc. nouem: lithargyri lib. tres: olei, uini optimi, ana unc. triginta. Litharg. oleo coquitur, coctione media reliqua metallica injiciuntur, uoluntantur rude, dum non inquinent: hic pix immittitur: refrigerantibus ladani unitur è uino tritum: omnia in mortario conficiuntur. Hoc & reliqua medicamenta, quæ siccant, & non mordeant, diutius coqui melius est. Adhibetur hoc in platysmate, deligatur, nec ante quartum diem exolui debet. Alia quarto de composi. phar. κατὰ γέν. Sunt & hæc epulotica: Aeruginis, æris cremati, ana semuncia, aluminis fissilis drach. duæ, ceræ drach. sex: ærugine uisla melius est: metallica excipiuntur cera præmolli ta igne, uel cerato ex larignæ semuncia, et ceræ unc. 1. alioqui cerato myrteo, uel rosaceo. Squamæ, æruginis, ana uncia: ceræ pinguis uncia sex: larignæ semuncia: liquatis ceræ & resinæ reliqua trita coniunguntur, hæc in platysmate apponuntur, quod ulceris locū nec eo amplius circūscribat. Munitur uicina his, quæ phlegmonē arceant: tertio quoque die, uel quarto, medicamentum reuellitur: austero uino fouetur locus, platysma innouatur. Repetuntur hæc, dum cicatrix duci incipiat: resinæ loco, uel æsypus, uel medulla est, si quid inest durius. Et hæc quidem efficacia sunt, & maligna iuuant. Aliud: Cerusæ, lithargyri, ana libra una: olei myrtini lib. duæ: ceræ sex libra: terebinthinæ unc. tres: aluminis fissilis unc. una: piperis semuncia, uel paulò minus: leuius erit, si sesquunciam thuris addideris. Parabile & mirabile: Aluminis fissilis semuncia, in uini aquæ

Quomodo hæc
adhibenda.

Alum è cerusa
& litharg.

aque pluuiæ, uel quæ in cauis quercuum desidet, un-
cias nouem, diluitur: linteolum uetus, sed mundū, aqua
incolatur, exarescit sole: depestitur, & concerptum
imponitur. In sedis uitij, & inueteratis, uino quàm
aqua, uti melius est. Aliud, in quo ueterum & poste-
rorum consensus est: linteolum aqua illa, uel uino
madens, sed expressum, molliter apprimes loco: cui
deinde pertenuem plumbi laminam induces, & alliga-
bis. Cerusæ drachmæ duæ: gallarum, myrti, recre-

Aliud.

Lamina plumbi.

1^o menti plumbi, ana drach. una: fiat puluis. In ignis exu-
stionibus & calore: Cerusæ, lithargyri, hordei tosti,
ana uncia una: ceræ unc. tres: rosacei, uel myrtini, unc.
octo: metallica è uino terito, ceram cum oleo liquefa-
cito, hordeum cribratū inspergito, omnia coquito, ex
colato, in mortario conficito. Aliud: litharg. cerusæ,
ana libra una: coquantur in olei albi libris duabus,
aque purissimæ selibra, dum aqua exhalauerit, & pu-
rum pharmacum consistat: purus sit ignis. Liquatis
adde terebinthinæ, uel larignæ potius in malignis, un-

Album Galen.

Larigna potior
est, quā terebin-
thi. in malignis.

2^o cias duas, uel tres: ceræ albæ uncias quatuor, uel sex:
ut augetur resinæ modus, sic & cera augēda est. Post-
quàm uerò hæc cum ceteris coterint, adde thuris semē-
ciam, pompholygis, ostreorum, cadmiæ, ana unciam
unam. Vsta hæc in cinerem, trita, & ex aqua lota:
dulci quidem in acri sanie, marina, uel aceto in callo-
sis, & tumentibus labris usurpentur. Inopia marinæ,
subduplum salem aqua diffundes. Quòd si multus hu-
mor affluit, uino albo pellucido leniter adstrungente,
commode lauabis. Calx septies elota, è rosaceo, uel

Ratio in his ab-
luc di metallicis.

3^o aqua diluitur, in æstu medio subinde uersatur, teritur,
abluitur:

Calx.

Recentiorum
pharmacæ
Vnguen album
communitatis.

Album Rasus.

Pulvis epulo-
ticus.

Plantago.

Album d. cerusa.

Album d. ceru-
sa Adu.

Litharg. nutrita
Rasis & Aui.

abluitur: postremò cum iam satis lota, tritaq; exaruit,
è rosaceo pista im ponitur: cicatricem trahit, ulcera
neruorum maligna & ambusta iuuat. Probanda quo-
que remedia posteritatis: Cerusæ uncia una, lithargy-
ri semuncia, rosacei libra una, aque rosaceæ sesquun-
cia: metallica in mortario fortiter perfricantur pistillo
duro, quòd cum sit, deinceps ac paulatim liquida af-
funduntur. Vng. desiccatum rubrum. Album Rasis:
Olei rosacei libra una: ceræ uncie due: cerusæ uncia
una: caphuræ drachma una: albumina ouorum tria. 10
Melius fiet cum drach. sex lithargyri. Aliud: Balau-
stiorum, sanguinis draconis, cadmiæ, argenti, æris usti
loti, ana: fiat pulvis. Addunt santalos, nymphaeam, mi-
norem plantaginem, rosas, ubi calor inest. Vtraque
plantago cum radice trita epulotica est. Emplastrum
album è cerusa non omnino dissimile albo Gal. Ceræ
unc. quatuor: rosacei lib. dimid. terebinth. unc. tres: ce-
rusæ unc. due: lithargyri unc. una: thuris, aluninis, ci-
neris è cochleis crematis, ana semuncia: ceræ, oleum, te-
rebinth. simul funduntur, fusis reliqua commiscantur, 20
pista omnia in mortario uniuntur. Aduarij: Litharg.
sesquilib. cerusæ lib. quatuor: ceræ albæ lib. septem: olei
myrtini quantum sufficit. Litharg. ol. coquitur, cerusa
additur, & ceræ. Litharg. nutritum Rasis & Aui:
næ: Lithargyros tenuissimè teritur, ex aceto & rosa-
ceo diu exercetur in mortario, ut quidam uolunt, plum-
beo. Modus est, ut inde crassior fermentetur, & extur-
geat. Sunt qui addant uni parti lithargyri tam nutri-
ti, sextulam æris usti, uel cremati plumbi: aut tantun-
dem aluninis, balaustiorum, rubiæ, sanguinis draco- 30
nis,

nis, cadmie argenti. Idq; singulari ope in malignis & pertinacibus utijs. In cancroſis ceruſa iungitur piſtillo & mortarto pluimbeo. Ceruſa per ſe curat abraſa. Ceruſa.
ex uino trita humidioribus ulceribus idonea eſt: ex aqua roſacea lota pellit, cicatricem contrahit, & calorem attemperat: butyro mixta, mollit, coquit, & epulotica eſt, at licet & emplaſtro deſiccatiuo rubro, & alijs. Epuloticis utimur, iam propè pleno, ſed nondum Ratio uſus epulotici.
adequato ulcere. Celfus linamento cfrigida preſſo in-

- 10 tegit: ubi iam æquatum eſt, ſicco: ac bene fiet, ſi in frigida alumen maduerit, et quod ſiccum imponitur, in ea merſum, poſtea inaruerit. Et hæc quidem in leui ulcere faciunt ſatis. In malignis, linteolo bene puro ſinu molliter extergebis, Epuloticum induces, quod plurimum ſiccet: deinde ſi quid eſt durius, platyſma, quod attenuet labra, ſuperdabis, quod æquali linteo conteges, ex quo ſplenion ſubijcies expreſſum frigida. alioqui uino, ac frigiditatem ſplenij affuſa ſubinde frigida continebis: poſtremo commodè ligabis, tertio primum.
- 20 die ſolues. Hic linteolo ſicco, molli, puro. ſanem detergebis, & ut prius, omnia reuocabis. Recentiores uino calido cui balaſtia concoxerint, aut ſimilia, ulcus fouent. Alioqui aqua, quæ uim aluminis conceperit, ubi calor aliquis eſt, molli uellere humorem ſorbent, phar-
macum imponunt, ſuperdant ſtupis uino madidas uel aqua: omnia glutinantibus faſcijs conſtringunt. Galenus interdicit aqua, nec ulcus nudum contingere oportet. Plurima epulotica ex. 1. 2. 4. de compoſit. phar. κατὰ γένν, & 14. Aëtij.

De glutinantibus. Cap. X.



ONGIVS fortasse quàm res postulabat,
 de glutinantibus sermo dilatus est: uerùm
 ita nos cōgīt, traxitq; consequens mede-
 larum ratio: nec alius locus obtigit commodior, in quo
 de illis orationem institueremus. *κολλητικὰ* Græci
 uocant, *συμφυτικὰ* & *τραυματικὰ*. Quidam
 etiam *ἐνδομια*: & peculiariter quæ cruentis uulneribus
 adhiberētur. Siccant hæc omnia ad secundū ferē gradū, 10
 media ratione inter ea quæ cicatricem trahūt, & quæ
 carnem regenerant: non detergent, sed adstringūt, pro-
 hibentq; ne quid humoris labris ulcerum obuēniat: nec
 in cruentis solū usurpari solent, sed ad sinus, fissu-
 las, maligna uetustaq; ulcera transferuntur. Opitulanz-
 tur celerius, si integrā partium natura est, si paucus
 sanguis idemq; purus affluit, si non abrasa, non præci-
 sa, sed uel salua, uel parte aliqua etiamdum herens cu-
 tis est. Etenim cuti cum subiecta carne naturalis quæ-
 dam amicitia coijt, ut ægerrimē sanescant, quibus om- 20
 nino illa excidit: facilius, ubi incolumis seruata est. Mi-
 rum quòd præcisa, sed loco suo reddita coalescit ac
 mortua reuiuiscit, quodq; è plaga liuore ducto, non in
 iuuene solo, sed etiam sene uiuidum colorem recipit.
 Magna igitur cutis habenda ratio: non ob id tantū
 quòd inde celerius glutinatur ulcus, sed quia interiecta
 cute plurimē iuuatur, quæ nuda alioqui caro non per-
 ferat. Nudum ulcus linteo, lana, spōgia irritatur: medi-
 camentis paregoricis sordes colligit, uellicatur cathar-
 ticis: iuuatur omnibus si familiari tectorio munitū est. 30
 Ideoq; & abrasa cutis & pendula, suo loco inducatur,
 & reducta

Facultas gluti-
 nantium.

Cutis quàm fa-
 ciat ad celerita-
 tem glutinatio-
 nis.

Et reducla molliter apprimatur: sic enim unà cū ulcere celerius coalescet. Animaduertēda quoq; labra sūt, quia uidelicet, alia cōtracta, alia euersa plurimā dehiscunt.

Ratio adhiben-
labris.

Contracta deligatione abducenda, quæ in ulcere laxior, hinc inde sana partē arctius contrahatur. Colligēda uerò quæ plurimum hiant à sanis partibus incunte fascia, quæ ut ad oras propius accedit, ita firmitus constringatur, sed ita ut ne nimis cogendo nimis comprimamus Et dolorem ingeneres. Euerso tantum altero ul-

Ratio deligendi.

10 ceris labro, hinc lintea abduces, Et in alteram partem quasi trahendo uolutabis. Si utrumque eueritur, ea quam ἐν δυνάμει ἀρχὴν ἐπὶ δυνάμει uocant, necessaria est: Et ut sunt ulcera, ita remedia distinguuntur. In recenti paruoq; ulcere fasciola in orbem nexa, satis esse potest: nisi uel cacoehymia, uel plethora, uel acriore sensu partium subesse periculum uideas: hinc enim uel si acus minima pupugerit, dolor, phlegmone, conuulsio denique ad exitum sequi cōsuevit. Statim ergo collectis abstinendum, Et paregoricis utendū erit. In maio-

Paruū ulcus nō
negligendum.

20 ri uulnere, maiora remedia querenda sunt, deligatio, sutura, fibula, medicatio: (hicq; audiēda sunt magnum Et paruum in sectione, non quorūdam ueterum more, qui ἐπὶ κινδύνῳ insigne uulnus ē natura loci: μέγας, e periculo statuūt.) Atque in glutinando, natura corporum distinguenda: quia uidelicet (ut illi loquuntur) hoc δυσέλκεις, illud εύέλκεις: ac difficultas ferē nascitur ex ijs quæ in rebeli ulcere proximo capite tradita sunt. Primum igitur in cruento uulnere, si qui-

ἐπὶ κινδύνῳ uul-
nus.
μέγας.

30 spongia, lana succida, molli panniculo detergendus cruor est, atq; illa prius inculcanda frigida, exprimēda, atque

Quomodo exter-
gendus cruor.

Ratio Gluti-
nandi.

In reſiſ uul-
neribus.

In tranſuerſu.

Vinum nigrum
aſterum.

In quibus ſuen-
dum.

In quibus etiam
fibula.

Particularis ma-
teriae diſtinctio

da, atque ita adhibenda. Quod ſi altè deſcendit uulnus
erupitq; ſanguis frigida loco aceto utendum erit, ut
inde grumum attenuet, & ſanguinem ſupprimas. In
neruis, ab aceto metus eſt: ideoq; ſpecilli extremo li-
teolum alligabis, quod uel ſapa uel melicrato madesca-
cies. In lacunis ubi iam glutinandum, uinum & oeno-
meli idonea ſunt. Ac cum iā deterſus cruor eſt, nihilq;
labris intercedit, qualia ſunt, pilus, grumus, oleum, plu-
ma, & ſimilia, ſequitur ut latera lateribus, oræ oris
rite cœant. Ponimus autem neque dolore, neque phleg-
mone, neque ullo alio uitio ulcus laborare, ac iuſtam
carnem lateribus uulneris intereſſe. In reſiſ uulneri-
bus labra facile adducuntur, multò magis ſi molle cor-
pus eſt, adducta faſcijs continenda ſunt, ex duplici ini-
tio: alioqui ſimplicibus, ſed futura interdum addita, &
fibulis. In tranſuerſo uulnere, oræ diſident magis, qua-
re futuris & fibulis opus eſt. In magnis & profundis
uulneribus uincula ex duobus initijs neceſſaria, eadem
quoque in latis ſimul & profundis: ſed hæc præterea
altis futuris cogēda ſunt: neutra uerò præproperè glu-
tinanda, ac faſcias aſtero uino & nigro maduiſſe iu-
uat: quod in uulneribus cæteris præferendum eſt, quia
repellit, phlegmonem prohibet, & cogit: in quo etiam
aliquid eorum quæ adſtringant licet incoquere: ſed mo-
dus ſit, ne nimis contrahas, unde excitetur dolor. In
molli parte, extrema auricula, imo naſo, fronte, bucca,
pericranio, palpebris, cute gutturis, uentre, membranis
quæ non ſunt tendines, futura conuenit. Præputiū aſ-
ſutur & infibulatur, ut & carnoſum genus, ubi nimiū
debile eſt uulnus, nec oræ facile coniunguntur. Sed de
his alio loco pluribus. Particularis materia, ut ſexu,
ut molle

ut molle durumue corpus: ut recens uetustum, paruum magnumq; ulcus est, ita distingui debet, quod in fascijs, futuris ac fibulis similiter seruandum est. Ebulus, sambucus, symphytum, syderites, palmæ cortex, plantago, fraga, equisetū, pini, tedæ, dracontij folia recentia, anagallis, salix, androsæmon, astragalus, phlox nunculus, araneæ tela, & ea percipue cui è pistrino farina infederit. Spongia, lana succida, linteolum, expressa è frigida, uino, uel liquore qui contrahat: ca-

10 seus recens & oxygalactinus. Isatis satiuæ neruos Isatis satiuæ.

etiam præcisos in fine musculorum iungit, & duriora corpora conglutinat. Neruos etiam iuuat pentaphylli folium cum melle, allia assata tritaq;: myrrha ulceribus capitis idonea. Sarcocolla, gummi genera & resinae quæ non mordeant, nec ita detergeant. Pix sicca magis quam humida: hordeum uisum, aloë ex aqua trita: herbæ succus & folia, quam ex India comportant, & patrio nomine Zambanam appellant. Aloë uulgaris est, quæ tenace uita in multos menses uiget: è laquea

Zambana.
aloë.

20 ribus ædium & tabulatis magna uiroris commendatione suspenditur. Constat hoc remedium certo experimento nautarum. In colleticis quæ ad manum sunt, præcipua laus attractylidi. Eius cacumina austero uino uel oxycrato incoquantur, excipitur concha quod enatat. Ulmi cortex alligatus, eiusdem quoque folium intritum glutinat, & ambusta uiuat, ut sine manifesta cicatrice coëant. Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, & artificialibus balsamis miscetur, aqua quæ ulmi folliculis concluditur, bene purgata uermiculis.

Ulmi & à fol
liculis aqua.

30 Et balsamo quodam raro & precioso principes utuntur glutinando. Sunt qui aquam quæ castratis uitibus,

Balsamum.

R R exudat

Aqua uiu.

exudat uere, uitreo uase excipiant, annum integrum bene operculatum uas & clausum exponunt soli, loco subdiali, sed qui ab iniurijs cœli tutus sit: uas subinde ad solem uertunt, melligo tandem con crescit quæ sit balsamo uiribus æqualis. Efficaciora sunt sorbus, mēspilus, pyrasler, quercus, & quæcunque acerba sunt: teruntur, affuso interdum uino, quod adstringat: atque ita alligantur. Addunt bolum Armenum, terram sigillatam, & similia. Composita sunt: Cerati myrtini unc. 3. cerus. unc. 1. uetusta glutinat. Aloë arida, cœno 10 melite coquuntur, emmotum inde tinctum imponitur: capitis ulcera coniungit. Galenus pharmaea temperauit mollioribus naturis ex Lithargyro, oxelæo, et cœnelæo: durioribus ex bitumine, æruginē, squamma, aloë &

Ex litharg. & oxelæo nigrum.

myrrha. Lithargyr. unc. 4. olei, & aceti, ana unc. 8. uel eo plus, ut diutius coquatur. Oxelæo facilius liquescit argenti spuma: diutius tamen uexari mortario ac deinde integrum diem excoqui necesse est, idq; luculento foco, & sereno aëre: quod bene coctū ritē coijt, nigrum euadit, non absimile ei quod nigrum uocant: 20 fortius fit, si oleū uetus est: acetum uerò tenue, pellucidum, & acerrimum. Fistulas sine callo, maiora minoraq; uulnera, cruenta, lacunosa, difficillima, & parotidas glutinat. Quod uerò ex cœnelæo, cruenta iungit: Litharg. lib. dimid. teritur diebus quindecim ex uinigi-lui, tenuis, & odori scilicet libra, uel libra una: deinde af-

Ex cœnelæo.

fusa olei libra una, ut prius coquatur. δὲ χαλκί= τως, fistulas & magna ulcera coniungit, & cicatrice tegit. Axungia ueteris bene purgatæ fibris, & sine sale lib. duæ: olei ueteris, litharg. ana lib. tres: chalciti= 30 dis unc. sex: cōficiatur ex arte: quod si spatha palma-

Δὲ χαλκίτιος

ria de

- ria defuerit, saligna rudicula commouebis potius, quam radice cannæ, cui non exigua uis inest abstergendi. Diuturnis maximisq; ulceribus, & quæ agrè cicatricem ducunt: Succī foliorum lilij unc. quinque: *E' succolilij.* mellis & aceti, ana unc. 1. coque ad crassitudinem: efficacissimè glutinat. Cochlearum carnes cum thure & myrrha tritæ, neruorum uulnera, & alia quæque uniunt. Cruentis, suggillatis, excisis, quacunque corporis parte: uutiligini depræ, maculis & crustis auxilio est: Attractylidis effossæ cū radice & siccata in umbra, deinde tritæ, olei dulcis, ana unc. 4. Colophoniæ unc. 1 8. ærug. unc. 2. ceræ unc. octo: liquabilia simul liquato: excolatis æruginem primum: deinde attractylida commisceto, mixta in frigidam conijcito, diu manibus uersato, ac per noctem frigida macerato: postmodum usui reponito. Barbarum Gal. Ceræ, picis, resine, bituminis, thuris, ana unc. septem. Aliud: Picis lib. 1. bituminis, ceræ, ana selib. ammoniaci, mænæ, ana unc. 3. cerus. sesquunc. olei drach. 1 8. aceti unc. 1 8.
- 20 Aliud ad crueta: Aerug. rasæ denarij. 1 2. lith. arg. denarij. 20. aluminis, picis aridæ, resine pini aridæ, ana denar. 1. aceti, olei, ana unc. 9. Plura primo & secundo de comp. medic. κατὰ γένν. Iam uerò adscribenda remedia posteriorum. Puluis ruber ex sanguine draconis, & sesquialtera ratione, uel dupla thuris. *Puluis ruber.* Alij calcem, bolum Armenum, uel santalos cōmiserunt. Sunt qui hoc modo conficiant: Symphyti maioris, boli Armeni, ana unc. 1. picis Græcæ unc. 3. mastiches, oliban, ana semunc. sanguinis drac. mūmiæ, ana drach.
- 30 2. Pulueres futuris insperguntur, uel in cerato imponuntur. Sanguinē draconis collecticon uariè conficiunt. *Sanguis draconis.*

Thus, mastichem, bolum Arm. equaliter mixta, hirci sanguini maciati Augusto mense contorporant: alij aliter ex eadem materia: quidam bolum Arm. terunt, efficiuntq; ut multum sorbeat sanguinis hircini, & sorborum succi. Plinius sorborum succo, & caprillo sanguine compingit. In his omnibus providendum, ne supra modum contrahas: quod si metuitur, cerato pharmaca temperabis. Eidem Plin. & Solino sanguis est draconis, qui dum uulneratus elephas concidit, colliso casu dracone colligitur. Aëtius è succo herbae Indicae quam dracontem uocant, fingi credidit. Dracontio nostro uis inest glutinandi. Plantaginis utriusque, cōsolidae, betonicae, uerbenae, pimpinellae, pilosellae, millefolij, linguae canis, caudae equinae, ana manip. 1. Conquassata coque cum lib. tribus sepi arietini: colatis adde resinae, cerae, galbani, ana quart. tres: sarcocollae quart. 1. terebinth. quart. 1. & semiss. Liquata omnia miscentur.

Centaurij minoris manip. 6. macerentur per noctem in uino albo: tum in eodem coquito, dum medium uinum consumptū sit: colatum succum iterum coquito ad mellis crassitudinem: postremo reposito: usus tempore accipito terebinth. lib. 1. cerae nouae quart. 1. resinae, thuris, gummi Arab. mastiches, ana unc. 1. succi praedicti unc. 3. lactis muliebris unc. 2. fiat emplastrum. Betonicae, centaurij, ana manip. 2. coque, & cola ut prius: excolato succo adde resinae quart. 1. terebinthinae felibrum: sarcocollae uncia una: cerae unciae duae. Liquata omnia bulliant, acetum paulatim affundatur: ubi refrigerint, omnia manibus e muliebri lacte conuoluantur.

Cerae albae, resinae, ana quart. 1. olei unc. 2. terebinth. 3. lotae unc. 1. thuris, mastiches, ana semunc. fiat unguentum.

Viride Bonan-
tini.

E' centaurio.

Disti.

Anserini.

tum. Pimpinella, betonica, melangiana, uel loco huius telephij, uel maioris semperuiui, uerbena, uermicularis, aut potius semperuiui minoris, ana manip. i. coquantur uino ut prius, dum duæ partes exhalauerint: & alijs similiter percolentur, colatus succus iterum coquatur, tum adde resinae lib. i. cereæ albæ scilicet mastiches unc. 2. refrigerata ut prius è muliebri lacte subigantur. Aliud: Olei bedegaris lib. i. cereæ quart. i. feminis albarum rosarum semunc. fiat ung. Olei bede.

Vng. glorie.

- 10 garis finges, cumis bedegaris, aut si defit, attractylidos, in olei & uino nigro coctis, dum uinum expirauerit. Semen rosarum est, quod detractis folijs, & apicibus luteis, excusso capite decidit. Chelidonie panis cuculli, ormini, hybiscici, scabiosæ, ana manip. i. sepi arietini lib. i. olei scilicet cereæ, mastiches, thuris, aloës, æruginis, ana unc. i. E uermibus neruosis partibus glutinantibus: Vtriusque symphyti, cynoglossi, pilosellæ, utriusque plantaginis, ana manip. i. uermium terrestrium lib. dimid. trita omnia macerentur septem dies in olei ses-

Viride ex herbis.

E uermibus.

- 20 quilib. deinde cocta leuiter excoquantur: expresso succo, misce sepi arietini purgati lib. i. picis naualis scilicet lib. picis Græc. quart. i. ammoniaci, galbani, opopanax, terebinth. ana unc. i. thuris, mastiches, ana semunc. macerata pinguis in aceto, & soluta ceteris uniantur. Lumbrici terræ per se triti, & imposti neruos glutinant. His ergo utendum, ut prius, constituto ulcere, stupa è uino rubro pressa superponenda, hypodesmides, splenia, & reliqua lintea eodem uino insuccanda: ligandumque uulnus, ut contineas, reformes, cogas, quantum uidelicet ulcus exposulat.

Vermes terreni.

De pyroticis. Cap. XI.

Δρώπαξ.

Υρωτικά sunt δρώπαξ, σινιπισμός,
π Φοινιγμός, καθαυρετικά, σιπτικά,
εσχ αρωτικά: ignis denique, & inde cau-

teria. Dropacas picationes uertunt; non ē uerbo qui-
dem, sed πῖττω & πῖττωα ueteres appellarunt,
unde Latina uox conuersa est. Alij etiam δρώπακι-
σός ē pice, et quarta, uel quinta parte olei, quibus sub-
decuplum, plus minus uel piperis, pyrethri, euphorbij, 10
& similiū, misceri solet. Sic enim melius calfacit,
ut accepto sulphure, cinere sarmentorum, & sale sic-

Vfus.

cando magis conuenit. Nam & dropax, quiq; descri-
bentur, sinapismus & phoenigmus, eo sunt, ut refrige-
rata calfaciant, confirmentq; partes, quæ partim fri-
gore, partim assidua fluxione elanguescunt. Alia qui-
dem possunt plurima: hic tamen præcipuus eorū usus
est. Et hæc in genere μετασυγκριτικά ueteres ap-
pellarunt. Alutæ dropax impingitur, uel lintels com-
plicatis, quæ πτύσματα & διπλώματα Græci uo 20
cant. Deglabratur cutis crasso pilo, dropacissimus calens
inducitur: idem subinde reuellitur, priusquàm refrige-
scat. Renouatur pharmacum, dum inde efflorescat lo-
cus in ruborem, & leniter extumeat. Nimum est, cum
mora pharmaci subsidet tumor, & exalbescit. Hoc
enim uolumus, ut dropacis ope reuocata anima, pars
uelut intermortua reuiuifcat, calorem suum ac spiritū
recipiat, & iam proprio alimento perfruatur: postre-
mò etiam corporetur, quæ cōfecta macie intabuit: ue-
rùm alia tardius, alia celerius uitā recipit. Quæ breui 30
rubit, ea celeriter inflaturatur: tardius, quæ agrè reca-
lescit:

Μετασυκρι-
τικά.Πτύσματα.
Διπλώματα.

Μ: dms.

lescit: desperatio est, quum neque frictione, neque fotu tepida, neque dropace melius coloratur, Alijs satis fuerit, si tribus aut quatuor diebus adhibeatur dropax, nec assidue quidem, sed bis hyeme, semel aestate. Alijs bis ter uel singulis diebus, nonnunquam tertio, uel quarto quoque die, & uidelicet uel facile cedit, uel contumax languor est. Ac tepida prius fouisse confert, uel sinegmate affricasse, quod aliquid thapsiae, sinapi, euphorbij, piperis, pyrethri, capparis receperit. Quod si

10 affixus dropax pertinacius haesit, tepida diluendus est: quem quum detraxeris, sursum decocto, & similiun, partem extergebis. Sinapismus paralyticos, coxariorios, podagricos, inueterata rheumata, hemicranias, quaeque caloris inopia languent, adiuuat. Caricæ uno die aqua maceranda, aut cappares, si grauius malum est, uel si lenius, & acrior sensus est; panis triticeus: hicque magis, cum in superficiem tantum agere oportet: macerata tundenda sunt. Lenis erit sinapismus, qui subduplum sinapi scorsum triti acceperit: acrior, qui

Sinapismus.

Materia.

20 duplum: mediocris, in quo utrumque ex aequo temperatum fuerit. At quo tempore pinsitur medicamentum, paulatim affundenda aqua est, in qua illa maduerint. Sunt in ueteribus, qui acetum praeulerint: alij aquam, quod experimento didicerunt, sinapi uim aceto exolescere. Eodem modo, quo dropax, usurpari debet. Si quis dolor, aut feruor a medicamento extiterit, tepida, uel rosacei fotu, illitu cerati rosacei: cerusa e rosaceo trita, & alijs id genus extinguitur. Phœnigmus rubo

Phœnigmus.

30 re facto etiam uestigas mouet, & exulcerat: in eorum genere, quae quia illita exulcerant, uocantur ἀπυκνιστικά. Ex nasturtio, sinapi, radice helenij, bryoniae, le-

ἀπυκνιστικά.

Materiæ.

pidij, columborum fimo, maxime syluestrium, caprillo
 flercore (unde δρακοντσαυγας) aceto pistis. Scilla
 trita, nucleis alijs, & tunicis, lacte tithymalli, ficulneo;
 pulegio, cantharide, urtica, ranunculis, thapsia, euphor
 bio. fece ussa, metallis acribus, & alijs id genus: lana
 sordida bene carminata, & calēte igne, assis carnibus,
 & ouis, dum uehementer calent, impositis. Visco, mel-
 le, axungia ueteri, terebinthina, cerato, acrioribus,
 gummi, & resinis, ut res exigit, & corpora uel mollia
 uel dura sunt, excipere oportet. Alias quoque friabi- 10
 lia affricantur: emplastra uero imponuntur loco: hic
 prius palpatur manibus, exercetur ferulis, aut asser-
 culis euerberatur: affricatur etiam, ut laxatis spiracu-
 lis medicamenti uirtus celerius penetret. Anacardia
 trita septem diebus macerant aceto: in eodē coquunt,
 dum pars tertia euanescat: refrigerari sinunt: exci-
 piunt concha, quod enatat oleosum. Id mel anacardi-
 num est. Alij conquassant anacardos, sepeliunt melle,
 dum hoc uim anacardij satis conceperit. Fermentum
 aceto tinctū, anacardino melle, uel causticis rebus con- 20
 corporatur. Puluisculus ē sinapi, piperis, euphorbij,
 ana drach. una infricatur: uel inspersus anacardino
 melli. Ita cerato ē tapsia, & alijs utendum est. Breui
 mora rubor fit, deinde bullæ excitantur, ulcus etiam, si
 diutius insiterint: uestiæ configuntur, humor expri-
 mitur: relinquitur ulcus, dum uitium reddiderit. Hac
 arte coxarij, podagrici, hemicranici sæpe releuantur:
 repurgantur uiscera, sexcentaq; uitia percurantur.
 Cathartica sunt, es ussum non lotum, ærugo, squama
 eris, & rubra magis: testa, & terra furnaria, testa- 30
 rum, concharum, & ranarū cinis, alia quoque in epu-
 loticis

Mel anacardi-
dinum.

Cathartica.

loticis descripta: hæc ferè in superficiem agunt, exere-
 scentem carnem cōplanant, ac leniter radunt. Septica
 aliū subeunt, tenellā carnem tabefaciunt calore mul-
 to, nec ita crasso corpore. Arsenicum, sandarachæ,
 dryopteris, chrysocolle, pityocampe, aconitum, san-
 guis equi admissarij. Escharotica ut nihilo plus ca-
 leant, rōdunt tamen acrius, crassiore materia, quæ du-
 ris & callosis corporibus conueniunt, ut septa mollio-
 ribus. In escharoticis calx uiua, uini sœx cremata, &
 10 aceti, quæ secundum mensuram non superet: nam quæ
 uetustior, exanimari solet. Ignis denique, & cauteria:
 utriusque generis usus est in callosis fistulis, putrilagi-
 nosis, humore fluentibus, ac solutis ulceribus. Escha-
 roticis peculiariter utimur in cancris, carbunculis, hæ-
 morrhagijs. Hic frugaliter uita, frigida liberaliter pota,
 uini abstinentia, alimenta refrigerantia, magis etiam si
 subest febricula, imperanda sunt. Septon, quod exest
 sine morsu: Sandarachæ, auripigmenti, ana drach. duæ:
 calcis uiuæ, mānæ, thuris, aristolochiæ, ana drach. sex:
 20 pumicis, resinæ, ana drach. quatuor: iridis drach. duæ:
 terūtur omnia. Arsenici lib. una: calcis uiuæ drach. 2.
 diebus triginta in aqua mersa tundere oportet, idq; in
 sole, & bis quotidie aquam commutare. Auripigmen-
 ti, sandarachæ, calcis uiuæ, pumicis, ana drach. qua-
 tuor: eodem modo mersa, tusa, & siccata usurpantur.
 Squamæ æris drach. quatuor: sandarachæ drach. duæ:
 ellebori nigri, aluminis scissilis, uel auripig. ana drach.
 una. Squamæ sandarachæ, auripig. ellebori nigri, se-
 minis urticæ torrefacti, ana cum rosaceo tritis uterè-
 30 Sandarachæ, aluminis scissilis, ana drach. quatuor: au-
 ripig. squamæ ana, drach. una: in serpente ulcere, &
 humore

Septica.

Escharotica.

Vsus septorum
& escharotico-
rum.Ratio uitæ in
usu escharoti-
corum.

Septa.

Elleborus.

Callus quid.

ἐκ πλῶτον.

Curatio calli.

Materia.

Olea Esculotica.

humore fluído, uteris arido. In cancro, & struma, cum
 rosaceo subiges: bis in die commutatur. Atque hæc fe-
 re materia septicorum est, quam exuras, eluas, cerato
 & alijs temperare possis. Elleboro magna uis inest
 contra callos: fistula iniectus, ad tertium diem callum
 adimit. Callus, dura quedam est & compacta caro,
 unde pars stupet, albicat, nec expirat. ἐκ πλῶτον
 sunt, quæ callos detrahunt. Oppugnantur calli, pri-
 mum quidē malacis: deinde causticis: postremo igne
 & ferro: unguibus eraduntur, lacerantur scalpris, ex- 10
 scinduntur cultris ad uiuum, & si quid reliquum sit,
 caustico remedio absuntur, uel candente ferro inuri-
 tur: sed fluxio reprimenda, prius quàm exercetur cal-
 lus. Exciso callo tepida fouendum, tum abluendum
 aqua, ubi alumen disfluxerit. Repurgandum melle, &
 erugine, si qua sordes extiterit. Esculotica sunt, scilla
 cocta, & cum calce trita: nitrum, sal, torrefacta: sex
 cremata ueteris acrisq; uini uel aceti, cortex salicis
 ustus, & aceto pistus, usta calx cū pueri impubis uri-
 na: erugo melli, sali, tburi, æqualiter mixta. Laser aut 20
 calx cerato irino uel ligustrino capta. Testa, terraq;
 furnaria, pumex crematus ex aceto, trita: nasturtij fa-
 rina aqua subacta, bdellium pingue cum melle, ammo-
 niacum aceto fusum cum pari ærug. Radix lilij usta in
 cinerem, ærugo cocta, læuigata: amygdala e melle tri-
 ta. Squamæ unc. i. æruginis drach. duæ: cerati lentisci-
 ni, uel myrtini, uncie octo, plus minus ue: harpax cum
 modica ærugine. In hoc genere laudatur oleum lenti-
 scinum, quia præterquàm quòd mollit & digerit, etiã
 adstringit, repellitq;: quibus omnibus difficilia ulcera 30
 cum oris induratis egent. Terebintinum similiter &
 mastichinum

massichinum, quæq; similia sunt, ἐκπλαστικὰ ὡς
 σπιντικὰ ipsæ rebus quibus amytica excipi possunt,
 uisco & alijs. Satis profecisse putes, cum suis margi-
 nibus utiosum corpus à sano excefferit. Quod si se-
 ptis nihil effeceris, ad escharotica, ignem, & cauteria
 ueniendū, atque omninò uis pro magnitudine & con-
 tumacia ulceris adhibenda est. Escharotica ex septo- Escharotica.
 rum materia conficies, sed ut firmior trahatur crusta,
 è metallicis acribus miscēdum erit, quod sit crassa, &

- 10 adstringente potentia: qualis est cadmia, chalcitis,
 chalcanthum, quæ per se cruda, trita, & salua homi-
 nis, uel aceto capta, crustam contrahunt. Eadē uis le-
 niora quidē, uerū escharotica. Septa muscentur, cum
 altius imprimenda crusta. Celerius operatur ignis, &
 melius, si ægri perferunt. Atq; is nō uno modo adhibe-
 tur. Cōceptus aqua feruida, ligneo tubulo, canali, pēna vñ ab igne
 scriptoria inducitur, extrema parte in equabilem cir-
 culum circumscripita, quæ clauos, uerrucas, & similia,
 quæ urere oportet, includat: altero extremo dehiscen-
 te, aqua feruens, plumbū fūsum, uisum, & similia illi-
 quantur: dum uim suam una collabens ignis satis im-
 presserit. Alioqui lana mollis, specilli nucleo alligata,
 feruente oleo, uel butyro intingitur, atque ita impri-
 mitur. Fortius est, si uel è uitreolo, uel antimonio, &
 uocato sublimato, alijsq; id genus, oleum fuerit extilla-
 tū. Quidam nucali testā, uoluta cochleæ & oui irūt,
 posteaquā igne incanduerint. Alij radice Aristolo-
 chie, gentianæ, struthij, ramento myrti, buxi, & simi-
 lium, cauteria effingunt. Oportet igne contineri, dum
 30 extrema parte carbunculent. Vñtione Arabica uete-
 res, ut pōst etiam recētiores, uisunt. Auro & argen-
 to lenius:

to lenius: ære, & ferro acrius inurūt. Cæsim, punctim
 cauteria imprimuntur, adiguntur longius & latius,
 & in circulum circumferuntur: uno loco uel pluribus,
 semel ac sepius: ut natura rerum, partium, & corpo-
 rum sustinet, & uitia requirunt: ex quo uariæ caute-
 riorum formæ affinguntur. Locum igni circumscribe-
 re oportet, nicali testa uel re simili, quæ suis margini-
 bus constans, pateat in medio. Cerato rosaceo, lana ui-
 no tincta muniendæ sunt uicinæ partes, ne iusto latius
 euadat ignis uolentia. Alioqui splenijs imbutis oui
 candido, mûcca gine psyllij, cerusa è rhodostagmate lo-
 ta, refrigerante succo, & ijs omnino quæ αφλεγμα-
 τος Græci uocant. Crusta non statim detrahenda,
 sed nutare prius oportet, ac ueluti maturitate sua exci-
 dere. Alioqui uis afferri solet: profundum ulcus relin-
 quitur: dolor, fluxio, phlegmonæ irritantur. Tempesti-
 ua deduci potest butyro & rhodostagmate loto, fari-
 na tritici in porri uel rutæ succo. Lenticula cocta &
 cum melle mixta, folijs oleastri cum melle litis, sulphu-
 re trito ex oleo, contusis nucum interaneis, porri folijs
 salina tinctis, & in mollioribus lacte cum melle cocto:
 albo stercore canino, cinere ustarum hirundinum, &
 minoris centaurij: humano stercore seccato, crematis
 cochlearum terrestrium carnibus. Chalcite trita &
 subtriplo melle: uel chalcite eos unc. .i. ireos semuncia,
 per se tritis aut cum melle. Nutrito lithargyro cum
 ustulato butyro, radice ononidis, columbino stercore è
 melle, quod & carbunculos searificat. In summa, abster-
 gente & incidente materia, quæ paregorico & molli-
 te remedio temperari potest. Recentiores chirurgi in
 septis numerant, stupas canabinas, hermodactylos, bryo-
 nie

Que crustam
 detrahunt.

niæ radices, alumen, unguentum apostolorum. Et in carne dura & multa, uitreoli genera, & cuperosam, quibus pro calcantho & chalcite uti solent, æruginem.

Unguentum uiride Aegyptiacon: Trochiscos. e uiuæ calcis unc. quatuor tritis & cum melle iunctis: sit autem mellis plus minus uel, ut sunt corpora. Trochisci ca

Recentiorum
septa,
Trochisci de
calce.

psula figulina ordine collocantur, siccantur in clibano, puluis inde utilis est. Succus radicis asphodeli unc. 6. calcis uiuæ unc. 2. auripig. unc. 1. arida succo mersa

10 sub canicula insolentur, dum squaleant. Calcem uiuam modò melle, modò sapone incorporant. Cantharidum uentres fermento cogunt uel sepo: sed à cantharidibus urinae ardor metuitur: nam & hæc illita capiti id genus uitij inferre possunt, cui malo gargarismus & infusio è lacte succurrit. Eadem quoque parata è paregoricis, septa adipe uel sebo excipiunt. In adipibus septicus est è ranis uiridibus, quas in arboribus uenantur. Quæ sequitur ex quinto de comp. pharm. κατὰ γέννην transtulerunt: Malicorij drach. 10. aristoloch. rotun-

20 de gallæ, drach. 8. aluminis scissilis, aloës, ana drach. quatuor, myrrha, chalcanti (uitreolum uertunt) drac. 2. thuris drach. 4. Exedunt sine morsu: Sandarachæ, id est, arsenici rubri, auripig. ana drach. 2. calcis uiuæ, drach. 4. mannæ thuris tantundem: tritis utitor. Sic enim Galenus. Recentiores hoc modo: Calcis uiuæ lib.

Trochisci de
arsenæ.

1. auripigmenti rubri & citrini, alkali, acaciæ, ana lib. dimid. trita uniantur cum capitello. Est autem al-

Alkali.

30 teres fingeant: nunc è brassica marina, betis, & nitrosi rebus comparari potest. Alioqui torrefactum sallem cum

Capitellum.

lem cum hydrargyro, tandiu pistillo uolutabis, dum sal nigrescat. Alij aliter al kali interpretantur. Capitellum ita fit, Calchs uiuæ salis ammoniaci, ana lib. 1. trita subigantur lixiuio è fabaceis scapis. Deponuntur olla quæ à fundo hiet angusta rima: aliud figlinum subijci-
 tur, in quod paulatim lixiuium diffluit: sed uas utrinque statim initio defodi terra opus est, ubi septem dies persisset. Cathareticon, septicon, & lene escharoticon capitellum est. Alij tres partes cineris fabaceorum, unâ uiuæ calcis, subinde persundunt aqua, identidem con- 10
 uoluunt, & per quasillum rarum transcolant. Rami ficulnei cremantur, cinis aqua maceratur, qui ubi in aquam uim suam demisit, exprimitur & abijcitur, nouus aliquoties reuocatur. Eodem modò è ramis tithymalli & causticis cineribus lixiuium parari potest, in quo spongia subinde mersa apponitur. Alia capite de epuloticis. In humido ac sordido ulcere, pingui abstinendum: arida insperguntur. In calloso, & squallente malo arida pingui excepta adhibentur. Septica faciunt Arabes quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus re- 20
 linquunt, quod humido calore cum foetore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, sublimatum, cinabrium, brassicæ succo, solani, limonium, & similia attemperant. Licet etiam, quod ueteres fascitauerunt, non tribus, sed triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, bis mutata aqua. Et ut sunt corpora & uitia, ita magis minus uel acria comparari possunt: nec lotura solum, sed ustrina & mixtura diluuntur. Minium è micks metallicis, è sterili gleba plumbi, è cerussa usta, quod alij syricon, alij sandicen 30
 uocant, ad epulotica potius referendum. Quod uerò è sulphure

Lixiuum ficul-
neum.

Minium.

fulphure & hydrargyro facilius est, in causticis cen-
 feri debet. Vsurpant præter hæc, aquas fortes, & ut *Aque fortes.*
 dicunt Alchymistarum. Salis ammoniaci, auripig. ru-
 bri & citrini, cuperose, æruginis, ana trita in alembi-
 cum vitreum bene stipatum luto, & undequaque clau-
 sum deponantur, & ita extillantur lento igni, quod
 primum fluit, uel abijcitur, uel in alembicum repeti-
 tur. Ignis augetur duplo: quod secundo stillat, fideliter
 reponitur. Alijs ex aluminis rotundi, vitreoli Romani,
 10 ana lib. 1. salis nitri, aut si desit cremata facis aceti
 sesquialbra: aquam eliciunt, hæc callosis naturis idonea
 sunt, suspecta in naso, labris, palpebris, digitis aut pu-
 dendis, mollibus atque exiguis partibus, ubi uena, nera-
 ius, arteria insignis est: ac primum quidem minimum
 sit, quod imponitur: deinde ut res exigit, augeatur. Ali-
 quando cerato rosaceo, unguento albo, di althæas, &
 similibus mixta retunduntur: muniunt uicina: doloribus
 medentur ut prius.

20 De dolore. Cap. XII.



ACCIDUNT multa uomicis & uulneri-
 bus, quorum remedia aliquot conspersa lo-
 cis, ut proximo capite contra callos: alio
 contra uermes, cancerosa, putredines: & quæ rheuma-
 ta intercipient, præcidantq; phlegmonem causas ac
 feruorem partium à pharmacis extinguant: alia quo-
 que obiecta et annectata sunt. Iam de dolore & hæmorrha-

Causa doloris.

30 lia interturbant. Itaque dolor omnino fit subita alte-
 ratione & solutione continui, cui quam celerrime oc-
 currendum:

currendum: nunquam enim committendum ut diutius crucietur aeger: sic enim rheumata commouentur, oriuntur pblebmonæ, labefaciuntur uires, conuulsiones rapiunt ægros, ac sæpe mortes. Et quod ad institutum maximè pertinet, ulcera inde madescere contingit: quæ sicca esse, seruata naturali ratione, et uacua excrementis necesse est. *Ανώδυνα* uocant et *παρηγερινά*, quæ dolorem leniunt, tenui substantia, primo gradu calida, uel ita temperata ut familiaritate elementorum, naturæ partium consentiant. Adde si uis, quæ qualitate contraria causam oppugnant, quale est oleum laurini in refrigeratis, uiolaceum in calefactis, siccatis hydreleu: humiditas enim non tam qualitate quam copia dolorem facit. Ideoq; pblebotomia, catharticon, clyster, et similia, quæ sublata copia dolorem tollunt, in hoc genere collocare licet. A calore et frigore dolor accerrimus, à siccitate mediocris, ab humiditate propè nullus, uel stupidus excitari solet. Tertium quoque genus adiiciunt, sed improprie: eorum quæ stupefacto sensu dolori remedio sunt, quia quod doleat sentire necesse est, et extincto sensu dolor necessario conquiescit: *αλγοπικνά* et *ύπνοπικνά* talia appellant. Anodyna sunt oleum dulce ætate medium, oleum Chamæmeli, oleum è lini et althææ semine, et è dulcibus amygdalinum, oleum lumbricorum, uulpinum, melinum, è meli, è pullis cygni, extortum tritico candenti ferro, è sarmentis uitium, ex ouis pressum, sambacinum, sambucinum, è floribus, et alia, de quibus postea. In quibus distinguenda, quæ non solum leniant dolorem, sed etiam causæ repugnant: quale est rosaceum, ubi à calore dolor est: aut à dolore commotus calor. Chamæmelinum

*Ανώδυνα, et
παρηγερινά.*

2. Genus.

3. Genus.

Olea.

chamæmelinum ubi leniendum simul atque discutiendum aliquid est. In anodynīs sunt butyrum, cefypus, lana bene succida, suillus adeps, vitulinus, è cercopitheco, & simia, gallinaceus, anserinus, humanus, ex anguilla & cuniculis, vulpinus, melinus, asininus, lac muliebre, & uaccinum. Altheæ, malvæ, seminis lini & cydoneorū, lilij, violariæ, pedum arietis, capitum & interaneorum hœdi similiter decoctum, & hæc lacte coqui melius est, aut cocta lacte butyro condiri, uel conteri rosaceo.

Adipes.

Materia deco-
ctorum.

1. Crocum, thus, mannam, galbanum, & similia pharma-
cis commiscant, ut quæ aliquid habeant quod paregori
con sit. Calorem temperant, & anodyna sunt, aqua te-
pida, oleum rosaceum, violaceum, nymphaeon, papaveri-
num, cucurbitinum, & quod è candido alterci semi-
ne, priuatim usurpatum feruidis doloribus podagrico-
rum: lactucinum, portulacinum, psyllinum, cucumeri-
num. Et ex horum oleorum materia succus ac mucca-
go colligitur, uel eadem in lacte coquitur, ex conue-
nienti oleo subigitur: linteola in decocto merguntur,

Olea anodyna
qua refrige-
rant.

2. succo & mucagine imbuuntur, & ita iuuant. Ac subin-
de inculcare linteola & auxilium repetere necesse est.
Cerata & enchrīsta è cera alba lota, oleo conuenien-
te, mucaginibus, cerusa lota, populeo unguento, & si-
milibus confingi possunt. Dolores è frigore iuuant,
quæcunque ferè in anodynīs numerata sunt, oleum
chamæmelinum, anethinum, è leucoio, meluloto, hyperi-
co, lininum: atque his magis è baccis lauri & iuniperi
uino maceratis extunditur mola, coxarijs, & frigidis
articulorum uitijs. In lue uenerea frigidōs dolores iu-

Contra dolores
frigidōs.

3. uat galbanarium, sulphurinum, styracinum, in quo
thus, manna, & similia diffusa sunt, & quod è nuce
S S myrrepsica

myrepfica incude & candenti ferro pressa extringitur. Sed eadem conquassata, ut & cinnamomum oleo incoqui possunt: ita è calēdula, maiorana, roremarino, & similibus parare licet. Irinum ex acori radicibus, centaurio, gentiana, aristolochia, bryonia, hyssopo, thymo, pulegio, ubi crassus humor impactus cruciat. Sinapinum, cnidelaō, & alia id genus efficacissima sunt. Vino ferè & pari oleo materia coquitur, quæ prælo uel mola oleum non reddit. Cùm iam uinum exhala-

Oleum terebin-
thinum.

ut, ea exprimitur, oleum reliquum usui est. Terebin-
thinum oleum, è terebinthinæ libra una: laterum an-
tiquorum, uel, ut Albucasis, recentium, quia plus olei
combibant, uncia una: mastiches, & styracis, ana uncia
una: lateres igniti extinguntur oleo, extincti tritiq;
ceteris commiscuntur in Alembico uitreo: tres liquo-

E' floribus ro-
ris marini.

res effluunt, quorum tertius est optimus. Flores roris-
marini amphora uitrea duplici linteo obstipata, dein-
de etiam cera includuntur: elicitur oleum calida arena,
Chymicorum more. Oleum philosophorum Mesuæ, pe-
treleaeon, & quod ex euphorbio. Contra flatum & dolo-

res frigidos uentris atque uteri, quod sequitur, pluri-
mum facit: Olei anethim libra una sem. agni casti, se-
minis rutæ, ana uncias tres: cinnamomi unc. sex: con-
quassata hæc quadraginta diebus insolentur mersa
oleo, uel lento igne incoquatur. Fetus è Chamamelino
& meraco uino calidus, dolores omnium partium cor-
poris compefcit. E' caryophyllis oleum, & calamo aro-
matico efficacissimum est. Radix cucumeris agreflis in
taleolas ceditur, cum absynthij cacumine hydreleo co-
quitur, hinc fetus & cataplasma hemiceranijs singula
re. Erinaceus terrestris oleo & uino excoquitur, dum

solum

solum oleum reliquum sit: contra dolores articulorum.
 E' sex uittellis asis, myrrhæ drachmæ dimid. ellebori
 nigri grani. 4. oleum exprimunt singulare ulceribus
 pucrorum, callosis ac dolentibus ulcerum labris, putria-
 laginosiss ac uermiculantibus uitijs & scabiei. Styracis
 pinguis uncia duæ, uel eo plus, in sesquilibra olei colli-
 quantur in duritie dolente: addita octaua parte ellebo-
 ri albi, scabiei conuenit. Agrippa & Marciato quidā
 utuntur in frigidis doloribus. Vulgatum est anody-
 10 non: mica panis soluta lacte, uel incocta ex tribus ui-
 tellis oui & sesquuncia rosacei subigitur, cataplasma
 fit. Sit panis libra una: oua momento croci intinguan-
 tur. In desperatis narcotica usurpantur: unguento ro-
 sato, & dialthæas, aliquid populei unguenti & opij
 commiscetur. Cerati rosacei unc. 3. opij drach. 1. ca-
 florei scrup. 2. unguenti rosacei unc. 1. terebinth. unc.
 dimid. colliquatis adde opij scrup. 1. croci grana. 4.
 Aliquid etiā Philonij scriptis unguentis & ceratis mi-
 scere licet. Oleum in quo uiua torpedo coxerit, nar-
 20 coticum est. Dialthea unc. 2. galbani semuncia, opij
 scrup. 2. croci grana. 6. Grauißimis quibusque dolori
 bus singulari ope succurrit, ex aduersa parte detra-
 ctus sanguis, quem statim initio minuere melius est.
 Sic enim præciduntur malorum causæ, & quæ nocent
 uulneribus omnia ferè sanguinis uitio commouentur,
 dolor, phlegmone, gangræna, syderatio. Multò magis,
 si affecta parte uenæ sunt insignes, quæ oppressæ co-
 pia dolorem cient: postea uerò cum non expirent,
 gangrænam pariunt & σφάκελον, id est, syderatio-
 30 nē. Hoc uitium corruptela est, primum quidē ossium,
 deinde partium reliquarum: cui periculo phlebotomo
 SS ij occurrendum,

Scarificatio. occurrendum, atque etiam cultello scarificandus locus est, ut leuatus onere & uisito, ad spiritum liberè attolatur. Cucurbitula quoque ad hanc rem sepe contulit, de qua seorsum à nobis libellus editus est.

Cucurbitula.

De hæmorrhagia. Cap. XIII.

NON SOLVM è recenti, sed & inueterato ulcere sanguis effluit, apertis, ruptis, exesls uasls. Et ex arteria hæmorrhagia periculosior: deinde maioribus uenis, quæq; plus sanguinis effundunt, quas inde αἱμορροῖς uocauit Hippocrates. Apertis adstringentia, ruptis glutinantia, exesls sarcotica, & boni succi alimenta remedio sunt. Aperta simul & rupta uiuat plantago, balaustrum, hypocisthis, rhus, onphacium, galla deflagrans & uino uel aceto tincta, acacia, malicorium, symphyti radix, porrum contusum, polygonon, peruinca, terra sigillata et figulina, bolus Armenus, rhabarbari magma, rubigo ferri, lapis hematites, passæ uuae nucleus, gallæ flos, lanugo quæ cotoneo & mascula salice insidet, quæq; in ea panniculæ dependent, fraga herba, cynosbatus, aqua frigida, uinum adstringens, acetum, oxycratum, & alia quæ in epuloticis, glutinantibus, & repellentibus antea descripta sunt. Peculiariter ruptis conueniunt, thus, manna, aloë, mastiche, tragacantha, amyalum, gummi, glutinum, larigna, terebinthina, pix sicca, colophonina, gypsum, farina pristinialis, cochlea cum domo trita. Horum alia in puluerem cōminuta insperguntur: meliora ferè emplastica, ideoq; in oui candido, resina liquida, conueniente succo imponi debent.

Apertis.

Ruptis.

Utendi ratio.

Linamenta,

Linamenta, pili leporis, lanugo illa salicis & cotonei succis liquidis inculcantur; atque inde penicillus aut uermiculus pharmaco madens hianti uasorum ori inseritur: floccus ex eadem materia & pharmaco saturatus superdatur, ligaturq; commodè, iniectis uasi modò tribus, modò quatuor fasciarum orbibus, ad eam partem unde profluit sanguis, ex quo fascia radicem uersus paulatim adduci debet, ut sursum uersus magis magisq; stringas atque illabentem sanguinè reprimas.

10 Tertio die resoluenda lintea sunt, neque commutanda linamenta, flocci, uermiculi, si quidè firmiter inhaerent, sed tantum irriganda pharmaco, ac ut prius colliganda. Quòd si uacillant, digitus uasi imprimendus, reuelanda turunda, et reliqua tum noua ut prius omnia repetenda, eademq; ex praescripto uincienda sunt: idq; tandiu reuocandum, dum renata carne, ac bene stypto uase, extra periculum omnia uideantur. Aliquando uerò ubi in superficiem uasa exponuntur, digitus impressus haemorrhagiam sistit, coacto grumo. Que si

20 in profundo latent, nec facile digito continguntur, hamo prehendere, leniter intorquere, & laqueo interciperi oportet. Nonnunquam uolsella capta utrinque funiculo illaqueantur, & media praeciduntur, ut extrema in se reuulsa coeant. Id uerò in maioribus uasis non caret periculo. Desperatis alijs auxilijs, ad ignem & cauteria ueniendum, multò magis si quid putre, uermiculosum, serpens, rodens: si eiusmodi locus est qui facile cõputrescat, qualis est sedes, os, & genitalia, quiq; uim ignis sine periculo sustineat. Escharotica hoc

Ferrum.

Ignis.

Escharotis.

30 loco uehementius contrahere oportet, ut firmam nec deciduam crustam efficiat. Alioqui maior uis sangui-

Phlebotom.
Cucurbit.
Sanguisuga.

Purgatio.

Vsus refrige-
rantium.

Spongia.

nis erumpet, ante tempus resoluta crusta. In remedijs laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguisuga, uincula aduersa parte $\epsilon\tau$ κατ' ἐνθωσιν $\alpha\pi$ reuellendo adhibita, $\epsilon\tau$ constringens epidesis. Cucurbitulae ratio ex libello nostro repetenda. De phlebotomia $\epsilon\tau$ sanguisugis alio, quod paramus, opere differemus. Purgatio saepe necessaria, sed tardius opitulatur. His fere remedijs materiae cursus retrahitur: quanquam non temere remittendum sanguini: quia ex omni uulnere, nisi sit in uentre, crebro sanguinem fluere utile est: autor 10 Hippocrates. Tempestiue ergo supprimes, iusta ratione leuato corpore, ut inde siccius effectum, ulcus celerius possit coalescere. Ac fortasse tutius fuerit ulcus emplastris obstypare, frigidis $\epsilon\tau$ adstringentibus medicamentis uias intercipere, quâ sanguis decurrit: frigidum enim $\epsilon\tau$ adstringens ulceribus mordax. Et in ijs frigido utendum, unde fluit sanguis uel fluxurus est, non ad ipsa, sed circa ipsa, inquit Hippocrates. Aliæ quoque partes, ut thorax $\epsilon\tau$ quæ neruaceæ sunt, frigido læduntur magis. Ideoq; iam auersa materia, neque 20 etiam locis omnibus, frigida adhibere conuenit. Columbæ sanguis peculiariter reprimat hæmorrhagias è membranis cerebri. Memorabile remedium est quod sequitur: Spongia noua, alioqui uetus, sed marina uel lixiuio querno repurgata, acerrimo aceto inebriatur, tum inquinatur liquefacta pice, deinde trito bitumine, galla, uel re simili conspergitur, atque ita crematur testa figulari clausa, dum cinerescat. Alij aceti loco, taurino sanguine imbuunt, ex odoro uino propinant, singulari ope, dysenterijs, mensstruis, $\epsilon\tau$ alijs hæmor- 30 rhagijs. Emplasta sunt, gypsum crudum, gyris, si oui candido

candido excipias : thuris partes duæ, aloës pars una, uel eo plus in duriore natura. Loco thuris usurpatur manna, ut quæ melius adstringat, sed thus ἐπιτολᾶσι = κώτερον pharmacum reddit. Concorporantur liquore oui: uermiculus è mollissimis pilis leporis medicamentum intingitur, & si fuerit opus, dehiscenti uasi immittitur. Ex ijsdem pilis conficitur floccus, qui eodẽ pharmacum imbuatur, atque imponitur cauo, ut incumbat uermiculo. Eunuchis è manu sianma profluens sanguis eo.

Historia.

1. o pharmacum non resistit, qui deinde linamentis ex dilu-
tissimo oxycrato pressis omninò conquieuit. Loco pi-
lorum leporis, linoxylò quod uocatur cotton, & me-
morata lanugine bene depexa atque carminata uti li-
cebit. In erosione, ubi uniuerso corpori consulueris, nec
aliter mederi datum est: ueniendum ad pastillos An-
dronis, Passonis, Polyidæ, ex libro quinto de composi-
tione pharmaco. κατὰ γένει. In uehementi hæmorrha-
gia primò quidem ualidè adstringentibus materiæ in-
petus retundi debet, quibus paulatim pastilli commi-

In erosione.
Vfus pastillo-
rum.

2. o scentur, postremò solis pastillis utendum erit. ἰσχυρο-
τα καὶ νετèrum: Chalcitidis drachmæ sexdecim, alij octo:
mannæ drachmæ duodecim, alij sexdecim: terebinthi-
næ frictæ & aceto extinctæ drachmæ duodecim. Chal-
citidis drachmæ sex, mannæ drachmæ duæ: terebinthi-
næ, colophonix, ana drach. quatuor. Mirabile: Chalciti-
dis, resinæ, ana drach. octo: mannæ drach. sexdecim, in-
friata ænea pyxidicula reponuntur, usus tempore par
pondus gypsi commiscetur. Adduntur his ad crustas,
Chalcanthum, misy, auripigmentum, sandaracha, calx

ἰσχυροτα.

Escharotice.

3. o uiua. Debilior crusta est à calce uiua & auripigmẽto,
nisi adstringenti materiæ coniungantur. Ferrum can-

dens, & es, aurum, & argentū cautēria sunt: sed ab auro
 & argento mollior eschara relinquitur. Celerius auxi-
 lium à ferreo cauterio percipitur. E' subere uel spon-
 gia orbiculus tenuis feruida pice immergitur, & ita
 calens impingitur. Alij malicorio, gala, radicibus ad-
 striclorijs prius ignitis, crustas efficiunt. Recentiorum
 escharotica sunt: Vitrioli Romani semuncia, balaustio-
 rum unc. tres, aluminis uncia una: fiat puluis. Colopho-
 niæ unc. tres: boli armeni sesquuncia: mastiches, oliba-
 ni, sanguinis draconis, ana semuncia: radicis symphy- 10
 ti, rosarum, ana drachma una: utuntur puluere rubro,
 sanguine draconis, & alijs, de quibus antea: ac plura
 escharotica ex proximo capite repetenda. Adhibitis
 remedijs membrum ita collocari debet, ut altior sit lo-
 cus, unde hæmorrhagia, reliquæ uena, quæ radici pro-
 prior est: ut ueluti declini uase quasi deorsum, sanguis
 resuat. Sit membrū in quiete, & ea figura situm, quæ
 dolorem non asserat: ac mitella confirmare manus, &
 puluino crura melius est: æger quoq; aduersa parte de- 20
 cumbat. Instituatur uita unde sanguis acquiescat, aquæ
 potus, & similia. Interdicatur ijs unde efferuescat, qua-
 lia uina quedam sunt fortia, & calida alimenta.

De utili materia in uitijs ossiū. Cap. XIII.

Celeriter medi-
 candū ossibus.



IT IIS quæ ossa fecerint, eodem ferè mo-
 mento succurrere oportet. Alioqui phleg-
 mone succenditur quæ saniem facit, agit
 cuniculos, ulcera dispergit alta, exesa, & curanda mo-
 tis: ἐμμόττος inde uocat Hippocrates. Ex quo deni- 30
 grantur ossa, cariem inducunt, & syderationem con-
 trahunt.

trahunt. Laborant fracta, collisa, fissa, forata ossa, & mota articulis. Accessio mali est; si cum iulnere lesa sunt, multò magis in articulis ubi nerui tendines nuda carne & ossa loca sunt, in quæ laxa & commota excrementa corporis coire solent. Addè quòd ibi chara tilago quædã est, in qua cicatrix firmari nequit. Hic ergo asperior casus, dolor, uigilia, conuulsio, deliria, sepe uanero commouentur. Atque ut maior articulus est, ita grauius periculũ creare solet. Verũ non alia

Vitia in articulis.

1. o parte ditior supellex ueteris discipline, nusquàm hæc curiosa magis, quàm in ossium medelis. Infinita prope reperit & literis tradidit, quædam etiam autoritate principum, ære publico in ciuitatibus extruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent: serraenta uaria, cauteria, excisorios cultros, scalpra, rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, *μυρυσσοφύλακας*, uolsellas, scalas, scamna, repagula, uectes, canales, glossocomia, sphaeria, stathmia, trochiscos, pennas, inceratos canaliculos, fistulas, setas, si-

Multiplex materia mechanica.

2. o la bysso & auro texta, alia quoque plurima, quæ ad purganda, tendenda, reformanda, constituenda denique ossa facerent. Et in una deligandi arte quàm plurima usu diuersa suis etiam nominibus ueteres distinxerunt: linteola, fascias, hypodesmidas, splenia, apodesmos, regulas, ferulas, spatulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modò scorteos modò mollusculos, nodos, acus, acias, & alia sexcenta: quorum multa quidem retenta, alia antiquata, quædam deserta, quia uidelicet multis in rebus faciliior, nec tam operosa cura

In deligando quàm multa.

3. o inuenta est. Corruptum os ad uiuam scobem eliminandum, exterebrandum, inurendum, excidendum, etiam ut asperum,

Compendiosa curatio materia.

ut asperum, malum est. Atque hinc medicamentis opus est, quæ uehementer siccant: quorum materia capite de purgantibus pharmacis & epuloticis instituta est. Nec ante uias claudere oportet, quæ ad læsa ossa pertinent, quàm hæc omni carie, nigredine, sorde, corruptela sedulo purgata sint. Quin & præclusum iter uel angustum, ferro ampliare necesse est, spongiâq; aut penicillo implendum cauum, ut ne coëant, sed dehiscat uulnus, dum uel integendum carne, uel ferruminandum callo bene purum os & iam incolume, uideatur. 10

In altis cuniculis, spongia, linamenta, penicilli summa parte deuincta sint filo, quod foras propendeat, ut illa facile reducantur. Videndum quoque priusquàm impleas, ne quâ squama uel fragmentum excesserit, quæ si licet ossi suo coaptanda sunt, aut si acumine carnem subintrant, molliter præcidere oportet, uerùm incolumi radice: alioqui elimando scalpro. Quod si nihil molestiæ adferunt, uerùm non possunt ossi suo compingi: in horum altero consilium est. Nam uel medicamentis detrahes, uel permittes dum ueluti maturitate quadam & sponte sua excidant. Ita enim os celeriter carnem inducet, uel callum contrahet: ex quo medicamentis, quæ mediocriter siccant uel adstringant, cicatrice operies. Quæ uerò squamæ ante maturitatem rapiuntur ferro, aut ui reuelluntur, fistulas agrè sanabiles reliquunt. Omnino ergo declinanda uis est. Squamas detrabunt medicamenta, tum superiùs capite de glutinantibus memorata, tum cruce radix, cucumeris agrestis, utriusque bryoniæ: Aristolochia peculiariter elicit testulas caluariæ. In abscessu paruo ossium deligatio κατάγματιχὴ idonea est, sed paulò laxior, &

sine

Aperta sit uia
ad os.

Squama.

Quæ squamas
detrabunt.

Abscessus.

sine ferulis. In magno non est deligandū $\kappa\alpha\tau\alpha\gamma\mu\alpha\pi\iota\kappa\acute{o}\varsigma$. Satisfaciunt splenia insuccata uino nigro, sub-
 auscero, quæ deinceps atque continenter hinc inde
 adhibenda sunt, non ut hoc illi infideat. Longiores
 sunt quàm quæ solum ambitum membri comprehen-
 dant: nam si quadrantalis circulus est partis, paulò
 longiores splenes trientalibus esse oportet. Oblique
 inferuntur membro, & aduersa parte decussant. Sa-
 nantur ulcera alijs similiter: nisi quòd ossa magis sic-
 cantia desiderant, & quæ continenter ossibus genera-
 tur caro, ut est paulò siccior, ita magis siccantibus
 phar-macis gaudet: ut uerò ducenda carne ab ossibus
 recedis, ita uis siccantium temperanda est, donec iam
 cicatrix trahenda sit. Ac carne ossa tegere sæpenu-
 mero opus est, ubi callum cogere non licet, nimirum dissi-
 dentibus fracturæ labris, & ubi in circulum os exci-
 sum est: uerum è callo multò stabilius uinculum est. In
 fractis ossibus & luxatis multarum rerum cura est, ac
 circa initia omninò prohibenda fluxio, dolor, inflama-
 tio. Os ergo quod uel abiit loco, uel fractū dissidet, om-
 ninò cōstituere oportet: deinde ita cōtinere, ut ne exci-
 dat. In quo hæc sunt præcipuè, $\tau\alpha\iota\varsigma$, $\delta\iota\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha\varsigma$, $\tau\acute{\alpha}\iota\varsigma$,
 $\epsilon\pi\acute{\iota}\theta\epsilon\iota\varsigma$, $\acute{\alpha}\pi\omega\theta\epsilon\iota\varsigma$ uel $\upsilon\pi\omega\theta\epsilon\iota\varsigma$. Extenditur mem-
 brū, ut diductis et adductis marginibus soluti ossis ora
 oris molliter consuescant, nihil exasperetur, nihil dis-
 fringatur, quod in fracturis denticulatis, scabris ac ser-
 ratis sæpe contingit. Videndū quoq; ne in distentione
 neruus, uena, arteria, musculus, contra naturam extor-
 queatur. Extensum membrum & loco redditum, mani-
 bus palpari, tractari, atque legitimè conformari de-
 bet: $\delta\iota\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha\varsigma$ appellant. Quòd si tractatum, ten-
 sum,

Splenes magnorum abscessu.

Incar-nantia os-sium abscessus, & uulnera ui-cina.

$\tau\acute{\alpha}\iota\varsigma$.

$\Delta\iota\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha\varsigma$.

ἐπίδεσις
καταγματικῇ.

sum, non constituitur os, ad $\mu\omicron\chi\lambda\iota\alpha\pi$, lorium, habenas, & machinas eiusmodi ueniendum erit. Sequitur ἐπίδεσις, quam $\kappa\alpha\tau\omicron\gamma\mu\alpha\tau\iota\kappa\eta$ appellant: in qua multorum prouidentia est, sed maximè, ut contineas, phlegmonem arceas, procures callum. Ac primùm an sit deligandum statuere oportet: tum quæ deligandi forma, ac ferè $\alpha\omega\delta\ \delta\upsilon\omicron\ \alpha\pi\chi\ \epsilon\sigma\tau$, uaria tamen ratione: ex quo decernendum, quibus, quàm multis, longis, latis, quàm denique firmis fascijs opus sit. Adhæc idonea forma linteis querenda est. Cognoscendum præterea unde primùm injicias, quæ sit futura progressio, quàm multi & quales circuli, quomodo distinguendi orbes, quibus interuallis, ubi, & quando laxior uel adstrictior deligatio, qua parte desinat, quo loco, & qua arte neclantur nodi, aciæ figantur, conducantur habena, quando regule, ferule, puluinaria, mitellæ adhibenda sint: quandiu continere omnia, & quando soluere oporteat. Atque in sano membro probanda prius deligatio, quàm in ægro periculum factus. Postremò prouidendum, ut in ea figura collocetur pars, in qua diutissimè constare possit, & minimè doleat. Iustos hæc commentarios desiderant, uerùm hæc breuiter, nec tam do-
 cendi, quàm monendi causa dicta fuerint. In fascijs re-
 media adhibentur quæ repellant, & maiorem scissiliū
 linteorum contineant: sic enim prohibetur dolor atque
 inflammatio. Fasciæ initio plures & adstrictiores, si
 neque dolor neque phlegmone, uulnus, uel aliquid tale
 prohibeat. Ac ferè inebriantur uino crasso, nigro, modicè austero: uinum hoc superficiem cogit, uim suam ad
 repellendum altius imprimi, & ita præcidit inflam-
 mationum causas. Quod nimium stringit, dolorem ex-
 citat.

Quæ in fascijs
repellunt.

Vinum quale.

- citatur. Tenuē, album, giliū, fuluū, etiam si cōtrahat, repudiandum tamen est, ut reprimētium genus quod humectat, papauer, cicuta, mandragora, multo magis si in articulis & nervaceis partibus labor est. Nec enim *Vitanda.* qualitas sola, sed horum etiam corpus intro penetrat, & nervosa lēdit: atque inde calor qui regit corpus, interdum extinguitur. Vīno igitur crasso, nigro, modice austero fasciæ & splenes saturandi sunt. Minister ad *Oenelēum.* sit, qui subinde affuso uīno ligamenta compluat: alio-
- 1^o qui cum periculo resiccantur: quod ne fiat, noctu præcipue providendum erit. Hyeme uīni loco cōnelao uti satius est, quo etiam tempore succida lana splenibus præferri debet: fumoso uīno & odoro abstinentum, ne caput feriat. Ausum quoque insuccandis linteis medicamentum ex oui candido, oleo rosaceo uel myrtino. Alij aceto & oxelao cōtra phlegmonem fascias imbuūt. Detur id bene carnosā parte & sine ulcere. Ceratum *Ceratum albū.* album in usu est, suspecta ministrī diligentia, ne uide- licet lintea inarescant: quod uīno quidem minus effi-
- 2^o cax, repellit tamen & phlegmonem inhibet. Verū ce- rato uti post initia satius est, iam abeunte periculo inflammationis, & ubi fractura simplex, nec in fragmen- ta uaria contritum os est. Cerato ergo pars agra, fasciæ, & splenes, illinenda sunt: adhuc extremæ partes, sed manus præcipue, ne quod deligatione exstringi- tur, infirmum scilicet frigidumq; corpus imbibat. Ce- ratum κατὰ γράμματα est cera pingui & duplo oleo conficitur, oleum sit recens rhodinon uel myrteum. Ce- ra sicciore paulo liberalius oleo emollitur. Picato uete- *Ceratum picatum.*
- 3^o res usi sunt, si quid contusum esset, si quid coquendum atque mitigandum. Liquidiori cerato albo pix addita, *Perfusiones.* piccatum

peccatum facit. Omnia uerò lenia sint & mollia, ne
 asperitate lædant. Vitetur pondus, quod callum probi
 beat & partē opprimat. Perfusiones fiunt ex aqua te
 pida, ita calore tēperata, ut in qua manū iucundē con
 tineas: in frigoribus hydreleū melius est. Perfunditur
 pars tertio ac quinto die, quoties uidelicet lintea dis
 soluuntur, idq; liberaliter ut inde priuigo acquiescat,
 & materia eius dispergatur. In articulis tepida, tensa
 relaxat, lenit dolētia & phlegmone aduersatur. Septi
 mo die uel nono iam affunditur, non ut discūtiat, sed
 ut euocet sanguinem: unde concreto poro ossa conseruā
 tur (πώρωσις Græci uocāt, & inde πώρωτικὰ quæ
 callum gignant.) Callus neque caro est neque os, sed
 inter utrumque ambigit. Itaque deposito metu inflam
 mationis, circa hoc tempus omninò cogitandum, ut
 coëat porus, unde effracta solidantur: sic ergo mode
 randa persusio, ut inde pars uiuido colore efflorescat,
 & leniter attollatur: nimium est, si subsidet & pallorē
 ducit. Alimēta sunt, quæ probum sanguinem, multum
 crassum, uiscidumq; creent. Panis triticeus ē farina
 primaria: triticum legatur graue, dēsūm, unde ptisana
 comparētur: chartilagineæ animalium partes, nerua
 cæ, cutacæ & pingues, ligamenta, tendines, petioli,
 uentres, linguæ, rostra: capita hœdorum, ueruecum, &
 porcellorum, agnina caro & suilla, palmulæ pingues,
 castaneæ, uinum stringens, & similia. Medicamenta
 sunt emplastica, quæ modicè calfaciant ē gyri, simi
 la, thure, manna, gummi, fabrili glutine, mastiche, tra
 gacantha, liquore oui, pingui cera, oleo, lachrymis &
 succis, quibus emplasticum nec ita calens corpus est.
 Ac iam antea de catagmaticis & cephalicis sermo ha
 bitus

πώρωσις.
 πώρωτικὰ.

Alimenta.

Medicamenta.

bitus est, sed hic quoque ea materia locupletanda est.

Caninum cerebrum in linteo adhibetur: superdatur lana inculcata oui candido: ubi squalescit remedium;

Caninum ce-
rebrum.

commutari debet: quatuordecim diebus solidat. Alijs purgatur hybisei radix, atque hinc medulla eraditur,

Hybiscus.

quæ per se farinæ tritici mixta liquori oui, effracta iungit. Radix hæc aquæ indita & sub dio posita, aquâ cogit. Musco uiticks utuntur ueterinarij: alij quernum præserunt. In honore est ueteri exemplo, quam conser-

Muscus.

10 uam uocant. Muscus est densus, herbaceus, spongiosus,

Conserua.

herens aquatilibus petris. Putator quidam ex alta ar-

Historia.

bore deciderat omnibus ferè ossibus confractis, præsto aderant amici, qui corpus eius uniuersum eo musco obli-
garunt: atque ita relatum domum in quiete tenuerunt, subinde conspersa aqua, ne muscus emarcesceret: raro nec nisi deficiente herba remedium mutatum est: atque hac medela uix credibili celeritate conualuit.

Æstate, bene carnosio duroq; corpore, recenti malo, exemplum uetus liceat imitari: Farinæ triticeæ unc.

20 6. sanguinis draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ, ana unc. 1. trita hæc cum farina & oui candido subiguntur. Triticea farina, gummi, & manna incoquantur aqua: sit cataplasma, quod reprimit, continet, & per-
ron generat. Exiguæ partibus effractis, pelliculæ affi-
guntur illitæ gummi & fabrili glutine. Canaliculi as-
formantur, cauis, emplastro inducti, ut & contineant,
& solident. Fuligo thuris liquori oui & farinæ tri-
tici coniungitur. Emplasta quæ pertinaciùs hærent, te-
pida fotu reuelluntur. Panalithes ad contusa, fracta

Panalithes.

30 etiam cum uulnere, uulnera neruorum, uertebrearum, pur-
gandas collectiones, incijum scrotum, bestiarum etiam

uenenatarum

uenenatarū morsus, & alia: Olei dulcis unc. 9. bitumi
 nis, cera, resinæ piceæ, picis aridæ, ana lib. 1. litharg.
 ceruss. æruginis, ana drach. 10. thuris, ammoniaci,
 myrrhæ, aloës, ana drach. 8. opij, succi pomorum man-
 dragoræ, ana drach. 6. aluminis scissilis, chalcantbi,
 chalcitidis, croci, ana drach. 4. aceti, quod sufficit. Om-
 nia à litharg. ad crocum in puluerem trita, & affusa
 conducuntur mortario, ut sit luti crassitudo: oleum,
 cera, bitumen in fabales pillulas diuisum nihil uersan-
 do colliquantur: liquatis pix & resinæ ammiscentur, 10
 colantur omnia, atque recoquuntur. Aegyptiacum
 Andromachi, eadem potest, mollit ac maligna operit:
 Cera, litharg. ana unc. 5. & semis: ammoniaci unc. 7.
 & drach. 6. terebinth. unc. 4. succidæ lanæ uisæ unc.
 2. & drach. 2. aristolochiæ, thuris, squamarum aris
 & stomomatis, id est, perpurcati ferri, ana unc. una:
 myrrhæ drach. 3. opopanacis drach. 2. ol. ricinini, sty-
 cyonij, uel antiqui, lib. 3. Litharg. oleo coquitur, dū cō
 crescat: squama inijcitur: ubi non inquinant, cera &
 ammon. exactissimè tusum imponuntur: liquatis tere- 20
 binth. additur: sublati igne thus, & lanarum cinis in-
 sparguntur: refrigerata manibus subiguntur. Nigrum
 Asclepiadæ mirabiliter unit laxata & confracta: Li-
 tharg. unc. 8. bituminis. unc. 6. cera, picis, ana unc. 3.
 resinæ piceæ sesquuncia: aluminis, propoleos, ana unc.
 1. ammoniaci drach. 6. ærug. drach. 2. & semis. olei
 quod suffic. In oleo litharg. coquitur dum non conta-
 minet: cera & bitumen seorsum liquefcunt, neque
 commouetur: his pix adiungitur: traiecta colo omnia,
 lithargyro coctæ uniuntur: ammoniacum uehementer 30
 tusum immittitur, atque ita in solidum corpus omnia
 concoquuntur:

- concoquantur: hinc præmolita cera & propoli coniunguntur: ubi coierint probè & igne decesserint, alumen & ærugo in pollinem trita insperguntur: uersantur omnia & oxycrato mersa manibus subiguntur. *Moschionis.*
- Moschionis.* Litharg. unc. 3. picks aridæ, adipis uituli, ana unc. 2. terebinth. manna, ana unc. 10. ceræ unc. 5. æruginis, opopanax, galban, ana unc. 1. picks liquida selibra: aceti, succi mororum, olei ricini, ana lib. 1. Litharg. oleo coquitur, ubi efferbuerit,
1. adeps inijcitur: iam non inquinantibus, cera & pix immittuntur: mororum succus cum pice liquida seorsum coquitur, cocta hæc alijs permiscetur: subductis igni manna & ærugo in puluerem resoluta insperguntur: opopanax, aceto fusus coniungitur: confectum pharmacum uino in tertium diem maceratur, & manibus pistum sedulo reponitur: usus tempore thorulum madentem uino, uel fasciam, superponere oportet. Alutæ intenditur uel duplo rosaceo dilutum, non aliter quàm ceratum album in fascijs ac plagulis usurpatur:
2. nam & fracturas conserit, ulcera coniungit, & phlegmonæ aduersatur. Concreti calli signum est, quum iam sine uulnere exudat sanguis, qui lintea contaminet. Id ferè fit criticis diebus. 14. & alijs. Conueniens callus est qui neque maior neque minor, durior aut mollior quàm oportet, neque distortus est. Iustus callus confirmari debet medicamentis quæ ἐναιμαῖα uocant, quæq; cruentis uulneribus adhibentur. Siccant leniter, & callum mediocriter confirmant. Ac de enemis multa capite de glutinantibus. Perfundunt uino
- Signum concreti calli.*
- Conueniens callus,*
- Quæ callum firmant.*
- Perfusio.*
3. no, quod πηθαλασσομένον & θαλάττιον Græci, Latini falsum & marinum uocant, quod si desit, salem

uino liquefcere oportet. Rosæ, balaustia, myrta, muscus
 è quercu albus, absinthium, & alia uino incoquantur.
 Addunt perotocis quæ callum cōtrahant bolum Arme-
 num, globulos cupressi, & alia. Sed hic moderatio quæ
 dam adhibenda est, ne nimium stringendo callum su-
 pra modum atteras. Confirmant peron: Rosacei unc.
 4. resine unc. 3. ceræ unc. 2. colophon, mastiches, thu-
 ris, ana semuncia: coni cupressi, radicis rubiæ maioris,
 ana drach. 1. Melius fiet auclis emplasticis, minuto
 oleo, & adiecto momento croci. Thuris, mastiches, 10
 picis, farine prifunalis, boli Armeni, ana unc. 2. sepi-
 arietini, ceræ albæ, ana selibra. Liquefactis cera & se-
 po reliqua infriantur: in his linteam sæpius inculca-
 tum fracturæ imponitur. Sparadrapum uocant. Vtun-
 tur Apostolico, oxycroceo, & alijs. Atque hic memi-
 nisse oportet, instituenda esse callosis corporibus quæ
 magis contrahant: mollioribus autem, quæ id mediocri-
 ter præstent. Callus maior extenuandus est, deducta
 parte alimenti & mutata qualitate. Diu leniterq; af-
 fricanda pars est, ex oleo, sale, nitro: eademq; calida 20
 salsa squeri debet, induciq; malagmatis quæ discutiât.
 Colligandū arctius: oleribus utendum & uomitu. Alte-
 rum membrum sinapismo linere oportet, ut eo diuer-
 tat alimētum. Paulus in recenti callo qui supercreuit,
 uehementer stringentia instituit, arctissime ligat, lami-
 na plumbea interdum apposita. In eo uerò qui iam
 uetustate induruit, & unde pudendum ac deforme
 membrum est, neque officium facit, cutem aperit, dera-
 dit peron, lacerat scalprio, terebra pertundit, & quan-
 tum superest, execat. Quod si nulla inde actio naturæ 30
 intercipitur, neque conspicuus membri pudor est, nul-

lus

lus denique dolor, præstat abstinere ferro. Qui uerò Minor callus.
 infra modum crescit, aut non crescit quidem suis ter-
 minis, alia ratione promoueri debet. Idq; contingit plu-
 rimùm, cùm nimis ac sæpius fouetur locus: parum con-
 uenienter alligatur, sæpius & ante tempus fasciæ re-
 soluuntur. Sæpe etiam in ratione uitæ peccatum est.
 Omnia ergo commutanda in melius. Quòd si atrophìa
 totius corporis callus non prouenit, in primis consulen-
 dum corpori. Sæpe etiam adstrictioribus linteis, natu-
 1^o ræ partis uitio membrum quasi syderatum ac marci-
 dum gracilescit: hìc affecto membro instauranda uita
 est, & laxanda deligatio. Id uerò in dropace magna
 ex parte descriptum est, capite de pyroticis. Exte- Extensæ orum
membrorum in-
stauratio.
 nuatum membrum uehementer iuuat commoda deliga-
 tio, sed contrà quàm in fracturis. Marcescente tibia fe-
 mur superius alligamus, ab inguine ad genu deducta fa-
 scia: atque initio quidem arctior, paulatim relaxatur,
 ut communibus uenis quasi riuus deorsum sanguis ex-
 primatur. Femore dextro contabescente uel toto cru-
 2^o re, sinistro femori fascias injicimus à genu ductis orbi-
 bus, adstrictius quidem, qui cùm desinant in inguine,
 hìc etiam ita constringant, ut parte aliqua ueluti di-
 uerticulo, sanguis in gracile membrum deriuetur. Sit
 autem deligatio ea ratione temperata, quæ neque do-
 lorem creet, neque uniuersum sanguinem ab incolumi
 membro reprimat: hoc enim alere frugalius, nutrire
 tamen statutum est. Eadem ratio in superioribus
 membris seruari debet. Distortus callus siquidem mol- Distortus cal-
lus.
 lis est, laxante fotu & diaphoreticis exinaniri debet:
 3^o fouetur tepida, hydrelæo, althæa, & similibus decocto.
 Discutitur arida sicu muxta stercore columbino. Sed

Mollior & du-
rior.

Mucosus hu-
mor abscedens.

Scirrhus.

de ijs generibus medicamentorum capite de resoluenti-
bus abundè dictum priùs est. Si uerò occaluit, eadem
quæ in supercrescente & inueterato p̃uro, consilia
sunt. Mollior adstringentibus emplasticis firmari de-
bet. At uix durior esse potest, nisi ea de causa fra-
gillior sit: atque hîc tota gignendi calli institutio sæ-
penumero repetenda est. Est quum è neruaceis par-
tibus & osseis mucosus humor eliquescit, puri simi-
lis, qui serè in alto latet, nec facîle discutitur: quan-
quàm laxata parte fusa incisaq; materia conuenien-
tibus pharmacis dissipari debet: alioquî facto uulne-
re repurgandus est. Atque is neglectus in scirrhum
coit, qui præscriptis antè remedijs capite de mala-
ticiis expugnari debet.

F I N I S.

INDEX IN SEX LIBROS

PRAECEDENTES, SUMMA

CVRA ET DILIGENTIA

collectus.

A

Abluendi fistulas modus secundus	483	Abscessus uelamento inclusus	notae	145
Abluendi ratio	600	Abscessuum pituitosorum materia	tertia	144
Abolendi fistulas tertius modus	483	Abscessuum qui ad pituitam pertinent causa		144
Abscendentes carnes moris suum uirulentorum sunt amputandae	351	Abscessuum pituitosorum differentia		144
Abscessus	650	Abscessuum pituitosorum enumerationatio		137
Abscessus qui dicantur Galieno	25	Abscessuum pituitosorum iudicia		145
Abscessuum duplex genus Galen.	26	Abscessuum pituitosorum curandi ratio duplex		147
Abscessus mox futuri signa ex Auic.	31	Abscessuum ex materia pituitam referente creatorum, quos excrementis phlegmaticas uocant, curatio		147
Abscessus iam facti notae	32	Abscessus melius ac tutius scalpello, quam ruptorio aperiuntur		33
Abscessuum iudicia	33	Absoluta humoris praeter naturam definitio, ex Gale.		
Abscessus qui facile conquantur, et qui per resolutionem maxime terminentur	33			
Abscessuum curatio in uniuersum	34			
Abscessus quando secandi	45			

scriptis desumpta	4. 15	authore Gale. multum fi-	
Abundantia succus	264	dere oportet	451
Accepti uulneris in carne		Adeps & medulla	568
una specialis præcipuaq;		Adeps & sebum	580
intentio est	305	Adeps salsus	581
Acetum	563. 568. 653	Adeps uetus quomodo re-	
Aceti usus	582	cens fiat	581
Aceti, uini, & lixiuij colla-		Ad fistulas antiquas & ual-	
tio	130	de callosas	482
Accidentales definitiones tu-		Ad fistulas medicamenta	
morū præter naturā	226	uaria	486
Accidentium luxationū cor-		Adglutinatoria	324
rectio	546	Adglutinationē solam postu-	
Accidētia tumorum præter		lat uulnus simplex	306
naturam quæ	6. 30	Ad herpetas depascētes	106
Acria ubi uitanda	610	Ad induratos tumores cata-	
Acrochordones quæ	11.	plasma Galen.	66
108. 110.		Ad inflationem ex cōtusio-	
Acrochordones & myrme-		ne in artubus, musculis,	
ciæ quibus inuicem disti-		& mēbranis quæ ossa con-	
deant	109	tegunt	129
Ad antiquas & ualde callo-		Ad inueterata ecchymō-	
sas fistulas	482	mata	337
Ad contraria reuellēdum, si		Ad inueterata ulcera	106
fluxio ualēter irruat	260	Adipes	179. 641
Ad desperata ulcera, quo-		Adipum tres naturæ	581
rum scilicet curationē ple-		Ad maximas hypersarcoses	
rique aggressi, nō absolue-		medicamentum	42. 8
runt, sed tanquam ab insa-		Ad musculos cum inflatio-	
nabilibus destitēre, empla-		ne dolentes ex contusio-	
strum admirandum, cui		ne.	129
			Adole-

Adolescens ex cerebri uul-	Affatim exiccantia	446	
nere curatus	311	Affectus cum luxatione cō-	
Ad phlegmonem qui tumo-	plicati	536	
res pertinent	9	Affectuum cum ulcere con-	
Adstringentia discutiētibus	plicatorum curandi qua-		
admiscēda, per initia cura	tuor intentiones	401	
tionis ecchymomatidis	336	Affectus pessimus cācer ex-	
Adstringentia mixta catag-	ulceratus	186	
maticis	611	Agglutinātiū facultas	465
Adstringentia cerata	565	Agrippa aceto libera-	
Aduersus inflāmationes &	tus	575	
abscessus uulnerum cura-	Albaras Punicorū, est leuce		
to	Græcorum & Celsi	13	
Ad ulcerum uermes	432	Albæ pustulæ	119
Aduētia medicamēta	73	Album ē cerusa	620
Adiunt sanguinē quæ	174	Albū ē cerusa Actuarij	620
Aeger quomodo collocādus		Album ē cerusa & lithar-	
in fractis artubus	508	gyro	618
Aegyptiacum	604	Album Gal.	619
Aegyptiacum Androma-		Album Rafis	620
chi	656	Alcali	637
Aegrē sanabilem ulcerum		Altarum sinus partium cōi-	
tres modi	406	tionis notæ	473
Aëris nos ambientis tēperiē		Alchymistarum aquæ	483
in curandis uulneribus spe-		Alie curandi uerrucas ra-	
ctandam esse	320	tiones	112
Aeris ærugo, est uiride		Alimenta in conuulsione ex-	
æris	447	sticcitate facta, idonea	285
Ærugo quid	111.444	Almisinar	109
Æruginosa bilis	87	Aloë	609.625
Æsculapij nigrū med.	656	Alphi duplices	13
		TT iij	Alphitidon

Alphitidon fractu facta	497	Annua & diuturna ulce-	
Althea	492	ra	414
Alteratio eius quod dolorē		Anserini emplastr.	628
creat	347	Antecedens causa phlegmo-	
Alius quando ducenda in		nes	50
uulneribus	262	Anteced. tumorū causæ	22
Alumen	445	Ante diem tertium remoue-	
ἀμυχτὰ	631	ri non debent, quæ cruen-	
Ampliatio sinus fistulæ	480	tō uulneri primum admo-	
Amputatio membri demor-		ta sunt	301
si aut isti	352	ἀντιδωλγείας	595
Anadendromalache	179	Antidotarium quid	558
Anacardinum mel	632	Antimonium	444
Anacephaleosis dictorū	509	Antispasmi 39.264.	356
ἀνατομώσεως causæ	334	Antispodium	609
Andromachi ægyptia-		Anthracas qui	68
cum	656	Apostema aliter à Græcis,	
Andromachi emplastrū ad		aliter à recentioribus ac-	
ulcera dysepulota	448	cipitur	1.5
Angusta deligatio artubus		ἀπερὶ σκετοῦ ulcerus	606
utilis	512	Aperta sit uia ad os	650
Animalia parua discerpta		Apertio oedematis	124
& virulento morsui admo-		Apollonij medicamentū	190
ta	350	Appositus uulneratæ par-	
Animaduertenda in usu fer-		tis situs supprimit sangui-	
ri & ignis	593	nem	363
Animalium morsus ac pun-		Apostematofum ulcerus	414
ctus duplices	340	Apostematis absoluta defi-	
Animi παθήματα	174	nitio, & definitionis exa-	
ἀνώδυνα & παρηγορί-		minatio	2
κα'	640	Aphronitrū pro lixiuio	130
4.		A' pur.	

A' purgatione incipiēda cu ratio ulcerum exeden= tium	454	Aquosī tumores quas maxi mē partes occupent	134
Aqua & aquea	563	ἀραιωτική	573
Aqua alchymistarū	483	Ardoris & doloris mitiga= torium	98
Aqua calida	426	Argentum uiuum sublima= tum	464
Aqua calens uulneratis ner uis est infestissima	373	Argumentum libri de mate ria chirurgorum expli= catur	558
Aqua ex fermentis distillans conuenit uerrucis	111	Aristolochia & thus	607
Aqua folliculorū ulmi	625	Arrodens ulcus	412
Aqua nudato neruo aduer= satur	385	Arsenicū 162.459.482	
Aquæ aluminosæ	455.469	Arsenici legitimi effectus notæ	489
Aquæ aluminosæ uis ad pi= tuitosos abscessus	148	Arsenicū principatū obti= net in carbunc. curat.	71
Aqua uitæ	310	Arsenicum sublimatū	81.
Aqua uilis	626	461.489	
Aquæ fortes	639	Arsenicum sublimatum opti mū ad hæmorrhagias præ sidium	361
Aquæ metus & horror nul lum habet tempus præscri ptum constitutumq;	343	Artis canon generalis	42
A' quibus excitetur ecchy= mosa	334	Asli lapidis flos	427
A' quibus petantur notæ fi= stularum	476	Arteriæ atque uenæ erosæ signa	477
A' quibus sumantur disse= rentiæ tumorū præter na turā recentioribus	6.8	Arteriæ, uenæ, nerui inter= dum diuisi coeunt	222
Aquosorum tumorum no= tæ	133	Artuum ulcera	417
		Ascites à maiore frigidita= te fit, quā tympanites	133
		Apho=	

Asphodelorū trochisci	482	uehementes morsus, &	
Atra bilis exquisitè	167	ictus uenenatos	348
Attrahentiū differētia	567	Auxilia attrahēdi uirus car	
Attrahentiū materia	566	bunculorum	72
Attrahentibus quæ immu-		Auxilia in principio oede-	
scenda	567	matīs admouenda	122
Atheroma	140	Auxiliorum profuturorum	
Attritio & cōpressio	151	& non, notæ	417
Auersio à manu & ab alte-		Auxiliū expeditissimū est	
ro crure in uul.	262	ustio demorsis à cane ra-	
Auersio fluxionis, quæ se-		bioso	351
cunda est intentio curat.		Axungie mira uis	581
pbleg.	56	B	
Auertentia fluoris sangui-		Balneæ ex oleo & hydre-	
nis	355	leo	283
Augmentum tumorum præ-		Balsamum	625
ter naturam	29	Balsami liquoris Mesuæ do-	
Auicennas myrmecias con-		tes	297
fundit cū herpetibus	102	Barbarum recentiorū	627
Auicennæ desudationes	16	Bifariam effluxum moliri	
Auic. emplastrum ad stru-		posse saniei aut puris, in	
m. is	155	sinu	467
Auic. puluis ad fluorē san-		Bilis atra exquisitè	167
guinis	365	Bilis atra ex admixtio-	
A uipera morsus uinitor, si		ne	169
bi digitū amputauit	341	Bilis atra ex adustione hu-	
Aureum Mesuæ	613	morum aliorum	168
Auulso & absumpto car-		Bilis atra per cōgelationem	
bunculo quid postea agen-		(ut uocant) & induratio-	
dum	74	nem	169
Auxilia aduersus magnos et		Bilis duobus modis deficit	
		à sua	

I N D E X.

à sua natura	87	Callus quid	634
Bilis flaua duplex	87	Callus conueniens	657
Bocium	140	Callus quibus notis genera-	
Bolus armenia	456	ri deprehendatur	521
Boni ac mali puris nota	410	Callus maior, minor, con-	
		ueniens	658
Brachij caput	538	Callus distortus, melior, &	
Bronchocele	140	durior	659
Bruni et Theodorici emplastrum ad strumas	153	Calli mediocritas	506
Bruni medicamentū suppurans sanguinem	365	Callos exteientia	482
Bubo	143. 417	Calx elota cū rosaceo	383
Bubo quid apud Guid. & alios recentiores	143	Cambil	446
Butyrum	83	Canabil	434
C		Cancer à carcinomate dif-	
Cacochymia quid	39	fert	11
Cacoëthes ulcus	414. 436	Cancer exulceratus pesti-	
Cadmia	444	mus affectus	186
Χαλαστικὰ fiunt ἐκ πυλινικὰ	587	Cancer ulceratus cur quibusdā lupus appelletur	493
Chalcanthum	444	Cancer ex quo humore gignatur	182
Chalcitis	444	Cancer sine ulcere	183
Calida aqua	426	Cancerosi tumoris descriptio	183
Calida defluxio quomodo tumorem creet	20	Canceri nomē ad duo morborū genera extenditur	187
Calida ulcera	415	Canceri notæ per initia cōsumæ atq; obscuræ	183
Calidi tumores	8	Canceri qui radicitus tolli debent & qui non	185
Caloris et frigoris notæ	423	Canceri euentis non ulcerati	
Callus	11. 110. 221		

rati notæ	184	tis, summa corporis occu-	
Cancris radices	186	pantis	192
Cancris non exulcerati, ad-		Capita curationis œdema-	
huc incipiētis, & nondum		tis	124
inueterati, summa corpo-		Capita curationis phlegmo-	
ris occupantis	186	nes	67
Cancris exulcerati	89.183	Capita curationis rheuma-	
Cancris ulcerati signa	488	ticæ	66
Cancris ulcerati ratio curan-		Capitellum	538
di	488	Capitis luxatio	537
Cancris ulceratis aliquando		Capitis musculorum uul-	
adblandiendum uera cu-		nus	216
ratione omiſſa	490	Caput brachij	538
Cancro curando scopus tri-		Caput delirantium oxyrrho-	
plex proponitur	186	dino perfundendum	302
Candens ferrum	385	Carbunculi generatio &	
Canes quibus notis suam		descriptio	68
rabiam testentur & pro-		Carbunculi notæ	69
dant	343	Carbunculus duplex	68
Caninum cerebrum	656	Carbunculi luem pestife-	
Canis sæpius rabie perici-		ram ferè semper conse-	
tur & corripitur	342	quantur	2.70
Canis rabidi morsus per ini-		Carbunculus quando maxi-	
tia nihil molestiæ adfert		me lethalis	70
præterquàm dolorem ex		Carbunculi iudicia	70
uulnere	342	Carbunculi curatio à san-	
Cannule tentæ	257	guinis missione auspican-	
Canon generalis artis	42	da	71
Cantharides	489	Cancerosa ulcera	602
Capita curationis cancri nō		Carcinoma	11
ulcerati, adhuc incipien-		Carcinoma mitiora contē-	

INDEX.

nit remedia	489	cataplasma Gal. ad indura-	
Caries	610	tos tumores	66
Carnes abscendētes de mor-		cataplasma Galen. ad scir-	
sibus uirulentis sunt ampu-		rhos	176
tandæ	351	cataplasmata & cere-	
Carnis generatio in fistu-		ta	564
lis	486	cataplasma ex orobi fari-	
Carnis detractionem medi-		na & oxymelite	73
camentis perfici non ope-		cataplasma herpetibus ac-	
ra naturæ	328	commodum	105
Carnis producendæ medi-		cataplasma leniens cancrū	
camentum idoneum	317	ulceratum	492
Carnis regignendæ opifex		cataplasma pgleg. Gal. 58	
est natura	316	cataplasmata suppurato-	
caro cochlearum	626	ria	426.590
caro recte se habet, si pro-		καταρτικὰ	599
prium seruet temperamen-		catharticis quomodo uten-	
tum	423	dum	601
casus in quibus non licet re-		cathæretica	325.632
pellere siue reperate-		cauendū ne quid labris uul-	
re	40	neris intercizat	308
καταγμα	496	causa coniuncta nihil dif-	
κατ' ἀποθρασυρίαν		fert à morbo	25
flurafacta	497	causa delirij in uulneri-	
καταγματικὰ	611	bus	301
cataplasmata carbunculo		causa doloris	278.639
idonea	72	Causa inflationum	126
cataplasma commune		causa rebellis ulceris	617
phleg.	62	causæ abscessuum quæ ad	
cataplasma ad nervos uul-		pituitam pertinent	144
neratos	379	causæ coadiutrices fluxio-	
		nis	

nis	38	gressæ, antecedentes, tumorum præter naturam	22
causæ coniunctæ tumorum præter naturam	23	causæ sinuum	463
causæ congestionis	20	causæ tumorum præter naturam efficientes	7
causæ convulsionis ex consensu cerebri factæ	378	causæ tumorum aquosorum	133
causæ duriciæ in particulis	177	causæ uariæ propter quas non sanescat ulcus	437
causæ oedematis tres	116	causæ ueri erysipelatis	89
causæ erosionis	354	causæ ulcerum antecedentes, continentes	405
causæ externæ paralysis	292	causæ ulcerum putrium & sordidorum	459
causæ externæ curationem non indicant sed affectum	205	causæ ulceris exedētis	454
causæ fracturarum	499	causæ uniuersales solutæ continuitatis	204
causæ internæ paralysis	292	cauteria in capite periculosa, in collo, in exterior humero, in mesopleurijs, &c.	594
causæ luxationis externæ & internæ	539	cauterij potentia	595
causæ mortificationis	78	cautio in adstringētib.	561
causæ phlegmones summotio	53	causticum ex calce & sapone	161
causæ phlegmones tres	50	celeriter medicandum ossibus	648
causæ profusionis sanguinis ex arteria uel uenâ	353	celsi papulæ	17
causæ scirrhi legitimi	171	celso quæ uulnera insanabilia	224
causæ sex fluxionis	20	cenchrias, id est, herpes miliaris	
causæ spasmi ex uulnere	216		

liaris	101	Cicatricem per accidens in-	
centaurium	382	ducere	325
choerades Græcorum	139	Circumglabra ulcera	415
κεφαλαία	611	Circundantis nos aëris tem-	
cera	565	periem in curandis uulne-	
cera uiridis	604	ribus maximè spectandam	
cerata	576	esse	320
ceratum album	653	Κηφέλαιον	589
ceratum oesypatum	130	Chironia ulcera	436
ceratū è coriandro	565	Chironij ulceris descriptio	
ceratum è psyllio	564	ex Cornelio Celso	436
ceratū ex aqua frigida	96	Cirrha & phæa medicamen-	
ceratorū formulæ ex Gale.		ta	472
& Aëtio	571	Cirrhum medicamētū	474
ceratum humidum cur ad-		Chirurgus in ijs quæ ad phle-	
hibeatur	514	botomiam & purgationē	
cerata magis adstringen-		attinent, nihil attētare de-	
tia	565	bet, citra periti alicuius	
ceratum Necepsonis è cu-		medici consilium	94
presso	572	Chirurgia in cancri teme-	
Ceratum picatum	653	rè non adhibenda	191
Ceratum relatum ad Andro-		Cystis fellis uulnera	214
machum	572	Clauus	11. 109. 110.
Ceratum rosaceum	564	Clauicula quæ luxetur	538
Cerebrum in omni conuulso		Coagulum	570
ne roborandum	290	Cochlearum caro	626
Cerebri uulnus, & cordis,		Cognitio quæ habetur per	
cur lethalia	209	ipsius rei naturā, quæ per	
Cerusa	621	pendat	204
Cicatricis inducendæ me-		Colli et capitis ulcera	417
thodus	323	Colophonía	610
		Colorem	

Colorem totius corporis re-	Concoquentia & maturan-
presentantia ulcera 415	tia 123
Commissio & coaptatio in-	Concremati sales 428
uicem fracturarum par-	Concreti calli signum 657
tium 506	Congestionis cause 20
Commissorum conserua-	Coniunctam causam nihil à
tio 246	morbo differre quorūdam
Communis aduersus omnes	opinionem 25
morsus & ictus uirulen-	Coniuncta causa phlegmo-
tos, curatio 346	nes 51
Commune de digerentibus	Coniunctæ causæ tumorum
præceptum 455	præter naturam 23
Communis indicatio omnium	Conseruatio substantiæ par-
tumorum curandorum 34	tis 258
Communes notæ conuulsio-	Consilia in usu resoluen-
nis 281	tium 573
Communis omnium phlegmo-	Consilium Celsi 233
narum generatio 38	Consolida maior 75
Communia quedam in ex-	Continētis causæ defini-
trahendis telis sedulo ob-	tio 24
seruandis 232	Cōtra dolores frigidos 641
Communia repellentia 40	Contumacium & maligno-
Communis solutæ unitatis	rum ulcerum summus cu-
curandi indicatio 225	rationis scopus 438
Compēdiaria curationis ma-	Cōtussio fracturarum 523
teria 649	Contusio neruorum cum ec-
Complicati tumores 8	chymosis, tū generationis
Composita remedia 626	tiam curationis rationē ha-
Compositum medicamen-	bet communem 386
tum 97	Cōtusi ulceris curatio 426
Cōpressio & attritio 151	Conueniens callus 657
	Conuulsionis

Conuulsionis causæ duæ in uniuersum	275	Corrosio	489
Conuulsionis causæ ex cõsensu cerebri factæ	278	Corrosio & mundificatio	161
Conuulsioni contrarius affectus est paralyfis	291	Corrosiuum ulcus	412
Conuulsio duplex	279	Cortex capparis	446
Conuulsio ex cõsumata siccitate	282	Corruptelæ particularũ indicia	31
Cõuulsio ex elleboro	278	Corrupti sanguinis uacuatio	79
Cõuulsio ex febribus adurẽtibus	283	Cbrysocolla	610. 445
Cõuulsio ex repletiõẽ	282	Crystallus	610
Conuulsio ex siccitate non prorsus absoluta	282	Crocea bilis	88
Cõuulsiois præcautio	372	Croceum unguentum	613
Conuulsio solius morbi est opus	275	Crocum	65. 590
Conuulsio tribus accidit modis	276	Crucians ulcus	413
Cornelij Celsi opinio refellitur	515	Crudus tumor qui dicatur Hippoc.	369
Cornelij Celsi locus emendatus	482	Cruentõ uulneri quæ primũ admota sunt, ante diem tertium remoueri non debent	308
Cornelij Celsi remedium cõtra metum aquæ	345	Cruentis aptum uulneribus medicamentum	307
Cornua	11. 110	crustas à partibus exustis soluentia	82
Correctio symptomatum in uulneratis	270	Cubitus luxatio	541
Correctio symptomatum phlegm.	63	Cubitus, manus, et femur, in quatuor partes prolabantur	539
		Cucurbitula	644
		Cucurbitulæ usus in quibus ecchy.	

ecchymomatis utilis	336	curatio cācri nō exulcerati	
Cucurbitula recte morsis et		adhuc incipiētis, et nōdum	
iclis adhibetur	350	inueterati, sūma corporis	
Curandi aquosi tumoris du-		occupantis	186.192
plex indicatio	134	curatiōnū communiū indica	
curandæ conuulsionis me-		tio in tumoribus præter na	
thodus	283	turam	34
Curandorum omnium tumo		curatio communis aduersus	
rum indicatio	34	omnes morsus & ictus ui-	
Curandi ratio optima tripli		rulentos	346
citer indicatur	43	curatio contusi ulce =	
curandi putridum ulcerū ra		ris	426
tio	456	curatio conuulsionis ex ple	
Curandorum scirrhorū sum		nitudine	286
ma	178	curatio conuulsionis ex ina	
Curandi uulneris contusi se-		nitione	283
cunda intentio	332	Curatio conuulsionis à cras-	
Curandæ phlegmones quæ		sis & uiscosis humori-	
adhuc in generatione est		bus	287
methodus	53	curatio conuulsionis ex cō-	
curandi caui uulneris indica		patientis societate	289
tio secunda	317	curatio delirij ex uulne-	
curatio aduersus uulnerum		re	303
inflāmationes, & absces-		curatio ecchymomatis pro-	
sus	272	pria	336
curatio abscessuum ex ma-		curatio ecchymomatis, quod	
teria pituitam referente		uel contusio uel ruptio ex	
creatorum, quos excre-		citauit	335
scantias phlegmaticas uo-		curatio erysipelatis	91
cant	147	curatio cedematis ut sym-	
curatio calli	634	ptoma est	118

Curadi

curādi œdematis scopus cū	non exquisiti	178
adhuc gignitur	117	
Curatio œdematis ex putui-	Curatio tendonum & liga-	
tofo humore in particulā	mētorum scirrhorum ex	
aliquam confluyente	Gal. & Paul.	180
curatio et iudicia uerruca-	Curatio tumoris in abscessū	
rum	degenerante	43
curatio est rei præsentis, nō	curatio tumorum in uniuer-	
absentis	sum	34
curatio fit per contra-	Curationem tutiorē quæ uul-	
ria	nera habeant	225
curatio ganglij ex Phila-	curatio uaricum	430
grio	curatio ueræ fistulæ	485
curatio gangliorum per chi-	curatio ueri ac legitimi scir-	
rurgiam	rhi, non tamen exquisiti,	
curatio herpetis	& in tophaceam durtiē	
curatio inflationū	omnino insensilem concre-	
curatio lupiæ	ti	172
curatio paralysos ex uulne-	curatio uerrucarum per pē-	
re	nam	113
Curatio particularis ulceris	curatio ulceris exeden-	
arrodentis	tis	454
Curatio per chirurgiā	curatio uulnorum in carne	
Curatio per digerentia	summōtenus accepto =	
Curatio per exedentia	rum	305
Curationis phleg. quatuor in	curatio uulneratorum of-	
tentiones	sum	390
Curatio profusionis sangui-	curatio uulnorum partium	
nis ex uulnere	neruosarum	370
Curatio puncti nerui	curatio uulneris in ue-	
Curatio scirrhi illegitimi, &	na	366
	cur quæ rupta fuere subin-	
	de do-	

de dolorem renouēt	338	Et tantum, non etiam of-	
cur futura alta esse debe-		sis	314
ant	382	De causis ulcerum	405
cutis eadem specie cum ea		De causis, signis, & iudi-	
quæ perijt, regigni non po-		cijs scirrhi legitimi	171
test	323	De causis & signis paraly-	
cutis quàm faciat ad cele-		sis	292
ritatem glutinationis	622	De causis, signis, & iudicijs	
		uulnerum	204
Dartre gallicæ	17	De causis, signis, & iudi-	
De aceti usu in uarijs scirrho-		cijs fracturæ in uniuer-	
sis partibus	179	sum	499
De aperienda uomica	592	De causis & signis luxatto-	
De apposita repositionis		nis ofiũ in uniuersũ	539
perfracti membri figu-		Declinatio in tumoribus præ-	
ra	515	ter naturam	29
De attrahentibus	566	Declinationis et status cede-	
De carbunculo, gangræna,		matris remedia	122
sphacelo, quæ sangu-		Decoctum caricarum	589
neas pusculas uocant	68	De curatione abscessuum in	
De carbunculi curatio		uniuersum	43
ne	71	De curatione tumorum præ-	
De cancroso tumore, quem		ter naturam in uniuer-	
uulgò càcrũ apostematosũ		sum	34
uocant	182	De curatione ulcerum in uni-	
De cancro ulcerato	487	uersum	418
De carne in ulceribus super		De curatione uulnerũ in uni-	
crefcente	427	uersum	225
De cauo uulnere, cum		De desipiscencia, seu deli-	
amissione substantiæ cutis		rio accidente in uulneri-	
utriusque, & carnis subie-		bus	301
		De dif-	

De differentijs ulcerũ, & à quibus sumantur	400	uniuersum	479
De digerentibus commune præceptum	455	Defluxio calida quomodo tu morem creet	20
De dolore	639	De formicis, & alijs uerru- carum differentijs	108
De ecchymosi, seu ecchyma- mate, quod unà cum contu- sione ruptioneque, cute in- tegra manente, inci- dit.	333	De gangrana & sphace- lo	77
De œdemate, & tumoribus frigidis, pituitosis	113	De glândulis, nodis, strumis, et ceteris abscessibus, quas excreſcētias phlegmaticas uocant	137
De epuloticis	614	De glutinantibus	622
De cryspelate, & alijs tu- moribus à bile crea- tis	85	De hæmorrhagia	644
Defensua quæ	566	De herpete	100
Definitionis apostlematis ex aminatione	25	De hydrelæo & lithargyro ceratum	565
Definitio absoluta tumorũ præter naturã, ex Gal. scri- ptis desumpta	425	De hyosciamo notan- da	65
Definitionis tumorum præ- ter naturam accidenta- les	225	De inflammationum seu fla- tulentorum tumorũ cura- tione	127
Definitiones ulceris exami- natio	398	Deligatura	245. 566
Definitio uulneris exami- natio	199	Deligatura alternis diebus soluenda.	457
De fistula	475	Deligatio angusta artubus utilis	512
De fistularum curatione in		Deligatura ante diem ter- tiũ minimè soluenda	364
		Deligatura expulſoria fit infernè sursum	148
		Deligatura fracturæ cum VV iij uulnere	

uulnere accommoda	523	tis	377
Deligatura malignorū ulce		De neuoriorum contusio	
rum duplex	457	ne	385
Deligatura membri morfi		De paralyfi ex uulne	
est supra acceptum uul-		re	290
nus	347	Depascens ulcus	412
Deligaturæ modus in uulne		Depascens uel exedens her	
rato offe	392	pes	101
Deligaturæ ossis fracti mo-		De penicillis siue turundis	
dus	511	(quas tentas uocant) & li	
Deligaturæ quatuor Corn.		namentis formandis, deq;	
Celsi	515	eorū usu multiplici	256
Deligatura retinens	249	De pyroticis	630
Deligatura supprimens san-		De phlegmone uera, et alijs	
guinem	363	à sanguine procreatis tu-	
Delirantium caput oxyrrho-		moribus	48
dino perfundendum	302	De plumbea lamina notan-	
Delirium ex siccitate	302	da	456
Delirij ex uulnere cura-		De potionibus, quæ uul-	
tio	302	neratis exhiberi consueue-	
Delirium quid, & unde na-		runt	265
scatur	301	De profundo & cuniculoso	
Delitescentiæ, regressionis,		ulcere, quod et sinus lati-	
tumorū indicia	31	nus dicitur	462
De localibus remedijs in pa-		De prognosticis seu iudicijs	
ralysi ex uulnere adhiben-		luxationum	540
dis	297	De proprijs ac magis sa-	
De modo conficiendi pul-		mosis ulcerū differentijs,	
uillos, & eorum usu	254	& primò de ulcere uirulē	
De mollientibus	578	to et corrosiuo seu nomo-	
De neruis casim uulnera-		de	453
		Depur-	

De purgantibus	598	alijs telis è corpore extra-	
De purgatione in uulneribus		hendis	229
molienda	262	De scirrho illegitimo non	
De quarta intentione cu-		exquisito, ex uehementi	
randorum uulnerũ	258	refrigeratione, aut exic-	
De quinta intentione, quæ		catione originem sorti-	
medico chirurgo præpo-		to	176
nitur in curandis uulne-		Descriptio cancerosi tumo-	
ribus, quæ est symptoma		ris	183
tum correctio	270	De secunda intentione cu-	
De ratione abluendi	600	rationis uulnerum	245
De ratione curandi luxata		De sedando dolore in uulne-	
in uniuersum	543	ribus	271
De ratione uelut in uul-		De signis et iudicijs inflatio-	
neribus & continui solu-		num	126
tione obseruanda, & à		De signis et iudicijs tumorũ	
medico præscribenda	266	præter naturam in uniuersum	27
De repellentibus	560	De signis & iudicijs scirrhi	
De repellentibus græcorum		non legitimi, ac nõ prorsus	
sententia	561	exquisiti, ex coincidentia	
De resoluentibus	573	creati	177
Dracõtion morbus, siue dra-		De signis, & iudicijs uulne-	
cunculus	12	rum	206
De sanguinis detractiõne in		De signis spasmũ	281
uulneribus	259	De signis & iudicijs fistula-	
De sagittis, plumbis glan-		rum	476
dibus, & globis ferreis,		De syncope ex uulnere	299
ac quibuscunque alijs te-		De sordidi et putris ulceris	
lis, è corpore extrahen-		curatione	459
dis	227	De spasmõ	274
De sagittis, & quibuscunque		VV iij Despe-	

Desperatus scirrhus	579	qui	339
Destructio seu mortificatio		De uerminoso ulcere	432
fistula	481	De ulceribus dyssepuloticis,	
Desudationes Auicennae	16	inueteratis, & ijs quae ca-	
De suppurantibus	387	cocthe, & chironia di-	
De sutura uulneribus facien-		cuntur	436
da	250	De ulcere cum tumore par-	
Detergentia	47	ticula	424
Detergentia quando admo-		De utili materia in uitijs of-	
uenda	331	sum	648
Deterforium medicamen-		De uulnere contuso, ab aëre	
tum	385	alterato, dura callosaq; la-	
Deterfio fistulae	486	bra habente, cruciante, &	
De tertia intentione curandi		pblegmoe, aut alio praeter	
uulneris	246	naturam tumore, implici-	
De tollenda in uulneribus in-		to	329
temperie, quam dyscrasiam		De uulnere cum profusione	
uocant	273	sanguinis ex uenis & arte	
De tumore e serosa substan-		rijs	352
tia creato, quod aquosum		De uulnere ex morsu uel	
apostema nominant	132	iclu animalium, tum ue-	
De tumoribus praeter natu-		nenatorum, tum aliorum no-	
ram, qui inflationes dicuntur		ita noxiorum, illato, & pra-	
Latinis, uulgo autem aposte-		sertim de morsu canis ra-	
mata uentosa	125	biosi	339
De tumoribus qui cum ery-		De uulnere impleto siue ea-	
sipelate societatem ha-		quali	323
bent	100	De uulnere in carne acce-	
De uenenatis uulneribus		pto, & eius differentijs	
scripserunt multi tum re-	303		
centiores tum ueteres, &		De uulnere magno, percus-	
		sim	

sim diuiso, in summo residē	Diaphœnicine seu diapal-	
te, in quo non sola suffi-	ma	190.
cit deligatura ad oras ip-	Diaphragmatis uulnera quā	
sius applicandas & coniu-	do insanabilia	212.
gendas	διὰ πλάσις	651.
De uulneribus neruorum,	Diapompholygos	190.
tendonum, & syndesmo-	διὰ φορητικὰ	573.
rum	Diatetica et pharmaceuti-	
De uulneribus ossiū	ca opus est in curanda pa-	
De uulnere profundo &	ralysi	297.
occulto, sine amissione	Differentiæ ab essentia mor-	
substantiæ, in carne acce-	bi	202.
pto	Differentia abscessuū pitui-	
De uulnere supercrescentem	torum	144.
carnem habente, quam hy-	Differentiæ à natura par-	
persarcosin uocant	tium	202.
Diabrosis	Differētia attrahētū	567.
διακοπῆς αἰγίας Gale. &	Differentiæ fistularū multi-	
Auic.	plices	476.
διὰ χαλκίπewς	Differentiæ fracturarum	
626.	simplices & composi-	
διὰ χαλκίπewς usus	te	497. 498.
Diachylon	Differētia inflationis œde-	
διὰ χυλῶν ἐπλαstrū	matis	125.
διὰ χυλῶν Oribasij	Differentiæ quatuor me-	
Diaireos	lancholiæ non natura-	
διὰ λαοδώνε critonis	lis	167.
διὰ λθαῖου ueterum	Differentia sanguinis pro-	
Diapalma	fluentis ex arteria aut ue-	
Diapedesis unde oria-	na	353.
tur	Differentiæ simplicis fractu-	
		re.

72	496	Diphryges	427.446
Differentiæ sumptæ à materia & figura	229	Discissa quæ dicantur	223
Differentiæ sumptæ à natura uulneris	203	Dyssepulota	436
Differentiæ telorū sex	229	Disidentiū coniunctio	245
Differentiæ tumorū ex sanguine quatuor	50	διονγοτον ulcerus	413
Differentiæ tumorū præter naturam ex pituita	115	Discretio quando sanguis ab arteria, & à uena reijci-	354
Differentiæ ulcerum ab affectibus quibus compli-	401	tur	354
cantur	401	Discrimina spiculatorū	229
Differētiæ uulnerū à tribus potissimū sumuntur	201	Discriminatelorum sumpta à magnitudine, numero, habitu, uiribus	230
Differentiæ uulnerū neruofarum partium	367	Discussio per digerentia medicamenta	154
Diffinitio uulneris	199	Dissolutionis indicia	31
Digerendum quod iam par ti inhaest	439	Distantes oræ uulnenum trifariam in idem adducuntur	245
Digestiū uulneri imponendum	331	Distentio quando remittenda	508
Digito comprimere sanguinem	362	Distinctio remediorū epicurum	615
Digiti luxatio	541	Distortus callus	659
Diligenter inspiciendū, unde sordes in ulcere enata sit	440	Diuisio partium	202
Dini emplast.	628	Diuisio tumoris in suas differentias	6
Dimensio ulceris	403	Diuisio tumoris præter naturā in suas species, iuxta recētorū sententiā	515
διωλόμενα	630	Diuisio uulneris	303
		Diuturna ulcera	414

Doctrinæ prognosticæ uul-		rarum differentiæ simpli-	
nerum	208	ces	497.
Doloris causa	278	Duæ uniuersales proponun-	
Doloris & ardoris mitiga-		tur indicationes in curan-	
torium	98	do cauo uulnere	314.
Dolor fracturarum	522	Duo alij scopi ad summum	
Dolor in delirio sedan-		& generalem scopū asse-	
das	302	quendum necessarij	439
Dolorem in phlegmone le-		Duorum aphorif. Hippoc.	
nientia	64	interpretatio	542
Dolor phlegmonas & flu-		Duo spectāda in omni cauo	
xiones concitat	271	uulnere	316
Dolor quare subinde reno-		Duo spectanda in curatione	
uetur in ijs quæ fracta sue-		ulcerum	418
runt	338	Duplex acceptio phlegmo-	
Doloris sedatio & saniei		nes	48.
eductio	374	Dupliciter coniuncta mane-	
Dolorem sedantia in uulne-		re quæ cōmittuntur	246.
ribus	271	Duplicem esse indicationem	
Dracontij radix	603	morborū, qui adhuc in gi-	
Drageta coctionem adiu-		gnendo sunt	21
uans	128	Duplicibus eget medicamen-	
δρῶπαξ	630	tis ulcus sinuosum	465
Duas esse primarum indi-		Duplex genus abscessuum	
cationū differentias	318	Gal.	26.
Duæ in uniuersum conuul-		Duplex genus ulcerum con-	
sionis causæ	275	tumacium	609.
Duæ purgationis in uulneri-		Duplex indicatio aquosius	
bus adhibendæ indicatio-		randi tumoris	134.
nes	264	Duplex prouenire solet ex-	
Duæ sunt potissimæ fractu-		crementum in carnis ge-	
		neratione	

neratione	316	Electio uena secunde in phleg.	56
Duplex prouenit excrementum in noua carnis generatione	465	Electio uini in syncope	300
Duplex ratio curandi abscessus pituitosos	147	Elephantiasis	11
Dura ulcera	415	Emphysema quid	8
Durities relicta	65	ἐμψλωσσωδῆ	616
Duriciei in particulis cauesc	177	Emplastrū Andromachi ad ulcera dysepulota	448
E		Emplast. Anserini	628
E' centaurio emplast.	628	Emplastrū Auic. discutiens aquosos tumores	136
Ecchymosis seu ecchynoma quid	333	Emplastrum Auic. ex malo punico dulci	273.
Ecchymosis notæ	334.	Emplastrū Auic. infixa stim extrahens	240
Ecchynoma ex quibus occassonibus excitetur	333.	Emplastrum Auic.	123.
Ecchymomatis per initia, nonnihil adstringentium discutientibus, admiscendum	336	155. 434. 460.	
ἐκχυμωτικὰ	587	Emplastrum Bruni & Theodorici ad strumas	155
Ecthymata	16. 103	Emplastrum cicatricæ obducens, imbecillius tamē quā ut cacoëthe persanet	448
Εκπιλωτικὰ	634	Emplastrum de arnoglossopotum carbunc.	72
E' farina pistrinali emplastrum	613	Emplast. Dini	628
Efluxum saniei aut puris bisariam moliri posse in sinu	467	Emplast. è centaurio	628.
ἐλκος ὀδυνηρὸν	413	Emplastrum escharam resoluens	75.
Elleborus	634	Emplastica esse oportet malactica	582
		Emplast. è succo lilij	626
		Emplastrū	

Emplastrū ex malis punicis commodum carbunc.	72	quod usurpatur in Parissorum nosocomio	74
Emplastrum ex melle	384	Enema	471
Emplastrum ex metallicis ad gangrenas & putredines	373	Enumeratio abscessuum pituitosorum	137
Emplast. ex oenoleo	626	ἐπὶ πληγῶν uulnus	623
Emplastrum Guid. acrioris potentie	349	ἐπὶ τοῖς κατὰ γυναικὰ καὶ	652
Emplastrū Gale. ad punctos nervos	376	ἐπὶ τοῖς αἰσθητοῖς	595
Emplastrum Guilliel. à saliceto	83	Epinyctis unde dicta	15
Emplastrum Halyab.	155	ἐπὶ πλῆθους	616
Emplastrum in fracturis ossium	612	Epithymum	187
Emplastrum mitissimum & lenissimū ad ulcera	448	Epuloticorum & glutinantium finis	471
Emplast. nigrū ex lithargyro & oxaleo	626	Epuloticorū facultas	324
Emplastrum nigrum	311	Epulotica propriè dicta quā facultatem habeant	325
Emplastrum phlegm. ad mouendum Gal.	60	E putri casco emplast.	584
Emplastrum præceptoris Guid. ex limacibus, ad strumas	156	Erysipelata circa caput curatu difficilia	91
Emplastrum Razis	121	Erysipelas cum ulceratione	86
Emplastrum Rogerij ad strumas	156	Erysipelatis curatio	91
Emplastrum Theod.	271	Erysipelas in ossis nudatione malum	388
Emplastrū uulgare optimū,		Erysipelas in utero pregnantis	91
		Erysipelas motum sequitur tertianæ febris	91
		Erysipelas non legitimū, & eius species	86
		Erysi-	

Erysipelas phlegm.	86	Exarthrema	535
Erysipelas quid	85	Excipiens fluxum parti-	
Erysipelatōn, qui tumores		cula	20
referunt	9	Excisio cācri ulcerati	488
Error Theod. et Hērici	266	Excisio labrorū Gal.	429
Erroris occasiōē alijs de-		Excrementum duplex pro-	
derunt, qui de medicamen-		uenire solet in carnis ge-	
tis indeterminatē, et citra		neratione	316
distinctionē scripserūt	442	Ex ærugine emplast.	604
Erosio in metallicis per cō-		Ex oenelæo emplast.	626
bustionē edomatur	443	Exhibēda potioniis tēpus et	
ἐγπας ἐοδίομενος	101	modus	266
Erosionis causæ	354	Ex humoribus non naturali-	
Esandice medicamētū	604	bus qui tumores fiāt	23
Escharotica	633.635.647	Ex immodicē affato sangui-	
Essentia tumoris præter na-		ne melancholico fieri bi-	
turam à tribus constitui-		lem exquisitē nigrā	168
tur	235	Ex influxu humorū, qui fiūt	
Ex succo lilij emplast.	626	tumores	9
Euacuatio coniunctæ mate-		Ex ijs qui aquæ metu labo-	
rie per euaporationē	97	rant, pauci seruātur	345
Euphorbium	569	Exitura	5
Euulsio & ligatura	163	Ex lithargyro & oxelæo	
Euulsio uaricis	432	nigrum emplastrū	626
Examinatio definitionis apo-		Ex morsu uirulento ulcera-	
stematis	25	tiones esse prorogandas in	
Examinatio definitionis ul-		longum tempus	352
ceris	399	Ex neruorum uulnere quæ	
Examinatio definitionis uul-		sympt. quicq; affectus obo-	
nerum	199	riantur	368
Exanthemata	16.103	Ex orobo emplastrum	612
		Ex osium	

Ex ossium uulnorum pra-	Facultas glutinantium	622
ua oboriuntur symptoma-	Farina hordeacea	588
ta	Fasciarum circūdatio	512
387	Fasciarum longitudo & lati-	
Expulsoria deligatura	tudo	513
248	Fascia sic deliganda, ut &	
Ex quatuor humoribus na-	contineat, neque adstrin-	
turalibus quatuor fiunt le-	gat	248
gitimi tumores praeter na-	Faustini pastilli	428
turam	Fax combusta aceti uel uini	
23	loco nitri	568
Ex quibus uulneribus excite-	Febris conuulsioni ex pleni-	
tur paralyss	tudine superueniens bo-	
290	num	288
Exquisitus scirrhus non ad-	Febris & tremor si paralyss	
mittit curationem	superueniant, bonū	295
178	Ferendi iudicium ex scri-	
Exquisitum erysipelas	pto de uulneratis formu-	
86	la	218
Ex quo humore gignatur cā-	Ferinos Auic.	172
cer	Fermentum	569
182	Ferulae ab initio non ultra	
Extenuatorum membrorum	adstringēda, quā ut ossa	
instauratio	contineant	515
659	Ferulae quales esse de-	
Externae causae curationem	beant	518
non indicant, sed affe-	Ferulae quando fracturis cir-	
ctum	cumponendae	617
205	Ferulae quando in fractura	
Externae paralyss cau-	cū uulnere adhibēda	524
sa	Fibula	246
292		
Exterunt callos quae		
481		
Extincti carcinomatis no-		
tae		
490		
Ex uulnere, spasmus lethar-		
lis, id est, periculosus		
216		
F		
Facilitia olea		564
Facultas & uis prioris &		
sequentis deligaturae		513

Figura ulceris	403	dant	484
Figura uulnerum	595	Fistula specillo maximè ex	
Finis adurendi	74	plorande	477
Finis glutinantium et epulo		Fistula trifariam destrui =	
ticorum	471	tur	481
Fistulas abolendi tertius mo		Fistula ueræ curatio	485
dus	485	Fistulosum ulcus	413
Fistularum curandi ratio uni		Flos asij lapidis	427
uersalis	479	Fluens humor	20
Fistularum differentie mul		Fluxionis causæ coadiutri =	
tiplices	479	ces	38
Fistulæ destructio seu morti		Fluxio in carbunculo non	
ficatio	481	debet auerti, nec po =	
Fistularum iudicia seu pro =		test	71
gnostica	478	Fluxiones et phlegmonas cõ	
Fistulæ mortificatæ si =		citat dolor	271
gnum	485	Fluxio quibus prohibea =	
Fistularũ notæ à quibus pe		tur	53
tantur	476	Fluxionis sex causæ	20
Fistulæ obliquæ quomodo ex		Fluxionis spatium	20
plorande	478	Fomētũ aquæ calidæ	523
Fistulis potiones ido =		Forcipes dēticulatæ ad eucl	
neæ	479	lendum &c.	241
Fistula quid	462.475	Formicæ Auic.	100
Fistulas repurgans ac de =		Formulæ aliquot instrumen	
tergēs medicamētũ	486	torum, quæ telis extra =	
Fistula si lōgior & trāsuer		hendis idonea sunt	240
sa sit	483	Formula ferendi iudicium	
Fistulæ sinus amplia =		de uulneratis ex scri =	
tio	480	pto	218
Fistulæ si sub cute intro ten		Formula forficis exciso =	
		riæ	

rie	245	Frigidum punctis nervis ini-	
Formula Glossocomi, instru-		micum	375
menti ad gignendum callū		Frigida ulcera	415
in fracturis idonei	532	Frigus convulsionis cau-	
Fotus in spāmo	283	sa	277
Fouendæ ac seruandæ sunt		Frigus convulsis inimi-	
uires in morbis	268	cum	289
Fractura alphitidon fa-		Frigidi tumores	8
cta	497	Fugille	143
Fracturarum aliæ differen-		Fuligo	610
tie	497	Fuscum Nicolai	613
Fractura κατ' ἀποδρα-		G	
σιν facta	497	Galla combusta supprime-	
Fracturarum differentie cō-		sanguinem	366
positæ	498	Galla omphacitis	446
Fracturarum differentie sim-		Galenus agnouit menta-	
plices due	497	gram	18
Fracturarum dolor, inflāma-		Gal. cataplasma ad scir-	
tio, pruritus, uulnus, contu-		rhos	176
sio, gangræna	523	Gal. duo tantū pituitæ gene-	
Fractura quid	496	ra posuit	115
Fractura si sine callo supra		Gal. medicamentū suppress-	
definitū tempus remanse-		sanguinem	365
rit	531	Gallarum reges diuino quo-	
Fractura schidacidon fa-		dam munere strumas cu-	
cta	496	rant	150
Fracturæ simplicis differen-		Gallarū pulli sunt boni cū	
tie	496	esui tñ impositioni morsuū	
Fractura ungularis	497	uirulentorum	350
Friclio in punctura ner-		Ganglion & lupiam eundē	
ui	372	esse affectum	152
		XX	
		Ganglij	

Ganglij curatio ex Phila- grio	152	Gignendæ carnis materia est sanguis bonus	315
Gangliorum per chirurgiã curatio	154	Glandose pustule	19
Ganglium quid	10. 138	Glandula Auic. quæ eadem sunt cum ganglijs Græco- rum	138
Γαγγλιῶνα	68	Glandula Guidonis	138
Gangrænæ & sphaceli st- gna	79	Glandula Guidonis disidet à glandula Auic.	138
Gangrænæ et sphacelus ma- gnas consequuntur phleg- monas	68	Glossocomi instrumenti ad gignendum callum in fracturis idonei formu- la	532
Gāgrænæ fracturarū	523	Glutinantium & epuloticorum finit	471
Gangrænæ quid, et unde or- tum habeat	77	Gradus desiccantium medi- camentorum tres esse sta- tuendos in curatione vulne- ris	324
Gemina intentio in curan- do vulnere cōtuso proponi- tur.	330	Græcorum sententia de repet- lentibus	561
Geminā esse curādi rationē in omni morfu aut iclu ue- nenato	346	Guaiacum, lignum san- ctum	480
Geminum scopū esse in curā do ulcere	464	Guidonis emplastrum acro- ris potentiæ	349
Generatio & descriptio car- bunculi	68	Guido notas canceri tribuit scirrho	171
Generalitas specialitatē an- tecedit	28	Guidonis præcepta de redu- ctione fracturæ	507
Generalis curādæ fracturæ method.	505	Guidonis prologiū de reper- cutientibus	41
Genu in tres partes luxa- tur	538		
Genu laxatio	541		

Halyab.

INDEX.

H

Halyab. emplastr.	155	Hydrophobia unde	344
Hæmorrhagiæ suppressæ		Hydrophobiæ notæ	345
quartus modus	360	Hiera picra	149
Hemina	451	Hieræ Ruffi, Auic. cōpetūt	
Hemina capit uncias septē		canceris	188
et semissem	190	Hyoscyamus	65
Herba Roberti	265.493	Historia de gladiatore in se	
Herpetis uulnera	212	more uulnerato	381
Herpes exedens	89	Horrorem aut metū aquæ,	
Herpes exedens medicamē		nullū præscriptū cōstitutū;	
tū exigit cholagogū	104	tūq; tēpus habere	343
Herpes miliaris siue cen-		Humeflantia et lenientia	
chrias	101	accommoda spasimis	283
Herpes miliaris medicamen-		Humeri luxatio	541
tum desyderat, quod bi-		Humiditas calli generationē	
lem simul et pituitam edu-		impediens	527
cat	104	Humidioris intemperiei cu-	
Herpes quando fiat	100	ratio	422
Herpes solius cutis est exul-		Humor biliosus qui herpetē	
ceratio	102	excitat, admodum tenuis	
Herpetem esthiomenum, et		est	102
erysipelas ulceratū nō om-		Humor fluens	20
nino idem	103	Humoris melancholici eua-	
Herpetis cūratio tres ha-		cuatio competit can-	
bet scopos, siue intentio-		cris	187
nes	103	Humores naturales qui di-	
Herpetis species	100	cantur	22
Hybiscus	656	Humores non naturales qui	
Hydrelæum	98	dicuntur	22
Hydrophobia	343		

I

Iam facti abscessus notæ 32

Ichthyocolle	445	est secunda	71
Ictus uel morsus uenenatorum	189	In carnatiua ossu abscessus, et uulnere uicina	651
ἰχθῆρ	408	In carnatiua seu adglutinatio deligatura	247
Ictus scorpionis quæ symptomata inuehat	342	In carnis generatione duplex prouenire solet excrementum	316
Idem medicamentum detorsorium, sarcoticum, et glutinans	470	Incisio ex aduerso, quando in sinu fieri debeat, et quando non	466
Idoneum carnis producenda medicamentum	317	In complicatis affectibus urgentiori semper primū succurrendum est	424
Ieiuni intestini uulnera	214	Incrementi cedematis remedia	122
Ieiuni intestini uulnus cur in sanabile	215	In curando sinu geminū esse scopum	464
Ignis sancti Antonij	78	In curanda paralyti dietetica et pharmaceutica opus est	297
Illegitimum cedema	114	In curando uulnere contuso gemina curandi intentio proponitur	330
ἰλαοι	109	In curandis uulneribus temperiē nos aëris circūdati spectare conuenit	320
Impages	257	In declinatione phlegmonæ quibus auxilijs sit utendum	61
Impetiginis species quarumtuor	13	Indicatio communis curandi solutam	
Impetigo	13		
In abscessibus pituitosis qualis debeat esse uitæ ratio	147		
In apertione iā suppurati abscessus, septē sunt attendenda	46		
In cancro sensim ac blandè, non semel atque affatim purgandum	188		
In carbūculo uena ē directio			

<i>Solutam unitatem</i>	225	<i>In facto tumore quid agen-</i>	
<i>Indicatio curadi uulneris ca</i>		<i>dum</i>	41
<i>uirtutia</i>	319	<i>Inflamatio quibus maximè</i>	
<i>Indicationes particulares in</i>		<i>uulneribus accidat</i>	272
<i>curado cauo uulnere pro-</i>		<i>Inflamatio fracturarũ</i>	522
<i>ponuntur</i>	314	<i>Inflationum causa</i>	126
<i>Indicationũ primarũ differẽ</i>		<i>Inflationũ curatio</i>	127
<i>tia sunt due</i>	318	<i>Inflatio inueterata</i>	130
<i>Indicatio prima in curan-</i>		<i>Inflationis & œdematis dif-</i>	
<i>da ecchymosi obseruan-</i>		<i>ferentia</i>	125
<i>da</i>	335	<i>Inflationum notæ</i>	126
<i>Indicatio quæ à morbo sumi</i>		<i>Inflationũ prognostica</i>	127
<i>tur, principium tantũ est</i>		<i>In fracturis ossium cõueniẽs</i>	
<i>meth. quæ de medẽdo insti</i>		<i>medicamentum</i>	612
<i>tuitur</i>	203	<i>Ingẽti dolori primò succur-</i>	
<i>Indicia regressiõis et deli-</i>		<i>rendum</i>	370
<i>tescentiæ</i>	31	<i>In indicatione quæ à na-</i>	
<i>Indicia & signa uulnerum</i>		<i>tura partium desumitur,</i>	
<i>neruosarũ partium</i>	363	<i>quatuor potissimũ spectan-</i>	
<i>Indicationes tumorum cu-</i>		<i>da esse.</i>	36
<i>randorum pro tumoris</i>		<i>In longum tempus proro-</i>	
<i>differẽtia, et laborãte par</i>		<i>gãdas ulcerationes ex mor-</i>	
<i>ticula</i>	35	<i>fu uirulento</i>	352
<i>Indicatiões uniuer-sales due</i>		<i>In nervi punctura uulnus</i>	
<i>proponuntur in curado ca</i>		<i>diu apertum seruandum</i>	
<i>uo ulcere</i>	314	<i>est</i>	370
<i>Indurationis tumorum indi-</i>		<i>In nouæ carnis generatiõe</i>	
<i>cia</i>	31	<i>duplex prouenire excrea-</i>	
<i>In erysipellate phlegmono-</i>		<i>mentum</i>	465
<i>so competit phleboto-</i>		<i>In omni cauo uulnere duo</i>	
<i>mia</i>	94	<i>speculanda</i>	316

In omni conuulsione cere-	nerui punctura obseruan-
brũ corroborandum 290	de 371
In omni morſu & icſu uene-	Intectio ſpecialis ac præcipua
nato gemina eſt curãdĩ ra-	curandĩ uulneris in carne
tio 346	accepti, una eſt. 305
In offe male ferruminato	Intentiones ſiue ſcopi cura
quid agant chirurgi recen-	tionis herpetis 103
tiores 529	Internæ paralyſis cau-
In ofibus nudatis quæ uitari	ſe. 292
da 607	Interpretatio duorum apho-
In quibus conſpirēt, & inui-	riſm. Hippoc. 542
cem diſſideāt uirulēti mor-	Interpretes materiæ chirur-
ſus, & non uenenati 340	gorum 556
In quibus etiam fibula adhi-	In tollendis diſpoſitionibus
enda 624	cum ulcere complicatis,
In quibus ſuendum 624	duplex cõſiliũ eſſe 420
In quibus uulneribus uten-	Intentio occaſionis eſt prin-
dum turundis & linamen-	pium curationis tumorum
tis 256	præter naturam 37
Inſanabilia diaphragmatis	Inueteratum cœdema quomo-
uulnera quæ 212	do curetur 118
Inſtrumentatilis atque inſi-	In uulneribus præualidis
xis alijs extrahēdis acco-	ſanguinem mittendum eſ-
moda 231	ſe 259
Inſtrumētōrũ inuēctio 229	Ionthi 15
In ſuppuratis bubonibus cur-	ἰσδορίπερις 595
fiat ſectio per tranſuer-	Iugularium uenarum uulne-
ſum 46	ra 214
Intentiones in curandis uulne-	ἰσχαμὰ 647
ribus obſeruandæ 226	Iſatis ſatua 635
Intentiones quatuor in	Iudicia abſceſſuum 33
	Iudicia

Iudicia abſceſſuum pituito-	unde petantur	206
forum	L	
Iudicia cancri euidentis non	Laborans profluuiū ſanguiniſ claudat oculos, aut	
ulcerati	loco obſcuriore continetur	304
Iudicia carbunculi		
Iudicia de ecchymoma =	Lacertæ caput	111
te	Ladanum	609
Iudicia diſſolutionis	Lamina plumbea	151.
Iudicia oedematis	491. 528. 619	
Iudicia eryſipelatis	Lana ſuccida	129. 380
Iudicia & curatio uerruca	Lanfrancus definiuit ulcus	
rum	putridum	412
Iudicia & ſigna inflatio =	Lapidis aſij ſloſ	427
num	Lapis mylites	180
Iudicia fracturarum	Lapis pyrites	180
Iudicia phlegmoneſ	Larigna potior eſt terebin =	
Iudicia ſeu præſagia paralyſis	thina in malignis ulceri =	
Iudicia ſcirrhi	bus	619
Iudicia ſcirrhi illegitimi &	Latum telum ab ea parte	
non exquiſiti	qua uenit extrahēdū	235
Iudicia ſinuum	Laus aliqua Arabum & po	
Iudicia ſphaceli & gangræ	ſterorum	556
næ	Laus operis Ioann. Tagaul =	
Iudicia ſeu præſagia ſpaf =	tij	559
mi	Leges in uſu malagma =	
Iudicia tumorum aquoſo =	tum	579
rum	Lemnium ſigillum	444
Iudicia tumorum præter na	Leniunt dolorē phleg.	64
turam in uniuerſum	Lepra	12. 13
Iudicia & notæ uulnerum	Leuce Græcorū & Celfi eſt	
	XX iiij Punicorum	

Punicorum albaras	13	in uulneribus	357
Leucophlegmatia	132	Locus affectus ulcere	403
Leucophlegmatia ad œde-		Locus in Cor. Celfo emēda-	
matū species refertur.	10	tus.	482
Lichenæ	12	Loco nitri fax cremata ui-	
Lienis uulnera	215	ni uel aceti	568
Ligamentorum & tendonū		Locus strumarum	146
scirrhus. curatio ex Gal.		Lotis metallicis tutius est	
& Paul.	180	uti quā nō lotis	445
Ligamenta uulnerata ualen-		Lumbrici in rosaceo deco-	
tissima tollant reme-		li	392
dia	369	Lupia	139
Ligatura & euulsio	163	Lupiam & ganglion eundē	
Lignum sanctum, guaia =		esse affectum	152
cum	480	Lupiae curatio	151
Linamentorum & turunda		Lupinus	603
rū usus & materia	257	Lupus cur appelletur qui =	
Linimentum	123. 284.	busdam cancer ulcera =	
461		tus	493
Linimentum phlegm. Ha =		Lupus morbus	140
lyab.	58	Luxationū à situs differētia	
Liquoris balsami Mesuae do		modi sumpti	537
tes	297. 299	Luxatio capitis	537
Litbarg. nutritum Rasis et		Luxatio cum fractura si eue	
Auic.	620	nerit	549
Lixiuuium ficulneum	638	Luxationum curandi ratio	
Loca exulcerata quibus in =		in uniuersum	543
ungenda	106	Luxationum omnium signa	
Localium remediorum quin		cōmunia, à tribus potissi =	
que genera, quibus hæ =		mum sumuntur	539
morrhagiæ supprimuntur		Luxationū prognostica seu	
		iudicia	

iudicia	540	Malleoli & poplitis uenae	
Luxatio quid, & quae sint		quando secandae	262
luxationum differentiæ, &		Mali aut boni indicis notæ	
quot modis ossa luxen-		in fractura cranij	504
tur	535	Malicorium	446
Luxatio uertebrae spinae	538	Malua	492
M		Malum portendunt tumores	
Macedonicum tetrapharmacum	591	de repente detumescen-	
Magna ex parte lethalia uul-		tes	207
nera quæ	210	Malū punicū dulce	426
Magna redduntur uulnera		Malum uulnus	225
trifariam	260	Mannæ & thuris usus post	
Magnitudo strumæ	146	incisionem, & eorum ui-	
Magnorum ossium præcissio		res	47
cum exitu medullæ pericu-		Materiæ antecedentis sub-	
losa admodū est	388	tractio in nervi punctu-	
Maiores uulnera in demorsis		ra	371
à rabido cane, minus ue-		Materia attrahentium	566
rēda quāminora	351	Materia cephalicorū	611
Malaclica quomodo differāt		Materiæ chirurgorū inter-	
à pepticks	588	pretēs	556
Malagmatum natura & u-		Materia chirurgorū unde pe-	
sus	578	tenda	556
Malagmatum quæ usi in pan-		Materia decoctorum	641
da	586	Materia & usus turundarū	
Malæ saniei notæ	410	& linamentorum	157
Maleficks ulceribus tibiae		Materia gignendæ carnis est	
rum conueniens empla-		sanguis bonus	315
strum	613	Materia particularis attra-	
		hentium	567
		Materia particulariū mol-	
		lientium	

lientiam	579	Medicamentum callū fistula	
Materia particularis resolu-		rum extensum & incar-	
uentium	574	nans	486
Materia pituitosorum absces-		Medicamentum carni pro-	
sum	144	ducenda idoneum	317
Materia pyroticorum	631	Medicamentū cirrhū	474
Materia puluillorum	255	Medicamenta cirrha &	
Materia refrigerantium ex		phæa	472
Gal.	96	Medicamentum compositum	97
Materia reagentiū herpe-		Medicamentū cruentis aptū	
tem	105	uulneribus	307
Materia repellentiū	562	Medicamenta dyspepulis et	
Materiarū recursus ad inte-		malignis ulceribus sanandis	
riora	65	accommoda	440
Materia scirrhorum causæ		Medicamenta discussoria	
tractanda	175	per digerentia	154
Materia suppurantiū	588	Medicamen epuloticū opti-	
Materia tumorū præterna-		mū, quod δὲ ἀλσέως in	
turam	620	scribitur, ad Critonem re-	
Matricis uulnera	214	latū, callosis, ueteribus, &	
Maturantia seu supuran-		curatu difficilibus ulceri-	
tia	158	bus apprimē idoneū	449
Maturatiuum Auic.	74	Medicamentum ex charta	
Maxilla inferior quā luxa-		combusta	469
tur	537	Medicamentum ex pompho-	
Medicamentū ad fistulas lō-		lyge	384
gē optimum	486	Medicamentū fistulas repur-	
Medicamentū ad maximas		gans ac detergens	486
hyperfarcoses	428	Medicamentū incarnans &	
Medicamenta aperiētia uo-		glutinans	472
micis	596		

Medica=

Medicamentū Oribasii mol	= non naturalis	167	
litorium ad ganglia	153	Melancholicus succus ex in	
Medicamentū Pauli ad stru	teruallis uacuandus	491	
mas maturandas	158	Mel anacardinum	632
Medicamenta putridis con	Meliceris	141	
secrata	80	Meliceratum	469
Medicamenta quibus usus	Melligo passæ uue	590	
est Gale. in neruis punctis	Melior est. lēso quā		
uulneratis	375	mors	272
Medicamentū Rasis ad scir	Melius ac tutius scalpello		
rhos emolliendos & di	quā ruptorio aperiūtur		
scutiendos	176	abscessus	33
Medicamenta scirrhis accō	Membri demorſi aut icli ana		
moda	175	putatio	352
Medicamentum suppressans	Membrorum particularium		
sanguinem	355	uulnera quando morta	
Medicamen ualidē exedens	lia	217	
absque morſu	165	Membrum demorſum supra	
Medicamentum ualidius ad	uulnus deligandum	347	
chironia ulcera ex Aſcle	Membrum perſractū pror		
piade	450	ſus immotū ſeruandū	511
Mediocre medicamētum ad	Membrum ſi ex attritu cor		
moderatē maligna ulcera	rumpatur	530	
idoneum	449	Membrum ſyderatum ſta	
Medullæ	178. 582	tim reuocandum	77
Medulla & adeps	568	Mendicus lue ueneræ cu	
Medulla nucis auellane car	ratus	569	
bunculos maturat & rum	Mentagra	17	
pit	72	Metallica	610
Medulla panis	271	μετασχηματιζα	630
Melancholia naturalis, &	Methodus curæ pblegmo		
	nes		

nes quæ adhuc in genera-	Misy	444
tione est 53	Moderatè siccantia medica	
Methodus eximèdi tela sum	menta simplicia	444
pta indicatione ab ipsorum	Modi luxationũ à situs dif-	
differentijs 234	ferentia sumpti	537
Methodus extrahendi tela	Modi quinque suturæ ag-	
infixa, sumpta à sede affe	glutinatoriæ	250
ctæ indicatione 236	Modus ac ratio adhibendi	
Methodus generalis curan	ferulas	519
dæ fracturæ 505	Modus alius supprimendi	
Methodus Hipp.' sanandi ca	sanguinem qui statim flu	
ui ulceris 314	xurus est	362
Methodus inducendæ cicæ	Modus deligandi sinus post	
triciis 334	glutinatorij medicamenti	
Metridatum 289	impositionem	472
Metus aquæ aut horror nul	Modus & tempus potionis	
lum habet præscriptũ &	exhibendæ	266
constitutũ tempus 343	Modus & tempus reponen	
Mylites lapis 180	dæ suturæ	254
Minium 603.638	Modus euphorbij & simi-	
Myrrha 391	lium	569
Myrmecia & acrochordo-	Modus extrahendi tela in-	
nes quibus inuicem disti-	fixa duplex	231
deant 109	Modus extrahendi instru-	
Myrmeciarũ cũ summa cu	menta	229
te æqualiũ curatio 112	Modus incidendi et uellen-	
Myrmeciarum noua curatio	di strumas, ex Albucasi et	
ex Gal. 112	Leonida	159
Myrmecia uerrucæ 111.	Modus inueniendi instru-	
108.110	menta	229
Murum de axungia 581	Modus repellentium medi-	
	caminum	

caminum	3560	lium duplices	340
Modus secundus sistendi san-		Morsuum ac punctuū uene-	
guinem	358	natorum notæ	341
Modus tertius sistendi san-		Morsus à uipera uinitor si-	
guinem	359	bi digitū amputauit	341
Modi tres sistendæ hæmor-		Morsus canis rabiosi per	
rhagiæ	355	initia nihil molestiæ ad-	
Modus uacuationis ex qui-		fert, præter quàm ex uul-	
bus indicetur	261	nere dolorem	342
Modus ulceris & ratio ge-		Morsus non uenenati	340
nerationis eius	403	Morsus omnis quoddam ui-	
Modus usus succi solani	492	rus habet	340
Morbilli	16	Morsus oris uētriculi cōuul-	
Morbilli ex herpetum sunt		sionem excitat	290
genere	103	Morsus uel ictus uenenato-	
Morbi magnitudinem in-		rum	289
dicatricem esse purgatio-		Mortificationis causæ	78
nis adhibendæ in uulneri-		Mortificatæ fistulæ si-	
bus	263	gnum	485
Morborum uerus curator		Mortificatio seu destructio	
quis	204	fistulæ	481
Morborū omniū qui adhuc		Moschionis med.	657
in gignēdo sunt, duplicem		Motus & nervosa substan-	
esse indicationem	21	tia adglutinationem im-	
Morbus comitalis	280	pediunt	213
Morbus Neapolitanus	18	Mox futuri abscessus signa	
Morbus Venereus quando		ex Auic.	31
primū in orbē irrepst	18	Mucosus humor absce-	
Mordacia medicamēta quid		dens	660
efficiant	438	Mūdificatio & corrosio	161
Morsus ac punctus anima-		Mulsū	469
		Multiplices	

Multiplices differentiae si-	rum	208
stularum	476	Ne quid labris uulneris in-
Multiplex materia mecha-		tercidat cauendum
nica	649	308
Multiplex usus attrahen-		Nervi caesim uulnerati &
tium	566	nudati curatio
Multitudo strumarum	147	383
Mundificatiuum ex apio	74	Nervi & tendonis punctu-
Muscus	656	ra
Musculus aut nervus inter-		216
dum per transuersum pra-		Nervi in fistula erosi no-
eidendus	290	ta
		477
		Nervi puncti curatio
		370
		Nervi, uenae, arteriae, inter-
		dum diuisae coeunt
		222
		Neruis amicum medica-
		men
		605
Nata	10.142	Neruo denudato nihil acre
Nata uel napta ad steato-		admouendum
ma spectat	143	384
Natura epuloticorum	514	Neruorum nomine apud Cel-
Naturae fertilitas in mate-		sum ligamenta intelli-
ria chirurgorum	556	guntur
Naturalis bilis & non natu-		541
ralis	87	Neruo nudato oleum non est
Naturales humores qui di-		admouendum
cantur	22	385
Natura malagmatum	578	Neruorum contusio promi-
Natura partium	607	scuam habet cum ecchymosis
Natura subieclarum parti-		tum generationis tum cu-
cularum opifex est carnis		rationis rationem
regignenda	316	386
Natura suppurantium	587	Neruorum uulneribus acco-
Necessitas ac utilitas do-		moda medicamenta qualia
ctrina prognostica uulne-		esse debeant
		380
		Neruosarum partium uulne-
		rum curatio
		370
		Neruosarum partium disse-
		rentiae

rentiæ uulnerum	367	Nomine periculi quid signi-	
Nervosa substantia & mor-		ficetur	208
tus adglutinationem im-		Non curationem sed affectu	
pediunt	213	indicat causæ externæ	205
Nervosis partibus inflama-		Non debent remoueri ante	
tis delirium accidit	301	diem tertiu, quæ cruento	
Nervus aut musculus inter-		uulneri primum apposi-	
dum per transuersum in-		ta sunt	308
cidendum	290	Non esse de nominibus con-	
Nihil differre à morbo cau-		tendendum	404
sam coniunctam, quoruna		Non est reprimendum her-	
dam opinione	25	pes nisi multus sit uitio-	
Nihil frigidu nudato neruo		sus succus	104
admouendum	384	Non legitimus erysipelas	
Nigra ulcera	415	& eius species	86
Nigrum emplastr. ex lithar-		Non naturales humores qui	
gyro & oxaleo	626	dicuntur	22
Nigrum med. Aesculapij	656	Non naturalis melancholia	
Nitri loco sex cremata ui-		quatuor differentiæ	167
ni uel aceti	568	Nō opera naturæ sit detra-	
Nodi Auic.	140	ctio carnis, sed medica-	
Nodus	140	mentorum	328
Nome	412	Non sunt propriæ differen-	
Nomē cæcri ad duo morbo-		tiæ, sed uerius complicati	
rū genera extēditur	182	affectus	396
Nomina solutæ unitatis	200	Non sunt relinquendi uulne-	
Nomine ambiētis nos aëris		rati sine auxilio	220
quid intelligendum	320	Non uenenati morsus	340
Nominibus parū fidendum		Non unus est morbus, ulcus	
propter diuersum usum eo-		habens carnem supercre-	
rum apud authores.	14	scens	327

Non

Non unum idemq; medica-	Notæ iā facti abscessus	32	
mentum omnibus corpori	Notæ ὑδροφοβίας	345	
bus mederi potest	441	Notæ indurationis	31
Nota de plūbea lamina	456	Notæ in fistula crosti ner-	
Notāda de hyoscyamo	65	ui	477
Notæ abscessus uelamento		Notæ inflationum	126
inclusi	145	Notæ malæ saniei	410
Notæ arsenici legitimi ef-		Notæ morsuum ac punctuū	
fectus	489	uenenatorum	341
Notæ boni ac mali pu-		Notæ ossis cariosi	478
ris	410	Notæ ossis fracti & sua se-	
Notæ boni aut mali indicis		de moti	510
in fractura cranij	504	Notæ ossis fracti recte com-	
Notæ canceri euidētis non		missi	504
ulcerati	184	Notæ ossis perfracti callo	
Notæ canceri per initia con-		firmari incipientis	531
fusæ atq; obscuræ	183	Notæ ossis uitati	433
Notæ carbunculi	69	Notæ paralysis curabilis,	
Notæ cerebri primariò af-		aut incurabilis	296
fecti in paralyti	292	Notæ paralysis initio spi-	
Notæ coitionis altarum si-		ne affecto	293
nus partium	473	Notæ puris optimi ac deter-	
Notæ conuulsionis ex reple-		rimi ex Hippoc.	34
tione	281	Notæ quæ in cancro futu-	
Notæ ecchymosis	334	ram exulcerationem por-	
Notæ & iudicia uulnerum		tendunt	186
unde petantur	206	Notæ scirrhi	171
Notæ extincti carcinoma-		Notæ scirrhi illegitimi &	
tis	490	non exquisiti	177
Notæ fistularum à quibus		Notæ syncopæ proximè in-	
petantur	476	stantis	299
		Notæ	

Notæ spasmī ex consensu cerebri	282	Nux rancida	574
Notæ suppurationis	31	O	
Notæ tumorum aquosorum	133	Obliquæ fistulæ quomodo explorandæ	478
Notæ tumorum præternaturam uniuersales	27	Obseruanda in omni conuulsione curanda	283
Notæ ueræ ac legitimæ phlegmones	51	Octo differentiæ tumorum præternaturam ex pituita	115
Notæ ueri erysipelatis	89	ὀδυνὰς ἐλκος	413
Noua nomina quædam tumorum apud recentiores medicos	10	Oedematis curationis capita	124
Noxæ ex amplis sectionibus	46	Oedema duplex	114
Noxæ suppressæ saniei	592	Oedematis ex pituitoso humore in particulâ aliquâ confluente curatio, eiusq; scopi	117
Nucis auellanae medullæ carbunculos maturat & rum pit	72	Oedema inueteratum	125
Nudata ossa à frigido malignopere offenduntur	388	Oedematis inueterati curandi ratio	118
Nudato neruo & uulnerato oleum non est admoendum	385	Oedema morbus	125
Nudatus neruus uehementem medic. uim ferre non potest	383	Oedema morbi accides	124
Nullum præscriptū cōstitutumq; tēpus habet horror aut metus aquæ	343	Oedema quid	113. 132
		Oedematis ut symptoma est curatio	118
		Oedema ut symptoma quibus maximè accidat	114
		Oenelæum	653
		Oesipus	129
		Olea adstringētia uitanda in punctura	

punctura nervi	375	uinum succurrit	300
Olea anodyna quæ refrige-		Omnis ferè morsus habet	
rant	641	quoddam uirus	256
Olea commoda	571	Omnis morsus uirus quod-	
Olea ecclilotica	635	dam habet	340
Olea fasciitia	564	Omnium morborum qui adhuc	
Oleum	568	in gignendo sunt, duplicem	
Oleum è floribus rorisma-		esse indicationem	21
rini	642	Omnium phlegmonarum com-	
Oleum liliorum cum cro-		munis generatio	38
co	574	Omnium tumorum præter na-	
Olea malactica	580	turam & abscessuum cura-	
Oleum nudato nervo et uul-		tio uniuersalis	34
nerato, non esse admouen-		Omphacium	563
dum	385	Opifex regnande carnis	
Olea παρρηγορικῆ	640	subiectarum particularum	
Olea refrigerantia & ad-		est natura	316
stringentia	457	Opinione quorundam nihil	
Olea resoluentia	574	differt causa coniuncta à	
Oleum ricininum	179	morbo	25
Oleum sabinum	180. 374	Oppilantia	561
Olea spasmò ex plenitudi-		Optimam curationem tripli-	
ne conferentia	288	citer indicari	43
Oleum terebinthinum	642	Optimum, optimum uulneri me-	
ὠμὴ λύσις	97. 589	dicamentum uinum	309
Omnem ecchymosin uacua-		Ordo dicendorum	443
tionem indicare	336	Ordo tractandorum in hoc	
Omnia ulcera per sanans em-		libro	36
plastrum	613	Oribasii medicamentum molli-	
Omnibus syncope uexatis		torium ad ganglia	153

Orificij

Orificij sinus deorsum spe=	lenda	389	
stantis curatio	466	Ostium syderatio	77
Oris sucilio in morsu uene=	Ostium uulnus	387	
nato confert	347	Ostracodermorū testæ con=	
Ortus strumarum	147	crematæ	446
Ossa puerorum fracta coale	Ostreauia	670	
scunt	223	Os uasis quomodo obstrua=	
Ossa puerorum per se co=	tur	359	
alescunt	388	Oui candidum quare uulne	
Ossa quando iterum fran=	ribus admoueat	306	
genda	529	Oui candidum cum rosa =	
Ossa quæ inter se dehi=	ceo	653	
scunt	536	ὄξάλμῃ fit ex aceto & sa=	
Ossa quæ propriè luxan=	le	173	
tur	536	Oxaleum	379
Ostium extantiæ	509	Oxymeli	369
Os fractum deligandum es=		P	
se & quare	511	Panalithes	656
Os fractum quare non coale		Panis medulla	271
scat	221	Papularū eruptiones	103
Ostis cariosi notæ	478	Papulæ duplices Celso	17
Ostis fracti & sua sede mo		παρηγορικὰ καὶ ἀνώδυ=	
ti notæ	510	να	640
Ostis perfracti callo firma=		παρηγορ medicamen =	
ri incipientis notæ	531	tum	583
Ostis fracti rectè commissi		Paralysis ab ictu uel cæ=	
notæ	504	su	295
Ostis utiati notæ	433	Paralysis affectus est ægrè	
Ostis uulnerati frustula nec		sanabilis	295
subitò nec magna ui eucl=		Paralysis affectus est cōuul	

I N D E X.

fioni contrarius	291	Particularis glutinatiũ ma-	
Paralyſis curabilis aut incu-		teriæ diſtinctio	624
rabilis notæ	296	Particulares in curandis ul-	
Paralyſis ex quibus uulneri-		ceribus ſcopi	420
bus excitetur	290	Particulares intentiones	
Paralyſis ex uulnere cura-		curandi aquoſi tumo-	
tio	296	ris	135
Paralyſis ex uehementi ner-		Particularis materia attra-	
uorũ contuſione ſeu diui-		hentium	567
ſione	296	Particularis reſoluentiũ ma-	
Paralyſis neruorũ reſpira-		teria	574
tioni ſeruientium	296	Partis ſitum plurimũ con-	
Paralyſis particularis	291	ducere ad hæmorrha-	
Paralyſis quid	291	giam	358
Paralyſis uniuerſalis	291	Partium neruoſarũ uulnerũ	
Pararthrema	535	curatio	370
Parocheteuſis	356	Parua animalia uirulento	
Pars incifa priũs mitigan-		morſui imponenda	350
da	47	Parum nominibus fiden-	
Pars propellens	20	dum	14
Partes motui uoluntarioſa		Paruum ulcus non negligen-	
mulantes	279	dum	623
Particularis cõuulſio	280	Pæſtilli	384
Particulares curadi eryſſipe		Pæſtilli cauſtici	458
latis ſcopi	92	Pæſtilli Fauſtini	428
Particularis curatio ulceris		Pauci ex ijs qui aquæ metu	
arrodentis	455	laborant ſeruantur	345
Particularium emollientiũ		Pauli medicamentũ ad ſtru-	
materia	579	mas maturandas	158
Particula excipiens	20	Pauſanies ſophiſta uehiculo	
		excidit,	

excidit, unde paralyſim in digitis contraxit	295	ronia ulcera in mollibus corporibus	452
Penna ſcit è radicem uerſus abſcindenda	113	Pharmacũ uehemens & mi tigatorium ad cacoëthe,	
Penetrantia uulnera	215	Andromachi	451
Penſilis uerruca	108	Phlebotomia	643
Per caneros ſæpe gâgræna & ſphacelus intelligi = tur	500	Phlebotomia competit in eryſpelate phlegmono = ſo	94
Perfuſiones.	653. 657	Phlegmones cauſæ ſummo = tio	53
Perfuſio ex aqua ſalfa calē te conuenit carb.	71	Phlegmones cauſæ tres	50
Periculi nomine quid ſigni = ficetur	208	Phlegmones curationē que ſymptomata interpel = lant	52
Periculo non uacant uul = nera quæ futuris indi = gent	207	Phlegmone dupliciter acci = pitur	48
Periculofa ulcera	416	Phlegmonas & fluxiones	
Periculofa uulnera	225	conciat dolor	271
Peſtifera lueſem ferè ſemper cōſequuntur carbunc.	70	Phlegmone eryſpelato = des	86
Phœxa & cirrha medica = menta	472	Phlegmone quid	37
Phœnigmus	631	Phlegmonoſi ulceris cura = tio	415
Phagedene	89	Phlyctene	133
Phagedena	412	Picatum ceratum	589
Pharmaceutria & dieteti = ca opus eſt in curanda pa ralyſi	397	Pyrates lapis	180
Pharmacum Galen. ad chi =		Pituita in humorum gene = ratione permixta ſangui = ni	85

Pituita quid	114	Pori magnitudo	522
Pituita quando & quomo=		Porus sarcoides	221
do à propria sua natura		Poscauel pusca	106.425
degenerat	114	Posca aquosa	121
Pituitosi tumores	9	Post scarificationem locus	
Pix & resina	610	aqua salsa abluendus	80
Pix liquida	379	Post quartum diem quæ fie	
Planta noctis	15	ri debent in cruento uul=	
Plantago	620	nere	309
Platyfma	450	Potionis exhibende tempus	
Plethora quid	39	& modus	266
Plumbea lamina	151.456	Potioes fistulis idoneæ	479
Plumbeum uerticellū	153	Potio Guidonis à Cauliaco	
Plumbi uis mirabilis in can		urinam ciens in abscessi=	
crofis tumoribus	191	bus pituitosis	149
Plumbum combustum	445	Potiones quæ in ecchymosi	
Plurima in morbis præter		à recentioribus propinan	
expectationem contin=		tur.	337
gunt	220	Potiones quæ uulneratis ex	
Poplitis & malleoli uenæ		hiberi consueuerūt	265
quando seccandæ	261	Praua oboriuntur sympto=	
Porra	11.108	mata ex ossium uulneri=	
Porracea bilis	87	bus	387
Porracea bilis quomodo gi=		Praua uulnera	207
gnatur	88	Praxis communis	322
πρωσις & πρωπι=		Præcepta obseruanda in sup=	
να	654	pressionem sanguinis	362
Pori, id est, calli substantia		Præcepta quedam de sup=	
unde nascatur	506	primendo sanguine obser=	
Pori generatio	520	uanda	362

INDEX.

Præcipua ac specialis inten- tio curandi uulneris in car- ne accepti una est	305	turam	29
Prægressæ causæ	22	Prioris deligaturæ uis & facultas	513
Præsagia seu iudicia para- lysis	295	Probatio medicamēti	601
Præsagia seu iudicia spas- mi	282	Probatio morsus canis ra- bie perciti, ex Oriba- sio	344
Præsidium optimum adhæ- morrhagias est arsenicum sublimatum	361	Profusionis sanguinis ex ue- na uel arteria causæ	353
Præstantia partis	207	Prognostica doctrina uul- nerum necessitas & uti- litas	208
Præter dolorem ex uulnere nihil primum molestiæ adfert morsus canis ra- bidi	341	Prognostica fluoris sangui- nis	354
Primum artis opus esse, ut cognoscat an sperari pos- sit quod destinat	204	Prognostica inflationū	127
Prima indicatio in curan- da ecchymosi obseruan- da	335	Prognostica quædā de fra- ctura in ueterinis	502
Primarum indicationū dif- ferentiæ sunt due	318	Pro lixiuio aphronitru	130
Primus & secundus appa- ratus cruenti uulneris	309	Proloquium Guidonis de re percutientibus	41
Principium curationis tumo- rum præter naturam est inuentio occasionis	37	Pronœa chirurgos potius quàm epicurea	557
Principium tum. præter na-		Propellens pars	20
		Propolis	567. 379.
		πύσματα	630
		Pruritus fracturarum	523
		Psydraces	16
		Psylli	74
		Psoa	12. 13
		Puerorum ossa diuisa per se	
		ΥΥ	iiij coale-

coalescunt	223.388	Purgans medicamentum in-	
Pulli gallinarum recte come-		terdum conuulsionem in-	
duntur, & uirulentis mor-		ducit	279
fibis imponuntur	350	Purgatio in neruo pun-	
Pulmonis uulnera	213	cto	372
Puulli ad supprimendum		Purgationis in uulneribus	
sanguinem	363	duæ adhibendæ indicatio-	
Puullorum usus, ratio no-		nes	264
minis, materia, numerus,		Purgatio quando in spasms	
figura	255	adhibenda	286
Puluis ad fistulas	605	Purgatio quando in uulneri	
Puluis epuloticus	620	bus necessaria	262
Puluis exiccatorius	456	Puris generatio	408
Puluis optimus uulneri cruc-		Puris optimi ac deterrimi	
to	310	notæ ex Hippoc.	34
Puluisculi quomodo paran-		Pus ἐλαϊώδης	410
di	614	Pus euocans medicamen-	
Puluis Rasis	614	tum	605
Puluis ruber	627	Pus medium est inter sa-	
Pumex	610	niem & sordem	410
Puncti nerui curatio	370	Pus mouentia	62
Punctura nerui & tendo-		Pustula	5.12
nis	216	Pustula albæ	19
Puncturæ dilatatio	374	Pustula glandosæ	19
Puncturam nerui quæ sym-		Pustule malæ & cholericæ	
ptomata comitentur	370	uulgò dicte	100
Punctus ac morsus anima-		Pustula una maiuscula uel	
lium duplices	340	plures exiguæ	69
Punctuum ac morsuum ue-		Putrefactio	66
nenatorum notæ	341	Putridum ulcus	412

Quale

Q	quando non	466
Quale esse debeat specillū,	Quando iterum frangenda	
quod in sinum immitti-	ossa	529
tur	468	Quando liuor locū iam oc-
Qualia in uniuersum medi-	cupauit quid agendū	98
camenta esse debeant, ner-	Quando maximē lethalis	
uorum uulneribus accom-	carbunculus	70
moda	380	Quando phlegmone dege-
Quando admouenda deter-	nerat in abscessum	57
gentia	331	Quando pustulæ miliares
Quando ad uersionem pro-	in ulcus abeunt quid agen-	
perandum	73	dum
Quando crusta à uiuo re-	Quando potissimū sint se-	107
soluenda	candi abscessus	45
162	Quando scirrhus ad suppu-	
Quando ducenda alius in	rationem spectat, quid	
uulneribus	agendum	176
262	Quando secāda uena mal-	
Quando erysipelas exulce-	leoli & poplitis	261
ratur quomodo proceden-	Quando soluenda deliga-	
dum	tura	520
98	Quando speranda resolutio	
Quando & ubi præcipuē	phleg.	61
utendū suppuratibus	587	Quando uulneratis plenior
Quando facienda sectio in	uiclus sit cōcedendus	268
parte opposita	312	Quando uena strumæ est
Quando fiat herpes	100	annexa quid faciendū
Quando flatuosus spiritus	160	289
uenenatus est	131	Quando uinū conuulsis in-
Quando gangrena in spha-	terdicendum	289
celum abit	82	Quantitas arsenici
Quando in sinu exciso ex-	aduerso fieri debeat, &	162
		Quantitas

Quantitas ulceris	403	turam	30
Qua ratione porus uel au-		Quatuor potissimū spectan-	
geri uel minui possit	527	da esse in indicatione, quæ	
Quare canceri nomē hoc ui-		à natura partium desu-	
tium sibi adoptarit	183	mitur	36
Quare os fractum non co-		Quatuor scopi in curatio-	
alescat	221	ne uulneris ossium obser-	
Quarta indicatio curandi		uandi	390
uulneris caui	320	Quatuor scopi particula-	
Quartus modus supprimen-		res in curando legitimo	
de hæmorrhagiæ	360	cedemate obseruadi	119
Quartus scopus qui est ac-		Quatuor tempora tumorū	
cidentium correctio	546	præter naturam	29
Quatuor impetiginis spe-		Quatuor tumorum differen-	
cies	13	tiæ ex sanguine	50
Quatuor indicationes par-		Quatuor tumorum differen-	
ticulares, in curando cauo		tias fieri ex melancho-	
uulnere proponantur	314	lia	169
Quatuor inflamationū dif-		Quatenus refrigerandū in	
ferentiæ ex flaua bile	88	erysipelate	95
Quatuor intentiones cura-		Quæ ad consilium repellen-	
tionis phlegmones	54	tium adhibenda	560
Quatuor intentiones in cu-		Quæ adglutinationem re-	
randi nerui punctura ob-		morantur in fractis ossi-	
seruandæ	371	bus	504
Quatuor legitimi tumores		Quæ à generationis modo	
præter naturam fiunt ex		et ratione sumuntur dif-	
quatuor humoribus	23	ferentiæ, magis ad uul-	
Quatuor modis terminan-		nus pertinet quàm ad ul-	
tur tumores præter na-		cus	395
		Quæ	

Quæ callum firman	657	Quæ membri mixtionem	
Quæ calida adstringūt	562	dissoluunt	78
Quæ cancro ulcerato im-		Quæ miscenda attrabenti-	
ponenda	491	bus	567
Quæ cōplent secundam in-		Quæ nomine ambientis in-	
tentionem	105	telligantur	320
Quæ cruento uulneri pri-		Quædam nomina noua tu-	
mum apposta sunt, ante		morū apud recētiore	
diem tertium remoueri non		dicos	10
debent	308	Quæ notæ in cancro futu-	
Quæ crustā detrahūt	636	ram exulcerationem por-	
Quæ dicātur discissa	223	tendant	186
Quæ ætates, naturæ, et cor-		Quæ ossa inter se debi-	
poris constructiones, stru-		scant	536
mis magis sint exposi-		Quæ ossa propriè luxen-	
tæ	145	tur	536
Quæ fascia uulneri deligan-		Quæ osium squammas ex-	
do aptima	249	cidere faciant	433
Quæ in abscessibus inue-		Quæ particularem pituito-	
niantur	26	forum abscessuum curatio-	
Quæ in curandis malignis		nem euariant	150
ulceribus præcipuè consti-		Quæ partes maximè præ-	
deranda	441	hendant aquosū timo-	
Quæ in fascijs repel-		res	134
lunt	652	Quæ per halitum dige-	
Quæ in statu phleg. conue-		rant	149
niant	60	Quæ perpendat cognitio,	
Quæ in ulcere ponēda	47	quæ habetur per ipsius rei	
Quæ in mittendo sanguine		naturam	203
obseruanda	286	Quæ post quartū diem fie-	
		ri de-	

ri debeant in cruēto uul=	et quæ non	462	
nere	309	Quæ squamas detrahūt 650	
Quæ poſt uſtionem facien	Quæ ſunt attendenda in		
da	435	apertione ſuppurati ab=	
Quæ potiones in ecchymo	ſceſſus	46	
ſi à recentibus propinan=	Quæ ſupprimant ſanguine		
tur	ſtupefaciendo	356	
Quæ potiones uulneratis	Quæ trahunt aduentitio ca		
exhiberi cōſueuerūt 265	lore	569	
Quæ qualitate occulta at=	Quæ uehementer refrige=		
trahunt	rant	563	
Quæ refrigerāt pariter et	Quæ uitare oporteat in ſe=		
humeſcant, nō conueniunt	rulis adhibendis	515	
herpetibus exedenti=	Quæ urinam cieant	149	
bus	105	Quæ uulnera diaphragma=	
Quæ refrigerando ſangui=	tis inſanabilia	212	
nem fluere inhibēt 356	Quæ uulnera difficilē cura		
Quæ rupta fuerunt, cur do	tionem habeant	224	
lorem renouent	338	Quæ uulnera inſanabilia	
Quæ ſanguinē mittendū in	ſint Celſo	224	
dicant in uulneribus 260	Quæ uulnera magna et ex		
Quæ ſanguinem ſiſtant in=	parte lethalia	210	
crāſſando	356	Quæ uulnera tutiorem ha=	
Quæ ſymptomata inuehat	beant curationem	225	
iētus ſcorpionis	342	Qui abſceſſus facilē conco=	
Quæ ſymptomata, quicq;	quantur, et qui per reſo=		
affectus ex neruorū uul=	lutionem maximē termi=		
nere oboriantur	368	nentur	33
Quæ ſinum differentie cu	Quibus auxilijs ſit utendū		
randi rationem cuarient,	in declinatione phleg.	61	

Quibus

- Quibus atluenda sanies de
 neruo uulnerato 385
 Quibus canceris duntaxat
 adblandiendum, uera cu-
 ratione omiffa 490
 Quibus inungenda loca ex
 ulcerata 106
 Quibus maximè uulneribus
 accidat inflāmatio 272
 Quibus notis deprehenda-
 tur callus 521
 Quibus notis deprehēdatur
 simplex ne fit fistula, an
 multiplex 477
 Quibus notis suam testen-
 tur rabiem canes, & pro-
 dant 343
 Quibus prohibeatur flu-
 xio 53
 Quibus remedijs euacuetur
 uirus morfu aut icū in
 corpus ei aculatum 346
 Quibus remedijs syncopæ
 occurratur 30
 Qui canceri radicitus tolli
 debeant, & qui non 185
 Quid agant chirurgi recen-
 tiores in osse male ferru-
 minato 529
 Qui de medicamētis inde-
 terminatè & citra distin-
 ctionem scripserunt, er-
 roris occasionem alijs de-
 derunt 442
 Quid fractura, & quæ sint
 eius differentia 495
 Qui dicatur tumor crudus
 Hippoc. 369
 Quid in principio, & simul
 ipso purgationis cancri
 tempore agendum 189
 Quid luxatio, quæ sint lu-
 xationum differentia, &
 quot modis ossa luxen-
 tur 535
 Quid nomine ulceris intel-
 ligendum 399
 Quid post adustionem &
 resiccationē fistulæ agen-
 dum sit 485
 Quid secunda deligatura
 efficiat 513
 Quid sit ulcus uulgò apud
 chirurgos, & eius diffini-
 tionis interpretatio 397
 Quid super ulcus crustosum
 imponendum 73
 Quid uulnus simplex, &
 quæ sit eius curandi ra-
 tio 306

Quid

Quid uulnus, quæ sint species solutæ unitatis, quot uulnorum differentia, & à quibus sumantur	199	cussatur, nota est denarij	76
Qui nam canceri ulcerati uisionem, aut sectionem desiderent	490	Quo differat spasmus ab epilepsia	280
Quinque auxiliorum genera localia, quibus hæmorrhagia supprimitur in uulneribus	357	Quòd multa puris copia sistenda est colligi in fundo sinus, priusquàm ex aduerso diuidatur	467
Quinque particulares intentiones curandi aquosissimi tumoris	135	Quomodo obstruatur os uasis	359
Quintus modus sistendi sanguinem	360	Quomodo explorandæ fistulæ obliquæ	478
Qui præsertim authores, tum recentes tum ueteres, de uenenatis uulnibus scripserunt	339	Quomodo extergendus cruor	623
Qui succi propriè humores dicantur	21	Quomodo plumbea glans, aut globus, à ferentarijs & leuis armaturæ militibus emissus, extrahatur	228
Qui tumores cum erysipelate societatem habent	100	Quomodo tenuiora metalla fiant	571
Qui tumores fiant ex humoribus non naturalibus	23	Quomodo tumorem creet calida defluxio	20
Quod aptum medicamentum canceris	189	Quomodo urendæ sint tutò uerrucæ	112
Quod sic * stellatim de-		Quomodo uulnus ligari conueniat	247
		Quorum fracta ossa coalescere non possunt, & quorum possunt	505

Quorundam opinione nihil differt coniuncta causa à morbo	25	ta	53
Quot & quibus modis cu- rentur abscessus	164	Ratio curandi sinus seu ul- ceris profundi & cauerno- si, non tamen adhuc callo- si	464
R		Ratio deligandi	623
Rabiosi canis morsus proba- tio ex Oribasio	344	Ratio deligandi artus per- fractos	512
Radix bryoniæ cõfert de- lirantibus	303	Ratio fistulas curãdi uniuers- salis	479
Radices cancri	186	Ratio glutinandi	624
Radix centaurij mino- ris	383	Ratio inueniendæ figuræ, in qua custodire mem- brum perfractum conue- niat	517
Radix dracontij	603	Ratio in oleis	564
Rasis medicamentũ ad scir- rhos emolliendos & discu- tiendos	176	Ratio nominis puluillo = rum	255
Ratio ablucendi metalli = ca	619	Ratio purgandi	598
Ratio abscessuum pituitoso- rum curãdi duplex	147	Ratio uictus in cãcro ulcera- to obseruanda	491
Ratio ac modus adhibẽdi fe- rulas	519	Ratio uitæ in usu escharoti- corum	633
Ratio adhibẽda labris	623	Ratio uiuendi in neruis pun- ctis	371
Ratio curandi cancri ulce- rati	488	Ratio urẽdi metallica	615
Ratio curandi œdema inue- teratum	118	Ratio usus epulotici	621
Ratio curandæ phlegmones ex defluxione concita =		Recentiores à quibus sumãt differẽtias tumorũ præter naturam	69

Recen-

Recentiorum pharmaca & unguenta	620	Remoueri non debent ante diem tertium, quæ cruento uulneri primū admota sunt	308
Recentiorum septa	637	Remediorū per meth. inuentionem præcedere debere, deinde hanc experientia comprobare	376
Recta partium fracturarum inuicem commissio et coaptatio	506	Renum uulnera	214
Recta curadi ratio uulneris contusi	330	Repellendum quod in fluit	430
Rectiss. membri figura quæ dicatur Gal.	516	Repellentia circa initium phleg. adnouenda	58
Recurfus materiarum ad interiora	65	Repellentia cōmunia	40
Regerentiū materia	104	Repellentia & siccātia ulcerum malignorum	456
Regressiōis et delitescētiæ indicia	31	Repellētū materia	563
Regula compositorum sunt simplicia	137	Repellētū modus	560
Rei præsentis est curatio, non absenti	205	Repellentia propriè dicta	40
Relicta durities	65	Repositionis figurā ad duodirectam esse	516
Remediū Cornelij Celsi contra aquæ metum	345	Reprimentia herpetibus exedentibus accommoda	105
Remedia cedemati incrementi tempore adnouenda	122	Reprimentia in aug. phleg. præpollere debēt digerentibus	57
Remedia herpetis ex Paulo	106	Reprimendi tempus in herpete	104
Remedia in phlegmona = rum incremento adnouenda	59		

Resinæ

tur	260	ta	606
Sanguis draconis	627	<u>Sarcotica mixta</u>	612
Sanguis in quibus spasms		Scabies	13
<u>mitti debeat</u>	286	Scabiosa	75
Sanguinis missio cōpetit cā		Scalpello quā ruptorio	tu
cris	188	<u>tius ac melius</u> aperiuntur	
Sanguinis missio confert		abscessus	33
<u>demorsis</u> à cane rabi =		Scarificatio	54.644
<u>do</u>	351	Scarificatio Auic.	429
Sanguinis <u>missio</u> in nervo pū		Scarificationes profundæ	
Ho	371	sunt faciendæ in carbuncu	
Sanguinis profusionis ex		lis	71
arteria uel uena cau =		Scirrhi genera	578
<u>se</u>	353	Scirrhi <u>illegitimi</u> & nō ex =	
Sanguis quid & quottu =		quisiti curatio	178
plex	49	Scirrhi illegitimi et nō exqui	
<u>Sanguisuga</u> adaptantur car		sti notæ	177
bunculis.	71	Scirrhi incurabiles	178
Sanies quid, & eius spe =		<u>Scirrhi</u> tumores	11
cies	407.410	Scirrhus	660
Sanies quibus abluēda	385	Scirrhus canerosus irritatur	
Sanies sordes	316	malactucis	578
Sanies uulgò pro pure malè		Scirrhus duplex	167
usurpatur	408	Scirrhus exquisitus curatio	
Sapa	129	nem non admittit	178
Sarcocolla	445	<u>Scirrhus</u> illegitimus quomo =	
Sarcotica	324	<u>do</u> generetur	176
Sarcoticorū facultas	471	Scirrhus phlegmonodes,	
Sarcotica improprie	608	œdematodes, erysipelato =	
Sarcotica medicamen =		<u>des, exquisitus, canerosus,</u>	
		proprie	

INDEX.

<u>proprie dictus</u>	170	Scorpionis ictus quæ sympt.	
Scolopomacherion	113	inuehat	341
Scopi curandi cedematis cū		Scrofulæ	139
adhuc gignitur	117	Sebum & adeps	580
Scopi curandorū inflationē		Secunda indicatio curādī ca	
tres	128	ui uulneris	317
Scopi curationis herpe =		Secunda intētio curandi uul	
tis	103	neris contusi	332
Scopi distinguendi reme =		Secūduſ modus abolendi fi	
dia	599	stulas	483
<u>Scopi</u> particulares <u>obser =</u>		Secundus conuulſionis mo =	
uandi in curando cedema =		duſ ex repletionē	277
te	119	Secundus modus futura ag	
<u>Scopi</u> particulares curandi		glutinatoriæ	251
eryſipelatis	92	<u>Secundus</u> modus ſupprimē =	
Scopi quatuor in curādā fra		di ſanguinem	358
ctura, quæ per trāſuerſum		ſectio in bubonibus ſuppu =	
facta eſt, <u>medico</u> proponū		ratis cur fiat per trāſuer	
tur	506	ſum.	46
Scopi tres proponūtur <u>chi =</u>		ſectio in parte oppoſita quā	
rurgo in curatione tumorū		do faciēda	312
ex influxu humorū ſactio =		ſectio oliuæ aut <u>myrtbi ſoa</u>	
rum	38	lium imitans	45
Scopi uniuerſales curatiōis.		Sedantia dolorem in uulneri	
eryſipelatis	91	<u>bus</u>	271
Scopuli	15	Semper cor petit uene	
<u>Scopus</u> alius purgationis in		num	341
uulneribus	245	Semper ē directio ſecanda	
<u>Scoria</u> plumbi	446	<u>uena</u> in uulnere	261
Scorpio	570	Senes <u>nix unguā</u> à paralyſi	
		<u>22 ij</u> liberantur	

INDEX.

liberantur	295	dit	434
Sensim ac blande, non semel atq; affatim purgandū in cancro	188	Si caro contusa multū sit la niata	332
Septem attēdenda in apper- tione iā suppurati absces- sus	46.	Si cauus sinus carnē requi- rat	471
Septica	328	Siccitas callo gignēdo obli- stens	527.
Serosum recrementū	132	Sic deliganda est fascia ut cōtineat, neque adstrin- gat	248
Serpentum ac uiperarum usus mire strumosos iu- uat	156	Si cōtusa caro in gangrēnā degeneret	333
Seruādæ ac fouendæ sunt ui- res in morbis	268	Si cum neruo cutis contusa sit	386
Sesiles uerruæ	108	Syderatio ossium	77
Sex causæ fluxionis	20	Syderatū membrū statim re- uocandum	77
Sex telorum differen- tiæ	229	Si dolor unā cū contusione infestet	386
Si ab osse male agglutina- to uetustas iam occupa- uit	529	Si dolor uehemens ad- est	375
Si auxilia profuerint aut no- cuerint	417	Si durities adsit ulceri- bus	458.
Si calida adsit intempe- ries	273	Si erosio nō cedit medicamē- tis	458
Si callus in lapideam duri- tiem cō insignem nimis magnitudinem euase- rit	528	Si febris adsit spāsmo	284
Si caries altē in os descen- sa sit		Si febris uulnerato accide- rit	274
		Si fistula longior et trāsuer- sa sit	483
		Si fistulæ	

Si fistula sub cute intro ten-	num	126
dant	484	
Si fluxio fiat ob partis im-		
becillitatem	421	Signa & iudicia uulnorum
Si fluxio ualenter irruat		neruosarū partiū 368
ad contraria reuellen-		Signa & iudicia scirrhi nō
dum	260	legitimi, ac nō prorsus ex-
		quisiti, ex coincidentia crea-
Si fractura quibusdam ue-		ti 177
lut aculeis carnem diue-		Signa imbecilli sarcotici &
xet	527	acrioris 608
Si fragmenta uelut emoriā-		Signa luxationum omnium
tur	526	communis à tribus po-
Si fragmentum ossis emi-		tissimū desumuntur 539
net	526	Signa mox futuri abscessus
Si fractura sine callo supra		ex Auic. 31
definitum tempus remāse-		Signa spasmi 281
rit	531	Signa tumorū præter natu-
Si frigida intēperies uulnus		rā in uniuersum 27
obsederit	273	Signa uenæ crosæ, & arte-
Signa abscessuum	145	riæ 477
Signa canceri ulcerati	488	Si inflammatio ulcera exer-
Signū cōcreti calli	657	ceat 425
Signa conuulsionis ex inani-		Si iam syncope præsens
tione	281	sit 300
Signa cedematis	116	Si inflāmatio adest cum fra-
Signa corruptionis	31	ctura 514
Signa fracturarum	499	Si labra uulneris fuerint du-
Signa gangrænæ & spha-		ra & callosa 332
celi	79	Si luxatio cū fractura cue-
Signa & iudicia inflatio-		nerit 549
		Si membrum ex attritu cor-
		rum=

rumpatur	530	nem	311
Simplicia sunt regula cōpo-		Syncope in uulneribus un-	
sitorum	1237	de	299
Simplicis fracturæ differen-		Syncope parua mors	300
tia	496	Syncope quid	299
Symptomata interdū cura-		Sinapismus	630
tionem peruertunt	270	Si neq; apertio in imo, si ne	
Symptomata quæ fracturā		que cāuitas tota dissecare	
comitantur	522	possit	468
Simplex ne sit fistula, an		Si nerui uulnerati phlegmo	
multiplex, quibus notis de		ne occupentur aut putre-	
prehendatur	477	scant	372
Simplex uulnus quid, &		Si neruus totus sit præcia-	
eius curandi ratio	306	sus	386
Symptom. nerui puncturam		Si neruus cōtusus est, cutis,	
commitantia	370	uerò nequaquā	386
Symptomata quæ phlegmo-		Si nimius callus superincre-	
nes curationem interpela-		uerit	528
lant	52	Sinus	475
Symptomatiū phleg. corre-		Sinus degenerat in fistu-	
ctio	63	lam	475
Symptomatiū correctio	270	Sinuū differētiæ quibus de-	
Symphytii fluori sanguinis		prehendantur	463
conuenit	366	Sinus fistulæ amplia-	
Sympt. quæ uulneratis acci-		tio	480
dunt	270	Sinuum iudicia	463
Syncopæ proximè instantis		Sinus quid & eius differē-	
notæ	299	tia multiplices	462
Sinus in femore curatus, ci-		Si ossa diuersa inter se con-	
tra ullā ex aduerso sectio-		ferueant, et membrum di-	
		stortum	

Stortum callos firmaue =	rit	528	Si succus qui influit nec	359
Si ossis fractura uulnus quo	que accessit	514	copiosus sit, nec mali =	
Si ossis pars aliqua recessura	est	525	gnus	421
Sinus quibus liquoribus sit	ablundus	368	Si telum altè in carne inse	237
Si partes adiacentes inflam	mentur	457	dit	238
Si particule plures confixæ	fuerint	139	Si telū alius in osse demer	238
Si quinta spine uertebra	afficiatur	294	sum sit	238
Siraon	580		Si telū in opposita processu	237
Si renes aut partes circū =	positæ uulnus accepe =	262	rit	237
Syrion & siraon	589		Si telū in articulo se inter	238
Si sagitta spiculis cincla	est	235	duo ossa demersit	238
Si sexta uertebra affecta	est uel septima	294	Si telū in summa carne in se	236
Si sinus orificium deorsum	spēctet	466	xum est	237
Si sordes in putredinē dege	nerent	460	Si telū ossi inhaesit	237
Sistēdi hæmorrhagiæ modi	tres	355	Si totū ecchymoma per ha	338
Sistēdi sanguinē tertius mo			litum digestum sit	338
			Situm partis ad hæmor	
			rhagiam plurimum condu	
			cere	358
			situs ulceris	403
			Situs uulneratæ partis ap =	
			positus supprimit sangui	
			nem	363
			Si uarix crus occupauit	432
			Si uena strumæ est an =	
			nexa quid facien =	
			dum	160
			Si ulcus arrodatur	417
			ZZ iij	Si ue =

Si uenenat o telo quis ictus	139	Spasmi iudicia seu præsa-	282
est		gia	
Si ulcus sinuosum frigidum	470	Spasmus quid	275
fuert		Spasmus quo modo fiat	
Si ulcus sinuosum calidū fue-	470	Gal.	274
rit		Specialis præcipuaq; in-	
Solani succus	190	tentio curandi uulneris	
Solutæ continuitatis causæ		in carne accepti, una	
uniuersales	204	est	305
Solutæ unitatis nomi-		Speciales causæ tumorum	
na	200	præter naturam	22
Solutæ unitatis uariæ spe-		Species conuulsionis	281.
cies apud Auicennam	200		283
Somnus cõciliadus in spaf-		species ecchymoma =	
mo	285	tis	334
Sordes, sanies	316	Species herpetis	100
Sordes quid	408.409	Species erysipelatis nõ legi-	
Sordis ablutio	460	timi	86
Sordium ulcus	412	Species saniei, & diffini-	
Sori	444	tio	407
Spacium fluxionis	20	Specillum quod in sinu mit-	
Sparadrapum	657	titur, quale esse debe-	
Spasmi ex cõsensu cerebri		at	468
notæ	282	σφακελὸς	68
Spasmi ex uulnere cau-		Sphaceli & gangræna fl-	
sa	216	gna	79
Spasmus ex uulnere leth-		Sphacelus & gangræna ma-	
lis, id est, ualde periculo-		gnas consequuntur phleg-	
sus	216	monas	68
		Sphacelus quid, & eius	
		ortus	

ortus	77	Strigmēta gymnastorū	179
Spiculatorū discrimina	229	Strumæ	10
Spina Auic.	86	Strumæ Corn. Celsi	139
Spina dorſi ueluti carina		Strumæ magnitudo, natu-	
nauiſ	298	ra, locus, multitudo, or-	
Splenes magnorum abſceſ-		tus	146. 147
ſuum	651	Strumis quæ ætates, natu-	
Splenia ſiue plagulæ cur ad		ra, & corporis conſtru-	
hibenda fracturis	514	ctiones magis ſint expo-	
Spōgia lixiuiio imbuta	123	ſitæ	145
Spongia ac paruum empla-		Stupæ aride	332
ſtrum de ſinu ſunt demen-		Subſtantiæ partis conſer-	
da tertio quoque die	473	uatio	258
Spongia ſinubus adhibenda		Succi, qui propriè humores	
qualis eſſe debeat	475	dicuntur	23
Squalentis ac ſiccæ intem-		Succus abundantia	264
periei curatio	422	Succus melancholicus ex in-	
Squama	650	teruallis uacuandus	491
Squāma æris	427. 446	Succus qui influit in ulcere	
Squamma ferri	446	ſi ſit copioſus aut mali-	
Squamas quæ detrahūt	650	gnus	422
Status & declinationis œde-		Succus ſolani	190
matiſ remedia	122	Succorum uſus	491. 564
Status tumorum præter na-		Sulphur	568. 576
turam	29	Summa curandorū ſcirrho-	
Steatoma	141	rum	178
Stercus bubulum	111	Summotio cauſæ phlegmo-	
Stercus caprillū uetus	155	nes	53
Stibi uel ſtibium, uulgò an-		ſummus curationis ſcopus	
timonium	444	malignorum & contuma-	
		cium	

ciūm ulcerum	438	Tela interdum diu in corpo	
Sumach	105	re deliteſcūt, perſanato uul	
Super ulcus cruſtoſum quid		nere	236
imponendum	73	Telephia ulcera	436
Suppurantia ſeu maturan-		Telorum discrimina ſum-	
tia	158	pta à magnitudine telo-	
Suppurationis notæ	31	rum	230
Sutura	245	Telum latum ab ea parte	
Suturæ agglutinatoriæ mo-		qua uenit. extrahen-	
dus ſecundus	251	dum	235
Suturæ agglutinatoriæ u-		Telū ea parte qua uenit ex-	
ſus	250	trahendum	236
Suturæ altæ eſſe debent, &		Telum rotundum & an-	
cauſa	382	guloſum extrahi	
Suturæ incarnatiuæ tertius		tur	235
modus, quattus, quintus		Temperiem aëris nos am-	
251. 252		bientis ſpectare, conue-	
Suturæ reponende tēpus et		nit in curandis uulneri-	
modus	254	bus	320
Sutura ſanguinem ſuppri-		Tempora tum. præter na-	
mens	253	turam à tribus potiſſi-	
Sutura ſanguinem ſuppri-		mum ſuum discrimen aſſu-	
mens	357	munt	29
Sutura triplex	250	Tempora quatuor phlegmo-	
Talpa	10	nes	51
Talpæ uſus	142	Tempora quatuor tumo-	
Tapſia & uiſcum	568	rum præter natu-	
Tolis	651	ram	29
Taxantur noſtri homi-		Tempus & modus potionis	
nes	557	exhibende	266
		Tēpus	

Tēpus & modus reponēda	254	Tetrapharmacum	43.
suturae	254	426.591.613.	28
Tēpus quid insinuet	150	Testudo	10
Tempus ulceris	403	Testudo	141
Tendonis & nerui punctus		Themison ab hydrophobia	
ra	216	liberatus	345
Tendonum & ligamētorum		Theodorici et Bruni empla	
scirrhorum curatio ex		strum ad strumas	155
Gal. & Paulo	180	Theriaca	131
Tentae cannulae	257	Theriaca purgat.	613
Tenuis uiclus	268	Theriaca calfacit	289
Terminthi	19	Theriaca escharā soluit	76
Terra creuthrias	434.	τύλλοι	11
446		Thymia in obsecans pesti	
Tertia causa conuulsionis		ma	109
addita ab Auic.	276	Thymij magnitudo	109
Tertia indicatio curandi		Thymion	11.109.
uulneris caui	319	115	
Tertio quoque die spongia,		Typha exile est triticum,	
ac paruum emplastrū de		specie siligini non dissimile	
sinu demenda	473	mile	173
Tertius conuulsionis mo		Topica auxilia fluoris san	
du ex compatiendi socie		guinis	357
tate	277.	Thuris & mannae usus post	
Tertius modus sistendi san		incisionem, & eorum ui	
guinem	359	res	47
Tertius modus suturae in		Thus & aristolochia	607
carinatiua	252	Thus in quibus tum natu	
Tertius modus abolendi fi		ris, tum uulneribus carne	
stulas	465	producatur	318

Tracheae

INDEX.

Tracheæ arteriæ uulne=	Trifariam fistula destrui=
ra 213	tur 481
Tres adipum naturæ 581	Triplex excrementum ul=
Tres gradus desiccantium	cerum 599
medicamentorum in cu=	Triplex genus deligatu=
ratione uulnerum statuen=	ra 243
dos esse 324	Triplex in curando cancro
Tres intentiones in cura=	scopus proponitur 186
atione scirrhi legitimi ob=	Trochisci asphodelorū 482
seruandæ 172	Trochisci caustici . . . 81
Tres modi agrè sanabilium	Trochisci de arsena 637
ulcerum 406	Trochisci è calce . . . 637
Tremor & febris si para=	Tubulū instrumentū 243
lysi superuenerint, bo=	Tumores calidi, frigidi, cō=
num 295	plicati 8
Tres scopi curandarum in=	Tumor crudus qui dicatur
flationum 128	Hippoc. 369
Tres scopi in curandis tu=	Tumor etiam est inæqualis
moribus, qui ex influxu	Philagr. & Aëtio 139
humorum fiunt, chirurgo	Tumore iam facto quid agē
proponuntur 38	dum 41
Tria eryspelata illegiti=	Tumor in neruorum uulne=
ma 88	re 368
Tria morborum genera tu=	Tumores de repente detu=
moris præter naturam es=	mescentes, malum porten=
sentiam constituunt 2.	dunt 207
13	Tumores eryspelatosi 9
Trifariam distantes ora	Tumores pertinentes ad
uulnerum in idem addu=	pblegmonem 9
cuntur 245	Tumores pituitosi . . . 9

Tumores

Tumores præcipui, qui ex influxu humorum fiunt 9	nomina 10
Tumores præter naturam unde suam essentiam ha- beant 2.13	Tumorum præter naturam cause 19
Tumorum præter naturam speciales cause, præter- gressæ, antecedentes 22	Tumorum præter naturam cause coniunctæ 24
Tumores præter naturam quatuor modis terminan- tur 30	Tumorum præter naturam cause efficientes 7.9
Tumoris essentiam tria in se continere 35	Tumorum præter naturam definitiones accidentia- les 2.25
Tumoris in suas differen- tias diuisio 6.4	Tumorum præter naturam & abscessuū curatio uni- uersalis 34
Tumoris præter naturam diuisio in suas species, iuxta recentiorum senten- tiam 5.14	Tumorum præter naturam iudicia 28
Tumores scirrhost 11	Tumorum præter naturam principium, augmentum, status, declinatio 29
Tumorum accidentia 6.	Tumorum præter naturam notæ uniuersales 27
30	Tumorum præter naturam quatuor tempora 29
Tumorum aquosorum cau- sæ & notæ 133	Tumoru qui ex influxu hu- moru fiunt scopi tres pro ponuntur chirurgo 38
Tumoru differentia à qui- bus sumantur 7.10	Tutiùs ac meliùs scalpello quàm ruptorio aperiun- tur abscessus 33
Tumorum in abscessum de- generantium curatio 43	Tutiùs est lotis metallicis, quàm non lotis uti 436
Tumorum noua quædam apud recentiores medicos	Tutiùs

Putius ferro quàm aduren-	non sanefcat ulcus	437
te medicamento suppura-	Variola	16.103
tus tumor aperitur	Vbi cauteria periculo-	
Turunda	sa	593
Turundarum & linamento	Vbi nõ repellendum	562
rũ usus & materia	Vbi uitanda acria	610
V	Vena è directio est secanda	
Vacuatio à toto corpo-	in carbunc. curat.	71
re	Venarum iugularium uul-	
Vacuatio canceri ulcera-	nera	214
ti	Vena femper è directio est	
Vacuatio eius quod iam in-	secanda in phleg.	56
fluit	Venena non gustu, sed in	
Vacuatio materie antece-	uulnere nocent	139.
dentis, coniuncte	348	
174	Venenum femper cor pe-	
Vacuatiã per alium	tit	341
Valentia medicamenta pur-	Venæ atque arteriæ crofæ	
gantia in uulneribus recen-	signa	477
tibus suspecta esse	Venæ, nerui, arteriæ, inter-	
Valentior intemperies cau-	dum diuifa coeunt	222
sa est imbecillitatis par-	Venæ poplitis & malleoli	
tis	quando secande	261
Vapores à cerebro deliran-	Venæ secande electio ex	
te auertendi	parte uulnerata iudica-	
Varicis euulsio	tur	261
Varicosum ulcus	Venæ secande in phlegm.	
Varicum cū ulcere compli-	electio	56
catarum curatio	Ventriculi, ieiuni intestini,	
Varie cause propter quas	matricis, renum, uesicæ,	
	cystis	

<i>Cystis fellis uulnera</i> 214	<i>Verticellū plumbeum</i> 153
<i>Ventus meridionalis officit</i>	<i>Verum erysipelas</i> 88
<i>ulceribus</i> 418	<i>Verum oedema</i> 114
<i>Vera fistulae curatio</i> 485	<i>Verus morborum curator</i>
<i>Vera Hippoc. methodus san-</i>	<i>quæ</i> 204
<i>nandi caui ulceris</i> 314	<i>Verus scirrhus non exqui-</i>
<i>Veræ ac propriæ ulcerum</i>	<i>situs</i> 170
<i>differentiæ unde suman-</i>	<i>Vesica uulnera</i> 214
<i>tur</i> 402	<i>Vetus adeps ut recens</i>
<i>Veri ac legitimi, non ta-</i>	<i>fiat</i> 581
<i>men exquisiti, & in to-</i>	<i>Viclus paulò plenior, quan-</i>
<i>phaceam duriciem om-</i>	<i>do uulneratis conceden-</i>
<i>nino insensilem concreti</i>	<i>du</i> 268
<i>curatio</i> 172	<i>Viclus puro gignendo a-</i>
<i>Veri erysipelatis cau-</i>	<i>ptus</i> 521
<i>se</i> 89	<i>Viclus ratio in cancro ulce-</i>
<i>Vermes terreni</i> 629	<i>rato obseruanda</i> 491
<i>Vermiculantia ulcera</i> 602	<i>Viclus ratio in uenena-</i>
<i>Verminosum ulcus</i> 413	<i>tis</i> 131
<i>Verruca</i> 11	<i>Viclus ratio in cancro sit-</i>
<i>Verrucarum diuersa gene-</i>	<i>tenuis boniq; succi</i> 137
<i>ra</i> 108	<i>Viclus tenuis</i> 366
<i>Verrucarum iudicia & cu-</i>	<i>Vini, aceti, & lixiuij col-</i>
<i>ratio</i> 110	<i>latio</i> 130
<i>Verruca myrmeciae</i> 11	<i>Vini in syncope electio</i> 300
<i>Verrucarum per medica-</i>	<i>Vini usus interdicens uul-</i>
<i>menta curatio ex Pau-</i>	<i>neratis usque ad diem se-</i>
<i>lo</i> 111	<i>ptimum</i> 269
<i>Vertebrarum spinae luxa-</i>	<i>Vinum</i> 425.563.615
<i>tio</i> 538	<i>Vinū nigrū austerrū</i> 624
	<i>Vinum</i>

Vinū omnibus syncope ue-	spirent	340	Virulentum ulcus	412
xatis succurrit	300	Virus in corpus morſu uel		
Vinum optimū uulneri me-		ictu elaculatum, quibus		
dicamentum	309	remedijs euacuetur	346	
Vinum pro ætatis ratio-		Virus quid	408.409	
ne, diuerſa pollet ſacul-		Virus quoddam habet om-		
tate	310	nīs morſus	340	
Vinum quando & quare		Viſcum & tapſia	568	
conuulſis interdici-		Viſ & facultas prioris &		
dum	289	ſecundæ ligaturæ	513	
Vinum ſubaſterum	469	Viſ medicamenti dixit	Χυ=	
Vinitor morſus à uipera,		Λωπ	585	
ſibi digitū amputauit	341	Viſ morbi indicat	264	
Viperarum ac ſerpentum		Viſ plumbi mirabilis in		
uſus, mire ſtrumofos		cancroſis tumori =		
iuuat	157	bus	191	
Vires in morbis non eſſe		Vitellina bilis	87	
augendas, ſed duntaxat ſo-		Vitellina ex admixtione pi-		
uendas, & ſeruandas	268	tuitæ	88	
Viride Andromachi	591.	Vitæ aqua	310	
604		Vitæ ratio qualis eſſe de-		
Viride Bonantini	628	beat in abſceſſibus pituito-		
Viridis cera	604	ſis	147	
Viride ex herbis	605.	Vitia in articulis	649	
629		Vitiati oſis notæ	433	
Viride æris eſt ærugo	447	Vitiliginis nomine, alphon		
Viride Gal.	608	& leucā comprehendit Cel-		
Viridia ulcera	415	ſus	14	
Virulenti morſus, & non		Vitiligo quid	14	
uenenati, in quibus con-		Vitrum		

INDEX.

Vitrum combustum	446	tia	602
Viuedi ratio in neruis pui		Vlceris complexus cum sym	
flis	371	ptomate	402
Viuedi ratio in scir		Vlceris complexus cum	
rhis	172	sua causa & mor	
Vlcera annua & diutur		ba	402
na	414	Vlceris contusi cura	
Vlcera calida	415	tio	426
Vlcera cancerosa	602	Vlceris curatio in herpese	
Vlcera circumglabra	415	qua est tertius sco	
Vlcera cum contusione fa		pus	106
sta ad suppurationem du		Vlceris definitio	398
cenda	426	Vlceris disrupti, & cum ossis	
Vlceris cum duritie & de		corruptione complicati, cu	
coloratione labroru cura		ratio	433
tio	429	Vlceris dyscrati cura	
Vlcera flava, viridia, aut ni		tio	422
gra	415	Vlceris mundifica	
Vlcera frigida	415	tio	460
Vlcera in quibus partibus		Vlceris nomine quid intelli	
periculosa	416	gendum	399
Vlcera pudendi	607	Vlceris phlegmonosi cura	
Vlcera rotunda	416	tio	425
Vlcerationes ex morsu ui		Vlceris putridi definitio	
rulento in longum tem		secundum Lanfran	
pus prorogandas	352	cum	412
Vlcera totius corporis co		Vlceris sanatio mediocri	
lorem representan		siccatio est	419
tia	415	Vlceru cause antecedentes,	
Vlcera uermiculan		continentes	405
		&&	
		Vlcerum	

Vlcerum cōtūmāciū duplex genus	609	Vlcus omne exsiccati defy- derat	106
Vlcerum differentiae à cau- fis	401	Vlcus putridum	412
Vlcerum differentiae extrin- secūs sumptae	403	Vlcus quid Auicen- nae	398
Vlcerum differentiae maxi- mē propriae	403	Vlcus quid uocetur chirur- gis uulgaribus	398
Vlcerū differentiae unde su- mantur	400	Vlcus quo à uulnere disse- rat	399
Vlcerum prognostica	414	Vlcus rheumaticum	413
Vlcerum triplex excremen- tum	599	Vlcus se renouans	414
Vlcus ante morbum uel in ipso morbo enascēs	416	Vlcus sinuosum duplici = bus eget medicamen- tis	465
Vlcus α'περίστοτον	606	Vlcus sordidum	412
Vlcus apostematofum	414	Vlcus sordidum & pu- tre	459
Vlcus cacoëthes	414	Vlcus supercrescentem car- nem habens non unus est morbus	327
Vlcus cancerofum	413	Vlcus uaricosum	414
Vlcus cauernofum	462	Vlcus uerminofum	413
Vlcus corrosiuum, siue arro- dens	412	Vlcus utrulentum	412
Vlcus crucians	413	Vlmus, & à folliculis a- qua	625
Vlcus crucians	424	Vna est specialis præci- puaq; intentio curandi uulneris in carne accē- pti	305
Vlcus crustofum	69	Vnctiones spasmorū	283
Vlcus cuniculosum	413	Vnde	
Vlcus depascens	412		
Vlcus δ'ὐσχερότον	413		
Vlcus fistulosum	413		
Vlcus fraudulentum	459		

Vnde petenda materia chi-	billis	220	
rurgorum	556	Vnitatis solutæ uariæ spe-	
Vnde dicta epiny =		cies apud Auicen =	
dis	15	nam	200
Vnguenta super tumorem		Vnitio finis primus, quò ten-	
iam apertum applican-		dit is qui fracturam cu-	
da	47	rat	505
Vnguetū ad caneros ulcera		Vniuersalis conuulsio	280
tos	492	Vniuersalis curatio tumorū	
Vnguentum apostolo =		præter naturam & absces-	
rum	158	suum	34
Vnguentum Auic. longè op-		Vniuersalis fistularum curā	
timum	447	di ratio	479
Vnguentum diapōpholygos		Vniuersales in curādo cauo	
Theodorici	190	ulcere intēctiones proponū	
Vnguentum Dini	348	tur due	314
Vnguentum è uermibus		Vniuersales notæ tumorum	
379.629		præter naturam	27
Vnguenti ægyptiaci uis	81	Vniuersalis paralysis	292
Vnguentum ægyptiacum		Vniuersales scopi curatiōis	
73.158.428		erysipelatis	91
Vnguentum gloriæ	629	Vnum idemq; medica =	
Vnguentum mundificatiuū		mentum non in omnibus	
quod ad Dinum refer =		corporibus mederi po =	
tur	124	test	441
Vnguentum Rogerij	152.	Vomitus in uulneribus uti =	
287		lis	264
Vngularis fractura	497	Vsnea quid	123
Vnio in partibus organicis		Vstio	458
semel diuisis est impossi =		Vstio cæcri ulcerati	488
		et ij	Vstio

Vulnus expeditissimum est au-	na prognostica vulne-
xilium demorsis à canera	rum 208
bido 351	Utilitas repellendorum me-
Vulnus quando adhiben-	dicaminum 60
da 82	Vulnera cerebri cur lethala
Vulnus ab igne 635	lia 209. 211
Vulnus cephalicorum 611	Vulnera diaphragmatis
Vulnus δια χαλκί =	quando insanabilia 212
πεως 576	Vulnera ex necessitate le-
Vulnus & materia turunda-	thalia 209
rum & linamento =	Vulnera œsophagi 214
rum 237	Vulnera ieiuni intestini, ma-
Vulnus & natura malagma-	trici, renū, vesicæ, cystis
tum 578	fellis 214
Vulnus & vires thuris & mā-	Vulnera in articulis cacoē-
na 47	the esse 206
Vulnus pastillorum 647	Vulnera in capite musculo-
Vulnus pyroticorum 630	rum 216
Vulnus puluillorum 234	Vulnera lienis 215
Vulnus refrigerantium 646	Vulnerata ligamenta tolle-
Vulnus septorum & escharo-	rant remedia ualentissi-
ticorum 633	ma 369
Vulnus succorum 564	Vulnera magna ex parte le-
Vulnus futura agglutinato-	thalia 210
ria 250	Vulnera maiora in demor-
Vulnus uini interdicens uul-	sis à rabido cane, minus
neratis usque 269	uerenda quam mino-
Vtendi emplastrorum mo-	ra 351
du 591	Vulnera membrorum parti-
Utilitas ac necessitas doctri-	cularium quando ipsis mor-
	talia


talía	217	Vulneris contusi recta curã	
Vulnera penetrantia	215	di ratio	330
Vulnera periculosa	225	Vulneris diffinitio	199
Vulnera plurimum sanabilia	217	Vulneris in carne accepti intentio curandi specialis, & præcipua und est	305
Vulnera pulmonis	213	Vulneris in uena curatio	366
Vulnera quando membris impotentiam adferunt	217	Vulneris seu ulceris finis	398
Vulnera quæ futuris indigent periculo non uacare	207	Vulnerum differentie à parte similari affecta	196
Vulnera, quæ tutiorē habent curationem	225	Vulnerum differentie à parte organica affecta	196
Vulnerati non sunt relinquendi	220	Vulnerum duæ differentie primæ	201
Vulneratis usus vini in terdicendus usque ad curationem	269	Vulnerum figura	595
Vulnera tracheæ arte curia	213	Vulnerum notæ & iudicia unde petantur	206
Vulnera trifariã magna & grauiã reddi	206. 260	Vulnerum partium neruosa rum curatio	369
Vulnera tutiorem curationem habentia	217	Vulnus cordis cur lethale	209
Vulneribus neruorum accõmoda medicamenta qualia esse debeant	380	Vulnus diu apertum seruandum est in nerui punctura	370
Vulneris atque ulceris propriæ differentie	400	Vulnus & ulcus pro eo dem	201

Vulnus

INDEX.

Vulnus fracturarum	523	Vulnus quid Gal.	303
Vulnus ieiuni cur insanabi-		Vulnus simplex ex sola par-	
le	215	tium commissione adglu-	
Vulnus interdum maius effi-		tinari potest	245
ciendum	526	Vulnus simplex postulat	
Vulnus malum	225	tantum adglutinatio-	
Vulnus non simplex	306	nem	306
Vulnus osium	387	Vulnus simplex quid, &	
Vulnus quando per efflu-		etius curandi ra-	
xiones curandū	311	tio	306
Vulnus quid apud recētio-		Z	
res chirurgos	303	Zambana	625

FINIS.



3
a
la
s
at
6
7
6











